

IACOBI
HOLLERII
 STEMPANI, MEDICI
 PARISIENSIS CELE-
 berrimi, De morbis internis, Lib. II.

*Illustrati doctissimis eiusdem authoris scholiis & observationibus
 non antea excussis: deinde LUDOVICI DVRETI
 professoris Regij in eundem adversariis: & Anthony Valetij
 doctoris medici exercitationibus luculentis.*

EIVSDEM HOLLERII

DE { Febribus } DE { Rhemediis natæ totæque in Galeni
 { Peste. } { fibros.
 { } { Materia Chirurgica.

*Qua omnia Ant. Valet. Medici opera auctiora &
 castigatiora in lucem prodeunt.*



PARISIIS,
 Apud Carolum Macæum, sub signo Pyramidis.

1572.
 CVM PRIVILEGIO REGIS.

1

1

OFFICE

CHIEF OF POLICE

CHICAGO

RECEIVED

DEPARTMENT OF POLICE

CHICAGO

CHIEF OF POLICE

CHICAGO

CHIEF OF POLICE

CHICAGO

CHIEF OF POLICE

CHICAGO

CHIEF OF POLICE

CHICAGO

CHIEF OF POLICE

CHICAGO

CHIEF OF POLICE

CHICAGO

CHIEF OF POLICE

CHICAGO

CHIEF OF POLICE

CHICAGO

CHIEF OF POLICE

CHICAGO

CHIEF OF POLICE

CHICAGO

CHIEF OF POLICE

CHICAGO

CHIEF OF POLICE

CHICAGO

CHIEF OF POLICE

CHICAGO

CHIEF OF POLICE

CHICAGO

CHIEF OF POLICE

CHICAGO

CHIEF OF POLICE

CHICAGO


CHIEF OF POLICE

CHICAGO

CHIEF OF POLICE

CHICAGO

Typographus candido Lectori.

 *V*M multi medicinae studiosi
pene quotidianis precibus à
me contenderent lector op-
timè: ut libros Hollerij medici
doctissimi, quos frater meus annis superio-
ribus in lucem emisserat, rursus typis elegan-
tioribus excudendos curarem: id non ante
mihi faciendum esse duxi, quam ex peritis-
simis medicis quid de his sentirent intellige-
rem. Nam etsi me non latebat Hollerium
semper apud doctos viros maximè in ho-
nore extitisse: multos de eius singulari eru-
ditione tam honorifice iudicasse, ut nihil
ab eo proficisci posse ducerent, quod non es-
set diligenter elaboratū: tamen cum ante è
vita disceßerit, quam his postremam ma-
num imponere potuerit, existimabā m. hi
et reipublica melius cōsultum iri, si prius-

quam hos libros rursus in lucem ederem,
clarissimorum medicorum incorruptum de
his iudicium perspectum haberem. Itaque
aliquot summos medicos qui doctrina &
usu valerēt, obnixè rogavi: ut si quid tem-
poris à quotidiana vitæ occupatione liberi
haberent, id in his libris legendis & studio-
se examinandis collocarent, ac quid de his
sentirent ingenue mihi aperirent. Qui his
accurate perlectis & examinatis, sanctis-
sime affirmarunt: nihil ab Hollerio in his
libris scriptum esse, quod veterum medico-
rum præceptionibus non sit consentaneum,
& ad morbos depellendos accommodatiss-
imum. Continēt enim utiles, veras, & sibi
mutuo consentientes, de morborum inter-
norum & externorum depulsione, præce-
ptiones: quas summus medendi artifex,
quotidiana experientia qua ceteros medi-
cos superabat, verissimas esse comprobavit.
Neque enim rudis ac tyro ad scribendum
se contulit (quod plerique temere facere con-

sueuerunt) sed cum multos annos in uni-
 uersa medicina cum magna nominis com-
 mendatione docenda, & fœliciter summo
 ægrorum commodo exercenda, consump-
 sisset: longo rerum usu edoctus, animum ad
 scribendū appulit. Intelligebat enim vir sa-
 pientissimus, his solis de arte medica sine re-
 prehensione scribere licere, qui in ea & do-
 cenda, & factitanda, diu multūque ela-
 borassent: qualem optimi quique medici
 Hollerium fuisse agnoscunt, qui generalem
 medendi prudentiam, cum singulari, quoad
 vixit, diligenter maxima ægrorum leua-
 tione coniūxit, eoque nomine inter ceteros,
 medendi laude claruit, & gloriam immor-
 talem sibi comparauit. Ex quo facile intel-
 ligitur quanta utilitas ex his libris ad stu-
 diosos medicinæ sit peruentura, qua profe-
 cto caruissent, nisi vir clarissimus Andreas
 Pastoreus eius gener & senator sapientissi-
 mus, hos libros propter immaturam autho-
 ris mortem in tenebris iacentes, in lucem

protulisset : unde merito maxima gratia clarissimo viro habenda est, & cæteris doctis viris, qui hoc opus quod nondum postremam manum acceperat, emendarunt, & suo splendori restituerunt . In quorum numero primas partes obtinet Iacotius medicus, cuius labore & studio prior editio à fratre meo suscepta, auctior & castigatior in lucem prodiit . Neque vero minor laus debetur Ioanni Valetio doctori medico peritissimo, qui hos libros non solum à mendis quibus adhuc scatebāt vindicauit, verumetiam doctissimis scholiis illustrauit, & locupletauit : cui ego me hoc nomine plurimum debere profiteor. Quidquid enim bene & fæliciter in hac tertia editione à me gestum est, id eius industriæ & diligentiae tribui debet. Cuius propensam in te voluntatem si aliqua grati animi significatiue recognoueris, cum tui studiosissimum ad reliqua eiusdem authoris opera pari studio illustranda inflam-

4
mabis. Est enim mihi in animo doctissimas
eiusdem Hollerij commentationes, quas
in aphorismos hipocratis & coacas prædi-
ctiones scripsit, propediem in lucem emit-
tere, in quibus emendandis suam ope-
ram est mihi pollicitus si suos la-
bores tibi non ingratos ex-
titisse intellexerit.

V A L E.



ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο ΒΑΛΗΤΙΟΣ
ΕΙΣ ΦΡΟΝΙΜΟΤΑΤΟΝ
ΟΔΔΗΡΟΝ.

Ἰπποκράτους μὲν ἄνευ σωτάγματα κεντὰ κατὰ πῆ-
Γαληνός, βίβλοι, αὐτὰρ ἀπειρισίαις.
Δαμτρόπερον δὲ κλῖος κατὰ χεῖρας Ὁ δὲ ἡ ἐπιίδμων,
Αὐτός ἐπαγγίλλαι, ὁ αὐτὰ γράφ' ἀμφότερος.

*Idem ab eodem latinitate
donatum.*

*Mirandi Hippocratis decuit referasse Galenum
Arcana, innumeris penè voluminibus.
Spectate Holleri, maius decus arte capeſſis
Qui preſſe quicquid ſcripſit uterque reſers.*

ΕΙΣ ΔΟΔ. ΔΟΥΡΕΤΟΝ
τῶν ἱατρῶν λαμπρότατον

Πάνθ' ἔθιν Ἰπποκράτης ἀρρήτας δόγματ' ἔδωκε.
Κ' ἔδωκε δὲ ἄλλας μανικὰς ὀφιογόνοισι
Τόσα δ' ἢ (ὡς ἀσαφῆ) τὸ πῦρος μυστήρια καὶ β
Οἱ τε μὲν ταῦν βροδο σώματα ἀδυνάτω.
ΔΟΥΡΕΤΟ ΣΑΦΙΣΤΥΧ' αὐτοῖς καὶ δῖος ἰητήρ,
Δόγματα Ἰπποκράτους δὴ λὰτ' ἀδύνατα πύρων.
Ὅτι κεν αἰδῖον περὶ πᾶσι πύριζεντο δόξαν.
Οὐδέ τιτ' Ἰπποκράτης, νῦν τίτ' Ἰπποκράτης.
Isacoh. Basilins Labrousſquins.

5

ODE DE LOYS DE HVGES, SEIGNEVR DV MONE-
stier de Gap. en Daulphiné, à Ant.
Válet, Docteur en Medecine.

 I Phebus Roi de la lyre
M'echauffoit de sa fureur,
En daignant faire reluire
Son feu diuin sur mon coeur:
Et si ses sœurs immortelles

De leurs petites mammelles
Tirans les bouts precieux,
Auoyent ma leure ensucrée
De ceste liqueur sacrée
Qui met l'homme au rang des dieux:
Iusques au Ciel plain de gloire
Válet i enuoyroy ton nom,
Et sémeroy ta memoire
Depuis le dernier sablon
Du rinage de l'Espaigne,
Où le soliel au soir baigne
Ses moreaux, las du chemin,
Iusques à la mer perleuse
De l'Indie plantureuse,
D'où il se leue au matin.

Après ie viendroy à bruire
Sur les filetz abbatus
Dessus le fust de ma lyre,
Tes plus louables vertus:
Comme le ciel t'a fait naistre
Icy bas pour vn iour estre

*Des Medecins vne fleur:
Et le solas de tant d'hommes
Qui en ce siecle, où nous sommes,
Vivent pressez de douleur.*

*Comme Apollon t'empoisonne
De son eguillon iumean,
Et d'une double couronne
Ceint le tour de ton cerueau:
Pour la recompense digne
D'accoupler la Medecine
Au nombre inegal des vers,
Qui en mille & mille sortes
Portent sur leurs ailes fortes
Ton renom par l'univers.*

*Ie diroy encorres comme
Messrisant les courrisans,
Tu as choisy un pauvre homme
De l'orde des Mandians,
Pour le secours de ta peine,
Ton solas, & ton Mecene,
Esperant plus mille fois
De sa petite largesse,
Que de toute la richesse
De tous noz Princes François.*

*Et que de ceste esperance
Tu ne t'es trouué decen,
Puis qu'ainsi comme ie pense,
Tu t'es ia bien aperceu,
Comme sa main secourable,
Sa main douce & charitable,
Scait aider aux bon esprits,
Qui peuuent mangre l'enuie,*

*Aux mors redonner la vie
A l'aide de leurs espris.*

*Et comme en un champ fertile
Le laboureur haletant,
D'une main prompte & subtile
Va decà de là iettant
La graine de sa semence,
Qui venant en accroissance,
Grossit en espais tuyaux:
Puis usurant à sa peine,
Voit apres sa grange pleine
De gerbes de bleds nouveaux:*

*Ainsi ce Pere honorable,
Mon oncle & ton Mecenas,
T'eslargissant secourrable
Ses faueurs, dont tu fais cas,
A semé en terre bonne,
Qui usurant or luy donne
De ses fruiets trop plus qu'assez:
Desquels luy, & moy encores,
Nous nous en resentons ores
Plus que bien recompensez.*

*Mais, Valet, puisque la Muse,
Qui n'eut onc de moy soucy.
Ceste faueur me refuse,
Il faut demeurer icy,
Et tout prendre en patience:
Car si ma foible puissance
Ne peut attaindre si haut,
Ma volonté tant honeste,
Et mon audace modeste
Suleront à ce defaut.*

EIVSDEM
IN IACOBI HOLLERII ME-
dici Clarissimi interitum

Αὐτοσχέδιο; Ὑπολήψεις.

*Faucibus ex Erebi dum languida corpora summus
Hollerius renocat, moribundis tradere vitam
Instituit reducem, fatorum lege soluta
Mortis de imperio genq candore triumphat:
Ecce repente struit querimonia perfida diras
Insidias, Stygiis quas liuor ducit ab antris.*

*Præstina fatales ubi nânquē labascere iura
Senserunt Parca, querula pia numina voce
(Plāctibus ut fētis fuit ultio tetra gerenda)
Conuenēre simul, verbis propē talibus orsa.*

*Dij maris & terra, cæli mundi que Toparchæ,
Qui seclī rerūque vices statuistis ab omni
Tempore perpetuo firmatas ordine, nulla
Ætate occiduas, nostris assstite votis:
Nec sinite ut iuris sit quæ pars irrita nostri.
Nos hominum vitæ sortique præesse caducæ
Quis veter? Hollerium mandatum frangere vestrum
An deceat? licet hic pertractet gnauiter artes,
Quas sibi adoptiuo legauit munere Apollo?
Vos meminisse iuuēt (Superi) quæ fœdere fixo
Sanxistis: quæ non tempestas turbida quæuis,
Quæ non heroës, quæ non valūere Gigantes
Rumpere terrificis conatibus, impete vasto.*

*Tum Iouelis agitur sub indice: Iuppiter alta
Quas Parca lachrymas fuderunt, mente recondit.
Æst tribus è Parcis Lachesis crudelior vna*

Acrius instabat, donec moderator olympi
 Imperat Hollerium accersi, aethereamque, vocata
 Consulat ut causa, confestim accedere ad aulam,
 Hinc pius Hollerius sacrosancta capeßere diuinum
 Iussa sibi fas esse putat, nec cedere terris
 Huc graue, sed nobis funestum (proh dolor) istud,
 In caelum rapitur, stat supplex ante tribunal
 Ille Panomphæi Iouis: & plaudentibus astris
 Excipitur. Mox censor adest equissimus ultro
 Iupiter: ancipitem qui sic componere litem
 Aggreditur. Quid [ait] moliris liuida Parca?
 Iuris habere putes si quicquam in mente decorum
 Hollerium nostrum, demens te cura remordet.
 Mortali est fato maior, qui ritè merendo
 Deinxit cunctos: quem clara trophæa sequuntur,
 Præmia quandoquidem virtutis nescia lethi.
 Tu procul hinc abeas scelerata, adsit que superstes
 Hollerius, volo quem vitâ meliore potiri.

Tandem Syderei videt ut splendoris honore
 Se fulgere, putat satius spectare superna,
 Humanis iterum quàm se submittere rebus.

AD IACOBVM HOLLE-
RIVM MEDICVM CLARIS-
SIMVM HENRICI MO-
nantholij Rhemi
Carmen.




*I*upiter aeternum terris insensus habebat,
(Nescio quid, si quid moucrit ante Io-
nem)

Δείρα φέρον, vasto quod nos tremefecit
hiatu,

Nostra tot impendens vas super ora dies,
Hinc febres, hinc pestifero condita veneno,
Hinc Acherontigenis mens agitata deis:
Hinc *ἡμῖν γιγάντιο*, hinc nigro carbunculus igne,
Hinc veneris culta plena madore lues:
Hinc polypi, hinc Elephas, atque hinc Apoplexia, longis
Hinc crescens pedibus rumina Cancer edit:
Hinc vertigo, Caros, Catoche, Paralypsis, & omne,
Quod tam homines torsit tempora longa, malum.
Quis tantum in superos potuit committere crimen?
In miseros homines sic stimulare Iovem?
Hic, quisquis fuit, ignotus sine nomine pendit,
Quas merito pœnas Rex Acherontis habet.
Sed torquendo homini totus non sufficit orcus,
Termina tam dirum nulla piare scelus:
Ille licet pœnas referat quas Tantalus, aut quas
Sisiphus, aut Tityi tempus in omne iecur:
Propter quem meruere homines tot adire ruinas,
Tortæque tot iactis membra videre malis,

Et paterentur adhuc, passuri plur i, nisi quis
 Dæctus Apollonia sorte tulisset opem.
 Hic miseros tandem (seu quis sis ipse deorum,
 Sine Holleri hominum nunc miseratus adet)
 Floribus electis, coëta radice, suavi
 Exhibito potu subtrahis omne malum.
 Vas Iouis exhauris totum: vel si qua profundo
 Immittantur adhuc, irrita tela facis.
 Ergo tuum ut nomen iam sæcula nulla latebit
 (Si Deus æqualis fāsque nefāsque videt)
 Sic tibi non quicquid cælos extra eminet omnes,
 Sufficiet meritis reddere iusta tuis.



AD ILLVSTRISSIMVM
NOBILISSIMVMQVE VIRVM

D. Ioannem Faietanum, D. d' Aute-
feuille, Christopho-
rus Burgenfis.

*Te tua nobilitas generis, patriũque tuorum
Iam iam nobilitant stemmata clara satis.
Ad summos effert prestantia mentis honores,
Et tua te virtus inclyta, ad astra vehit.
Hinc tibi me dedam quæ sit mihi causa requirũ?
Si virtus animos imperiosa rapu?*

AD DESIDERIVM IACO-
TIVM MEDICVM
clarissimum, Gabriel
Deuagneus Me-
dicus.

*Quem duo suscipiunt concordĩ Marte laborem
Mutua seruata perficit arte manus.
Burgenfi tua dum coniungis scripta, Iacoti,
Clarior a docto prodit utroque labor.
Sic fera quod nunquam valeat delere vetustas
Vnica seruabit nomen utrunque dies.
Quòd quoque tam iunctis, Iacoti proficis orbi
Scriptis, se iactet nunc Arelat. tuis.*

TABVLA CAPITVM

LIBRI PRIORIS DE

morbis internis

De dolore capitis	Cap.1.fol.1.	de asthma	cap. 25.f.99
De diurnis capitis doloribus		de pleuritide	cap.26.f.99.
Cap.2.fol.13.		de sputo	cap.27.f.115
De dolore capitis ab ebrietate		de phthisi	cap.28.f.121
Cap.3.fol.16.		de cordis tremore seu palpitatio-	
De dolore capitis à perfrictione		ne	cap.29.f.128.
Cap.4.fol.17.		de syncope	cap.30.f.131
De vertigine	Cap.5.fol.18.	de cholera morbo	cap.31.f.134
De phrenitide	cap.6.f.20.	de imbecillitate stomachi	cap.
De apoplexia	cap.7.f.25.		32.f.138.
De lethargo.	cap.8.f.30.	de singultu	cap.33.f.145
De caro	cap.9.f.33.	de bulimo & canina appetentia	
De Paralyfi	cap.10.f.35.		cap.34.f.150
De cōuulsione canina c.11.f.41.		de iccoris inflammatione	cap.
de conuulsione	cap.12.f.43.		35.f.153
de angyglossis seu mogilalis		de debilitate hepatis	c.36.f.157
cap.13.f.47.		de morbo regio	ca.37.f.16
de incubo	cap.14.f.48.	de oppilatione hepatis	cap.38.
de epilepsia	cap.15.f.51.	folio 166	
de epilepsia per consensum à sto-		De hydropse	cap.39.f.168
macho	cap.16.f.58.	de splenicis	cap.40.f.1781
de melancholia	cap.17.f.60.	de colico dolore	cap.41.f.189
de catarrho	cap.18.f.18.	de alui fluxionibus	ca.42.f.191
de ophthalmia	ca.19.f.71.	de dysenteria	cap.43.f.196
de debilitate visus	c.20.f.76.	de tenesmo	cap.44.f.208
de catarrhacta	cap.21.f.82.	de curatione hepatici fluxus	
de hæmorrhagia	ca.22.f.87.		cap.45.f.290
de angina	cap.23.f.91.	de fluxu pestilentiali	c.46.f.211
De tussi.	cap.24.f.96.	de difficultate medi c.	47.f.212

INDEX.

de calculo	cap. 48. f. 217	de rhagadibus	c. 60. f. 264
de lapide vesicæ	ca. 49. f. 225	de mola	cap. 61. f. 265
de ardore urinae	ca. 50. f. 227	de hernia	cap. 62. fo. 266
de inflammatione renum	cap. 51	de arthritide	cap. 63. f. 272
folio 232		de elephantiasi vera	cap. 64
de mictu sanguinis	c. 52. f. 233	folio 279	
de diabete & similibus	cap. 53.	de cutis excoriatione, ulceratione, pustulis, & rubore faciei	cap. 65. f. 284
folio 336		de dolore	cap. 66. f. 285
de vermibus	cap. 54. f. 239	singulares aliquot Auctoris Observationes, quæ ad consilia curandi pertinent fol. 286. & sequentibus ad 296. vsque	
de hæmorrhoidibus	c. 55. f. 243		
de exitu ani	cap. 56. f. 249		
de exitu matricis	cap. 57. f. 251		
de sistendis mensibus	c. 58. f. 253		
de vteri præfocatione	c. 59. f. 261		

TABULA CAPITVM LIBRI SECVNDI

de morbis internis qui febrium historiam & curationem continet.

1	Quid sit febris	fol. 1.	14	de lippiria febre	fol. 43
2	De tertiana	fol. 4	15	de hectica febre	fol. 44
3	De tertiana notha	fol. 8	16	de febre ex cruditate	f. 48
4	de semitertiana	fol. 12	17	de symptomatis	fol. 50
5	de febribus horrificis	fol. 14	18	de somno & vigilia	ibid.
6	de febribus pituitosis, & pri- mum de quotidiana	f. 15	19	de siti	fol. 53
7	de febre Epiala	fol. 20	20	de linguae scabritie & nigre- dine, totiusque oris	fo. 55
8	de quartana	fol. 21	21	de dolore capitis in febr.	f. 57
9	de febre ardente	fol. 29	22	de sudore	fol. 59
10	de febre putrida continua	f. 35	23	de morbo Regio	fol. 62
11	De febribus colliquantibus folio 40		24	de dissoluta appetentia	f. 63
12	de febre affode	fol. 42.	25	de exanthematis, papulis, va- riolis & morbillis	f. 64
13	de cardiaca febre	ibidem	26	de varicibus	fol. 69

INDEX.

- 27 de peste, eiusque causis & signis fol. 70 & sequen.
 28 de præseruatione à peste
PERIOCHARVM
 Lib. Gal. de compos. phar. 27 τὸ π 85, summa capita.
PRIMÆ
 1 De alopecia & ophiassi fol. 2
 2 de profluvio capillorum f. 4
 3 de tinctura capillorum f. 5
 4 de pityriasi, seu furfurib. f. 6
 5 de phitiriasi, siue morbo pediculi ibidem
 6 de achoribus folio 7
 7 de psyracius folio 8
SECUNDÆ
 1 De capitis dolore in vniuersum ibidem
 2 de dolore capitis ab aestu f. 9
 3 de dolore capit. ab ebrietate folio 11
 4 de dolore capitis ex ictu, vulnere aut contusione f. 12
 5 de diuturnis capitis doloribus folio 12
TERTIÆ
 1 De aurium dolore folio 16
 2 de dolore auris à calore f. 17
 3 de vlceribus aurium ibid.
 4 Ad dolorem ex inflammatione, & sine vlcere fol 18
 5 de vermibus aurium f. 19
 6 Observationes quædã in di-
 27 folio 73
 29 Peste correptorũ curatio f. 80
 30 de bubone pestilenti fol. 81
HOLLERII AD
 1 Cura polypi fol. 23
QUARTÆ
 1 De medicamentis ocularibus folio 24
 2 de dolore oculorum ibid.
 3 Alexãdri mirabile in calida ophthalmia & dolore f. 26
 4 de repellentibus fo. 27
 5 de vlceribus oculorum ibid.
 6 de hebetè visu f. 50
 7 Ad albugines fol 31
 8 Ad hyposphagmata ibid.
 9 Ad œdemata oculorum f. 32
QUINTÆ
 1 De hypopis ibidem
 2 de agilope fol. 33
 3 de ionthis seu varis fol. 34
 4 de dentium affectibus f. 35
 5 Contra vermes fol 37
 6 Ad dentes mobiles fol. 38
 7 d erosos dent es ibidem

INDEX.

8 *Ad dentes malè coloratos*
ibidem

SEXTÆ.

1 *De oris affectibus* fol.39

SEPTIMÆ

1 *diamorum* fol.40

2 *diaræon ex granatis* *ibid.*

3 *de gargareone iſtamato* f.41

4 *de aphthis* fol.42

5 *de vitiis vocis* fol.43

6 *de aſthmate, orrhopnœa, dif-*
ficultate ſperandi fol.46

OCTAVÆ

1 *Ad ſtomachicos & iecora-*
rios remedia fol.47

2 *Ad dolorem ſtomachi* f.51

3 *Ad vomitum* *ibidem*

4 *de ſingultu* fol.52

5 *de vlcere ventriculi, vel œſo-*

TRIVM DE MATERIA

Chirurgica librorum capita.

PRIMI

1 *de apocrouſticis, ſiue repell en-*
tibus folio 3

2 *de elcticis, ſeu attrahētib.* f.9

3 *de diaphoreticis, ſiue reſoluē-*
tibus & digerentibus f.9

4 *de malacticis, ſeu emollien-*
tibus fol.15

SECUNDI

1 *De aperienda vomica* f.28

2 *De medicamentis vlcera pur-*

phagi *ibidem*

6 *de voulimo* folio 35

7 *de hepaticis* *ibidem*

8 *de morbo Regio* fol.56

9 *de ſplenicis* fol.58

10 *de colicis remediis* fol.60

11 *de priapiſmo* fol.61

12 *de hemorrhoïdibus excutan-*
dis *ibidem*

13 *de vitiis ſedis & pudendo-*
rum fol.62

14 *de iis, qui noctu ſtragulas*
permingunt *ibidem*

15 *de præfocatione vteri* f.63

16 *Ad rhagadas* *ibidem*

17 *de nephriticis* *ibidem*

18 *de inflammatione & exul-*
ceratione renum fol.65

19 *de aſthride* fol.66

TERTII,

1 *De vtili materia in vitiis oſſiū*
fol 47

2 *De remediis neruorum* f. 87

3 *De dolore* fol. 102

4 *De hæmorrhagia* fol. 114

5 *De pyroticis.* fol. 121

FINIS.

INDEX

LOCVPLETISSIMVS RERVM MEMO-

RABILIVM, QVÆ HOC OPERE CONTI-

nentur cuius literæ maiusculæ F. libros de Febrib. & Pe-

ste, P. Periochas libr. Gal. de comp. med. & τὸ πρῶτον

C. libros Chirurgices significant. Quibus verò

numéris nulla præfigitur litera, his Praxim

& Scholia Hollerij, necnon Valetij

Exercitationes intelligimus.

A

- | | |
|---|--|
| <p>A Abscessus oſis C. 75</p> <p>A Abſtinentia vini, arthritide multos ſanauit 274. P. 67</p> <p>A Acetum ubi ſuſpectum C. 7</p> <p>A Aceti vis quomodo intendatur C. 19</p> <p>A Achores, eorúmq; cauſa P. 7</p> <p>A Acopon Damocratis ab mēbra tabida C. 86</p> <p>A Acutæ febres cur ſic dictæ F. 2</p> <p>A Agilops P. 33</p> <p>A Egyptia Andromachi C. 83</p> <p>A Agrippa pedum cruciatu aceto liberatus C. 11</p> <p>A albucæſis non reuelandum remedium 142</p> <p>A albugines oculorum P. 31</p> <p>A alimenta pro menſanchoſicis 61</p> <p>A alopecię curatio P. 2</p> <p>A ἀφες, vitiligo 287</p> <p>A amauroſcus & amblyopię diſtinctionio 77</p> <p>A ἀμάρωσις 19</p> <p>A ἀμβλυωπία ibidem</p> <p>A anaſcollemata, frontalia f. 52</p> <p>A anaſarca 168. & 172</p> <p>A anaſtomōſis 259</p> <p>A anathymiaſis quid f. 30</p> | <p>anginæ quot ſpecies 24</p> <p>anginis omnibus quid commune ibidem</p> <p>anginoſorum hiſtoria 16</p> <p>anginæ curatio 25</p> <p>antimonij puluis C. 145</p> <p>ἀπληξία aphthæ ſerpentiæ oris vlcera P. 42</p> <p>apicula diuitias multas Chirurgico affert C. 24</p> <p>ἀποκροστικά, repellentiæ C. 1</p> <p>ἀπώτων apoplexia, eiufque curatio P. 35</p> <p>apoplexiæ diſtinctio 27</p> <p>apoplexia multi repente ſuffocati ibidem</p> <p>apoplexiæ magnitudo vnde 29</p> <p>apoplexia ſanguineæ curatio ibidem</p> <p>apoſtolicon C. 85</p> <p>aqua pluuiæ duplex P. 29</p> <p>ἀρχιγενής archigenis ad cruentos oculos remedium P. 32</p> <p>ardoris vrinæ curatio 227</p> <p>ardoris vrinæ cauſæ 228</p> <p>αἰσκα aſca P. 2</p> <p>ἀεξός Hipocrati quid 228</p> |
|---|--|

INDEX.

Asclepiadis	c.84	Cachexia	168
arteriotomia	2	Calculus	217
arteria qui seceretur in dolore ca- pitis	7	Calculus in vesica pueris gene- ratur	218
arthritis & eius causæ	p.66	Calculi signa	ibidem
arthritis curatio	172	Calculi remedia	220
arthritis non in omni fit ossium connexione	274	Calculo quæ conueniant à pro- prietate	p.64
arthritis quandoque à parëtibz podagricis	275	Calculi in medio friabiles	223
arthritis fluxio vt fiat	278	Calculi in vtero reperti	221
ascitæ generatio; signa, curatio	168.& 172	Calculi in corde inuenti	230
Asthenes febres fastidiosæ	fi	Calor attrahit	c.6
asthma	99.101.p.46	Cancer in superficie non cura- tur	203
asthmatis curatio	100.& 103	Cancer fluuiatilis tela extrahit	c.8
asthmatici	173	canicies vnde fiat	p.5
asthmatis duo symptomata	102	capitis affectarum partiū distin- ctio	6
asthmatis causæ duæ	ibidem	capitis dolores à calore, vel fri- gore	ibidem
asthmatis causæ in vniuersum	103	capitis dolorum per consensum signa vniuersa	6
Athenienses accensus ignibus pe- stem fugarunt	f.73	capitis quæ pars dolet frequen- tius	ibidem
attrahētium vsus multiplex	c.6	capitis dolorum causæ	7
Aureū Mesuæi descriptum	c.54	capiti dolenti quid conferat ex- celso	8
aurium dolor, eiusq; causæ	p.16	capitis doloris causæ externæ	9
aurium vlceræ	p.17	capitis doloris diuturni causæ	13
axungia falsa magis mollic	c.18	capitis dolor ab ebrietate	16.& p.110
Balburiet causæ	48	capitis dolor in febribz vt cure- tur	f.37
Basilicon	c.27	capparum vsus splenicis accom- modatus	179
Beauclerc Aduocatus vermen e- minxit	219	carotica	c.104
Bilis in vesicam diffuens vrina ardorem facit	227	car signa	32
Brassica ebrietatem arcet	p.11	cati & lethargi differentiz	ibid.
Bubo	f.81		
Bulimos quid	150.153		
Bulimi causæ variz	152		
Bulimi remedia	ibidem		

I N D E X.

Caros quid	33.34. & 35	Cœliaca affectio	194
Catalepsis	34	Κοιλιακοὶ qui appellantur	1433
Catalepsis quâ fiat	16	coitus urinae odoré gignit	227
Καταμηνια propriè menses	257	colica biliosa curatio	188
cataplasmata & cerota ut fiât c.5		colicus dolor	183.189
catarrhacta quæ locum mutat,		colici doloris urinae quæ	ibid.
qualis	83	colici doloris curatio	188
catarrhi definitio	66.69	colica symptomata	189
catarrhi duo perpetua seminaria		colletica medicamenta	c.63
69		coxarius morbus	p.66
catarrhus propriè dictus	16	crocus	c.26
catarrhi causæ efficientes	70	crudelè malum crudeliter depel-	
catarrhi calidi & frigidi signa		lendum	c.128
ibidem		cucuphæ	p.15
catarrhi curatio	ibidem	cucupharum usus	15
cathartica medicamenta qualia		cucurbitulae	8
esse debeant	c.36	cuti cum subiecta carne natura-	
cauteria ubi periculosa	c.30	lis amicitia	c.63
cauteria frigida quæ	c.34	cutis præcisa coalescit, spiritum-	
cautio in adstringentibus	c.4	que recipit,	c. ibidem
cautio in gargareone præscin-		Κυνώδης ὀρεΐς	152
dendo	p.42	D	
Celsi de duobus Medicis historia		Δακρυδάς Hippocrati quid	c.39
174		Damocratis malagma	c.27
cephalalgia à perfrictione	16	Decoctio pectoralis Rhazæ	68
cephalalgiae biliosæ signa	11	Decoctum caricarum leuissimum	
cephalalg. melancolic. signa	12	c.6	
cephalalg. pituitos. signa	ibidè	Defensua vulgò dicta	c.6
cephalæ curatio	15	Delirium in febre unde	f.59
cephalica	c.52	Democritus ut effluentem spiri-	
ceratum è psyllio, rosaceum, è co-		tum diutius retinuerit	338
riandr. myrthinum	ibidem	Diabetæ causæ	213
cera virginea	ibidem	Diabetæ curatio	236
cerati Galeni descriptio	138	Diachylon	c.21
chiragra	p.66	Diacopregias	c.20
cholera humida & sicca, eiusque		Dialthæon	ibidem
curatio	134	Diameli amicum nervis	c.76
cineres diaphoretici	c.14	Diaplasmata	c.61
coagulum quò vetustius, eò effi-		Diapedesis	259
cacius	c.8	Διάπλεσις	c.76

INDEX.

Diaphoretica	c.9	fieri	ibidem
Diarrhœa	194. 195	Epilepsia correptorum nutriti-	bus quid faciendum, quibûsue
Diaurosis	259	utendum	36
Diuerfis partibus diuersa sarco-		Epilepsia grandioribus laboran-	tibus quid conueniat
tica conuenientia	c.48	ibidem	
Dolorum differentia à part. p.9		Epilepsia obseruata sine partium	inferiorum concussione
Dolor vel intemperie, vel solu-	285 c.102	59	
tione continui fit		Epilepticorum variaz historiaz	ibidem
Dolor ab humiditate ferè nul-	ibid.		
lus		Epulotici medicamenti natura	c.57
Dolor stomachi vehemens	p.51		
Dolorem oculorum vini potio		Epulotica è sarcoticis quâ fiat	36
soluit	p.24	Errhina ex quibus comparentur	14
Δυσεντερίας καὶ δυσλκίας	c.64		
Dysenteria	169	Escharotica	c.126
Dysenteria, exulceratio intesti-	ibid.	Exanthemata	f.64
ni		Exitus ani	249
Dysenteria ab atra bile incur-		Exulcerationis pulmonum duæ	causæ
abilis	203		125
Dysenteriaz curatio	196		
Dysuria, meiendi libido	212		
Dysuriaz causæ	215		
Dysuriaz curatio	213		
	E		
Ebrietatis effecta	16	F	
ἐλκυσ leue animi deliquium	133	Facies Hippocratica	41
Elephas	281	Familiis quibusdam tertius est	testiculus
Elephantiascos causæ variaz	283		270
Elephantiasis vera, & eius sym-		Febris quid	f.1
ptomata	279	Febres quæ pessimæ	ibidem
ἐλκυσ	c.6	Febris morb ⁹ vel symptoma	f.2
Elleborus	c.127	Febres preuigiles & soporose	f.3
ἐμπροσθόνοτος quid	f.45	Febris tempora quatuor	ibid.
Epialos quid sit	20	Febris semitertiana, & cur sic di-	cta
Ephialtæ causæ	50		f.12.13
Epilepsia.	54-57.60	Febres nocturnæ Hippocrati	quid
Epilepsiaz in pueris remedia	52		f.15
Epilepsiaz in senib. remedia	53	Febris quotidiana & eius gene-	ra
Epilepsiaz causæ	55		f.15
Epilepsia à sola intemperie non		Febris epiala	f.20
		Febris quartana & eius curatio	f.21
		Febres quintanz	f.23

INDEX.

Febris ardēs à bile flaua fit	f.30
Febris putrida, & eius causæ	f.35
Febres ἐμόθονοι, ἐπακμασιν αἱ, καὶ παρὰκμασιν αἱ	f.38.39
Febres colliquantes	f.40
Febris afflodes quid	f.42
Febris cardiaca	ibidem
Febris lipyria	f.43
Febris hæctica	f.44
Fermenti facultas	c.8
Fernelij opinio de arthritide cō- futata	277
Flatus inopia caloris generatur	p.13
Fluxiones alui	191
Fluxus pestilentialis	211
Fluxuum causæ vt dignoscantur	245
Fœtus in vtero triplici vita frui- tur	266
Fœmineus sexus cur lunæ tri- buatur	257
G	
Galenus inconstancia noratus	148
Galenus cicatricem interdixit aqua	c.62
Γαλινγκών	c.100
Ganglia quid	c.101
Gargareon inflammatum	p.41
Glaucōma	85
Gycyrrhiza humectat	170
Gordonius secreti ad hydropem non revelandi autor	170
Græcorum vera de repellētibus sententia	c.3
Granatorum genera tria	p.40
Guaiacū frangendo calculo ido- neum remedium	219
Guaiacum	c.108

Guaiaci vsus quibus periculo- sus	ibidem
H	
Hæmophobi syncopæ obnoxij	134
Hæmorrhagia	87.89.c.114
Hæmorrhagiæ modi quatuor	49
Hæmorrhagiæ causæ	90
Hæmorrhoides morales	248
Hæmorrhoides vt excites	p.61
Hæctica febris signa p̄pria	f.44
Hemicrania quid	6
Hepate laborare quandoq; pleu- ritis representatur	105
Hepatici vnde dicti	155
Hepatis debilitatis causæ	157
Hepatis debilis curatio	158.160
Hepatis intemperies duplex	159
Heparica simplicia	160
Hepatici fluxus curatio	209
Hepatici Galeno qui sint.	p.53
Hermodactylus naturâ stoma- chum lædit.	273.278
Hernia quid; & quomodo fiat	267
Herniæ species	267
Herniaria, seu herba Hollerij	268
hieroglyphica Aegyptiorū	c.94
hordei exoleti vltus periculofus	f.71
hydrargyrum & eius differentiæ	c.113
hydragoga medicamenta	177
hydropistria genera	168
hydropis curatio	169
hydropotæ acutiùs vident	81
hypochoymatis, eiusque curatio	86
hyposphagmata	p.31

INDEX.

I

Icterus unde dictus.	161
Icterici qui flatuosi	163
Icteri variae causae	161
Ictericorum variae historiae	164
Icteri curatio	161
Icterus lienis & iecinoris	163
Icteri curationes variae	165
Iecoris inflammatio ut digno- scenda	153
Iecore influmato quam venam secat Galenus	157
Iecoris intemperies cum imbeci- llitate vix curabilis	160
Ignis in toto capite periculosus	286
Ignis halitus inspiratus antido- tum contra pestem	f.73
Ileum vel caecum intestinum in hernia procidit	269
Imperfectae formae perfectiori- bus continentur	266
Incubus quid	48.51
De Incubis & succubis quid sen- serint veteres Theologi	50
Incubus quibus familiaris	51
Incubi curatio	161
In ardore parcendum oleis	109
In fronte & rugosis partibus ut facienda vulnera	c.33
In usu ferri & ignis quae animad- uertenda	c.29
Ionthi	p.34
Ioannes Blanché hydrope ut cu- ratus	174
Ischuria, eiusque causae	212.215
Isis medicamentum	c.94
L	
Lac asininum omni lacte humi- dus	f.47

Ladanum mollit ac repellit	c.18
Lapis vesicae	225
Lapidis vesicae causae & signa	226
Lapidis curatio	227
Leges in usu malagmatum obser- uandae	c.16
Λεωπθυμία & λαωθυμία diffe- rent	132
Leienteriae causae & curatio	192
Λέων quid significet	194
Lenientia laxant	c.104
Lepa	281
Lethargi signa	30
Lethargi curandi modus	ibid.
& 33.	
Lethargi & cari differentia	31
Lethargicis pusilla vitae spes ali- quidior alio	32
Lien κατάρσος cui sit	181
Lieni & hepati eadem remedia	ibidem
Lienē per urinas expurgari	183
Litae quae sint medicamenta	c.44
Lithotomij	226
Lochia	256
Λοιμώδης	f.70
Δύγξ καὶ λυγμός	147
M	
Magdaleones, cylindri	c.14
Magnes attrahit ferrum	c.8
Malagma Scribonij	c.101
Malicorium	p.24
Mammarum duris inflammatio- bus obsestarum remedia	c.23
Mandragorae succus fluxionibus reprimendis accommodatus	23
Manna quomodo utendum in compositione	109
Mariscæ	243
Masticatoriis utendi modus & tempus	

INDEX.

tempus	14	Menstruæ purgationes quando	
Materia vitæ ossium utilis	55	fluere incipiant	ibidem
Matricis exitus	251	Menstruorum retentorum cau-	
Medicus nō semper naturæ imi-		sa	261
tator	258	Menstruæ purgationes iuveni-	
Medicamenta ad nudos nervos		bus albæ Aristoteli, rubræ Hip-	
c. 90		pocrati fiunt	258
Medicamentorum arteriacorum		Menstruæ purgationis quanti-	
tria genera	p. 44	tas	257. 259
Medicamenta porotica	c. 72	Mensium suppressionis tres cau-	
Meiendi difficultas	212	sa	260
Mel Anacardinū quomodo pa-		Mentagra Romanorum	282
retur	31	Mictionis vitiatæ tria genera	212
Melancholiæ varia genera	60	Millepedarum vires	104
Melancholicis alimenta conue-		Miua Rhazæ	141
nientia, itémque remedia	61	Mola quid sit	265
Melancholiæ à phrenitide diffe-		Mola vix curatur	ibidem
rentia	63	Mola utrôque ex semine forma-	
Melancholia omnis non febris		tur	266
expers	ibidem	Molæ conceptæ certissima signa	
Melancholiam generâtis humo-		ibidem	
ris generatio	16	Morbus regius	f. 62. p. 56
Melancholiæ signa	ibidem	Morbilli	f. 64
Melancholia hypochondriaca	64	Morbus pedicularis	p. 6
Melanchol. purgatio	65	Morborum duo genera	p. 40
Melancholici ferio purgâdi	272	Mulieris sanæ qualis sanguis ex-	
Melancholici per inferna pur-		eat	257
gandi	f. 28	Mulieres sine mēstrua purgatio-	
Melicratum vinosum	147	ne concipere ex Aristotele	257
Mendicus lue venerea laborans		Muræia vel μύραινα	79
ut curatus	c. 8	N	
Mēsis naturalis est purgatio	233	Nares ad sanguinem profunden-	
Menses sola peccant quantitate		dum ut prouocentur	7
257		Narcoticis recens paratis nun-	
Menstrua virulenta non sunt		quam utendum	119
ibidem		Narcotica dolore ut sedēt	c. 104
Menstruorum prouocatio	254	Nephritici	p. 64
Menstruorum retentio vel ex-		Nervorum vitia	c. 87
cretio qualia inducūt sympto-		Nervis frigidum inimicum	c. 82
mata	257. 260	Nipulæ	c. 124

INDEX.

Nomæ vlcera	c.37	Oppilationis curatio	ibidem
Nullum vulnus contemnendum	c.64	Ordo curationis i fracturis	c.84
O		Ois affectus	p.39
Observanda in dolore ex Gale-		Orthopnæa, cuiusque causæ tres	p.46
no	285	Oilibus quàm multa auxilia in-	
Oculorum anodyna duorum		uenta	c.72
sunt generum	p.25	Ostrea viua pestiferos bubones	
Oculorum ardor vehemens pin-		ad se attrahunt	c.8
guia cur respuat	p.25	Oxyroceum	c.85
Oculorum œdemata	p.32	Oxydorcia	p.30
Oculorum remedia vt inspiren-		Οὐρητικοὶ qui dicantur	236
tur	287	Ozæna vlcus malignum	p.22
Oculi punctio remedium à ca-			
pra inuentum	85		
Oleum annum superans exole-			
tum	c.5	Πάλυς quid	126.130
Oleum vim materiæ, cui inco-		Palpitationis curatio	127
quitur, combibit	c.5	Palpitationis causæ permultæ	129.130
Olei vsus in ardore periculosus		Palpitationis historiæ	ibidem
ibidem		Panalithes	c.84
Olea profluuium capillorum si-		Papauer cornutum vlcera mali-	
stentia	p.4	gua iuuat	c.45
Oleorum variæ compositiones		Papulat	f.64
ad dolorem capitis	5	Paralyfis quid	35
Oleum papauer. & mandrag.	23	Paralyticis vinû fugiendum	38
Oleum pro paralyticis	37	Paralyfis quî fiat vitio nervorû	
Oleum philosophorum quid	45	ibidem	
Οὐρ	85	Paralyfis qua ex materia fiat	79
Ophthalmia	71	Paralyseos causa antecedens	
Ophthalmiæ signa	74	ibidem	
Ophthalmiæ biliosæ & pituitos.		ad Paralyfim Hollerij experi-	
signa	75	menta	40
Ophthalmiæ causæ & curatio	86	Paralyfis duplex	ibidem
Opij vsus quibus conueniat	23	Paracenthesis quomodo fiat	72
Opij probatio & vsus	c.110	172.174	
Οπισσότονος quid	45	Parastatæ glandulæ	230
Opopanax	c.18	Partus monstruosi	266
Oppilatio hepatis vnde fiat	166.	Parotides quid	p.21
167		Pestis quid	f.70.71
			Pestis

I N D E X.

Pestis præseruatio	f.73	pleuritis nõ semper indiget phlebotomia	107
Peste correptorum curatio	f.86	pleuritici quibus potissimum in locis phlebotomia iuuentur	108
Phagedæna famis genus	150	pleuriticis sanguinem spuuentibus sanguis non detrahendus	ibidem
<i>Φαγὴ φρενῶδης</i>	f.14	pleuritidi biliosæ venę sectio nõ conuenit	ibidem
Phthiriasis	p.6	pleuritis notha	III.112
Phlebotomia in febre à cruditate an imperanda	f.45	pleuritis à melancholia rarissimè fit	112
Phthisis vlcus pulmonis	121	pleuritis ad quot morborum genera reduci potest	114
Phthisicos signa	ibidem	podagra Bacchi & Veneris filia	275
phthisis pro tabe	124	podagrici sunt salaces	ibidem
phthisicos species quatuor	ibid.	podagra	p.66
phthisicos symptomata perpetua	125	polydæ pastilli	c.97
phthisicos letiferæ tria signa certissima	ibidem	polypus tumor	p.22
phthisicos primarię causæ	ibid.	porosis & porotica	c.81
phrenitidis curatio	20.24	præfocatio ab vtero quid	263
phrenitide laborantibus quid vitandum	ibidem	præfocatio vteri ieiunio curatur	264
phrenitidis causæ duplex, eiusdemque signa	23	priapismus	p.61
piccatum ceratum	c.26	primarii Præsidis Rothomagensis palpitacione correpti histeria	130
pilulæ quomodo parentur ad capitis dolorem	4	profluuium capillorum	p.4
pilulæ quando ante cœnam, & quando post exhibendæ	8	<i>Πρόνοια χειρουργος</i>	c.1
pilulæ in affectibus siccis quales	ibidem	propolis scribonio quid sit	c.7
pilus vt allelscat	p.5	propolcos vsu nerui puncturam curauit Galenus	ibidem
pituita puri similis	c.29	propoli pro galbano veteres vtantur	c.18
pityriasis	p.6	psydracia	c.8
pix Brutia	c.18	pueri quartanæ obnoxij	f.22
pleuritis dolor lateris qualis	105	puella assiduè singultiens	149
pleuritidis plusus durus & serratus	ibidem	pulis citrinus	73
pleuritis noctu ferè exacerbatur	ibidem		
pleuritid. variæ causæ	ibidem		
pleuritid. curatio	106		
pleuriticis vino interdendum	ibidem		

INDEX.

purgationes valentiores in ob-	fine dolore	ibidem
structis periculosa	Sanguinis mictus	233
pyrotica	Sanguinis mictu quid significa-	234
pyrotica vt temperes	tur	234
Q	Sarcocoe insignis non curatur	271
Quartana salubris est, & nemine	Sarcoticoru natura qualis	c.47
iugulat	Sarcotica, quibus actia admixta	ibidem
Quartana in annum duodeci-	sunt, solis vlceribus contuma-	ibidem
mum produci potest	cibus adhibenda	ibidem
Quartana leuiora tantum admit-	Sardonius risus	45
tit medicamenta	Satyriasis	p.61
Quid in fracturis capitis contuso	Saturni & Martis coniunctio pe-	f.71
pericranio agendum sit	stem infert	f.71
R	Scabiosa trita contra carbonem	p.82
Raucedini purgatio an adhibe-	pestiferum efficacissima	f.82
da	Scirrhus desperatus quis	c.16
Regius morb ⁹ cur sic dictus	Scirrhus hepatis leuiter mollien-	c.17
Rhabarbaru an hepatis vita	tia desiderat	c.17
Rhagades fissura	Scorpio in cerebro genitus	1.p.9
Rhagades vnde nascantur	Sedis vitia	p.62
Renum exulceratio	Sinapismus, & eo quo modo ven-	125.32
Renum inflammationis causa &	dum	125.32
curatio	Singultus quid	145.147
Rhemenfi negotiatori vomitu	Singultus causa	148
citato desit conuulsio	Singultus ab inanitione despe-	ibidem
Repellentia vt conuenienter ap-	ratius	ibidem
plicentur, multa consideranda	Singultus ab inanitione, vel re-	p.52
c.3	pletione	p.52
Repellentiu materia aquea	Singultus in febre periculolus	149
Repellentium genera duo	Singultus tria remedia	ibidem
Ricotia	Spasmus siue nervorum contra-	44
Ρύπια medicamenta	ctio in paralyfi quid	c.85
Rosaceum lenit	Sparadrapum	209
S	Σπινθηρία excrementa	181
Sanguis an bilis refrigerium	Σπινθηρία	181
Sanguinis e naribus irritandi ra-	Spiritus gignituius (ai domicilij	261
tio	artifex	261
Sanguis expuitur a thoracis ve-	Σπινθηρία vnde dicatur	245
nis cum dolore	Splenica	
Sanguis expuitur a pulmonibus		

I N D E X

Splenicz venæ fecionem ridet	ibidem
Galenus	f.26
Splenici	p.58
Splenicorum symptomata, & co- rum curatio	178
Σπληνικοί morbi vnde	f.70
Sputi sanguinis è pulmonib ⁹ cu- ratio	116
Σταλάγματα	c.18
Stranguria	212
Stranguriæ curatio	213
Stomachici qui vulgò dicantur	143
Stomachici	p.47
Stomachica remedia quibus par- tibus adhibenda	p.48
Succinum illicit festucas	c.8
Sudor Anglicus quid	f.60
Suffusio per consensum quæ fiat	8
Suffusio primaria à secundaria suis signis distincta	ibidem
ad Suffusiorè aqua singularis	86
Suffusio	16
Suffocationis vteri cõmune sym- ptoma respirationis defectus	263
Suffocatio vteri simul cum men- sibus 45 vel 50. anno cessat, aut ingrauescens interficit ibid.	
Suppuratione non apertam no- xæ consequentes	c.28
Syncope quid, & eius curatio	131
Syncopes quadam specie semper moritur homo	133
Syncopes duo propria sympto- mata	ibidem
in Syncope vinum commendat Gal.	134
Syncope à plenitudine phlebo-	
tomia non iuuatur	ibidem
Symptomata febrium	f.50
T	
Tenesmus quid	206
Tenesmi curatio	ibidem
Tenesmus principium dysente- riæ	208
Tenesmus grauidis abortum mi- natur	ibidem
Tepida imbecillo vetriculo non admouenda	49
Tertiana notha	f.8
Theamenes lapis ferrum expel- lit	c.8
Thessali vitiosa curandi ratio	c.88
Thymiama	245
Tinctura capillorum	p.5
Tinea remediis luis veneræ cu- rata	p.8
Torpedo piscis τάρχην	c.111
Trochisci Rhazæ ad cholera	136
Tussis & eius causa	96
Tussi quomodo medendū	96.97
Tussiculosi senes	97
Tussis vt excitetur	98
Tussis causa multiplex	98
Tussis curatio	c.9
Typhodes Ætio quid	f.2
V	
Variz febrium diuisiones	170
Variolæ	f.64
Variolæ & morbilli à suppressis mensibus	65
Varix quid	f.69
Vena non secanda in præfocatio- ne vteri à semine retento	262
Vena iecoraria in pleuriticis an secanda	112
Vena in apoplexia an secanda sit	28

I N D E X.

Vertiginis primariæ causæ	19	Visio absoluta quæ fiat	16
Vertiginis per protopatheiam cerebri factæ signa	ibidem	Vis remedii vitio conferenda	c.3
Ver & Autumnus tabidis infe- stissimi	125	Vitiliginis tres species	281
Ventriculi affectus ferè infiniti	143	Ulcus ventriculi	p.52
Ventriculi imbecillitas à calida vel frigida causa	145	Ulcus abluendi ratio	c.37
Ventriculi imbecillitatis curatio ibidem		Vnguentum gloriæ	c.73
Ventriculi calidæ intemperiei re- medium	p.48	Βούλιμος	p.53
Vermium genera tria	293.241	Vocis vitia	p.43
Vermis latus narib⁹ eiectus	241	Vomicæ quo tempore aperien- da	c.34
Vermis latus Aëtio quid	ibid.	Vomit⁹ à cibo tertianam quan- doque soluit	f.10
Vermes à putredine cur gene- rantur	265	Vrinæ cū capillitio emittæ	230
Vermis in cerebro procreatus	p.9	Vrinæ carnosæ ramentis permi- stæ à renibus	ibidem
Vermes aurium	p.19	Vrina potui correspondere de- bet	237
Vigiliarium causæ tres	f.50	Vrticæ semen	c.34
Vinum aqua frigida dilutum ex- tremum ad choleram reme- dium	136	Vteri præfocatio	261.p.63
Vires corporis in quibus consti- tutæ sint	132	Vteri affecti varia symptomata ob variam, quam cum reliquis habet partibus, sympathiam	263
Visus debilitas & eius causæ	76.	Vterus Platoni animal	252
77		Vulneris figura qualis esse de- beat	c.33
Visum restituens aqua	78	Y	
Visorio spiritui ad oculos dedu- cendo quæ necessaria instru- menta	79	Υ' πρόσφαγμα	85
Visorij spiritus propriæ differen- tiæ	80	Υ' πυροπικα	c.104
		Υ' πύπνον	85.p.35
		Υ' σερικη πιξις quid	262

F I N I S



ANTO. VALETIVS
LECTORI.



VM ea munera, quibus Deus Optim. maximus humanum genus amplissimè auctū, & coonestatū liberalissimè voluit, mecū ipse considero, Candide Lector, eam in

sententiam facilè adducor, vt maius nullum, nullūmuc honorificentius reperiri posse existimem, quàm præclarissimam artium omnium Medicinam, quæ publicæ salutis temonem dirigit, & communi mortalium vitæ ad summū splendorem confectandum viam munit. Quod prudens imprimis antiquitas optimè edocta, meliora semper ingenia ad eam artem ab exiguis & rudibus profectam initiis, mirificis doctrinæ atque experientiæ incrementis lo-

cupletandā tam auspicate trāstulit ac exci-
tauit vt admirationis materiā magis, quā
imitationis spem, posteris visa sit reliquis-
se. Primis nanque temporibus cūm abdi-
ta illa Deorum doctrina (siue ex adscri-
ptis in templo Æsculapij monumentis pe-
tita esset, seu ab hominum ægrotantes vi-
catim exportatos inuisentium cōgressibus
accepta atque tradita) sola obseruatione
constaret, & collectis tantū affectuum si-
militudine remediis inniteretur, proximū
sanē fuerat, vt nocte densissima ingruente,
in qua iam adūsq; Peloponnesiacum Græ-
ciæ bellum trecentesimo Romanæ Urbis
anno gestum, miserē ac infelicitē delitue-
rat, penitus interempta iaceret, ni diuinis-
simus ex Æsculapidi familia Hippocra-
tes eam ē tenebris in lucem reuocāset, &
veluti nouo quodam partu genuisset, per
omnia membra aluisset, eduxisset, omni
denique ornatu insignem & plausibilem
reddidisset. Ab Hippocrate quanquam fa-
ma & ætate secundi fuerunt quampluri-
mi, Diocles Carystius, Praxagoras Cos,
Chrysippus, Herophilus, Erasistrat⁹ Chius,
Serapion Alexādrinus, Apollonius, Glau-
cias, Heraclides, Acron, Asclepiades, The-
mison, Dioscorides, Antonius Musa, Arto-
rius,

rius, Euphorbius, Valgius, Cassius Felix, Cornelius Celsus, qui pari studio inflammati Medicas artes propagare, exornarèq; enixissimè contenderint, tandem tamen vnus emerfit ac emicuit Galenus, qui superiores Medicos vt & ingenij magnitudine, & doctrina, & diligentia infinitis propemodum parafangis superauit, ita salutaris illius boni instaurator ac illustrator peculiari nomine meruerit appellari. Ea ferè tempestate, aut certè continuò pòst, alios atque alios extulit Græcia, qui grata mente & Viri tanti opera vterentur, & lætos vberèsq; fructus ad publicos vsus redundaturos multa scriptorū editione premerent: quam de præstanti consilio suo spem & expectationem fausto & prospero successu confirmârunt. Græcos æmulaturi mox prodierunt Arabes, qui Graiam concinnitatem & elegatiam quo stylo potuerunt, horrido nimirum & inculto, in suam linguam transfuderunt: indèque factum, vt Barbaris illis sexagenariis, qui primitus in quibúsque disciplinis, tanquam in latitudinibus prædiisq; suis, regnabāt non impudenter minùs, quàm superciliosè, Medicinæ sermone suo, rudi quamuis & incompro, euulgæque cupiditas incesserit admiræ.

da. Verumenimuerò instaurata plurima
post secula Latina linguâ, & visi sunt olim
è nostris non pauci ingeniû suum ad prisce
normam vetustatis rectè, præclarèque exi-
gere, & eandem etiam perbellè interpola-
re: & hoc nostro tempore cultiorum disci-
plinarum feraci non desunt, qui cum an-
tiquis certent: vt effceta non vsque adeò
natura hac conspicitur ætate, quin paria
illis ingenia proferat, quæ æquè fortasse
sint de posteris promeritura. Quod vt ve-
rum & expressum, non item adumbratum,
quiuis intelligat, spectet, quæso, quot quâ-
tâque Medicinæ numina hac vna è nostra
Parisiensi Academia omnium longè flo-
rentissima, celebratissimâq; exierint, quæ
suo iam pridem fulgore Orbi innotuerunt
vniuerso: protinus meherculè viderit se-
cundos nobis illuxisse Hippocrates, Dio-
scorides, Galenos, summos medēdi magi-
stros. Etenim vt Rüellium, Syluium, Fer-
nelium, omnium suæ tempestatis Medico-
rum Principes, omittam, vnus mihi Holle-
rius, velut Οὐλῖος, alter, id est salutifer &
pæanicus Apollo, omnium instar fuerit,
qui nota de meliore toti veniat posterita-
ti cōmendandus. Hunc siquidem, si quem
vnquam alium, nodosum illum baculum,
quem

quem Æsculapij simulachro ad artis signā-
dam difficultatem Veteres appofuerūt, ex-
plicitum habuiffe, & fubiectū Draconem
peruigilis ac oculatæ mētis aciei in medico
maximè defiderandæ hieroglyphicū, cū
multiuga illa superiorum rerum ac infe-
riorum cognitio, quā fefe cunctis ad mi-
raculum fufpiciendum exhibuit, tum ve-
rò expedita in Medicina faciitanda dexte-
ritas, quæ de vulgari, fupināque ofcitantia
fatis fupérque triumphauit, eft cumulatif-
fimè teftata. Nam cū Medicam faculta-
tem doctrinarum omnium confortio ac
circulo perfectam efle didiciffet, quantum
licuit per admirabiles ingenij fui dotes, or-
bem illum multiplicem, quem *ἐμπλο-
παιδεία* vocant, adæquauit: nec deftitit
prius, quàm summū in Virum euafert, &
(quod eft in medicina laudatiffimum) om-
nia nōrit, quæ in Proteo, & quidem magna
illa & honorifica, Poëta laudauit,

Quæ fint, quæ fuerint, quæ mixtæ vëtura trahātur.

Vt autem ad primorum Medicorum con-
fuetudinem laudabilem fe totū prima-
rius ille Medicus componeret ac compa-
raret, quicquid à praxi fupererat ocij, id
ftudio captus indefatigabili modò fcrip-
tionibus, modò prælectionibus commit-

tebat : vnde sibi laudis tantum quæreret,
ut quo donatus quōdam fuit Hippocrates
elogio, eo meritò debuerit vbiuis gentium
celebrari.

Ὁ Μένειος Φάος ἰὼ μερόπων, καὶ σῶ·το λαὸν
ἔθνεα, καὶ νεκρῶν ἦν ἀπάνις ἐν αἰὲ·ν.

Id est, ut ego venio.

*Lex hominū Hollerius populos tutatus, in Orco
Fecit ut umbrarum copia rara foret.*

Hæc rei fidem faciunt locupletissimam
tum hæc de medēdis morbis eruditissimæ
elucubrationes, tum quæ nondum in pu-
blicum venerunt paraphrastica in Apho-
rismos Hippocratis, prognostica, epidemia
& Coacas prænotiones Cōmētaria, quibus
nihil quicquam esse in eo genere perfe-
ctius deterate ausim : imò non dubitem
quoniam quod de Pericle scriptum est, aculeos
in doctissimorum hominum animis, vel
leuiter gustata relictura sint. Atque utinam
Hollerij exemplo moniti primi ordinis
doctores iisdem vestigiis insisterēt, & quā-
tum ab ea arte, quam ad fastum & gloriam
proficentur multi, luminis & decōris mu-
ntantur, tantum in eandem conferre or-
namenti studerēt, vel saltem studiosorum
copatus, ex quorum insectatione peruersè
nomen aucupantur, & quiùs consulerent,

ac interpretarentur. Melius, meo iudicio,
optimi quique Medici audirent, nec ita
passim apud multos contemptui haberen-
tur: nec stulta quadam animorum cæcita-
te boni & mali, docti & indocti, eadē sor-
te censerentur. Verum, prohi Deum atque
hominum fidem, iniquos videas hoc tem-
pore permultos, quorum impiis technis
ars pulcherrima, saluberrima, & sacratissi-
ma mirum in modum proscinditur & con-
culcatur. Alij probis viris insultant, quod suas
nugas liberius insinuent & iactent: alij iu-
niores medicos, tanquam inexpertos, crassæ
imperitiæ apud vulgus criminantur, quod
absolutos (viti aiunt) consummatosque ac
perfectos Medicos non nisi ætate confe-
ctos esse oporteat. Quinetiam quod egrius
ferendum, & mihi, meisque coætaneis ma-
gis ominosum videtur, insuper dictitant bo-
ni illi Patres sese in resarciendis pragma-
ticiæ nostræ vitiis frequentius occupari, si
fortè ad consilium adhibiti, in ægri, aut as-
sidentium aures quicquam potuerint in-
sufurrare, quod palam dicere salua pace
nequeant. At certè quotidie videre est me-
dicos, quibus & intonsa sit velut Æsculapio
barba, quibusque retorto

Pæonium in morem senior sit forma capillo,

communes istos in errores prolabi, & iu-
uenum plerunque solertia dexteriore le-
uari. Hinc interea accidit, vt & imperitam
plebeculam iamiam nocentissima inuase-
rit opinio, & occasio suspicandi nullam ar-
tem esse Medicinam, quæ tam dissiden-
tes, & velut in transuersum actos, sui ferat
profesores. Hac quoq; data porta in tan-
ta rei medicæ luce irruunt in communem
mortalium omnium perniciem, interne-
cionemque impostores Empirici, & artem
optimam male eementiti, posthabitis Aca-
demicis legibus, abrogatis Facultatû pri-
uilegiis, neglectis optimorum Principum
decretis, de humano corio miserabili-
ter ludunt. Sicque magno applausu ac con-
cursu suas quisque ineptias promouet: a-
lius editis vernacula lingua centonibus, &
experimentis quibûsuis etiam aniculis de-
mentatis & idiotis probatis: alius antimo-
nio præparato: alius nescio qua theriaca
noua ex intimis magni cuiusdam Medici
secretis eruta: alius denique Alchymisticis
fumis, quos magno studio venditat. Hinc
fallaces mille vagatores experimenta, tan-
quã certa auxilia, sub pignore capitis pro-
clamant, vel pro rostris etiam in vulgum
edicunt: vitam pollicentes, mortem ven-
dente s.

dentes: idque, quod apud Christianos maxime dolendum, inultè. Nostrorum sanè permagni interesset Medicorum istas circumforancorum pestes artem nobilissimam turpiter prophanantium longissimè arce, non mutuas altercationes & odia, quæ viros ἀνύμους & irreprehensibiles (quales ubique Medicos Homerus appellauit) exercere. Sed de hisce viderit magistratus, ne longius ista peruagetur calamitas nimium ac nimium in viros doctos iniuriosa. Quod ad meum attinet institutum, Cædidissime Lector, tanti apud me est rem Medicam iuuandi studium, ut censoriam quauis subeam animaduersionem, si modo quippiam tibi vsui & commodo futurum moliri valeam ac meditari. Et quanquam in me nullam agnosco industriam, quæ immensam iudiciorum varietatem atque intemperantiam expleat, tamen & utile aliquid aggredi præclarum semper, & honestum esse iudico, nihil hominum maleuolentiæ suffusorum iniquissimum iudicium, occæcatam opinionem, elatam ac superbam despicientiam moratus. Itaque cum quatuor abhinc annis Hollerii Medici clarissimi praxim secundò in lucem dedissem, eamque plagariis & furtiuis è mani-

bus Caspari Vuolphij Germani tempesti-
uè satis extorsissem, de tertia editione co-
gitare cœpi, & quod antè non licuerat mi-
hi, ex fide manuscripti exemplaris, cuius
copiam ANDREAS PASTOREVS Hol-
lerij dignissimus gener, & Regius in curia
Parisiensi Senator, pro ea, qualiteraros vi-
ros Vir ipse omnium literatissimus & do-
ctissimus complectitur, humanitate, mihi
fecerat, omnia emendare. Et ut me tandem
apud omnes constaret diligentiæ fides, quæ
excusationis errorum viam facilius inue-
niret & exoraret, in Chironiis aliquot &
Telephiis vlceribus detergendis, quæ pro
deploratis habueram, nisi Autor ipse, me-
dicus arte summus, præsentissima præsidia
suggerisisset, aliquantum operæ posui. Næ-
uos verò omnes si minùs, vti debui, casti-
gaui, optima spes est fore, vt boni omnes
excusent, nec tamen ob id impensum la-
borem sibi finant ingratum esse. Neque e-
nim occupatissimo homini, & asperiore
cum fato perpetuam luctam agenti vacat
aliquid omnibus numeris ac partibus ab-
solutum excogitare. Accurratissima autè,
elaboratissima, & Hippocratis supellectile
refertissima priorem in librū Scholia, quæ
Desiderij Iacotij Vadooperani Medici Arc-
latensis

latensis nomine hætenus sunt circunlata,
quia *αὐτορραφῶς* in Hollerii codicibus e-
notata repen, nefas putavi non ea legiti-
mo Autori suo restituere. Nihil tamen Ia-
cotij sedulitati detractum velim, qui alic-
na quidem, sed non sua, communi bo-
no gratulaturus publicârit. Ludouici Du-
reti Regij Medici & Professoris celeberrimi
Aduersaria, è penitissimis latricæ artis
mysteriis, quæ de communi Medicorum
Deo Apolline plus quam alius hausit, de-
prompta, denuò adicere libuit, quæ Zoïlis
etiam extremis vnguiculis perpruriētibus
plausibiliter accepta, illum impellere debēt
ad proferendas in publicum, quas domi
tam longum tempus continet, in Hippo-
cratem Commentationes antiquis & po-
steris palmam facilè præcepturas. Ego ve-
rò qui in alieno elaboro, nec vllius laudis
particeps fio, nec fieri quidem cupio: nam
hæc ferè talis est apud plurimos opera, vt
omnem quem pro laboribus meretur, lau-
dis fructum intercipiat: quasi ei, qui dere-
lictum cuiuspiâ ac sentibus occupatū agrū
suo labore expurgârit, colueritque, enata-
rum inde frugū pars nulla debeatur. Quò
propterea libētius hac sum deinceps ope-
râ & curiositate superseffurus. Interim vo-

rò tantulas nostras Exercitationes raptim
scriptas & exaratas damus: non quæ sint e-
iusmodi, vt Hollerij scripta venustiora, vel
locupletiora faciant, sed quæ tamen ad ac-
commodatam profligandis morbis reme-
diorum syluam comparandam quippiam
adiumenti sint allaturæ. Obtendat quas-
cunque voluerit vocularum maleuolus: nihil
esse nouum dicat: nihil allatum, quod non
sit scriptum prius: deniq; & mediocris esse
hominis hinc illinc excerptis communi-
bus locis libros quantumuis exiguos am-
pliare: huic etsi quid respōdeam in prom-
ptu sit, tamen cum planè ridiculum ducā
ociofo cum hominē verba cōmutare, hoc
cum rogārim vnum, me scilicet existimet
non sibi placere studuisse, sed vnus aut al-
terius Roscij (id est Medicinæ studiosi, qui
cōatus meos sit equanimiter accepturus)
quàm theatri totius, plausum referre ma-
luisse. Vale.



AD CLARISSIMUM VIRVM,
ANDREAM PASTOREM,
Regium in Curia Parisiensi Senatorem,
IO. AVRATI POETÆ REGII,
EPIGRAMMA.

QVI solitus mediū animas de faucibus Orci
Eripere, & triplicem detinuisse colum,
Ille idem Hollerius medio reuocatur ab Orco:
Et sua produci stamina secta vider.
Si non arte sua, qua non habet ille secundum,
Pastorei certē sedulitate sui.
Qui gener vt soceri genus haud sinit esse caducū,
Hollerij genitos stirpe per Holleridas,
Sic quoque ne soceri pereat cum nomine fama,
Scripta palam vulgans Holleriana, vetat.
Quæ ferus intercepta Lupus cum nuper abactam
Ceu stabulis teneram dilaniaret ouem,
Sedulus vt Pastor pradam de dente Lupino
Excutit, & nomen re probat ipse suum.
Felix Hollerius, viuo cui fauit Apollo,
Esset Apollinea ne quis in arte prior.
Felix Hollerius, cui Pastoralis Apollo
Pastoreum, sibi qui seruet ouile, dedit.
Quilibet vt veniat notus feritate Lycaon,
Hollerij frustra dente laceffet oues.
Quilibet vt veniat fallax Germanus Iason,
Aurata vacuus pelle redibit iners.

EIVSDEM AVRATI

In Vvolphij furtum à Valetio deprehensum.

Vvolphius, an ne lupus patriæ qui nomine lingua
Dicitur, & nomen moribus ipse probat,
Viribus, insidiisque Valens in furta lupinis,
Holl.ry libros finxerat esse suos?
Hollerij, Medica cui cedat in arte Machaon
Vino, nunc vulgus scripta superstes habet.
Illos qui potuit manifesto lādere furto
Phœbigenæ manes, Phœbigenæquæ rogam,
Non hunc posse putes turbare Nouend. a sacra,
Libæque semicremo deripuisse rogo?
Non impunè sed ille nefas immane patrauit
Deprensa furci calliditate lupus.
Nā lupicida vetus Phœbus, Lyciūsq; Lycoreūsq;
Hinc dictus, rabidum perdidit ipse lupum.
Et quia Diis hominū mos est sibi sumere vultus,
Sic & ab iniustus sumere supplicium:
In tua transformans se Cynchius ora, Valeti,
Furta ministerijs arguit acta tuis.
Sicque dedit meritis poenas Phœbōque, suōque
Phœbigenæ Hollerio, Vvolphius ille rapax.

NICOLAI ELLAIN, DOCTORIS MEDICI
Parisiensis, ad Casparum Vvolphium, Physicum &
Medicum Tigurinum, Hendecasyllabi.

D I C Vvolphi, precor, ore cur lupino,
Quod Germana sonare lingua ferunt,
Et clamore laceßis anserino,
Ductisque insequeris calumniosi,
Vigēsque iuvenitum meum sodalem,
Politum, nitidum, Virum probatum,
Doctum, candidum, & integrum Valeum,
Claram multiplici eruditione,
Cunctum tempora Phœbi virāque laurum,
Insignem Medicum, optimum Poëtam,
Acquē Diis superis amatum & imis,
Acquē principibus Vitis amatum, &
Plebi, nec minù. exteris amatum,
Quàm suis, patria decusque gentis?
An nescis homines ut eruditos
Nemini esse detere contumaces,
Molestos, neque contumeliosos,
Sed comes potius venastulosque,
Benignos, faciles, modestiāque
Insignes, lepidos & elegantes?
Sic vides quoque disputationes
Non debere gravem hanc & insolentem
Rivam admittere, sed modestiorem?
Ergò, si sapiis, impotentis aëtus
Mentis comprimito, & graves furorcs.
Iam iam mitte meo molestum esse
Sodali, monso, precorque amicum.
Iam iam mitte meum insequi sodalem,
Politum, nitidum, Virum probatum,
Doctum, candidum, & integrum Valeum,
Claram multiplices eruditione,
Cunctum tempora Phœbi virāque laurum,
Insignem Medicum, optimum Poëtam,
Acquē Diis superis amatum & imis,
Acquē Principibus Vitis amatum, &
Plebi, nec minù. exteris amatum,
Quàm suis, patria decusque gentis.

Quòd si consiliū & preces amicas
 Negligis, neque contumeliosa
 Modum ponis adhuc loquacitati,
 Pergisque immeritum meum sodalem,
 Politum, nitidum, ritum probatum,
 Doctum, candidum & integrum Valetum,
 Clarum multiplici eruditione,
 Cinctum tempora Phœbi utraq; lauro,
 Insignem Medicum, optimum Poëtam,
 Aequè diis superis amatum & imis,
 Aequè Principibus Viris amatum, &
 Plebi, nec minùs exteris amatum,
 Quàm suis, patriæ decusq; gentis,
 Exercere ferus, iocante Musâ
 Iam non Hendecasyllabos venustos,
 Sed multò potius furente Musâ
 Versus Archilochi seneriores
 Expectato Lycambico furore
 Famosos, laqueoque Bupalino.

ΕΙΣ ΔΑΜΠΡΟΤΑΤΟΝ ΙΑΤΡΟΝ,

Ἀντίοχον Οὐαλήτιον, Γ' ω. Σπινανσίου. Πετροκρηπίδου

Γρινολαϊκῆς Ἐπιγραφῆς.

Οὐλομένης Κελτῶν πολέμουσι τεύχεσσι τ' αἵμας
 Σκηπτοφόρος Κάρλος φησὶ ποῖσις ἔπαι,
 Πᾶσι ἱερὰν μάχης ὡς Διὸς ἰαὸν γένεθλον,
 Ἡδὲ καλὸς μυστῶν, καὶ χαρίτωι τεύχεσσι.
 Νῦν δὲ ἀκιστοῖν κρᾶττον μέγας ὡς πυκνὰ αἶμας,
 Τῶν τε πόνων (ῥυτίχῃ, τῶν τε φρενῶν πινυτῶν
 Φαίδιμος ἢ δ' ὀνομαστός ἐων παρὰ πᾶσι, ἀκρίστis
 Εὐεπίης κύδος, καὶ φᾶος ἡπιόνης.

ADRIANVS TARTERIVS MEDICVS

Trecensis, ad Candidatum Medicinæ.

Iam dudum manibus suis teruntur

Perdocti Hollerij graves labores,
 Lector, nec recipis manu sat ampla
 Fructus Hollerij labore dignos.
 Nil miror: deerat suo Valetus
 Doctori Hollerio: sed ambo iuncti
 Iam iam perficiunt viam medendi.



IACOBI

HOLLERII

STEMPANI, MEDICI

PARISIENSIS CELE-

BERRIMI, DE MORB.

internis Liber I.

Antonij Valetij opera iam nunc multò quàm
antehac auctior & emaculatioꝛ factus,
necnon luculentis exercitationi-
bus illustratus.

De dolore capitis. CAP. I.



OLET CAPVT, 1 intempe-
rie, aut solutione continui. Intem-
peries simplex, cōposita: sine ma-
teria, cum materia: illaque vel in
toto cerebro, vel in venis, arteriis,
membranis; neruosisque corpori-
bus. 2 Solutio continui fit acri humore erodente,
putri, bilioso, salso, vulnere, casu concussione, pun-
ctura, maligna qualitate, vt in lue venerea, carie,
distentione. Distentio ferè à copia 3 humorum,
vel flatuum: humorum quidem, vel omnium, vel
2 liquorum, vel alicuius. Fit quoque obstructione,
1 Quæ est tē-
peramēti ni-
mietas, aut
paucitas.
2 Hac est al-
tera doloris
causa, cū in
parte simila-
ri, tum in or-
ganica. So-
luunt solu-
tionē cōtinui-
tatis simila-
rium, quæ vo-
dūt, incidunt,
distēdunt, ve-
hemēter cal-
faciunt, aut
refrigerant.
3 Hi vel aliā
deaffluunt,
vel in capite
nascuntur.

quum videlicet angustias meatuum capitis intercipit humor crassus & viscidus, aut spiritus vehementer vaporosus, in futuris, ossibus palati colatoris, & quæ ad nares, aures, oculos & spinam pertinent.

Dignoscitur ex varietate causarum efficientium, ex partium laborantium natura, ex loco, ex qualitate propria. Causæ efficientes, externæ, internæ. Externæ, æstus, perfrictio, ebrietas (à vini enim potu multo caput quasi spiritu distenditur) casus, ictus, victus, vapor aliquis, ut fumus, gravis odor, aut naturæ ægri repugnās. Quinetiam adstrictis arctiore veste & iugularibus, & inferioribus venis, sursum sanguis regurgitat, venas capitis distendens. Internæ, intemperies naturalis, aut contracta morbo, quantitas, qualitas materiæ humorum, vel vaporum, mala conformatio, obstructio. A partium natura, nervosorum corporum, magis punctorius: arteriarum, pulsatorius: stupidior in venis, & cerebri substantia. In periostio superficialis: altus in meningibus. Intra calvariam ad radices oculorum extensus. In plenitudine, gravis: in acri humore & vapore, rodens: sed vapor distendit magis, humor magis mordicat. Vbi distentio citrà rorsionem, spiritus flatuosi vel humoris non rodentis copiam indicat. Distentio cum pulsu, membranarum inflammationem sequitur: cum gravitate, copiam membranis conceptam & inhærentem: sine gravitate & pulsatione, copiam crudi flatus. A sanguine ferè in frontem: à pituita in occiput: à bile, in dextrum latus: à melancholia, in sinistrum decumbit. Sunt quibus arteriarum intemperies sanguinem spirituosum multum colligit, unde dolor pulsatorius & vehemens

excitatur. Quibusdā vermes generātur in cerebro: Id rarum esse scripsit Auicennas, quod tamen memoria nostra visum est. Et cuidā Italo ex frequenti odoratu basilicæ herbæ natus scorpio in cerebro, vehementes dolores & lōgos, mortem denique attulit. Humor autem & vapor vel in cerebro gignitur, vel aliundē ascendit, ab extremo pollice, & plāta pedis à venenato vulnere clauso, vtero, hepate, liene, ventriculo, pulmone & aliis. Cæterum de causis dolorum capitis mulierum ab vtero abundē Galenus differit cōmentario in illam sententiā lib. 6. Epidem. Quibuscūque ex fœtu abortiuo, atq; vteri tumorib*, ad capitis grauitatē cōuersio fit &c. Sed iis adiunges pericranij & capillorum sordes, capitis vincula, & similia à recentioribus obseruata.

Curatio.

Curatio in his est: in phlebotomia, arteriotomia, sanguisugis, cucurbitulis, purgatione, potionibus & medicamentis materiam præparantibus, topicis repellentibus, concoquentibus, mitigantibus, alterantibus, digerentibus, roborantibus, phœnigmis, sinapismis, cauteriis, paracentesi. Hæc omnia remedia sunt dolorum capitis.

Phlebotomia 4 imperatur, si 5 plenitudo & sanguinis copia, si vehemens 6 obstructio est, si vultus, casus, concussio, febris, inflāmatio, atque adeo, vbi intolerabilis 7 dolor est.

Si à reliquo 8 corpore vitiū est, 9 primū axillarem, deinde 10 cephalicā, aut semel mediā diuidito.

Si à suppressis mēsis, aut hæmorrhoidibus, ve-

10 Ad auersionem materia propinqua, & amotionem causa coniuncta.

4 Ad reuul-
sionē materie
antecedentis.

5 Vniuersalis
& singularis.

6 Contumax
illa obstru-
ctio grauita-
te doloris per-
cipitur.

7 Cuius leniē
di causa ad
lipothymiam
mittitur san-
guis.

8 Vt à ple-
thora vniuer-
sali, aut trā-
slatione sym-
ptomatica.

9 Axillaris
seu interna
vena, basili-
ca vulgò di-
cta, primū
pertunditur,
si doloris cau-
sa & fons

perēnis sit in
hepate, liene,

& toto gene-
re venoso: id-
que fit ad de-
clinationem

causæ antece-
dentis, & ad

generationē
prohibendā.

DE MORB. INTERNIS

- 11 *Ab obstru-
ctione contumaci, causa
coniuncta magnitudine.* nas malleoli incidito: 11 perseverante malo, 12 venam frontis, temporum, quæque post aures sita est, aperito. Eam tamen eligit, in cuius regione dolor incumbit magis.
- 12 *In dolore enim fixo partibus propinquioris vena secanda, per apho. 68. li. 5.* Arteriotomia probatur in iis, qui ob intemperiem arteriarum capite dolent, ac vertigine: atque ubi sanguis calidus & vaporosus dolorem facit. Eligenda in fronte, temporibus, aut post aures, quæ micat, magis calet & rubet, & ubi dolor acerbior est. Ex libr. 6. de sanit. tuend. libr. 13. methoh. libr. de sang. missione.
- 13 *Diffuso humore inter pericranium & os.* Vacuato iam corpore & contumaci 13 malo, 14 sanguisugæ extremo naso affiguntur, post aures, & venis, quæ in caluaria eminent. Aliquando iis, qui ita 15 assueti sunt, & multi sunt sanguinis, post maiora remedia sanguinem è naribus 16 irritamus.
- 14 *Preparantur hircudines ex præscripto Galeni lib. de cucurbitulis, hircud. scarif.* Cucurbitulæ primùm leues occipitio, vel cervicis initio, deinde cum scarificatione affiguntur.
- 15 *Quibus humores sunt, ἀνὰ πρῶτον.* Post phlebotomiam & ante phlebotomiam imperatur 17 purgatio, aliquando etiam sine phlebotomia purgamus.
- 16 *Ut millefolio naribus imposito.* Ante phlebotomiā leui pharmaco, cuius vis hepatis non superet, sed tantum venter, mesenterium, sima hepatis, & intestina repurgetur: quale hoc erit. 2℥. cassiæ, aut cathol. 3.℥. aut cassiæ 3.℥. quadrante 18 horæ ante pastum.
- 17 *Quæ leui pharmacoperficietur, ad primæ regionis cruditatē excludendā, ne in venas cū sanguine rapiatur.* Purgationis vices clyster persæpè supplet: qui in doloribus capitis tãti est momenti, ut deorsum materiam reuellendo plerumque repetitiones ipsas fieri prohibeat. Vnde periodicis in doloribus, instante etiam accessione, commodè iniicitur, totaque
- 18 *Ne in cibum & alimentum natura vertatur.*

morbi historia repetitur. Clysteris communis hæc erit formula.

℞. decoct. comm. clysteris ℥. j. dissolue cassiæ & cathol. ana ℥. ℞. mell. ros. sacch. rub. ana ℥. j. vel ℥. x. olei violacei quar. i. f. clyster.

Dein post phlebotomiam, si quis humor vitiosus relictus est, & si quidem recens dolor est, materia sequax, & subtilis, & tenuis, nulla quoque ob-
structio est, leui pharmaco vtêris, vt Cassia, Rhab-
barb. 19 Manna, mollioribus atque diuitibus: electario de succo rosarum, diapruno, hieræ puluere, Catholico in aliis. Quales sunt hæ formulæ.

℞. decoct. prunorum, tamarindorum, passulorum, trium florum, cardiacorum, quantum sufficit ad dissolutionem ℥. i. mannæ.

℞. Cassiæ fistulæ ℥. ℞. mannæ ℥. i. dissolue in supra dicta decoctione, vel sero lactis, vel aqua hordei, ptisana.

Pauperibus, loco mannæ, penidia imperabis, vel cathol. drach. 6. cassiæ fistulæ vnc. ℞. aut cathol. vel cassiæ drach. 6. diapruni ℥. 2. Ex his omnibus cum saccharo fiat bolus: aut, vt supra dictum est, dissoluantur. Rhabarbarum aliquando per se, aliquando cum cassiâ imperabitur. Pueris ℥. 2. rhab. infunduntur in aqua endiuia, cum modico cinamomi: mulieribus, à ℥. i. ad ℥. i. & semissem: viris, ad drach. 3. Mollioribus, & quibus aluus facîle commouetur, ℥. 3. cassiæ, & ℥. 2. rhab. satis esse possunt. Ex his fit bolus cum saccharo. Aliis cassiæ fistulæ ℥. 6. addimus ℥. 4. aut circiter rhab. Puluere hieræ picræ sic vtendum erit.

19 Manna picrocholis nõ exhibeatur, vt nec cate-ra, quorum est facilis in bilem commutatio.

20 Simplicis Galeni, sine agarico & croco.

DE MORB. INTERNIS

℥. pul. hieræ 20 picræ recentis drach. 2. exci-
pantur modica conferuâ violarum, *ad tollendum*
amarorem. Aut hæ pilulæ fortiores erunt.

℥. pul. aloës 3. i. mastic. cinamo. ana ꝑ. 8. dactidij
gr. 4. (*ad eradicationem*) cum succo citri fiant pilu-
læ. In crassis & viscidis humoribus, magnis quo-

21 Doloris
enim pertina-
cia phleboto-
me indiget.

22 Quia vt
sunt varij co-
ctionis gra-
dus, ita &
purgationis,
ac exclusionis

23 Ad crasse
materie ena-
cuationem.

24 Nisi vlla
leuenteria, hi-
sterica affe-
ctionis, aut
melancholia
hypochondria-
ce adferripof-
sit excusatio.

que obstructionibus, grauior ferè atque contuma-
cior morbus est. In quibus & 21 phlebotomia, si
cætera consentiunt, necessaria est, & potiones, quæ
materiam incidant & attenuent, à quibus purga-
tiones per 22 interualla, validique clysteres. Topi-
ca ex iis, quæ incidunt & attenuant. Errhina, Apo-
phlegmatismi, Suffumigia, Gargarismata, Frictio-
nes, Vincula, Cucurbitulæ, Sinapismi, Setones,
Ferrum, Ignis:

Phlebotomia, vt priùs, instituenda satis 23 am-
plo vulnere. 24 Oxymelite, aut aliis descriptis, ma-
teria præparabitur, aut hac potione.

℥. stœchad. citrin. vnc. 2. fiat decoctio in aqua
purissima ad quart. 3. In expressione colata dissol-
ue mellis communis, aut mellis albi, vel sacchari
albiissimi lb. 8. plus minúsve. Fiat syrupus, vtatur
ieiunus, duabus horis ante cœnam, dosi trium vn-
ciarum. Hæc potio putredinem arcet, extenuat,
deterget, roborat non solum cerebrum, sed viscera
omnia, & corpus, laudata Græcis & Arabibus. A
qua, vsus esse potest syrupi de stœchade incomple-
ti, id est, sine aromatibus, *detracto croco.* Atque hinc
syrupi completi, id est, cum speciebus. Eodem mo-
do ex acoro, (*omnibus morbis à defluxione confert,*
quia adstringit) & fœniculi radice, oxymel parari
potest, atque hinc hydromel.

Calidiores syrupi suspecti sunt, vbi plethora, febris, cruditas in primis venis. Hinc enim augentur febres, liquefacta cruditas trahitur in corpus, fusa plenitudo apoplexias, febres, tabes, & alia mala inuehit. *Hic quoque considerandum anni tempus, regio, agri temperatura & ætas.* Purgationes ²⁵ fiunt ex hiera diacolocynthidos, agarico, & aliis, qualis hæc est.

℥. 62 pul. hieræ diacolo. 3. β. agarici tro. 3. 2. mastich. bdellij ana 3. β. nucis moschatæ Gr. viij. cum ²⁶ succo absynthij formentur pilulæ. Delicioribus naturis poterunt excipi pulueres in modico cōseruæ anthos. Solent autem parare syropos, quibus interuallis vtendum sit, quos ita conficies, vt in decocto describantur quæ attenuent, concoquant, aperiant, roborent, ²⁸ & conuenienter purgent, qualis hic est.

℥. rad ²⁹ graminis, petroselini, asparagi, an. 3. β. feniculi, & feniculi ana 3. i. ³¹ betonicæ, stœchados an. P. 2. florum ³² cardiacorum ana P. i. passul. mundatarum (*earum caro relaxat*) 3. β. liquiritiæ 3. 2. polypodij querni 3. β. aga. trocisc. 3. i. β. foliorum senæ (*orientalis: nostra nullius fere est momenti*). mūdatorum, & in fine decoctionis positorum 3. 2. fiat decoctio in aqua purissima ad lb. i. In col. dissol. sacch. albissimi q. i. Fiat syrupus mediocriter coctus, vtatur singulis hebdomadibus 3. i. β. cum 3. 2. hydromelitis, aut ptisanæ. Erit autem calidior cum hydromelite, frigidior verò cum ptisana. Fortior.

℥. polypodij querni, rad. acori, ireos, sem. carthami ana 3. i. β. sem. anisi, feniculi, cuscutæ ana drach. 2. sebesten N. 12. Cetherac, scolopendrii, betonicæ, summitatum lupuli, agrimonix ana P. i. stœchad.

²⁵ Quæ humores ex toto corpore ducunt.

²⁶ Dantur hæc pilulæ horis 6. ante cibum: aut hor. totidem post cibum.

Pilulæ.

²⁷ Ne ventriculi vim

labefactent.

²⁸ Ventriculū & caput.

²⁹ Ad liberandā obstruētā.

³⁰ Ad discutiedos flatus.

³¹ Hæc herba sunt cephalica, &

cerebro gratæ.

³² Violariū, borrag. & bugloss.

DE MORB. INTERNIS

33 Ad des stœ-
cad. ad yāth.
an. 3. 2. gly-
cirrhizæ, 3.
2. vt attra-
hatur humor
viscidus &
letus ab om-
nib⁹ partib⁹.

34 Adhibito
delectu pecu-
liaris agri
naturæ, aut
temporis.

35 Hæ pilu-
le sunt cepha-
licæ, quibus
preparata
materia ra-
dicitus extir-
panda.

36 In quo
prius infusa
sunt supra
dicta.

37 Remedia
partibus pro-
pria, quæ
sumuntur ex
indicatione
partu.

38 Topica nō
semper adhi-
bentur præ-
missa totius
corporis va-
cuatione, vt
in abscessi-
bus criticis.

arabic. & citrin. ana P. β. foliorum sennæ munda-
torum, & in fine decoctionis positorum 3. 4. agar.
recenter tro. 3. 1. β. turpethi gummosi 3. 1. 33 fiat deco-
ctio ad t̄b. 1. In col. dissol. sacch. albiss. & mellis albi
bene despumati ana t̄b. β. Fiat syrupus coctus secū-
dum artē. Accipiat 3. 1. cum hydromelit. 34 aut pi-
sanæ 3. 2. semel in 12. diebus.

Pilula.

3. 2. agar. recens troc. 3. 2. turpeth. 3. 1. β. salis gem-
mæ, & zinziberis (ad correctionem. Secus enim mate-
riam subtilem vacuaret, relicta crassa) ana 3. 1. Infun-
de omnia in vino albo, fiat levis feruor super cali-
dos cineres, deinde fortis expressio. Expressæ mate-
riæ adde pul. hieræ diacol. drach. 3. pul. hieræ picræ
3. 4. malaxentur cum vino 36 expressionis, fiat mas-
sa, capiat drach. 1. in singulas doseis.

Post purgationes imperari solent, quæ confir-
mant ventriculum & viscera, quale hoc est.

℥. myrrhidatij veteris, conseruæ buglossi & a-
cori ana drach. 1. Capiat manè diei sequentis.

℥. specierum electarij diambra. 3. 1. pleres ar-
chonticæ, & aromatici rosati ana 3. β. excipiantur in
modico cōseruæ anthos, vel cum syrupo de corti-
cibus citri, aut de stœchadē, fiat trochiscus.

37 Topica.

Repellentibus 38 statim initio vtendum est. Sed
in dolore calido, magis refrigerantibus, vt & in cor-
poribus durioribus, æstate, regione calidiorē, iuuen-
tute. Contrā verò temperanda res est in contraria
conditione, quale hoc est, quod vehementer repel-
lit & refrigerat.

℞. 39 olei rosati recentis 3. 2. aceti albi 3. 3. aquæ 39 *Loti sepe in aqua rosarum.*
 rosarum (in potu nocet ob odore, nisi sumatur aqua pe-
 culi ros.) drach. 2. agitantur diu, & refrigerentur in
 aqua frigidissima putei, aut niue, pro frōtali. Aliud.

℞ olei viol. & ros. ana 3. 1. aceti albi, succi agre-
 stæ ana drach. 2. Diuitibus adde caphuræ ḡ. 4. Lin-
 teolum insuccatur postea frigidâ, vel in succis sem-
 peruiui, centinodiæ, plantag. polygon. granatorum
 acidiorum, vmbilici vener. portulacæ, lactucę, psilij,
 rosarum, malorum granatorum, capreolorū vitis,
 omphacis, mēspili, cucurbitulæ, cucumeris. Ex his
 simplicibus nonnulla interdum tandiu teruntur af-
 fusa rosacea, donec fiat crassitudo aliqua: & popu-
 leo, oleisq; & succis cōuenientibus additis, fronti
 & temporibus adhibentur. Flores ros. violar. nym-
 phæ, papaueris, per se, vel cum aliis tutò quoq; ap-
 plicantur: conseruæ recentes rosarum & violarum:
 nodulus è rosis aceto madefactus, & narib⁹ inditus
 instar caputpurgii. Si nimium dolor & vigilie vr-
 geant, lac muliebre cum tantillo caphuræ & opii
 proderit. Fasciæ & anacollemata è gossipio carpto
 circumligantur capiti, à fronte ad occipitis verticem
 ductis capitibus, & his imbuuntur medicamentis.
 Videndum tamen ne quid in os & oculos defluat.
 Parabilia remedia sunt: oportet autem hæc subinde
 renouari, quia statim incallescunt.

Secundus ordo

℞. Cerati 40 Gal. diu subacti cum succo portu-
 lacæ, aut simili 3. 2. illinatur fronti, & superponan-
 tur folia salicis.

℞ mucag. sem. psilii, 41 mucag. sem. althææ, &
 cydoniorū ana drach. 6. agitetur cum modico aceti.

40 Quo r-
 tebatur Ga-
 lenus ad fra-
 cturas.

41 Extra-
 cte in aqua
 plantaginis,
 aut simili.

DE MORB. INTERNIS

℥. olei rosati & cham. ana ʒ. i. aceti drach. ʒ. hyme pueris, eunuchis, & mulieribus conuenit: in quibus nimia refrigeratio periculosa est. Iam progresso morbo, olei cham. anethini, liliacei aliquid adiiciendum.

Ad frigidam cephalalgiam.

℥. dialthex ʒ. i. agitetur in mortario, primùm quidem cum oleo rosaceo, deinde, vt procedit morbus, cum ol. de mastiche, de cydoniis, de spica. Et diuitibus addi possunt 42 Gr. 2. moschi. Olea conueniunt cham. aneth. (*in declinatione, quia odorati*) de lilio, laurinum, mastichinum, de spica, de costo: in quibus serpillum, mentha, thymũ, orig. rosmarinus, maiorana, calendula, pulegium, ben, nux moschata, caryophyllum, cinamomum coxerint.

℥. serpilli M. i. coquatur in qr. 3. olei cham. & lb. ʒ. vini rubri. Fiat decoctio ad consumptionem vini in vase duplici: deinde fortis expressio: seruetur 43 oleum ad vsum.

42 Nisi cerebro sint ingrata.

℥. caryophyl. nucis moschatæ ana ʒ. ʒ. fiat decoctio in qr. 3. olei cham. & vini rubri drach. 4. ad consumptionem vini in vase duplici, vt prius, lento igne, ac sine fumo.

℥. terebinth. lb. i. mastich. cin. nucis moschatæ ana ʒ. i. caryophyl. galangæ, zedoariæ, ladani ana ʒ. i. ʒ. succi ebuli, succi cucumeris asinini ana ʒ. i. Puluerisatis puluerisandis, in alembico distilletur oleum secundum artem.

Laudant & oleum sambucinum, iasminum. Nec omittendũ est remediũ mulieris apud 44 Paulum, quo in hemicranicis vsa, miradum in modum inclaruit.

44 Paulus Aeg. lib. 3. cap. 5.

Radices itaque cucumeris asinini concides in calcolas, & cū absynthii coma hydrelæo incoques. Fovebis partem hydrelæo, materiam verò modo emplastri impones.

Adhæc rarò fit frigida materia ad caput raptus, sed illic paulatim colligi consuevit.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Medico ad ægrum accedenti primum pars affecta investiganda, deinde affectus: postremo ex utrisq; incunda curatio. Partes affectæ in capitis doloribus ita distinguuntur. Si digito pressa cute doloris sensus acerbior, pili erecti, & oculorum radices, vel partes interne molestiâ non sentiunt, cutis, vel pericraniû laborat: sed pericranium à frigore frequentius ob similitudinem, cutis ab æstu, sordibus, mulis capitis integumentis, vt in mulieribus & similibus: dolorq; in pericranio ad oculi palpebras vsque tantum peruenit. Intra craniû dolor obtusus, arteriarû, venarum & substantiæ cerebri affectione indicat, quod sensu sint imbecilliores: punctorius meningû & nervorum. Sed in nervis communicatur parti, cui inseruntur: in arteriis pulsus percipitur cõtundens, & profundus in membranis ossium hæret. Sic deprehensa parte affecta ad affectus distinctionem & curationem primò videndum, an cum febre, an sine febre. Si cum febre inceperit & permaneat, internam partem affici significat, & futurum delirium portendit. In acutis post tertium aut quartum diem superueniens, sanguinis fluxus indicium est, modò cætera consentiant, atque hic nullo modo curandus, ne crisis impediatur. In ea tamen, quæ per vomitum futura est, admoueri medicamentâ possunt ad dolorem leniendum, nullo naturæ impedimento. Quod si sine febre sæuiat, vel in parte est, dextra, sinistra, superiore, inferiore: vel in toto. Dolor sæpius recurrens, statimq; temporibus & alterutram partem occupans ad futuram vsque, hemicrania est: in anteriore parte cephalgia: post multum tempus, cephalæa. Siccitas vehementem

Partium capitis affectarum distinctio.

*ἡμικρανία.
κεφαλαγία.
κεφαλαία.*

DE MORB. INTERNIS

*Gal. libr. 2.
de cōpos. me-
dicam. 25.
rurs.*

*Capitis dolo-
res à calore
vehementissi-
mi: à frigo-
re diuturnio-
res.*

*Doloris capi-
tis per cōsen-
sum signa v-
niuersa.*

*Doloris capi-
tis per cōsen-
sum modus
duplex.*

*Dolor capitis
cur frequen-
tius synciput
occupet.*

dolorem non infert, quia non fit cōfertim: nec proinde melancholia, nisi à bile flaua adusta, vel bile mixta, vel spiritu distendente. Neq; humiditas, nisi ob copiā, vt pituita frigida, quæ noctu potissimū infestat, facileque propriis signis pituitā significauitibus discernitur. Distentio cum grauitate & pulsu, sanguinis copiā: sine grauitate, bilem demonstrat, cæteris tamen perpenfis, vt victu præcedente, tēperamento, regione, ætate, anni cōstitutione. A calore vehemētissimi sunt dolores, sed breuiores: à frigore minūs subiti & diuturniores: ab ossis carie, vermibus, scorpione, subiecto pure, angusto loco cōprehenduntur. Postrema consideratio, an per consensum fiat. Cuins hæc sunt signa vniuersa. Si nulla euidēs causa ante gressa fuerit: si frequenter repetat: si cum alterius partis affectu inualescat, & eo sublato leuetur: deniq; si vel totius corporis plenitudo & cacochymia sit, vel partis alicuius vitium præcesserit. Modus autem huius cōmunicationis, siue cōsensus duplex. Nā partes inferiores vel ad caput aliquid transmittunt, vt vaporem aut humorē: vel sola connexionē, & quasi contagione quadam cerebrū afficiunt. Ex ventriculi tunicis externis ac sinu, fumi effertur ad caput per neruorum rectitudinem, & per œsophagū. Huius signa sunt, cruditas antecedens, ebrietas, cibi corruptela, dolor, nausea, oris amaritudo. Ab utero fit post mēsum retentionem, aut seminis putrescentis, aut si qua sit illic humorū perturbatio. Tunc dolor in occipite percipitur, vel illic incipit, præsertim nulla materiæ translatione facta, propter consensum vteri cum cerebro per spinalē medullam, cui robustis vinculis cōnectitur. A iecore magis per venam euaam: à liene per arteriam magnam fit materiæ ad caput translatio. Sed an à bile in dextrum latus, à melācholia in sinistrum dolor decumbat, controuersum est: cū & vena caua & arteria magna à iugulo in vtrūque latus traducant ramos, vt nulla ratio adferri queat, præter rectitudinē, cur in hanc potius, quā in alteram partem dolor inuadat, cū tamen rectitudo parum momenti habeat in iis, quæ per vias communes transferuntur. Sed dolor frequentius synciputprehendit multis de causis. Nam illic panniculorum partes suturis interferuntur, & vasa, arteria præ-

fertim, ac materia omnis seu vapor eò peruenit, futuræ rare, craniū tenuissimū, & fistulosum, tenuium vasorū copia. Vnde fit, vt semper ferè illuc incipiat sudor. Atq; hæc in vniuersum dicta sint de causis & signis doloris capitis.

Intemperie.

calida, frigida, sicca, humida, composita,

sine materia, intemperatis.

Curatur contrariis alterantibus, digerentibus, roborantibus.

repellentibus, cum adstrictione, enacuantibus, deriuantibus, discutientibus, roborantibus, materia accommodatis.

cum materia, in plethoricis & cachymis.

Dolor fit ab

distensione à flatu copia,

digerentibus, extenuantibus, discutientibus, laxantibus, fomentis, cataplasmatibus, potionibus, clysteribus, cucurbitulis.

crassis Et viscidis hum. cū flatu, & obstructio- ne vasorum:

cucurbitulis, attenuantibus, enacuantibus, leuiter primum, deinde magis digerentibus, fomentis, cataplasmatibus, potionibus, clysteribus.

Solutione continui,

contusione,

mixtis primum adstringentibus cum digerentibus, deinde solis digerentibus paulatim in dies auctis, sedato prius dolore per topica.

humorū acrimonia,

vacuatione, per vomitum, si in ventriculi ore fuerit: clystere, si deorsum tendat: incrassantibus, & acrimoniam respuentibus.

DE MORB. INTERNIS

Ut bene procedat curatio, imprimis vitandus animi motus & corporis, à polychymis alimentis abstinendum, declinandus quoque mandibularum & capitis motus, necnon clamor, strepitus tum à se magis, tum ab aliis. Non dura mandenda.

In omnibus capitis doloribus cōmune est, vt in principio parti repellentia admoventur: in decremento, digerentia: in fine declinationis, roborantia.

Cornelius Celsus cap. 2. lib. 3. de Medicis. *[Vbi intolerabilis dolor est.]* Cornelius Celsus tantum in dolore intolerabili venam aperit. Sed citra hunc, in propositis conditionibus etiam secanda est. A quacūque autem causa dolor exciteretur, si vehementia vrgeat, duabus de causis vena tunditur: vna, quòd vix dolor tantus esse queat sine materia calida: altera, quia metus est inflammationis, & resolutionis spirituum. In dolore quoque à bile mittitur sanguis, non ad vacuationem, sed ventilationem. In quo si phrenitidis metus sit, venæ sub lingua aperiuntur: vel cucurbitulae ad humeros, aut collum applicentur cum scarificatione: vel fiant ligaturæ & frictiones in extremis partibus, potissimum carpo & pedio. In vaporibus denique discutiendis ligatio colli, & ducta manus sursum, vt vis spiritus, caloris & sanguinis cogatur in caput, & ita vapor tenuetur, & discutiatur. Vbi cum febre dolor inuadit, liberior phlebotomia.

Ex apho. 68. lib. 5. *Eam tamen eligatio, &c.]* In diuersione non est eligenda vena partis dolētis, sed vena frontis secanda, potissimum si posterior pars capitis doleat. Sin anterior, & exigua sit quantitas materiæ, secatur, quæ est inter spatulas.

Arteriectomia.] Arteriæ sectio remedium est singulare in omni dolore pulsatili, vt Rhazes docet: sed periculosum, quia Chirurgis minùs vsitatum. Debet autem arteria scindi è directo partis affectæ, & in principio ad maximam sanguinis copiam. In quo videndū, num per maiores & internas arterias vapor efferatur. Sic enim nihil conferet, vt ex cap. 8. lib. 3. de locis affectis perspicuum est. Huius loco applicatur cauterium actuale in media parte capitis propè suturas. Si ignem refugiant, applicetur potentiale, Sinapismi, Dropaces, Capitella ex aluta,

Sanguinis è naribus irritandi ratio. *Sanguinem è naribus irritamus.]* Hoc fit nares frequen-

ter scalpendo, setis quoque, & folio arundinis, aut festuca, aut herbis quibusdam aculeatis, aut asperis, venas narium irritando ad hæmorrhagiam, aut sanguisugæ pin-nis narium affiguntur. Sin neq; his prodeat, cucurbitulæ cum scarificatione admoveantur, vt præcepimus.

Cucurbitulæ.] Cauendum, ne æger faciliè paralyti capiatur iis partibus, quæ nervos accipiunt à loco, vbi debent cucurbitulæ applicari.

Ante Phlebotomiam leui phar.] Hoc fit, ne eductione sanguinis excrementa ventriculi & intestinorū in venas rapiantur. Sed horum loco, clysteribus (& tutius, propter cassiam quæ cerebrum fumis replet) ante sanguinis missionem vi possumus emollientibus & detergentibus, si sine febre: in frigidantibus, si cum febre dolor sit, præsertim cum resistit aluius. Sæpe enim vaporibus sursum latis suppressa alui, dolor commouetur: clystere injecto, sedatur. Sin perseueret, venam secato. Cæterum, hæc minoratiua dantur per quadrantem horæ, aut etiam per horam ante prandium: tum vt cibi gravitate mittantur deorsum: tum vt fumos arceat, qui è cibo feruntur ad caput. Contra fit, quum caput purgandum nobis proponimus, vt pilulis. Exhibentur enim quatuor horis post cœnam, vt medicamentorum vis simul cum alimeni vapore ducatur ad caput. Ad diminutionem verò materiæ, pilulæ leuēs dantur tribus horis ante cœnam.

Rhabarbarum, Manna, &c.] Rhab. fumosum est admodum: qd id minus conuenit, nisi infundatur in aqua endiuizæ, vel violarum. Ab hiera auferenda sunt aromata, vt crocus, quia caput tentando, augent dolorem, vt Gal. docet de compositione hieræ agens. Idem fiat in syrupo de stœchade. Manna faciliè bilefcit in valde biliosis. Minus nocent odorata, cum valde laxantibus miscentur, quia non diu retinentur in corpore. Aromata adduntur, quia roborant, & tenuitate partium iuuant medicamentorum penetrationem.

Pilulæ.] In affectibus siccis melius purgabitur materia bolo, vel potius medicamentis humidis & liquidis, quia pilulæ omnes calidæ sunt & siccæ, saltem ob aloem, proindeque maiorem inducunt alterationem.

Phlebotomia, vt prius.] In crassis & viscidis humoribus

Cucurbitulæ vt rectè applicentur, quid vitandum.

Phlebotomia cur leue pharmacum præsumendū. Cassia fumis opplet cerebrum.

Pilulæ quādo ante cœnam, quando post exhibēda.

Rheii fumosum.

Aromata & crocum caput ferire scribit Gal. libr. 2. de cōp. medic. &c.

Pilulæ siccis affectibus minus commoda.

DE MORB. INTERNIS

ac materia frigida, metuenda est venæ sectio. Si tamen venæ tument, & sanguis abundat, cæteraq; cōcurrunt, poterit fieri, dato antè clystere ad diuersionem. Sin minus, à clystere incipiendum, qui materiam discutiat, incīdat, alteret, & euacuet: deinde leui medicamento vtendum, ne cruda materia agitetur, vt pilulis leuioribus, de hiera simplici, agar. trōc. cum oxymelite simplici, paulatim progrediendo ad fortiora, nisi grauiora symptomata statim extremis remediis cogant vti.

℥. Stæchados.] Flores anthos, stæchados, chamæmeli in omnibus capitis doloribus valēt, etiā in materia calida. Nam mirificè roborant cerebrum. In declinatione tamen ponuntur potiùs, & repressa fluxione.

Calidiores syrapi.] Leuioribus ergò antè est vtendum, vt mell. ros. syrup. capill. ven. de bizantiis, acetos. simpli. & composito. Deinde de hyssopo, de prassio, de acoro, de stæchade, &c.

℥. Graminis, petro.] In affectu melancholico, parum conueniunt hæc diuretica, quòd humor melancholicus per vrinas vacuari nequeat, cum splen. nullum habeat consensum cum renibus per viam communem, nisi addantur ad incisionem & attenuationem. Sed tunc sufficient semina anisi, sceniculi, apij ad 3.℔.

Corn. Celsus cap. 4. libr. 1. de Medic. *In aqua frigidissima.*] Celsus scribit nihil æquè prodesse capiti, atque aquam frigidam: adeò, vt eum, cui caput infirmum est, iubeat per æstatem id bene largo canali quotidie aliquandiu subiicere. Obseruauit quoq; quendam, cum 40. annos laborasset hæmicrania, frustra aliis auxiliis adhibitis, consilio Medici frigidâ sæpius lauissse frontem, atque inde persanatum, nisi quòd materia deriuata in cætophagum, & illuc concresecens, prohibebat deglutionem. Quia tamen cerebrum frigidum est, & membrum princeps, à frigidissimis metuendū, aut cum summo iudicio vtendum. Cæterum topica, quæ repellunt, tepida admoventur, vbi materia frigidior, & crudior: frigida, vbi materia calida & biliosa.

ANTO. VALETII EXERCIT. I.

Gal. lib. 1. Et 12. Meth. **Q** Vanquam symptomata curationem non indicant, eam tamen nonnunquam suam ob vehement-

vehementiam ad sese trahunt, aut, quæ viribus pro-
spiciat, mitigationem efflagitant. Sed morbos im-
primis, quorum soboles existunt, atq; causas eorun-
dem præcognoscere oportet, à quibus curandi con-
silia (σπογγῆς ἐνδείκνυται, hoc est, rectas collatio-
nes nocentis morbi & iuvantis auxilij appellant)
veniunt petēda. Itaq; cū de capitis dolore, quod
est symptoma in sensu, inquiram⁹, cuius causas sin-
gulas in numerato habere sit necesse, ab omniū pri-
mis, quæ Græcis *ἐξωτερικὰ καὶ ἐνδο-
τικὰ*, Latinis externæ & euidētes nominantur,
initium ducemus, deinceps ad reliquas progressuri.

*Gal. libell. de
optim. secta.*

Externæ capitis doloris causæ sunt, Solis ardor,
qui calfaciendo, animale spiritum agitando, tur-
bando & confundendo capiti negotium facessit,
frigus ambiens, condensante & adstringente vi fu-
liginosa recrementa (præsertim si oppleta per Au-
strinos imbres capita exceperit) arctissimè retinēs,
necnon calorē naturalē intrò penitissimè cogēdo,
calfactionem, incensionēque spirituum inducēs,
ebrietas ex vino naturâ calido, vaporoso, mero, lar-
go, vitiosus victus, ictus, casus, atque alia vnitatem
soluere nata: de quibus fusiùs Hollerius ex Galeno
cap. 9. lib. 3. de Loc. malè affect. & capitibus l. 2. &
3. libr. 2. de compos. medicam. *καὶ τὸ πρῶτον*.

*Procatarcti-
ca cephalal-
gia causa.*

*Hippocra.
aph. 5. lib. 3.*

Calidæ intēperiei simplicis sæpiùs ex Solis æstu
contractæ (quam ex capite & fronte ad tactum ca-
lidioribus, oculorum ariditate, squalore & rubore,
promptoq; ex frigidis iuvamine dignosces) refri-
gerantia & humectantia, cū assumenda, tum ad-
mouenda, institui debent. Assumenda sunt, alimēta
& medicamenta. Alimenta, cremor prisanæ, aquæ

*Cephalalgia
ab intēperie
calida simpli-
ci curatio.*

DE MORB. INTERNIS

*Gal. in sent.
9. sect. 3. li. 3.
Epidem.*

potus, iuscula conuenientibus oleribus temperata, elixæ pullorum carnes aranciorū aut limonū succo cōditæ. Rēliquæ etiā res nō naturales vulgō dictæ, quas liceat cum Galeno ad victus rationē referre, ad refrigerationē & humectationē sint cōparatæ.

Medicamenta, syrup. acetos. simplex, violac. oxy-
sacchar, & similes: quibus cum tripla aqua cocta dissolutis ad caloris remissionem vti conueniet. Ex his zulapia concinnantur hac forma.

℞. syrup. acetos. simpl. & violac. an. ʒ. i. ʒ. dissol. in aque
hordei quart. 3. f. zulapium in treis doseis: cōdiatur pauc.
cinam. aut santal. citrino.

*Id in seipso
expertū Gal.
profitetur ca.
21. libri 13.
Meth.*

Sunt & admouenda refrigerantia, fronti, tēpori-
bus, sincipiti anteriori capitis parti, quā medicamē-
torū vires à pilorum radicibus ad cōmissurā coro-
nalē pertingentes faciliē caput internum subeūt. Vt.

℞. olei ros. vel omphacini ʒ. 2. aq. ros. nymphae (addū-
tur aquæ maioris metu calfactionis ab oleis, quæ cele-
riter incalescunt) aceti albi an. ʒ. ʒ. Ex his mistis oxyrho-
dinum paratur ad litum frontis, temporum, sincipitis.

Vulgō linteola in oxyrhodino ex ol. rosac. ʒ. 3. &
aceti ʒ. i. composito immersa iisdē partibus adhibē-
tur: quæ subinde imbuta sæpe & sæpe renouantur.
His oleis si ceræ parū in aceto lotæ, aut cerati refri-
gerantis Galeni immiscueris, in vsum eundē vnguē-
tum habebis. Cui rursus si rosas, papaueris albi ca-
pita, aut similia pulucrata adiunxeris, maiore appo-
sita quantitate ceræ, ceratum compinges: quod, si
videbitur, duas inter syndones, telasve raras posi-
tum fronti applicabis.

*Cautiones
obseruanda.*

Talia refrigerantia postico capiti, à quo spinalis
medullæ principiū, vnde numerosæ prodeunt ner-
uorum in reliquum corpus disseminatorū propagi-

nes, ne vnquam admoueris: nam sunt immicissima. Hæc dum fiunt, expedita sit alius, ne si adstrictior, caput (cuius calor instar cucurbitulæ trahit) elatis hinc fumis perennis doloris necessariam cōsecutionem allaturis repleatur. Si corpus plethoricum & cacochymū cephalalgia istiusmodi nacta fuerit, proderit vacuare, ne huic diaria, synochus imputris, aut putris, vel alia è febris succedat.

His præsidiiis si non cesserit dolor, metusque sit ob fluxum humorum in oculos (nam nec diu hæc persistit intemperies non accessito materiæ affluxu) ægri visum læsum iri, arteriæ, quæ per tempora repunt, opportunè, suatore Galeno, à perito Chirurgo pertundentur, vt ex his sanguinis quantum satis sit, fundatur. At vt rarò venæ in capite eligi solent, sic rariùs multò arteriæ, quòd hæ diuisæ ægriùs conglutinentur. De dolore capitis à reliquis causis procatarcticis dicetur exercitat. 3. & 4.

*Gal. sub fin.
lib. 13. Meth.*

Sequitur vt cephalalgias à causis internis cum adiuncta materia, sanguine, bile, pituita, melancholico humore, excutiamus: & primū eam, quæ est à sanguine quatuor humores cōplexo, aut sanguine syncero plethoram capitis solius, aut etiam corporis totius faciente.

*Sanguinea
cephalgia
causa & signa.*

Sanguineæ cephalalgia cause sunt, omnia sanguinem cumulantia. Signa, grauitas & tensio capitis, faciei rubor, calor, ægri natura, ætas, antea actæ vitæ ratio, anni tempus, regio, locus, pulsus magnitudo, vrina rubicundior, crassior, longior somnus.

Eadem ferè victus ratione, qua nuda intemperies calida, oppugnatur, vitatis maximè polychymis cibis: quia, vt cætera conferant remedia, subtra-

*Sang. cepha.
Curatio.*

hendæ morbifici humoris generationi incumbendum. Vino igitur omninò interdicendum. Nam præterquam quod vaporosum est & *καρπώδες*, citissimè distribuitur, in affectam partem succo transuehens. Si tamen eius vsum consuetudo, *Gal. sub fin.* virium imbecillitas, aut morbi paruitas admiserit, *libell. de eur.* oligophorum, assentiēte etiam Galeno, imperabitur, *chym. & cat.* à cuius potu frigida hauriatur, quæ vini vaporibus reprimendis sit satis. Mox de vacuatione & alteratione cogitandum. Vacuatio, præmissis clystère blando, aut cathartico, perficitur sanguinis missione ex cephalica è directo, nisi vel plethora consilium immutet, & axillarem secandam indicet; vel solennis alicuius vacuationis, vt mensium & hæmorrhoidum, suppressio venam ad malleolum positam pertundere iubeat: vel præpingui in corpore humeralis non apparentis loco mediana secetur: vel denique alius satis sit fluida. Si vires, ætas, tempus, phlebotomen dehortentur, cucurbitulæ cum scarificatu scapulis & ceruici affigendæ: quæ etiam aliis post vniuersalem vacuationē, malo præsertim anteriora capitis infestante, vsui esse poterunt.

Eadem hîc alterantia, quæ in calida intemperie simplici, sunt vsurpanda: hac tamen cautione adhibita, vt si febris affuerit, iis abstinence in statu & declinatione, quæ impensius refrigerando interceptant perspirationem illis temporibus apprimè necessariam.

Biliofa cephalalg. causa & signa. Biliosæ cephalalgæ interna causa est bilis, quam inedia, ira, labor, vigiliæ, alimenta calida & sicca congegnerint. Signa, dolor acer, pungens & cro-

dens, grauitate paruus, ingens capitis ardor, os amaricās, flauitie pallēs facies, & velox pulsus, insomnia.

Victus non ita tenuis, vt in sanguinea, præscribendus, maximè si æger sit naturā biliosus. Naturis enim biliosis inimicissima inedia. Qualitate sit frigidus & humidus, vt in superioribus.

Mox antecedens causa reuellatur clystere refrigerante, in quo cholagoga sint dissoluta. Vt.

℞. malu. violaria, lactuc. end. ana M. i. semin. cucurb. melon. portul. ana ʒ. 2. flor. nymphaeæ M. ʒ. hord. p. 2. fiat decoct. ad ʒ. i. In colatura dissol. cass. ʒ. i. vel cass. & cathol. ana ʒ. ʒ. sacchar. & mell. viol. ana ʒ. i. ol. violacei ʒ. 2. ol. nenuphar. ʒ. i. f. clyster.

Vel potionem lenem, aut etiam paulò valentiorē imperasse proderit, præsertim si bilis turgens, & velut furiosa yrgeat. Qualis hæc.

℞. rad. oxalid. gram. polypod. quern. ana ʒ. 3. lactuc. nouell. cichor. totius, summitat. lupuli, endiu. ana M. ʒ. ramarind. prun. damasc. ana ʒ. i. semin. melon. anisi. ana ʒ. 2. flor. violar. recent. p. 2. f. decoct. ad dosim. In qua infunde rheī elect. ʒ. 2. cinām. ʒ. ʒ. In express. dissol. syrup. laxatiui ros. pallid. ʒ. i. vel diaprun. solut. vel electar. de succo ros. ʒ. 2. & syrup. de cichor. simpl. ʒ. i. f. dosis.

Pauperibus solum diaprunum solutiuum ad ʒ. ʒ. vel ʒ. 3. datur in aqua cichorij, vel endiuæ dissolutum. Biliosus succus si multus sit in vasis, nec dolor à purgatione mitescat, sanguis adimendus, qui refrigerationē inducendo doloris sedationem ferat. Parcè tamen detrahitur, quòd eo vacuato laxatis veluti habenis bilis incandescat ac efferueat. Itaque ad difflationem potius & refrigerationē, quàm ad euacuationē, biliosis in affectibus mittitur sanguis. Plus enim cōmodi ex refrigerato corpore percipi-

tur, quàm incommodi ex sanguinis vacuatione.

Interim topica etiam ab initio non sunt omittenda, quæ & valenter, & affectus magnitudini conuenienter, reprimant, facto tamen à mitioribus ad vehementiora progressu. Vt.

℥. olei ros. vel nenuph. ʒ. 2. aqu. plantag. viol. acet. alb. ana ʒ. ʒ. misce pro litu frontis & temporum. Vel ℥. ol. ros. & nenuph. ana ʒ. ʒ. aqu. solan ʒ. 1. populei, vel cerat. refriger. Galen. ʒ. ʒ. vel vtriusque ʒ. 2. aceti tantillum, f. vt supra.

Isthæc remedia si intolerabilis eludat dolor, ad narcotica veniendum, sed quæ neque ita sint valentia, nec diu hædere permittenda sint.

Quod si iteranda purgatio videatur, edomanda imprimis bilis, vt trahenti facilius cedat medicamento. Id præstabunt zupia è syrupis & aquis conuenientibus instituta: vel apozemata ex decocto superioris dosis, in quo syru. violac. de cicho. simpl. vel similes sint dissoluti. Dosis eadem purgatio erit.

Ferè fit vt vigilæ torqueant. Tum conferet frigida odorari. Vt.

℥. ol. viol. & nenuph. ana ʒ. ʒ. aqu. ros. succ. portul. depurati ana ʒ. 3. misce. Pars trahatur per nares. Vel ℥. caphuræ gran. 8. aur ʒ. ʒ. dissol. in aqua. ros. quam æger odoretur sæpe. Vel ℥. flor. viol. ros. rub. nenuph. ana ʒ. 2. caphur. ʒ. 1. cum gummi tragacanth. in aqu. ros. dissoluto f. pom. odoriferum. Vel hæc potio hypnotica exhibeatur. ℥. syrup nenuph. & papauerini ana ʒ. 6. cum aq. decoct. lact. & portul. f. potio danda dormituro.

Materia biliosa quia faciliè ob leuitatem, raritatem & tenuitatem exhalat, vix vllas sui reliquias in capite superstites facit, quæ diaphoreticis egeant.

Pituitosæ cephalalg. interna causa est pituita: externa, victus frigidus & humidus, deses vita, somnus multus, curarum vacuitas, satietas assidua. Signa, grauens & tensius dolor cum totius corporis grauitate coniunctus, magna in somnū propensio, pigritia, albicans facies & œdematosa, frigentia tempora, oculi, nares, os humectia, nulla sitis, pulsus paruus, pituitosum temperamētum, ætas, anni tempus, cœli constitutio, &c.

Victus fit calfaciens, tenuans & ficcans, quo le-
uantur omnia corpora, quæ frigidis scatent, lentis
& crassis humoribus. Potus sit vinū, non genero-
sum quidem (nā vaporosum) sed medium. Secun-
dum guaiaci decoctū, aliquot aromaribus cōditum
nonnulli vino putāt præferendum: alij hydromeli
simplex vel in quo thymū, pulegiū, salvia incocta sit.

Purgatio à catapotis lenioribus incipiat, quæ & repurgent ventriculū, & aliqua materiæ parte caput exonerent.

℥. massæ interioris pil. ex hiera simplici & pil. assaieret.
an. 3. excipiantur syr. è stœchad. fingantur pilulæ mol.
les. vel. ℥. cathol. & diaphœn. an. 3. s. oxymelit. simp.
3. s. cum aq. absynth. & beton. vel salu. f. potus.

Hic raro sanguis mittitur. Si quid tamen phlebotomē suadeat, ea temperanda erit, parciore ducto sanguine, ne frigidus affectus ingrauescat. Dein pituita, quia tenax & cōtumax, vti ferè crassa, lenta, & expulsionī minimè est apparatus, incidi, tenuari & tergeri vult. Id consequeris zula piorum, aut apoze-
matum vsu.

24. syr. è stœchade, oxymelitis simpl. vel syr. capill. venet. an. ʒ. i. aquar. salu. & beton. an. ʒ. 2. vel 3. f. zup. pro dosib. 2. manè & vesperi sumendis.

DE MORB. INTERNIS

Vel apozema tale paretur. ℥. rad. quinq. aperit. ana
 ʒ. i. rad. ireos acor. an. ʒ. 2. cartha. ʒ. 6. fol. hyssop. maiora.
 beton. calamenth. origan. capill. ven. borrag. & buglos.
 an. M. ʒ. femin. anis. fœnic. card. glycyrrhiz. ras. an. ʒ. 2.
 flor. anth. stœchad. viol. salu. an. p. i. fiat decoctio ad lb. i.
 In colatura dissol. syrup. de bizantiis & de quinq. rad.
 an. ʒ. 2. vel syr. de hyssop. & oxymelit. simpl. tātundē, f. apo
 zem. clar. conditū cinam. aut nuc. mosch. ʒ. i. pro dosib. 4.

Si febris fuerit, radice fœnic. gram. & oxalid. con
 tentus eris, omissis calidioribus, & calidas herbas
 cum contrariis bene temperatis vsurpabis. Si pur
 gans esse volueris superius apozema, addes in fine
 decoctionis agaricum, sennam, & id genus purga
 tion. Vel post præparatos tantum ab apozemate
 humores hæc potio imperatur.

℥. agar. recens troch. ʒ. 4. vel ʒ. i. fol. sennæ mundat.
 ʒ. 2. infundantur in hydromelite, vel in dosi prædicti a
 poz. addit. zinziber. gr. ʒ. In express. dissol. diacarth. ʒ. 2.
 syr. laxat. ros. pall. ʒ. ʒ. f. potio.

Robustioribus ægris pilulæ valentiores cū syrup.
 aut aquis, in quibus nonnihil turpethi sit maceratū,
 emollitæ, præscribuntur. Post vniuersalem purga
 natī sequitur particularis, quæ errhinis, apophleg
 matis, litubus, sacculis, embrochis, cucuphis, affixis
 cucurbitulis perficitur, quæ omnia sunt fusissime
 ab Hollerio tradita.

*Melanchol.
 cephal. sign.
 & curatio.*

Melancholica cephalalgia his proditur signis, plū
 beo liuore, frigore modico, graui, obtuso, perseue
 rante dolore, somno leui, depresso pulsū, ægri tem
 peramento melancholico. Vitæ modus idem ferè,
 qui in pituitosa. Purgantia accommodata melanco
 lico succo hūc referēda, catholic. confect. hamech,
 pil. de funaria. Eodē pertinebūt apozemata bi
 lem atrā præparantia, & alia eiusmodi, ex aliorū af

fectuum melancholicorū curatione petenda. Si cōfortij seu sympathie lege caput afficiatur, vt cum à toto corpore, aut aliqua parte vitiū manat, quod ipsi capiti sit cōmune, primario affectui primū, dein capiti consuletur.

De 1 diuturnis capitis doloribus. CAP. 2.

IN diuturnis capitis doloribus intemperies causa est, vel solutio continui. Intemperies, vt dictum est, sine materia, quæ vbi firmata est, ægerrimè curatur: vel cum materia. Atque hæc ferè frigidus 2 vapor & flatus, vel materia crassa est & frigida. Flatus aliquando ex inopia caloris & materia alimenti: aliquando alimenti vitio: nonnunquam vitio pituitæ crassæ & viscidæ, quæ membranis inhærescit, vnde vehemens 3 distentio membranarum, vt inde futuræ relaxentur. Atque hic sensus primū frigoris, quanquam aliquando agitatione materiæ & putredine calor succendatur, vbi iam febris, & aliquando inflammatio succedit. Sed sine his, quasi maleolis obtusis, acutis, feriantur, dolent. 4 Rariū arteriarum vitio & bilis permixtæ flatibus, aut aliis de causis. Ex signis iam dictis, antecedente vitâ, temperamento cum totius corporis, tum præcipuè capitis: deinde etiam viscerum & aliis de causis requirendum.

Iam diuturno & contumaci morbo, postquam solennia remedia fuerint celebrata, caput tondatur, aut radatur ad cutem: tum fortioribus vtetur remediis, quale est oleum de castoreo, & euphōrbio, quod confici oportet ex lb. i. olei de keiri, & 3. lb. euphorbij, vel castorei, quale hoc est.

1 De cephalæa vulgò dicta, quæ est cephalalgia cōtumax, & diuturna, cū maximis coniuncta paroxysmis, leui de causa obortis.

2 Crassus, qui exitum non habet.

3 Quod est symptoma flatus.

4 Quod deprehenditur ex colore, characterē, habitu & actionibus principib. natural. & vital.

DE MORB. INTERNIS.

℥. olei de keiri ℥b. s. cera 3 i. s. liquefiant in vase duplici, deinde insperge euphorbij drach. 2. plus minusve.

5 *Humor ē capite masticatoris nō est euocādus iis, qui sunt angusto pectore, & tabi obnoxij.* Oppugnandus quoque morbus est 5 masticatoriis, apophlegmatismis, caputpurgiis, errhinis, pomis odoratis, sacculis, vel cucuphis.

Masticatoria.

℥. mastichis 3. 2. piperis 3. 1. radicis capparis 3. s. cum aceto scyllitico formetur tres pilulæ, teneat in ore & mandat. Idem facit illud.

℥. staphysagriæ puluerisatæ, condisi ana drach. 2. excipiantur melle, fiant trochisci, teneantur in ore. Aliud.

℥. pyrethri, staphysagriæ ana 3. 2. liquiritæ 3. 1. mastichis 3. 1. fiant pilulæ.

Apophlegmatismi.

℥. sinapi 3. s. hyssopi P. 2. fiat decoctio in vino rubro cum modico melle, fiat gargarismus.

Errhina.

6. *Albo.*

7 *Fiunt hi trochisci ex ligno aloes, ambra & moscho.*

Errhinum caputpurgium fit ex succo, vel aqua maioranæ, betæ, anagallidis, cucumeris agrestis, adiecto pipere, castoreo, euphorbio, elaterio, 6 helleboro, condiso, gallia 7 moschata, pyrethro, pane porcino, sinapi, moscho. Succus itaque tepidi & excepti volâ manus naribus attrahantur: pulueres insufflentur in nares, aut alicui oleo commixti illinuntur, ut oleo de costo, de spica, irino, & simili. Delicatis additur modicum moschi, aut ambra, quale hoc est.

℥. olei de spica vnc. 1. elaterij drach. 1. in diuitibus adde mosch. gr. 2. illinantur nares interiores.

Aliud.

℥. succi maioranæ vnc. 2. succi betæ 3. i. aceti scyllitici vnc. 8. misce, fiat errhinum, attrahat tepidum naribus. Vel.

℥. piperis, castorei ana ʒ. i. hellebori, galliæ moschatæ ana ʒ. 8. fiat puluis. Modicum insuffletur in nares.

Pomum odoratum.

℥. Cinamomi, caryophyllorum, nucis moschatæ, ligni aloës, pulu. maioranæ, an. 3. 2. galliæ moschatæ 3. i. moschi, ambre ana gr. 2. fiat puluis omnium: deinde cum ladano & mastiche agitatus in mortario cum modico oleo de spica, de costo, de ben, fiat pomum.

Cucupha.

℥. sem. cumini, & fœn. baccarum lauri ana 3. 2. nucis moschatæ, cinamomi, caryoph. ana 3. i. galliæ moschatæ, mastichis, sandarachæ ana ʒ. 2. Fiat puluis omnium pro 8 Cucupha facta cum rasura scarlatæ. Extrema remedia sunt raso capillo Sinapismi, Dropaces, Phœnigmi, Cauteria, & Paracentesis, Seton, vitatis neruis. Sed de his alio loco.

Curatio 9 sode per 10 communitatem.

℥. aloës optimæ 3. i. cina. xylobalsami, asari, spicæ nardi, mastichis ana gr. 6. croci gr. 4. fiat puluis, detur cum 3. 3. aut 4. aquæ, aut feri lactis.

Proportio aloës est centum ad sex. In delicatioribus verò loco aloës, debemus imperare ʒ. 4. Rhabarbari.

Si sit à reliquiis luis venereæ decoctum guaiaci, & accommodata topica vsurpabuntur secundum rationem. Materia vbi pertinax, emplastris mercu-

8. Praestat si-
ne cucupha:
puluerē capi-
ti inspergere.
9 diuturni ca-
piti doloris.
10 per vteri,
ventriculi,
hepatis sym-
ptomiā: vel
etiam a toto
corpore reli-
quo, suppressis
aliquādo ha-
morrhoidib.
mensibus in
mulieribus,
aut alia va-
cuatione, vt
stercoris, san-
guinis ē nari-
bus, &c. j

DE MORB. INTERNIS

rialibus & vnguentis locus erit.

A carie subiecti ossis, vel abscessu dolor certo loco designatur, cutis ab osse tandem discedit. Cutem in crucem incidito: materiam vacuato: os radito: inurito. Maior est læsio, cum secunda in lamina vitium delitescit, vel osse interiore: vbi tantum excisione ossis est opus.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

*Masticato-
riis vtendi
modus.*

*Masticato-
ria quibus
infesta sint.*

*Masticato-
riis vtendi
tempus.*

*Errhina ex
quibus com-
parentur.*

Masticatoria Pituitam purgant ex attrahētibus parata, vt pyrethro, staphysagria, cubebis, &c. Digerunt ex resiccantibus magis, quàm calfacientibus, vt mastiche, ruce moschata, &c. Modus vtendi est, vt sacculis reponantur, aut excipiantur figibus, cera alba, aut vinoincta contineantur ore, aut per se sumantur. Nocent, si fuerint vlcera in ore, vel faucibus, vel pulmones oportuni vlceri, phlegmoni, fluxioni. Tunc errhina commodiora, quæ materiam deducant ad nares. Nam etiam si humor illectus è capite, vel mungendo, vel expuendo repurgetur, sit tamen humori cōsuetum iter, & noctu inter dormiendum ad partes infirmas delabitur. Tempus vtendi matutinum, & ante cibum.

Errhina Sicca ex acri materia fiunt, elaterio, pipere, sinapi, helleboro, melanthio, cyclamino, maiorana sicca pyrethro, hyssopo, thymo, saturiæ, anagallide, & similibus. Liquida ex iisdem exsiccatis, vel liquore mixtis, succo betæ, foliorum hederæ, quibus & arida permiscuntur. Sicca insufflantur corniculo, vel fistula, vel inspirando trahuntur, vel excepta oleo illinuntur, vel ex aceto, aqua maioranæ, hyssopi, aquâ vitæ inuoluta linteolo raro in formam noduli admoventur naribus. Liquida attrahuntur tepidè. Efficacissima sunt, addito scammonio, & farina excepta, vt adhæreant. Post horum vsum, si mordicatio percipiatur, lac muliebre in nares iniiciendum, vel oleum violatum. Tempus vtendi matutinum, longè à cibo: à balneo, vel aliter laxata cute. Ab imbecillioribus paulatim transeundum ad fortiora, vt euphorbium, elaterium, lacte, mucaginibus, butyro prius temperata. No-

cent oculis imbecillioribus, & iam laborantibus, atque ubi nasus opportunus est vlceribus, vt aliquando in lue venerea. Tum satius gargarismatis vti, quæ ab oculis diuertunt. Sternutatoria nocent in defluxione ad pulmones: iuuant, quibus caput vaporibus repletum est, & quib' iam tenuata, incisa, & incocta est materia. Adhæc caput anterius per nares, medium per choanā & palatū, posterius per nucham, neruos, & venas magis purgatur.

Cucupha] Puluis capiti inspersus commodior. Excutitur, & nouus manè reponitur. Cucuphæ semper eadē adhibita, & sudore ac pinguedine imbuta, sæpius nocent. Sunt tamen loco pilei. In dolore pertinaci fots, emplastra, sinapismus, saluatio cum mercurio, vnz particulares sectæ, cauteria, vel emplastra, quæ metallica recipiant acria, & exulcerent, mixtis tamen deterforiis, ne nimium poros obstruant, cōuenient. Et hæc quidem magis, ubi proprium est capitis vitium, & primum.

ANTO. VALETII EXERCIT. II.

CEphalæa, seu contumax & perseuerans capitis dolor, causis & signis à cephalalgia nō differt, sed sola magnitudine causæ. Si tamen spiritū *φυσώδην* (flatuosum vulgò vocant) causam habeat, splendente faciei tumore, turgido dolore, aurium tinnitu, vertigine, volatu in somnio, magis interno-scitur.

Idem remediis profligatur, quibus cephalalgia *Cephalæa* pituitosa, nisi quod valentiora requirit, vt est ferè *curatio*. crassa magis ac viscida materia. Prima purgatio erit huiusmodi.

℞. mass. inter. pil. de agar. 3. s. massæ pil. aurear, & eocciar. an. ʒ. i. emolliantur simul cum syr. de stœchad. f. pilul. molles. cap. noctu à primo somno.

Mox cōuenienti apozemate præparanda materia, quale paulò antè descriptum est. Nonnulli apozematū loco decoctū guaiaci, aut falsæ parillæ vsurpant ad sudorum prouocationem. Vt.

℞. fals. parill. ʒ. 2. ʒ. macerentur in aq. fontan. lb. 8. per 12. horas super cineres calid. Bulliant postmodum vsque ad tertiæ partis consumptionem in vase terreo, plumbato, & benè coopercolato. Fiat colatura, qua utatur singulis matutinis hora quinta. Dosis sit ʒ. 6. Alij in lb. 12. aqu. macerant fals. parill. ʒ. 4. vel 6.

Efficacius decoctū habebis ex interioris guaiaci lb. ʒ. & corticis eiusdem ʒ. 2. ex arte maceratis & coctis. Vsus erit per dies 8. 9. 15. pro consulti medici arbitrio. Magma superioris decocti, cui addita sit fals. parill. ʒ. 1. coquitur in lb. 12. aquæ, vt potui detur, vini loco. Et quia subinde purgandum, poterit hæc pilularum massa concinnari, de qua alternis dieb. 3. 1. aut 3. 4. capiat.

℞. massæ inter. pilul. sine quib. & cocciar. an. ʒ. 4. agaric. recens trochiscati rhei elect. puluerati an. ʒ. 1. aquæ infusionis ʒ. 1. turpethi in aqua beton. vel salu. infusi cum gr. 6. zinziber. f. massa pil. cap. vt dictum est.

Erit quoque locus clysteribus acrioribus, pituitam deorsum auertentibus. Qualis hic erit.

℞. malu. bismal. parietar. mercur. an. M. 1. fol. centaur. paru. salu. hyssop. maioran. origan. ana M. ʒ. sem. anis. fœnic. ana ʒ. 2. florum anth. aneth. chamæm. melil. ana p. 1. f. decoct. in hydromelit. ad lb. 1. In colatur. dissol. hieræ picr. benedict. laxat. ana ʒ. ʒ. vel ana ʒ. 5. mellis anthos. sacchar. rubr. an. ʒ. 10. olei chamæm. & aneth. ana ʒ. 1. ʒ. f. clyster.

Interim toto curationis tempore nō negligenda particularia, vt errhina, apophlegmata, &c.

℞. puluer. nigell. Rom. macerata in aceto fortiss. per 24. hor. ac exsiccata ʒ. 3. succi maioran. cum pauc. vino alb. extract. ʒ. 1. Pone in phial. pro caputpurgio indendo in nares quotidie manè.

Eodem pertinebunt gargarismata, sternutamenta, suffitus, frictiones capitis cum linteo aspero. Quod si neque his, neque illis præsidius cesserit do-

lor, prostremum erit remedium, cauterum ceruici, vel brachio ad musculum deltoïda vocatum, quâ vena pererpat humeralis, affigere, quò commodè deriuari, ac retrahi materia possit.

1. *Aristotel. sectio. 3. pro-
blematum.*

2. *Hippocr. aphor. 5. lib. 5*

De dolore capitis ab ebrietate. C A P. 3.

E Brietas 1 grauissima adfert symptomata, 3 *Vt ex ra-
dice cyperi,
acore vero,
caryophyl.
absynth. mē-
thā origan.
fit sacculus
ventriculo
admonendus.*
caq; partim subitanea, partim longo tem-
pore contracta, quale istud est annotatum
2 ab Hippocrate, Si quis ebrius repētē obmutue-
rit, &c. & quæ à Galenō annotata sunt cap. 5. lib. 5.
de locis affectis, epilepsiæ, dementiæ, conuulsio-
nes. Si dolor capitis solius à crapula hesternâ, mo-
tus, & crudum vinum in stomacho restiterit, vomit-
us, aut malè vomentibus ieiunium, 3 ventriculi
fotus, & illitus, qui concoquunt, remedio sunt.
Vbi vacuus 4 vëter est, & tamē 3 vaporibus dolor
cōmouetur, non sine ratione vulgò persuasum, vi-
ni noxam vini potu elui, quia inde vapores crassi-
disperguntur eo modo, quo dolores oculorum in-
de ortos scripsit Hippocrates 6 meraca potione di-
scuti. Somnus, inedia, quies, optima: cibi euchymi,
qui faciliè coquātur, 5 gallorum testes in aqua hor-
dei cocti, pulli columbarum, pisces saxatiles & mol-
li carne. Si aquæ potus noxius, vtatur hydrophosato
cum vino granatorum, zulapio Alexandrino: malis
& pyris adstringētibus in vapore coctis. In doloris
incremento & vigore, quiescat in declinatione um-
broso loco, si caleat, obambulet: aut calido, si fri-
geat. Ante cibum diutius & paulò celerius obam-
bulandum: à cibo lentius & breuius, idque duabus
post, aut tribus horis. Ebrietati naturali quadā pro-

4 *Vomitione
& fotus.*

5 *Hi cum
exitum non
habeant, di-
stentione dolo-
rem pariunt.*

6 *Sect. 6. lib.
2. Epidem.*

5 *Gallorum
testes nō sunt
veterū: sunt
enim virosi
& effati.*

DE MORB. INTERNIS

prietate repugnant amygdalæa maræ, brassica, cuius meminit Theophrastus quarto de historia stirpium. In principio siquidem crudum vinum concoctum, vel reiectum fuerit, vtere iis quæ æstum sedant: in declinatione balneum, itémque litus ex oleis sine calore multo digerentibus proderunt.

Κεαιπάλη.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Galen. com.
in aphor. 5.
lib. 5. Aph.

Vini potio
immoderata
qui gravissima
symptomata inducat.

Κεαιπάλη, Hippocrati dicitur hæc affectio, nostris crapula, omnis nimirum noxa è vino contracta præsertim in cerebro, ἀπὸ τοῦ κέλευον πάλλεσθαι. Nec mirum gravissima symptomata vini immoderata potione induci. Cum enim sit temperaturâ calidum, substantiâ tenue, vel non admodum crassa, utroque sursum repit: tenuitate promptè omnia penetrat, & in substantiam nervorum ingreditur, ac vaporibus caput & cruditatibus replet: unde vniuersum corpus necesse est variè affici. Sed quomodo vini noxam eiusdem potio persanat? Nimirum quæ mala suæ substantiæ tenuis copia inuexit, eadem sua qualitate tollit calefaciendo & exsiccando. Sin minus, periculosa omnia subsequuntur.

ANTO. VALETII EXERCIT. III.

Cephalalg.
ab ebriet. curatio.

Paul. Aeg.
sub finem
cap. 4. lib. 3.

EXcitatur à temulentia cephalalgia, vini generosi & largiùs epoti vaporibus calidis caput opplentibus. Restinguitur inedia, somno multo, adstringente, frigidoque cibo, qui vaporum ascensum coërceat. Initio confert aquæ repentis haultu vomitum ciere, si vinum incoctum adhuc in stomacho fluctuet. Quod si etiam post cōcoctionem caput indolescat, refrigerantibus & repellentibus, ut oxyrhodino, vtédum. Non semper tutum ad discutendam ebrietatem vinum exhibere. Cerebrum enim si incaluerit, dolorem augeat. Cornu ceruini rasura cum aqua pota naturali quadam & inexplicabili proprietate ebrietatem sedat. Creditur & hic pului-

pulvisculus ad eandem prohibendam, & ad sistendam plurimum facere.

℞. coriand. præpar. gran. oxyacanth. sem. brassic. cydon. plantag. spodij ana ʒ. 2. Ex hoc pulv. dentur ʒ. 2. cum succo adstringente, vt li-mon. granat. aranc.

Fabulosum est, quod medici veteres de polygono coronæ instar capiti imponendo protulerunt.

De dolore capitis à perfrictione. CAP. 4

Non concidit facies, sed est ¹ decolor, tardior mens, & animæ ² functiones, frigidis non iuuantur, sed calidis. Calefaciunt oleū rutaceum, irinum, de spica, de terebinthina, costinum, quibus hyeme rigida, & vbi calore maiore opus est, styracem calamitam, benzoinum, euphorbium, aquam vitæ, mythridatiū, ³ theriacam, & similia permiscemus. Affectu perseverante, raditur caput, aut detunditur, paulo crassiora medicamenta, quàm in æstu, adhibentur: sed tonsis, & capillo paucō, aliquo tamen tectis, liquidiora. Ceratum de euphorbio, ex olei anethi ʒ. 10. tribus ceræ, vna euphorbii. ⁴ Sinapismus, capitella, diachylum ireatū, & similia conueniunt. Non est vtendum phlebotomia, cucurbitulis, remediis luis venereæ, vbi sola intemperies est. Alimenta, vinum tenue, cibis calidus, ⁵ balneum, motus, loci calidi habitatio, odor suavis, calidus, ⁶ illitus narium, auris frictio.

¹ Nam quæ sunt propinqua & vicina, itēque cōmunia, ea primum & maximè affici solēt. Hip. li. de humōr.
² Naturales, animales.
³ Datur theriaca ad magnitudinem auellanae, hora somni.

⁴ De his cap. 5. li. 3. Institut. Chir.
⁵ Cūm vniuersale, tum particulare, idque ex cephalicis.

⁶ Hic oleo irino perfici poterit.

IIYSDEM HOLLERII SCHOLIA.

De hoc dolore à frigore, lege Aurelianus primo Chtōn. Rarō huiusmodi dolores ex sola intēperie fiunt: & si fiant, breui materiam accumulāt, præsertim in plenitudine laborantibus, & cacochymis.

DE MORB. INTERNIS
ANTO. VALETTI EXERCIT IIII.

*Cephalalg.
à frigore cu-
ratio.*

C Apitis dolor à frigore suis causis & signis satis innotescit. Vini subtilis & oligophori potu, moderata corporis motione, & aliis calfacientibus, ac frictionibus ex linteis calentibus, iuuatur. Caput imprimis sacculis foueatur.

℞. fursur. macr. lb. s. milij quart. i. salis friat. 3. i. torrefiant omnia simul in sarragine: fiant sacculi duo interpuncti, vt decet, qui alternatim manè & serò capiti admouean-
tur. Efficaciores erunt additis cephalic. herbar. puluerib. Seminibus calid. vt. ℞. furs. macr. mil. com. sal. vt supra: salu. maioran. sicc. contus. ana M. s. sem. anis. fœnic. con-
tus. ana 3. i. baccar. laur. iuniper. ana s. omnia simul in sarrag. torrefiant: dein ex his duo, vt antè, sacculi paren-
tur. Vel. ℞. beton. salu. rosmar. ana M. i. flor. anth. stoe-
chad. chamæ. meliloti, summitat. anet. ana P. i. f. sacculus, qui bulliat in æquis aquæ & vini partibus. Expressus ca-
piti admoneatur, ieiuno ventriculo.

Ab his ad litus pergendum. Parabuntur lini-
méta ex oleis ab Authore præscriptis, paucula cera addita. In quibus cauendum, ne sit præceps ad ve-
hementiora tráitus. His omnibustentatis si super-
stes fuerit dolor, certissimum dabit residis materię
purgatione excludendæ argumentum.

A siccitate sola infrequens est capitis dolor: qui
si accidat, vehemens animi contentio, insignis ali-
qua vacuatio, immodica Venus, & similia incusan-
da sunt. Ex depresso faciei charactere propalâm ex-
plicatur. Humido victu, pleniore, qui deperditam
substantiam instauret, somno liberiore, vita curis
soluta percuratur. Si litu visum fuerit opus, ex olei
amygdal. dulc. axung. butyr. rec. æqu. partibus com-
pingetur, quo frons & tempora illinentur.

Cæterum si capitis dolor ab ictu ad cranium &

membranas pertigerit, curatio à chirurgia petetur.

De vertigine. CAP. 5.

Δίῳς Græcis, vertigo nobis, quum caput 1 circummagi videtur. Σχοτόδιῳς, cum etiam tenebræ 2 oculis offunduntur, aut spectra 3 rubētia, quæ denuntiant 4 Maniam: aut rubore saturata, quæ Epilepsiam, ex inordinato motu spirituum & flatuum. Hæc omnia aliquādo gignuntur in capite: aliquando ex 5 inferioribus partibus corporis huiusmodi spiritus efferuntur. Quod iis ferè contingit, qui cruditates colligunt: quibus sæpius hepar calidius est: quibus ex hepate in ventrem regurgitat 6 bilis: quibus præsertim arteriosum genus intemperatum est, plenū feruido & spirituofo 7 sanguine. Itaq; Theophrastus libello de vertigine spiritum & humorem capitis ovo comparat: quod cum fufum habeat humorem, nō continuum, dum crudum est, non circumagitur: dum coctum, vertitur, unito iam & continuo humore, & æqualiter fuso. Vide Aristotelem probl. 4. sect. 6. Si in capite primū generatur malum, iisdem remediis vitor pro varietate materiæ, quæ in dolore capitis descripta sunt. Si ab arteriis, arteriæ post aures incidantur. Sed cum sit duplex venarum genus & arteriarum, quæ caput ascendant, interiores maiores, exteriores minores, siquidem per has sit fluxio, externa remedia, arteriotomia, venarum incisio & c. conferunt: si per illas, non conferunt, vt ex cap. 8. lib. 3. locor. mal. affect. dictum est. Nam venæ exteriores, nisi rami sint interiorum, non vacuant interiora. Si à cruditate, ea concoquantur, & temperantior vita instituat. Si à

1 Siue per idiopathiā cerebri, siue per sympathiam.

2 Quod sit translata ad nervū opticū materiā.

3 Inflammatis spiritibus, ab aestu, & incandescente sanguine.

4 Modò nulla perturbationis critica excusatio pos sit adferri.

Tunc enim ad salutē hæmorrhagiam portendunt.

5 Vt à pulmonibus & ventriculo: quæ tamen cardiogmo distinguuntur.

6 Quæ cardiogmum committit. ex aph. 17. lib. 4.

7 Cuius inordinatū motum marma-ryge sequuntur.

regurgitante bile, (sape enim tenebrosa quadam bilis ex hepate & intestino in ventriculum regurgitat)

8) Ad ex-
hauriendum
bilem ex ven-
triculo.

9) Simplicia.

10) Hyeme

ad cruditate.

11) Ut aestate.

12) Vel sac-

char, in aqua

rosacea disso-

luti.

pilulæ hæ singulis hebdomadibus 8 deuorentur.

℞. hieræ 9 picræ, rhab. elect. agar. trochiscati an.

3. β. mastichis, spicæ, fantali citrini, ros. rub. ana ḡ. 7.

cum syrupo ros. fiant nouem pilulæ pro tribus do-

sibus, sumendis horâ ante cibum. Aliis verò diebus.

℞. specierum 10 aromatici rosati, 11 specierum

trialantali ana 3. β. 12 sacchari rosati quantum suffi-

cit, cum syrup. rosato fiat electarium. Reliqua fa-

cienda sunt, ut diximus in dolore capitis, secundum

materiæ diuersitatem.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Συγρόσινος.

Συγρόμα.

Υποχύμα.

Vertiginis

primaria cau-

sa quæ sint.

Gale. comm.

in aph. 31. li. 3

Δίνας turbulenta est commotio spirituum crassorum, aut flatuosorum, aut solius spiritus cum multo vapore, in anterioribus cerebri ventriculis. Συγρόσινος duobus constat symptomatis, Νύξ seu vertigine, & tenebrosa oculorum offusione. Inde nomen Græcis compositum tenebrosæ vertiginis à vapore caliginoso. Συγρόμα pro utroque sumitur, sæpius pro vertigine. Ab utroque differt Epilepsia, tum materiâ, quæ est humor vel vapor: tum symptomate, quia cōuulsionem affert. Hypochyma longè alius affectus ab omnibus. Habet enim causam coniunctam in oculo, non in cerebro, nimirum aquam vel fumum. Quicquid ergo turbulentos illos spiritus procreare, vel procreatos commouere potest, siue internum sit, siue externum, vertiginis causa est. In capite primariò affecto causæ sunt humores repente ac vehementer agitati, animi affectiones: omnis intemperies siue arteriatum, siue cerebri coctionem impediens, aut corrumpens: præsertim calida, humores extenuans, & in feruorem agens, aut multos vapores generans: frigida, cruditaris parens, indeq; multorum & crassorum vaporum, unde senum diuturnæ vertigines apud Hippocratem: meatuum quoque densitas & obstructio, unde vapores intercluduntur,

& ut in fornace, per ventriculos circumaguntur: naturę conatus in secernendis humoribus per crifim: translata ad cerebrum matetia post crifes imperfectas. Mittuntur autem ad cerebrum vapores ẽ ventriculo per inediã, calore (alimenti inopiã) humores noxios exagitante, acres incidente, calfaciente, & ventriculum prauis succis replente: per cruditates, caloris natiui imbecillitate, qui vapores fecernit, secretos diffoluere nequit. Aliquando humor illic prauus aceruatur, vel genitus, vel aliũde accitus, vel cibus corruptus cõtinetur. Idem fit ab aliis vifceribus, hepate, liene, vtero, toto corpore, excrementis retentis, hæmorrhoidibus fuppreffis. Primariõ caput affici coniiicimus, fi fensus externi fenfim læduntur, fi in nulla parte inferiore vitium præceffit. Ab impuro corpore, cerebro infirmo, fi coctionis tẽpore, & cum a fono furgunt, vehementiũs vertuntur, fi tenuis fit vrina, pauca, alius dura, color cutis fimilis humori. A vetriculo, fi naufea, deiecta appetentia, ftomachi dolor, & fimilia præcefferint. Curatio perficitur fublatis caufis per cõtraria fanguinis miffione (fi conueniat) ẽ cephalica, vel mediana, vel basilica, ex arteriis poft aures, cauterio. In vaporibus à matetia calida primũ digerendo, deinde vacuãdo, poftea adftringendo, vapores prohibẽdo pulueribus, opiatis, fimilibus: per topica difcutiendo, roborando: ieiunos reficiendo optimis alimentis, & citò nutientibus. Nocet capitis frictio, nifi poft purgationem, vel aliarum partium frictionem. In capite fiat pãno flico: partibus inferioribus, calido.

Spectra rubentia.] Hippocrati & Auteliano μαρμαρυγὰν dicuntur λαμπρόδες πυκναὶ, πυρώδεις fpectra rubra oculis obuervantia, ẽ quibũ de humore peccante coniecturam facimus. Aliis ἀμαρυγὰν ἢ μαρμαρίσαι. Est autem facilis tranfitus vertiginis ad Epilefiam, vnde & veteres partem Epilefiam vocauerunt:

Vertiginis per protopatheia cerebri facta figna. Vertiginis ex partium inferiorũ fymptothia figna.

Hipoc. fent. 33. li. 3. Prog. Cal. Aureli. cap. 2. & 1. Chronicon.

ANTO. VALETHI EXERCIT. V.

Vertigo duplex: fimplex, & tenebricoſa: vtrãque maioris & minoris ratione diftinãta. Illa enim leuior: hæc grauior, quod à caufa fit potentiore. V-

DE MORB. INTERNIS

triūsque causæ & signa quibus inter se seiugantur, fusè repetita sunt ab Hollerio ex Gal. cap. 38. libr. tert. de loc. mal. aff. comment. ad aphor. 17. libr. tert. & ad sent. 42. libr. quart. de vict. rat. in morb. acut.

Si primaria affectio, an ab intemperie cerebri calida, arterioso genere intemperato, venis feruido & spumoso sanguine plenis, an sit à frigida, considerandum. Si ab illa, reprimētium vsus, vt oxyrhodini, reuellentium, vt phlebotomiæ, & cucurbitularū longinquis primū partibus, maioris ergō reuulsionis, vt tibiis, dein interscapulio affigendarum, indicatur. Veteres etiam arterias secuerunt, cum videlicet vapor exteriores per arterias ascenderet. Ante admotas ceruici cucurbitulas alius blando cathartico, aut enemate subducitur, ne vapor in caput ab his affixis concedat.

Interim sumenda sunt, quæ turbulentos sistant spirituum motus: vt zulap. rosac. syr. granatorum, de acetos. citri, cum aquis plantag. rosar. lactuc. & simil. In causâ frigida purgatio ex catapotiiis erit ex vsu, vt ex coctis & pillul. de agaric. æquis partibus mistis, & cum syrupo de stœchad. malaxatis. Hūc pertinebunt apophlegmatismata, & alia id genus particularia in cephalalgia pituitosa commemorata.

Commendatur maximè hic puluis. ℞. salu. 3. 2. flor. lauendul. hyssop. menth. an. 3. i. caryophyll. nuc. moschat. cinam. elect. zinziber. albi, granor. paradisi, zedoariæ, galangæ an. 3. i. calam. arom. 3. 2. granor. iuniper. 3. 3. granor. peron. 3. i. fiat puluis, de quo detur. 3. i. manè, & circa

somnum. Sunt qui vermem sericum facientem exsiccant, in puluerem redigunt, vertici capitis vertigini & conuulsioni obnoxii inspergunt, cuius mirabiles effectus esse volunt. Hoc puluere Carol. Quint. Imperator frequentissimè utebatur.

Si fiat per ventriculi consensum, purgabitur humor, qui os ventriculi lancinat, pilul. de hiera, aggregatiuis, & similibus syrupo de absinthio exceptis. Prohibebitur aditu ad cerebrū vapor aniso condito, ex cochleari à pastu dato, puluisculis reprimentibus è coriandr. ros. cinamomo.

Interea roborabitur ventriculus sumptis tabellis diarhod. Abbat. aromatic. rosati.

Quod si bilis ab hepate in ventriculum cōfluat, medendum hepatis diluto rhei in decocto hepatico, vel aquis hepaticis, syrup. de cichor. de endiuia, tabellis diatriasantal. cerato santalino.

De phrenitide.

CAP. 6.

Phreniticos ita ¹ curabis. Viribus integris ² sanguinem detrahes è ³ cephalica (nisi plenitudo ⁴ adsit, alioqui enim oporteret ⁵ prius secare iecorariam) angusto ⁶ foramine, ut vulnus celerius coalescat. Quod etiam fideliter ligabis, aut ⁷ pice obduces, ne temeritate phrenitici dissoluatur, & ita prorumpat sanguis. Obseruandum tempus, quo minùs furere videatur. Ministris quoq; opus est, qui phreniticum contineant: alioqui periculum, ne agitatione corporis vena phlebotomum eludat, aut amplior adigatur plaga, vel lo-

⁶ Ne ampla fiat spirituum dissipatio. ⁷ Vel linamento ex aloë, albumine oui & pilis leporum confecto.

¹ Si modò phrenitis curationē possit recipere, ut nec repētē phrenitidis paroxysmus ex diuturna generatione oboriat: nec phreniticus sit tremulus, aut etiā fanaticus, cū alui excrementis biliofa tinctura ex-pertibus, & impedimento partiū, quarrā officio vita carere nequit.

² Sine vllō infirmitatis metu.

³ Ad causā coniunctā remotionē, & antecedentis auersionem.

⁴ Vniuersi scilicet corporis, ad vasa.

⁵ Nisi etiā symptoma prohiberet.

cus turpiter laceretur. Detrahatur pro viribus, vitio animi deliquio. Paulus in iis, qui nimium corpus agitant, venam in fronte, alij venam nasi, Dio- cles venam sub lingua diuidit. Nonnulli sanguisuga fronti, temporibus, naso, caluariæ infigunt. Sunt, qui auriculas scarificent. Sed hæc omnia non nisi progresso morbo & vacuato corpore tempe- stiua sunt.

De aëre, vbi collocentur, iam olim disputatum est. Antiqui ferè tales ægrotos in tenebris contine- bant, tum quia in luce spiritus agitati furorem ex- asperarent: tenebras quoque ad somnum & quie- tem conducere existimabant. Asclepiades phreni- ticos in lumine esse habendos dixit, quia tenebræ terreant, quia lucido loco sensus occupantur, atque interim mens quiescat. In tenebris verò quietis sen- sibus, mens altis cogitationibus & visis sese exagitat.

Et propterea idem dicebat nulla re magis phre- niticos reuocari, quàm harmonia & Musica, vt cõ- stat ex Athenæo. Sed hoc ferè Græcis & Latinis placuit, vt qui luce ⁸ offenditur, habeatur in tene- bris, aut mediocri luce collocetur: quem tenebræ lædunt, in luce collocato: qui vtróque pariter of- fenditur, mediocri luci habeatur. Et si vires valent, lucido magis: si infirmæ, magis tenebroso iuuatur. Hæc & alia plura apud Celsum & Aurelianum de morbis acutis.

⁸ Spirituum
dissipatione,
& humoris
biliosi orgas-
mo.

⁹ Ad accē-
dā materiā,
infringendā
& digerendā.

Fuit & alia controuersia de tondendis, ⁹ aut ra- dendis phreniticis. Asclepiades radi noluit, nec etiā tondi, quia videlicet raso capillo aut detonso copio- sior materia in caput attollitur, vnde capilli fruticāt magis, & seges detonsa vberius prouenit. Itaque

cùm oporteat materiam à capite reuelli, non in caput attrahi, non erunt tondendi. Hoc verò reliquis omnibus Medicis placuit. Tondendi phrenitici (*ab initio*) radendi etiam, nisi prohibeat frigus, remissionis tempore, longiùs à cibo. Sic enim remedia commodiùs adhibentur, caput leuatur onere, & fumi faciliùs digeruntur. Misso sanguine molliusculis ¹⁰ clysteribus (*Cauendo à calidis, vt hiera, benedicta*) utemur: interim etiam acriusculis, & maxime, si phlebotomia omissa est, qualis hic est.

¹⁰ *Ad reuulsionem bilis.*

Talis autem clyster imperari poterit

℥. deco. lact.

plantag. nenuph. parietaria, althea

lib. i. In qua

dissolue. catholici 3. 6.

mell. ros. colati, sacch. alb.

ana 3. i. olei.

viol. 3. 3. sal. com 3. 2. fiat

clyster.

℥. deco. lact.

plantag. nenuph. parietaria, althea

lib. i. In qua

dissolue. catholici 3. 6.

mell. ros. colati, sacch. alb.

ana 3. i. olei.

viol. 3. 3. sal. com 3. 2. fiat

clyster.

℥. deco. lact.

plantag. nenuph. parietaria, althea

lib. i. In qua

dissolue. catholici 3. 6.

mell. ros. colati, sacch. alb.

ana 3. i. olei.

viol. 3. 3. sal. com 3. 2. fiat

clyster.

℥. deco. lact.

plantag. nenuph. parietaria, althea

lib. i. In qua

dissolue. catholici 3. 6.

mell. ros. colati, sacch. alb.

ana 3. i. olei.

viol. 3. 3. sal. com 3. 2. fiat

clyster.

℥. deco. lact.

plantag. nenuph. parietaria, althea

lib. i. In qua

dissolue. catholici 3. 6.

mell. ros. colati, sacch. alb.

ana 3. i. olei.

viol. 3. 3. sal. com 3. 2. fiat

clyster.

℥. deco. lact.

plantag. nenuph. parietaria, althea

lib. i. In qua

dissolue. catholici 3. 6.

mell. ros. colati, sacch. alb.

ana 3. i. olei.

viol. 3. 3. sal. com 3. 2. fiat

clyster.

℥. deco. lact.

plantag. nenuph. parietaria, althea

lib. i. In qua

dissolue. catholici 3. 6.

mell. ros. colati, sacch. alb.

ana 3. i. olei.

viol. 3. 3. sal. com 3. 2. fiat

clyster.

℥. deco. lact.

plantag. nenuph. parietaria, althea

lib. i. In qua

dissolue. catholici 3. 6.

mell. ros. colati, sacch. alb.

ana 3. i. olei.

viol. 3. 3. sal. com 3. 2. fiat

clyster.

℥. deco. lact.

plantag. nenuph. parietaria, althea

lib. i. In qua

dissolue. catholici 3. 6.

mell. ros. colati, sacch. alb.

ana 3. i. olei.

viol. 3. 3. sal. com 3. 2. fiat

clyster.

℥. deco. lact.

plantag. nenuph. parietaria, althea

lib. i. In qua

dissolue. catholici 3. 6.

mell. ros. colati, sacch. alb.

ana 3. i. olei.

viol. 3. 3. sal. com 3. 2. fiat

clyster.

℥. deco. lact.

plantag. nenuph. parietaria, althea

lib. i. In qua

dissolue. catholici 3. 6.

mell. ros. colati, sacch. alb.

ana 3. i. olei.

viol. 3. 3. sal. com 3. 2. fiat

clyster.

℥. deco. lact.

plantag. nenuph. parietaria, althea

lib. i. In qua

dissolue. catholici 3. 6.

mell. ros. colati, sacch. alb.

ana 3. i. olei.

viol. 3. 3. sal. com 3. 2. fiat

clyster.

℥. deco. lact.

plantag. nenuph. parietaria, althea

lib. i. In qua

dissolue. catholici 3. 6.

mell. ros. colati, sacch. alb.

ana 3. i. olei.

viol. 3. 3. sal. com 3. 2. fiat

clyster.

℥. deco. lact.

plantag. nenuph. parietaria, althea

lib. i. In qua

dissolue. catholici 3. 6.

mell. ros. colati, sacch. alb.

ana 3. i. olei.

viol. 3. 3. sal. com 3. 2. fiat

clyster.

℥. deco. lact.

plantag. nenuph. parietaria, althea

lib. i. In qua

dissolue. catholici 3. 6.

mell. ros. colati, sacch. alb.

ana 3. i. olei.

viol. 3. 3. sal. com 3. 2. fiat

clyster.

℥. deco. lact.

plantag. nenuph. parietaria, althea

lib. i. In qua

dissolue. catholici 3. 6.

mell. ros. colati, sacch. alb.

ana 3. i. olei.

viol. 3. 3. sal. com 3. 2. fiat

clyster.

℥. deco. lact.

plantag. nenuph. parietaria, althea

lib. i. In qua

dissolue. catholici 3. 6.

mell. ros. colati, sacch. alb.

ana 3. i. olei.

viol. 3. 3. sal. com 3. 2. fiat

clyster.

℥. deco. lact.

plantag. nenuph. parietaria, althea

lib. i. In qua

dissolue. catholici 3. 6.

mell. ros. colati, sacch. alb.

ana 3. i. olei.

viol. 3. 3. sal. com 3. 2. fiat

clyster.

℥. deco. lact.

plantag. nenuph. parietaria, althea

lib. i. In qua

dissolue. catholici 3. 6.

mell. ros. colati, sacch. alb.

ana 3. i. olei.

viol. 3. 3. sal. com 3. 2. fiat

clyster.

℥. deco. lact.

plantag. nenuph. parietaria, althea

lib. i. In qua

dissolue. catholici 3. 6.

mell. ros. colati, sacch. alb.

ana 3. i. olei.

viol. 3. 3. sal. com 3. 2. fiat

clyster.

℥. deco. lact.

plantag. nenuph. parietaria, althea

lib. i. In qua

dissolue. catholici 3. 6.

mell. ros. colati, sacch. alb.

ana 3. i. olei.

viol. 3. 3. sal. com 3. 2. fiat

clyster.

℥. deco. lact.

plantag. nenuph. parietaria, althea

lib. i. In qua

dissolue. catholici 3. 6.

mell. ros. colati, sacch. alb.

ana 3. i. olei.

viol. 3. 3. sal. com 3. 2. fiat

clyster.

℥. deco. lact.

plantag. nenuph. parietaria, althea

lib. i. In qua

dissolue. catholici 3. 6.

mell. ros. colati, sacch. alb.

ana 3. i. olei.

viol. 3. 3. sal. com 3. 2. fiat

clyster.

℥. deco. lact.

plantag. nenuph. parietaria, althea

lib. i. In qua

dissolue. catholici 3. 6.

mell. ros. colati, sacch. alb.

ana 3. i. olei.

viol. 3. 3. sal. com 3. 2. fiat

clyster.

℥. deco. lact.

plantag. nenuph. parietaria, althea

lib. i. In qua

dissolue. catholici 3. 6.

mell. ros. colati, sacch. alb.

ana 3. i. olei.

viol. 3. 3. sal. com 3. 2. fiat

clyster.

℥. deco. lact.

plantag. nenuph. parietaria, althea

lib. i. In qua

dissolue. catholici 3. 6.

mell. ros. colati, sacch. alb.

ana 3. i. olei.

viol. 3. 3. sal. com 3. 2. fiat

clyster.

℥. deco. lact.

plantag. nenuph. parietaria, althea

lib. i. In qua

dissolue. catholici 3. 6.

mell. ros. colati, sacch. alb.

ana 3. i. olei.

viol. 3. 3. sal. com 3. 2. fiat

clyster.

℥. deco. lact.

plantag. nenuph. parietaria, althea

lib. i. In qua

dissolue. catholici 3. 6.

mell. ros. colati, sacch. alb.

ana 3. i. olei.

viol. 3. 3. sal. com 3. 2. fiat

clyster.

℥. deco. lact.

plantag. nenuph. parietaria, althea

lib. i. In qua

dissolue. catholici 3. 6.

mell. ros. colati, sacch. alb.

DE MORB. INTERNIS

12 *Ad dige-
rendum.*

Apij succus, aut alius fortioris, vt calament. & origani, ad resoluendum addi poterit, sed non nisi declinante morbo. Licebit etiam vti in declinatione 12 oleo, in quo serpillum, & alia eiusmodi coxerint, vt concilietur somnus. Hordeata parentur ex aqua decocti quatuor seminum frigidorum. Perfundatur caput & facies, abluantur pedes & manus, excipiat quoque vapor hoc modo.

13 *Mascula.*

℥. violarum, hordei excorticati, capitum papaueris albi. rad. 13 mandragoræ ana M. i. fiat decoctio in aqua purissima. Vbi refrixerit facies ægri, inde abluantur pedes quoque & manus. Deinde sponsia immersa in his, id est, in decocto, subinde naribus admoueat.

Iuscula cum capite vno papaueris albi coquantur, multa lactuca alterentur, vel hoc nodulo.

℥. quatuor sem. frigidorum maiorum, papau. albi ana 3. ℔. fiat nodulus, qui imponatur in iusculis. Utatur cichorio & lactuca elixis, & modico saccharo violato conspersis.

Frontalia.

℥. ol. ros. 3. i. aceti 3. 2. populeonis (*ad somnum: sed recens esse debet, quia antiquum calfacit*) 3. 2. misce pro frontali. Oleum, in quo viua torpedo extincta sit, ac deinde coxerit, in quo lactuca coxerit, folia aut capita papaueris recentis, oleum violatum, de nenuphare, de papauere, de mandragora, de cucurbita.

Vel. ℥. olei rosarum, nymphææ & papaueris alb. aceti, aq. stillatiniæ solan. & betonicæ ana 3. ℔. mista agitetur pro embrocha frontis & syncipit. Item. ℥. vnguenti populei & rosacei aceto lotorū ana 6. 3. ℔.

feminis papaueris alb. & psyllij. contusorij, ceræ ana
 ʒ. ʒ. malaxentur, & cōcorporentur in cerati formā,
 quod inditum linteo fronti circunderetur. Aut.

℥. olei de mandrag. vel de aliquo alio ex suprā
 dictis ʒ. 2. populeonis ʒ. ʒ. aceti ʒ. 2. Agitentur &
 misceantur pro frontali. Aliud fortius.

℥. 14 opij, croci ana ʒ. 1. distemperentur in vini 14 *Succi pa-*
 albi, & aquæ ros. ana ʒ. 1. cum linteolo in eo made- *paueris ni-*
 facto fiat frontale. *gri. Caterum*
hec adhibē-

Chelidonij terrestris manipuli 2. vel 3. coquun- *tur, quō sym-*
 tur, lana vel stuppis excipiuntur, & raso capiti, em- *ptomati sum-*
 plastri modo, vtiliter imponuntur. Ad id quoque *ma sunt om-*
 facient odoratus rerum frigidarū. Nec desunt, qui *nia.*
 caphuram è collo ad cor suspensam commendent.

Conciliato somno, & expectato ægro, facies
 abluatur decocto cham. aut anethi. Non vtendum
 somniferis, quæ intrò sumuntur, nisi vires valeant:
 alioqui horum vsu languidus calor extinguitur.

Potio ad somnum.

℥. syrup. de nenuph. syrup. de papau. ana ʒ. 6. de-
 cocti lactucę ʒ. 2. fiat potus, detur horā somni. Alia.

℥. lactucarum P. 1. 15 dactylos N. 3. caput vnum 15 *Dactyli*
 papaueris albi: fiat decoctio ad ʒ. 4. In quibus disso. *phreniticis*
 syrup. 16 ros. ʒ. 1. ʒ. misce, detur horā somni. *non exhibē-*
di, quod va-

Vel. ℥. lactuc. nouell. M. 1. florum violar. nenuph. *peribus ca-*
 ana p. 1. feminis papau. alb. sem. melonum ana ʒ. 2. *put oppleat.*
 fiat decoct. pro vna dosi: in colat. dissol. syrupi de 16 *De ficcis*
 papau. ʒ. 1. vel eiusdem syrupi, & diacodij sine spe- *vulgò dicti.*
 cie. ana ʒ. 6. vel syrup. ros. ficc. & de nenuphare
 ana tantundem, fiat zulapium clarum: condiatur
 pauculo santalo citrino, vel cinanom. crassius con-
 quassato.

DE MORB. INTERNIS

℥.rof. violarum, absynthij an. 3. ℔. opij gr. i. simul mixta leuiter bulliant, colentur cum 3. 4. iusculi pul- li, sorbeantur. Quinetiam quoniam phreniticis ab immodica illa vigilia certa impendet virium pro- stratio, commodum erit, aliis remediis non respon- dentibus, tandem hoc vnguentum præcipere, quod ad omnem ἀγρυπνίαν, seu ex febribus, melancho- lia, aut dolore obortam mirificè confert. ℥. succi mandragor. violar. seminis hyoscyam. capitum virid. papau. ana 3. 12. cicutæ, solani, radic. lactuc. ceræ an. 3. 6. mastich. 3. 1. opij 3. 2. omnes herbæ, semina, & radices oleo viol. vel cōmuni diebus 12. infunde deinde ad prunas coque, donec herbæ co- quantur. Postea cola. Colatis tritum opium immi- sce. Postremò ceram & mastichem adiunge. Ad idem olea crocinum, hederaceum, mandragorinū, populneum plurimūm facient. Sic autem popul- neum parabitur. In vini ℔b. 4. olei, si vis, ros. ℔b. 3. oculorum populi verè collectorum libræ tres die- bus 7. macerentur: quotidie agitentur: leuibus pru- nis postea coquantur ad vini consumptionem. Ca- pitis dolores abigit efficaciter. Nimiūm sopitos his remediis ita excitabis.

℥. succi rad. fœn. 3. 2. ℔. aceti albi, in quo nux moschata coxerit, 3. 1. ℔. cum spongia ex aqua hyssop- i expressa, & rursus madefacta in suprà dicto suc- co, fiat errhinum, attrahatur naribus. In eundem vsum pulegium, aut hyssopus teritur, & ex aceto naribus admouetur. Porro quæ adhuc in menin- gibus superest crassior, aut impactior materia, ea digerentibus est vacuāda. Vacuabitur partim sum- ptis, vt rheo, myrobalan. & catapotiiis conuenienti-

bus: partim admotis capiti temperatè calidis, vt oleo rosaceo cum chamæmelino: fotu ex decocto maluæ betonicæ, fœnicul. alth. lini, fœnug. florib. chamæm. aneth. anthos, sambuc. cum spongia, vel cum linteo: vel eidem capiti applicitis, columbis, catulis, lapis, aut similibus animalculis viuis per spinam sectis, & exenteratis. Sed hæc nunquam nisi in fine vigoris & declinatione morbi tentanda sunt, alioquin plus attraherent, quàm digererent.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Mania & melancholia, deliria sunt sine febre: phrenitis & *παραφρεσύνη* cum febre. Hæ duæ species distinguuntur continuitate. Nam *παραφρεσύνη* symptoma est in statu febrium ardentium, cum quibus incandescit, & remittitur. Phrenitis verò morbus est cōtinuus, febrem & mentis perturbationem inducens. Hippocrati tamen interdum phrenitici dicuntur, quibuscūque mens oblata est. Causa duplex: vna à bile naturali, id est, tenuiore sanguine ad cerebri meningas affluente, & in illis inflammationem, vel etiam in cerebro, ob exitum è vasis, angusto loco coarctationem, & prohibitam transpirationem procreante, vel feruente duntaxat, vnde Hippo. *Phrenitidis causæ duplex.* Crati deliria securiora cum risu. Altera à bile non naturali, id est, acri & adusta, quæ quò acrior est, & adusta magis, cò sæuiora & periculosiora accidencia inuehit. *Hippo. aph. 53. li. 6. Aph.* Signa pathognomonica sunt, febris, delirium, continuas. Curatur primùm clysmate molliente & alterante, si & per morbi sæuitiam, & ægri morositatē liceat: sectione cephalicæ, aut eius loco, cucurbitulis humeris & natibus cum scarificatione admotis, aut sectione venæ sub lingua, materia fluente: in statu, venæ frontis: Topicis initio repellētibus, deinde admixtis paulatim resoluentibus, purgatione bilis, potionibus cordi acommodatis in virium imbecillitate, sed in bile adusta humectantibus & melancholico humori propriis, aluo perpetuò humectata, yrinæ prouocatione (si retenta sit) per adme-

DE MORB. INTERNIS

ta non calfacientia. Cæterum de venæ sectione in phrenitide non levis est dubitatio. Etenim Asclepiades medicos eos trucidare affirmabat, qui phreniticis sanguinē detrahi imperarent, quod phrenitis non nisi intenta & vigente febreprehendat: sanguis autem remissa febre mitti debeat. Et quidem ratio sanguinem mittimus, quia ferè prius missus fuit, & iam virib' deiectis incidit phrenitis. Quod si quando sanguis ducatur, animi deliquiū vitandum.

*Narcoticis
castè utendū.*

Oleum de papauere, de mandragora.] His cum iudicio utendum, ne cerebro naturā frigido noxa inferatur, idque in minima dosi, & in principio, aut vigiliis. Temperari possunt mulieris lacte puellam lactantis, quod frigidiusculum est. Possumus quoque pannos succis intingere, vel aquis in hyeme, & ad mouere frontis: qui remouendi sunt, ubi incaluerint, & sæpius repetendi. Potest etiam è tritici farina sola cum succo & oleo violarum fieri cataplasma, & fronti non dormientium applicari.

Syrupi de papa.] His quoque non utemur nisi coacti, & firmis viribus. Cum enim frigidissimi sint, de caloris natui extinctione periculum imminet. Ad virium robur & conseruationem addantur syrupus violatus, pulueres cordiales, ut de gemmis, diamargariton frigidum, aquæ buglossi, borraginis, & in bile adusta, puluerum loco, confectio alkermes in minima dosi pro imbecillitate virium, & extrā ventris fluxum.

*Opij vsus
quibus in na-
turis suspen-
dus.*

Opij.] Vfus opij in pueris, mulieribus, mollioribus, periculosus est: in robustioribus minùs: assuetis, ut quartidam regionum incolis, nullo modo, etiam si per os sumatur. Gulielmus Rondeletius primariæ notæ medicus, & in Monpensulensi Schola Regius Professor retulit mihi vidisse se ab Hispano in summo æstu opij semantiam sine noxa deuoratam. In dolore capitis opium, non croco, qui molestiam & grauitatem inducit, sed nucem moschata, corrigi debet.

ANTO. VALETII EXERCIT. VI.

Phrenitis membranarum cerebrum obuelantiū, atque adeo cerebri ipsius, inflammatio, vel ex-

quisita est, & cerebri, meningumque eius propria, vel spuria, cerebro septo transverso inflammato consentiente, & ex nervis, qui in ipsum sparguntur, vitium concipiente. In illa magna & rara est respiratio: in hac inæqualis, à contractione præcordiorum *Paul. Aeg. cap. 6. lib. 3.* & incendio magno. Vtriusque distinctiones, causæ & signa habentur cap. 3. libr. 5. de loc. malè affect. libro 2. de caus. sympt. comment. ad sent. 1. sect. 1. Prorrhet. 1.

Morbus hic, quia acutissimus, celerem petit curationem. Iniicitur clyster è decoct. remollient. additis feminib. frigidis: in quo sint dissolut. cathol. & diapr. an. 3. 3. mel. ros. & saccha. alb. an. 3. 1. butyri recentis (nō enim tam citò, atque olea, inflammatur) 3. 3. vel ole. violac. & butyr rec. an. 3. 1. s. *Phrenitidis curatio.*

Clystere reiecto, materiæ affluxus, qui tumori & inflammationi incrementum suggerit, reuellendus, aperta cephalica, vel, suadente Actio, media, ut celerius subueniatur, angusto tamen facto foramine, metu nimix spirituum exolutionis, qui in hoc affectu præ sanguinis tenuitate facilè dissipantur.

Conuenient deinde repellentia, quæ suo occursum humorem propulsent, eiusque feruorem cōtemperent: quanquam in statu, vbi meatuum resecutione, & humoris discussione maximè est opus, eorum vsus sit penitus abrogandus.

Purgationum etsi Græci authores non meminerint, fortasse quod existimârint humores motos inflammationem augere: tamen cum bilis ad furorem in phrenitide multū faciat, & in magnis morbis nō solum sanguinis missione, verum purgatione uti sit rectissimum, hîc purgante medicamento,

*Gal. lib. 4.
Meth.*

minùs tamé calido, medicari licebit, priusquam ad ea quæ alterant, discutunt, & vapores transpirare faciūt, veniatur. Sic itaque purgabis. ℞. expression. 3. 2. rhei elect. in decoct. 3β. 1. ramarindor. & cichor. infus. cū. 3. 1. cinam. in qua dissol. cathol. & syr. viol. an. 3. 1. f. potio. Pauperibus semunciam diapr. solut. aut eiusd. diap. & electarij de succo ros. an. 3. 2. in aqua hordei dissolues, nisi calidiora hæc exhibere febris vehementia veret.

Longius progresso affectu, & commoda erit deriuatio, & à parte laborante vacuatio. Alterum affixis cum sacrificatu interscapulio cucurbitulis: alterū sectione rectæ in fronte venę, stricto prius, vt appareat, collo, consequimur. Quod si consistente morbo spes sit alicuius crism consequuturæ vacuationis, nihil moliendum, ne naturæ motum interturbemus. Contrà verò si natura nihil tentando fatiscat, aliqua oneris parte leuanda, clystere, vel cathartico exhibito.

Mox ad discutientia linimenta & fomenta progrediendum: quæ quamuis calida, materiam foras euocando refrigerant. Parabitur ex moderatè calidis, vt chamæm. melil. aneth. beton. stœch. maioran. seminib. anis. fœn. & similibus, decoctum, in quo immersa sponsia capiti applicanda. Litus ex ol. chamæm. liliac. aneth. Hûc referuntur exenterata, vt loquuntur, viua animalcula.

Præterea quia in phrenitide superat calidus humor, & proinde in ea affectione est *αευκνυσία*, est quoque & *αναίσθησία*, ob vitiatam cerebri temperaturam, occurrunt duo grauissima symptomata, somnus difficilis & vrinæ retentio, quæ opem medici

dici requirunt. Somnus conciliabitur hypnoticis
portionib. ab Autore imperatis, vel hordeato cui
semina refrigerant. pap. alb. lact. vel portulacæ sint
addita. Subducetur vrina pubis & perinæi fotu, ex
malua, bism. pariet. cham. & mel. in aqua & vino
albo coctis.

De I Apoplexia. CAP. 7.

Apoplecticum 2 ita curato. Hominem agi-
rato, concurito, 3 fricato. Sæpe enim simi-
les apoplecticis concidunt ex leui obstru-
ctione, quæ agitatione corporis discutitur. Ea ob-
structio à crassis vaporibus esse potest, vel quia pau-
ca materia est, quæ obstruit. Similes quoque apo-
plecticis 4 sunt, qui apolectici & cataleptici veriùs
dicentur, ex plenitudine totius corporis, vel capitis,
vnde viæ spiritales interceptiùtur. Quibus vena bra-
chij interna quidè, si totius corporis plenitudo est,
cephalica, si tantum capitis, statim 5 aperienda est.
Hoc enim remedium sæpe satis est. Eiusmodi hi-
storia est apud Aëtium, capite de catalepsi. Iuuenis
quidam multi sanguinis derepètè mutus factus est.
Tres dies integros ita iacuit: quarto die multo
profluuiò sanguinis è narib⁹ liberatus est. Ἀφωγία
Græci affectum eum vocant. In apoplexia, quam
frigidus & crassus humor excitat, priuatione mo-
tus & sensus, ac propè extincta rectrice anima, ho-
minem 6 loco lucido & tepido collocato, ac cor-
pus vehementiùs concurito. Tum 7 multa frictio
conuenit, vnctio ex oleo calente, & maximè earum

1 De motus
et sensus uni-
uersi corporis
priuatione:

qua fit quum
spiritus ani-
malis è cere-
bro exitu pro-
hibetur, &
vitalis aditu
è corde ad ce-
rebrum.

2 Si modo a-
poplexia for-
tis non sit, sed
debilis. Est
enim insana-
bilis valida
apoplexia.

3 Dura fri-
ctione, vincu-
lis quoq; dolo-
rificis, vt con-
creti humores
fundantur, ac
spiritus ani-
malis exitum
habeat, vita-
lis aditum.

4 Ac præfer-
tim ij, qui bre-
uiore et cras-
siores sunt cel-
lo, quib. vita-
lis spiritus a-
ditu ad cere-
brum prohibe-
tur.

5 Nam aphoniā sine febre vena sectio soluit. sect. 5. lib. 2. Epid.
6 Vt splendore lucis materia foras euocetur. 7. Ad excitandā
nature vim, liberanda obstructa, & preparandā materiam.

partium, quæ magis refrixerint. Plantarum pedis pruritus, aquæ vitæ cū nuce moschiata in nares iniectio, sinapi vulgare illitum, vellicatio barbæ & pubis, sal ori iniectus. In phlebotomia, quæ vel hominē liberat, vel occidit, ita te gerito. Si nihil 8 repugnat, præparato prius 9 corpore, & 10 in tempore venam cephalicam incidito: parum detrahito. Post aliquot horas, si perseveret malum, alteram cephalicam vulnerato, nec ita multum sanguinis detrahito. Hæc verò repugnant, quòd aliquando immodica venere, aut alia quavis spirituū inanitione virtus corporis exhausta est. Hic 11 scarificatione, cucurbitulis, sanguisugis toto corpore fixis cōtentus esto, quemadmodū in obesis corporibus, mollioribus, & debilioribus, in quibus venæ 12 vel non apparent, vel non ferūt phlebotomū. Præparatur corpus, subducto prius ventre, totius corporis foru ex ol. calido, chamæmelino, anethino, aut simili, aspera 13 frictione, cōcussione corporis & ambulatu, vt sanguis crassior & frigore cōgelatus recalescat, attenuetur, & melius effluat, oportetq; iustū vulnus infligere: alioqui subsistet sanguis: quanquā nō vniuersim, sed interuallis detrahendus sanguis est. Occasio est in remissione, aut quo tempore non ingrauescit malū. Remissio intelligitur liberiore, quàm antea, respiratione, pulsu meliore, & vbi partis alicuius torpor cœpit egelari. Alioqui si, quod sæpe fit, aliter venam aperias, aut ægrum præcipitabis, aut nihil iuuabis, exitu materiæ negato. A phlebotomia spes salutis, si pulsus, respiratio, faciei color, partium frigus, mens, motus, sensus, omnia, aut ex his aliqua, in melius conuertantur. Alioqui, si non accreuit ma-

lum; ex altera cephalica iteranda sectio est. Quòd si ne tum quidem proficiatur, desperatur æger. Secta venâ, quiescat æger, atque interim stomacho & visceribus consulamus hoc modo.

14 Vel olei de absynth. & mentha an. 3 iij.

℥.ol. 14 de spica 3.3. mast. 3.1. liquefiant in 15 varie duplici: & cum cyperi, macis, cina. an. 3.2. coralli rub. 3.1. misceantur, cum rasura scarlatæ, aut gossipio applicentur calida. Poterit etiam aliquid syrup. 16 rosati deuorari. Visceribus sic.

15 Balneo marie vulgò nunc cupato.

16 Ad arcendos fumos, & inhibendum catarrhum.

17 Ut in lib. 8. ol. & quartar. j. vini.

18 Ad excitandâ naturâ vi

19 Qualis esse poterit ex origani, calamenth. stach.

bets. chama. foliorum lauri an. M. 8.

20 Ex floribus rorismarini confecti.

21 Vel rutacei, dū effecta intestinorum vis languet.

22 Motu peristaltico & subsultim facto.

23 Vel simplicis.

24 Ut septenis, exoluta opij vi.

℥. summiratum absynthij M.1. sem. carui, cumini ana 3. 8. fiat decoctio in olei & 17 vini an. quantum sufficit. Inde foueatur regio 18 hepatis & lienis. Post hæc clyster acris iniiciendus est, ex decoctionis 19 capitalis lib. 1. adiecta sem. carui, cumini, baccarum lauri 3. 8. Deinde in decoctione dissolue pul. hieræ picræ, & diacolocynth. an. 3.3. mel. 10 anthosati, sacchari rub. ana 3.1. salis 3.2. 21 olei anethini 3.3. Sæpe fit, 22 ut resistat clyster, aut per os reuomatur: tum fiat tale suppositorium.

℥. pul. hieræ diacolocynt. 3.2. castorei, sem. carui & rutæ ana 3.2. sal. gemmæ 3.1. cum melle, q. s. fiat suppositorium bene longum. Quòd si nec hoc modo alius quicquam reddit, cucurbitulis utendum est, ex libello de cucurbitula. Reddito clystere aliquâtisper quiescat æger. Postero die.

℥. pul. hieræ 23 diacolocynt. 3.2. theriacæ 24 veteris 3.1. dissol. in aquæ vitæ & calendulæ an. 3.1. cum cochleari, aut siphone infundatur in gulam. Antidotus hiera Pachij Antiochi à Scribonio Largo descripta multos olim apoplecticos Romæ liberavit. Hiera Logadij conuenientior fuerit, si à melancholico succo & crassa materia sit affectus.

DE MORB. INTERNIS

Interim quoq; utédum est remediis, quæ Apople-
cticum excitant. Oleum vitrioli plurimùm com-
mendatur. Quòd si deest, dissoluantur 3. 2. vitrioli
in 3. 1. olei de spica, de costo, de castoreo, de scylla,
aut simili, hoc modo.

℞. scyll. concisæ in taleolas 3. 2. castorei 3. ℞. vi-
trioli 3. 3. fiat decoctio in olei anethini & vini ana.
℞. ℞. ad còsumptionem vini. Nares & palatum hoc
oleo illinantur. Sunt & alia, quæ apud Græcos &
Arabas inuenias. Potio.

℞. cast. 3. 4. mastich. sem. rutæ, fantali citrini, nucis
moschatæ an. 3. ℞. ponantur in manica Hipp. &
colentur quater. Cum aquæ vitæ & calendulæ an.
3. 1. ℞. f. potio, infundatur in gulam. Aqua destil-
lata è nucibus moschatis auribus, palato, naribus
ebibita, omnium est remediorum accommodatissi-
mum. Quòd si fiat cum aqua vitæ destillatio, mul-
tò erit efficacior. Hoc præsidium Senectéssem Epi-
scopum horas iam 20. iacentem excitauit.

25 Calami 26 Aut aqua
aromatici. 26
nita, aut me-
lissophylli. ℞. conf. iris, 25 acori an. 3. ℞. conf. salu. 3. 2. diu
agitentur in mortario, ex 26 aquæ saluæ 3. 2. Fiat
fortis expressio cum supradicta aqua vitæ. Traicia-
tur per manicam Hippocratis, fiat potus.

27 Horum
materia des-
cripta est in
cephalalgia
frigida. ℞. capillorum hominis minutim concisorum 3.
℞. cast. 3. 2. helleb. 3. 1. incorporentur in opopanace,
fiat suffumig. Vel parabitur puluis in nares immit-
tendus. ℞. hellebor. condisi, albi piperis an. 3. 1. f.
puluis. Caputpurgis fortioribus, illitionibus palati
ex pulueribus, masticatoriis, 27 apophlegmatismis
vtendum. Sed prius suffumigiis & vaporibus mate-
ria incidenda. Radédum quoque caput est, fouen-
dumque ex oleo calente, in quo pulegium, serpillu,

alia quoque eiusmodi coxerint. Deinde dropacibus, sinapismis, ²⁸ sartagine Rhazæ vtendum est. Cucurbitulæ quoque & sanguifugæ iam bene purgato corpore, conueniunt.

²⁸ Vt candē
ti sartagine
excitetur so-
pita cerebri
vis.

℥. olei rutacei 3.3. picis nigræ lb. i. liquefiant in vase duplici: deinde adde pyrethri, sinapi, piperis albi ana 3.3. Misce, extende in aluta, calidum appone, renoua priusquam refrigescat.

℥. ficus pingues q. f. leuiter incoque: deinde cū duplo sem. sinapi contunde ad formam emplastri. Appone capiti post fotum conuenientem. Aliud.

℥. ²⁹ oxycroci vel emplastri de Vigo 3.3. fortiter agitetur in mortario cum oleo laurino. Deinde addantur gra. sinapi, pyrethri, staphysagriæ, piperis albi, euphorbij ana 3.2. misce.

²⁹ Id empla-
strum ab ace-
to Theraco no-
men habet.

Rhazes sartagine calefieri, dum candeat, interdum laudat, & de proximo admoueri capiti. His remediis per longiora interualla vtendum est, aut breuiora, vt res patitur.

Hic verò ad
incidendum
& foras euo-
candum præ-
scribitur.

Apoplexia secundo aut tertio die iugulat, aliquādo ³⁰ prius. Vt ergò celerior est, aut minùs celer, ita erunt interualla remediorum aut longiora, aut breuiora.

³⁰ Vt quæ
fortis existit.

℥. succi rosarum, mellis albi ana 3.3. fiat syrupus secundum artem: loco mellis potest substitui saccharum. Quædam apoplexia fit à multitudine humorum, quam plethoram vocant, & ea dicitur, ἀποληψίς, i. interceptio artiarum & venarum. Eam sanat subita & diligens sanguinis detractio. Potest autem esse repletio humorum, & tamen erit inanitio spirituum, vt in iis, qui venere immodica statim à cibo vtuntur. Nam

Syrupus me-
linus.

DE MORB. INTERNIS

in coitu multus spiritus vitalis effunditur.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

In Apoplexia homo repētē concidit sine motu & sensu. Sic à nobis observatum, in frigida & Austrina aëris constitutione Medicum quendam doctissimum sexagenarium, ultimo Ianuarij die, Lutetiae à cœna concidisse mortuum, Ruellium Septembri periisse quarto die, sicut & Bibliopolam quēdam eodem die, viâ Iacobæa. Pictorem quoque mense Aprili, anno 1545. interiisse stertenti apoplexia: eodem mense figulum in suburbio Iacobæo leui apoplexia Paralyticum altera parte cūcuisse, utriūque vinosum & macilentum, ut inde intelligas vim ambientis in suscipiente preparato. Eadem ferē constitutione temporis videre licuit Medicum apoplexia paulō ante cœnam correptum interiisse repente. Mulieribus quibusdam quo. tēpore foetus in utero animatur atque mouetur, ut 40. die, & in foeminis 3. aut 4. mense fiunt apoplexiæ leues, ut in Dominæ Ezechin à nobis est observatum. Acutissima apoplexia mox iugulat, & spiritum adimit: fortis violentum trahit, tertio loco est, quæ non violentum quidem & intentum, sed inæqualem, inordinatum & intermittentem, desinitque in paralytim. Vnde animaduersione dignum illud videtur, quod scribit Galenus comm. in aphor. sr. lib. 6. Quicūque sani capitis dolore derepente capiuntur, & statim murti fiunt, & stertunt, in septem diebus pereunt, nisi febris apprehendat. Quæ sententia etiam scripta est 2. de morb. Interpretatur enim de apoplectis, qui apoplexia forti laborent. Sed hi ferē primo, secundo, aut tertio die pereunt. Hinc quoque perspicuum est, ex difficultate respirationis de magnitudine morbi coniiciendum esse. Quæ nota etiam distinguitur à caro & catalepsi, in quibus libera manet respiratio. Apoplexiæ nomine non semper in hac significatione Hippocrates est usus. Fiunt apoplexiæ, vel quia spiritus animalis, qui per nervos descendit, non conficitur à cerebro, ob intemperiem totius substantiæ ipsius: vel quia intercipitur, idque vel à pituitoso humore crasso & viscido, cōfertim cerebrū irrigate, quales sunt senibus familiares & hyeme, ut scribitur li. 3.

*Apoplexia
multi repen-
tē suffocati.*

*Apoplexia
quæ nota à
caro & cata-
lepsi distin-
guitur.*

Apho. mulieribus minùs molestæ ob menstruam purgationem: vel ab humore melancholico, periculosa, & quæ hominem occupant à quadragesimo anno vsque ad sexagesimum, sicuti docetur Apho. 57. lib. 6. vel à sanguinis eruptione & plenitudine, aut crassis vaporibus cum humore vias spirituum intercludentibus, vt in ebriis quibusdam. Omnium facilis dignotio ex propriis cuiusque humoris signis. Si qua à sola intemperie, non nisi longa temporis progressionem induci potest. Nullæ vnquam, vel difficulter curantur. Si qua tamen curationis spes, ea fiet primùm clysteribus acerbis, ab imbecillioribus initio sumpto, id est, qui fortiter trahentia non recipiunt, vt colocynthidem, quia prius inaniendum, quàm à partibus remotis trahendum: suppositoriis, dum clysteres parantur, sanguinis missione, præsertim cum venæ tument, & distenduntur, ligaturis fortissimis & dolorificis, frictionibus asperis extremarum partium, hæmorrhoidum inflatarum apertione, potionibus ex-calfacientibus & extenuantibus, pilulis dissolutis in aquis sæpius repetitis, sinapi ori imposito, & dissoluto in oxymelite, vel benedictâ, vel diaphœnico, vel sinapi dissoluto aquâ vitæ, & naribus illito, sale in os iniecto, frictione palati: sternutatoriis post vniuersalia remedia appositis naribus, vt rutâ, castoreo, galbano, euphorbio: sinapismis, dropace, cauterio, & si paroxysmo liberentur, cocta materia, & educta.

*Apoplexia
curatio qui-
bus perfici-
tur.*

[*Hominem concutito, fricato.*] Collum commouendum, fricandum, & contrectandum durius, qua parte venæ sunt & arteriæ. His enim prohibetur congelatio, sanguis incalcescit ac tenuatur, melius fluit, & præparatur ad venæ sectionem.

[*Vena brachij interna*] Magna inter omnes dissensio de venæ sectione in apoplexia. Arabes initio eligunt saphe nam, vel malleoli. Sed cum exigua sit, & valde remota, nec sanguinis satis, nec sat citò inde reuelli potest, poplitis vena commodior, quia amplior, & tutior. Deinde cephalica vtriusque brachij, ad vtrâque partem exonerandam: postea ad deriuationem, venæ iugulares, quæ valde tument. Angusto tamen foramine, metu hæmor-

*De vena in
apoplexia se-
canda ma-
gna discēssio.*

DE MORB. INTERNIS

rhagiæ, sectio faciendâ, & cohibendus sanguis medicamento Galeni ex pilis leporis, aloë, thure, & albumine oui, conuenienti ligaturâ asseribus utrinq; ad collū applicatis supra iugulares, à clauiculis ad aures, & à sternō ad mentū, ne prohibeatur libera respiratio. Quod in canes sumus experti exectis etiam pilis. Venas linguæ aperire non licet, contracto ore. Ex venulis nasi nihil iuuatur eger ob paucitatē sanguinis. Venæ frontis à iugularibus oriuntur, nec tā conspicuæ sunt. Haly Abbas ca. 22. libr. 5. suæ Praxeos non omninò phlebotomen reicit, nisi hac forsan conditione, vt apoplectici facies non rubeat, non liuescat, aut viridis & repleta non appareat. Eadem occasione Rhazes sanguinem detrahit è iugularibus, vel cephalicis illico, deinde è pedib⁹, & extremō naso. Sternutatoria quoque reicienda, cū sit humor in corpore cerebri, non in ventriculis.

Cucurbitulis] Vbi sectio venæ non conuenit, illius loco cucurbitulis vtendum. Quæ si adhærere possint propè iugulares, & quasi sub mento, melius erit, quàm in humeris aut dorso. In hypochondriis nocent, impediendo motum musculorum abdominis in respirando, nisi extra paroxysmum. Loco cucurbitularū multæ sanguisugæ, cornicula applicabuntur cum scarif. Cucurbitulæ hypochondriis non affigendæ in accessionibus apoplecticis.

Theriace veteris] Minus conuenit tum propter adstringentia, quæ multa recipit, tum ob vim opij non omninò consumptam vetustate. Hæc omnia humorum cerebri corpus irrigantem altius impingunt. Horum loco detur 3. i. coctiarum dissolutarum in aqua vitæ, vel castorei ʒ. i. aut ij, tum piperis, zinziberis & euphorbij momentum. Expurgato tamen cerebro cōuenire possunt. Cæterum apoplexiæ & omnium affectionum frigidarum febris remedium est, vt constat ex aphor. 51. lib. 6. & sent. 5. i. Prorrhetic. de Numeni filio. Sed oportet febrem neque leniorem esse, quàm quæ possit morbum tollere, neque grauiorem, vt quæ ægrum interimat.

ANTO. VALETII EXERCIT VI.

A Poplexiæ magnitudinem respirationis noxa *Apoplexia*
 indicat: quæ quò maior est, eò morbum gra- *magnitudo*
 uiorem, magisque periculosum esse ostendit. Hinc *vnde.*
 est, quòd Gal. quatuor fecerit epilepsiæ gradus cap.
 10. lib. 3. de loc. mal. affect. comment. ad aphor. 42.
 lib. 2. Quibus ex locis omnia, quæ ad huius digno-
 tionem affectus attinent, elici possunt.

Curabilis apoplexia est, in qua non omninò in- *Galen. cap.*
 tercipitur respiratio. Fit verò, qualiscunque sit, vel à *4. lib. de cur.*
 sanguine in cerebrum repente influente, vnde viæ *rat. per sang.*
 cordis & cerebri communes occluduntur: aut ab *miss.*
 affectione calida, quæ Galeno *φλεγμονώδης Διγ-*
γερσις appellatur: aut à pituitoso humore, vel me-
 lancholico, cerebri ventriculos obstruente.

Sanguineæ apoplexiæ præsentissimum remediū *Sanguinea*
 est cephalica secta, nisi periculum minùs vrgens cly- *apoplexia*
 sterè ex decoct. cephalico priùs iniicere permittat. *curatio.*
 Optimum totum corpus concutere & agitare, ne
 sanguis sensim congeletur & concreseat. Mittendi
 sanguinis is sit modus. Nò multus semel & vniuer-
 sim, vt plethora exigit, sed paucior & sensim traha-
 tur. A quo si nec sensus redit, nec motus, spes in an-
 gusto. Frictiones cum pãno asperiore, adhibito etiã
 tale in aceto dissoluto, & ligaturæ fortes partium ex-
 tremarum ante sectionem, & post vtilis.

His artibus postquam sanguinis auersio & va-
 cuatio est procurata, intemperies à calido sanguine
 in capite relicta sumptis refrigerantibus, vt diamar-
 gar. frigid. confer. ros. viol. nenupharis, & syrup.
 accommodatis, emendatur.

Pituitosa si sit apoplexia, meritò phlebotomia su-

1 Lethargus

affectio est cerebri à celeri & repetita obliuione nomen habens: aut, est delirium intermissionis expert, cum febre, sopore, & celeri obliuione coniunctū, & phrenitidi sepe succedit, sed ad malū. Omnis enim frigida intemperies calida succedere malo esse solet. Cuius morbi causa est intemperies cerebri frigida, humida, pituitosa, que memoriam magis, quam facultates reliquas, ledit. Huius signa sunt inextinguibilis dormiendi necessitas, frequens oscitatio, aperta mandibula, magna, rara spiratio, pulsus lenti, rari, languidi, manuum tremor, faciei decoloratio, pendula gena, excrementorum alui liquidorum aut siccorum, uō ægri sponte excretio, urina iumentorum similes, que magnam in uenis spirituum perturbationem significat.

pecta est: præsertim verò, si magna præcessit inantio, propter quam extremēta frigida in cerebro collecta sint, ut in sanguinis profusionibus, immodico venereorum usu, &c.

Tum actior imperabitur clyster: qualis hic est. ℞. hyssop. origan. calamenth. centaur. minor. salu. an. M. i. bacc. laur. semin. anis. rut. fese. an. p. i. agaric. panno lineo inuoluti 3. 3. f. decoct. in aq. ad ℥. i. vel ad ℥. i. s. (maior enim esse debet quantitas clysteris in hoc affectu, & similibus, in quibus sensus torpet, aut aboletur.) In colatura dissol. benedictæ laxat. hier. diacolocynth. vel hierē Logad. an. 3. s. sacchar. rub. mell. anthos. ana 3. i. succ. mercurial. 3. 2. olei aneth. 3. 3. f. clyster.

Conferet nares oleo saluæ arte chymica facto, aut nardino, irino, costino, addito, si velis, aqua vitæ, itēque caput, & corpus vniuersum, cum ad apoplecticum excitandum, tum ad humorum congelationem prohibendam, inungere. Sunt qui cauterium ad suturas affigunt.

Liberato accessione apoplectica ægro, præparabitur materia zulapiis, apozematis, itēque purgabitur, ut in pituitosa cephalalgia.

De 1 Lethargo.

CAP. 8.

Ethargi 2 signa colliges ex Aëtio, Prædictionibus coacis Hipp. lib. 4. Galeni de causis pulsuum, sed plenissimè ex Aurelia-

miendi necessitas, frequens oscitatio, aperta mandibula, magna, rara spiratio, pulsus lenti, rari, languidi, manuum tremor, faciei decoloratio, pendula gena, excrementorum alui liquidorum aut siccorum, uō ægri sponte excretio, urina iumentorum similes, que magnam in uenis spirituum perturbationem significat.

2 Quibus distinguitur ab apoplexia, epilepsia, cara, catalepsi, & comate.

no, lib. 2. acutorum, cap. 1.

Lethargum cognitum ita 3 curabis. Initio 4 materiam repelles: deinde ægrum 5 excitabis: tum materiam vacuabis: postremo confirmabis caput: accidentia corriges: & in primis rationē 6 vitæ institues.

Loco itaque lucido & tepido collocabis: materiam repelles oxyrhodino. Hoc autem minus aceti recipiat, quam in phreniticis. Deinde oxyrhodinū parandum erit ex oleo rosaceo, chamæmelino, adiecta minori parte aceti. Exempli gratiâ.

℥. ol. ros. & chamæm. ana ʒ. i. ℥. aceti 3. 3. oportetque affundi in eam partem capitis, ubi iunctura est coronalis. Tum clysteribus acribus, & suppositoriis utendum est, qualia in apoplexia descripta sunt. Postea verò frictionibus, vinculis, vellicationibus: partim, ut his materia reuellatur: partim, ut inde æger excitetur. Excitatur quoque hac potione.

℥. mythridatii ʒ. i. dissol. in aquæ vitæ & calêdulæ an. ʒ. ℥. Similiter theriaca uti licet. Sed tutius post clysteres & vacuationes, & hoc quoque excitat.

℥. 7 castorei, lapidis gagatis, cornu cerui, abrotini, capillorum hominis ana ʒ. i. Excipiantur pice humida: fiat fumus, qui adhibeatur naribus. Interim proderit scyllam conquassatam cum oleo irino, aut simili occipiti admouere, Statim initio, si corpus sanguineum est, & tolerant vires, è cephalica sanguis detrahendus est. In lethargo, clysteribus & glandulis acribus potius, quam phar-

macis purgantibus utendum est. Vbi tamen diuturna passio est, & vires tolerant, utimur primum syrupis incidentibus, quales antea descripti sunt.

3 Si non sit insanabilis, ut qui super-venit phrenitidi, & in quo excrementa non sponte ægri feruntur, ut à delirio tum etiam à resolutione musculi.

4 Quæ affluit à cruditate humorum. 5 Ne motrix cerebri facultas opprimatur. Erit autem lethargicus excitandus eo studio, cui sese addixerit, clangore tubarum, similes: tinnitus auri & argenti, si avarus, &c.

6 Quæ aequè pugnet cum morbo, & natura studeat. Sed hic vino abstinendum, utendumque hydromelite simplici, vel

origanato, cibo media materia, qualitate humido, cōsistentiâ sicca. 7 Hoc suffragium illis minus conveniat, qui epilepsia corripiti solent.

DE MORB. INTERNIS

Horum loco oxymel concinnari poterit ex iis, quibus nervosum genus iuuetur. Decoctū apij, fœnic. capill. vener. Aëtio probatur. Deinde ex hieris, picra, diacoloc. & Agarico purgamus. Postea cucurbitulas ceruicis initio, ut ad primā, vel secundam vertebra, ac deinde scapulis, metaphreno, lumbis, & cruribus cum multo igne affigimus, ex quibus ad purgationem localem veniendum est, per errhina, diamassemata, illitiones palati & capitis, dropaces, sinapismos, phœnigmos.

Pulegium itaque, thymum, origanum, aliāque id genus cocta aceto, naribus ita admouebis, ut calidus vapor ad cerebrum perueniat, ex quo nares inunges hoc modo.

℥.ol. irini 3.1. aceti scyllit. 3.℔. castorei 3.2. 9 misce. Vel. ℥.olei irin. nardini, de costo ana 3.℔. medullæ scyllæ tritæ cum acet. scyllit. 3.3. castor. euphorb. ana 3.2. f. linimentum. Postea etiam errhin. suprā descriptis uti licebit. Palatum illines sinapi trito ex aceto & melle commixto: dumque hæc sunt, per intervalla clysteres iniicies. Caput æstate rades: hyeme 10 detondes: fouebisque primum decocto serpil.atureiæ, puleg. orig. coctorum in oleo & aceto. Deinde inunges & fouebis ol. de scyll. 12 prius descripto, oleo philosophor. de gagate, serapino, de piperib. de euphorb. quæ à Mes. describuntur. Alioqui irino, sampsuc. id est, de maiorana, aut ex rosmarino cōparato, vel hoc cerato. ℥.ol. laurini 3.4. ceræ tantundem. Liquefiant in vase duplici, fortiterque agitentur cum succo apij & rutæ, quibus adde castorei puluerati 3.1. Hinc ad dropacem prius 13 descriptum transeundum est,

8 Ut hyssop. calaminib. stach. calam. aromaticus.

9 Vel, succi radicū fœnic. 3.3. in aceti scyllit. in quo nucis moschata 3.℔. infusa fuerit, 3.℔.

10 Ne frigoris vi humor & vapor exitu prohibeatur.

11 Huius hæc erit formul. ℥.serpill. M.1. coquantur in ℔. 1. oleichama.

℥. ℔.℔. vini, ad eiusdē cōsumptionē. Necnegligēdum mulieris illius remedium, cuius descripta est à Paul. Aegi. historia, cap. de lethargo.

12 Cap. de apoplexia.

13 Ibidem.

ex quo ad sinapismum. Sinapismo autem sic vtendum est, vt simul atque pars rubuerit, reuellatur, parsque oleo calido foueatur. Quod si dolor vehementius inde excitatus est, leniendus erit rosacco, meliloti, chamæ. aut maluæ decocto, aut oleo violacæo.

Oportet autem sinapismum subigi ex aqua, vt vult Oribasius, non ex aceto, vt recetiores ferè Medici, & olim Archigenes. Aëtius ex aqua, vbi præmaduerint ficus siccæ. Credidit enim Oribasius vim sinapismi aceto dissolui. Id quod experientiâ didicit. Huic rei vtile est diacopregias Aureliani: aliorum diascyllatum, ex caprino stercore, aceto, vel posca subacto.

Sunt & 14 Phœnigmi, qui rubrificant, ex nasturtij semine, sinapi, helenij radice, columbarum agrestium stercore, scylla in mortario trita & illita, alliorum tunica, lacte tithymali, cantharidum puluere, vrtica, atramento sutorio, euphorbio. Hæc autem tandiu inhæreant, dum pars rubescat. Si quæ ampullæ excitatæ sunt, compungantur. Ampullas attollet, quod sequitur.

14 Phœnigmi & sinapismi minime vtendum in lethargo, quod coniunctus cum febre sit, quæ hæc calida respuit.

℥. sinapi, piperis, euphorbij ana 3. i. Incorporentur melle anacardino, & in parte sinatur, dum ampullæ tumeant. Mel anacardinum ita fieri oportet. Mel Anacardos septem diebus in aceto macerabis prius contritos: tum in eodem coques, dum tertia pars aceti consumpta sit. Refrigerari fines. Quod supernabit oleosum, mel est anacardinum. Albucasis in aqua macerat & coquit. Alij mel anacardinum appellant, in quo anacardi fuerint conditi. Oportet autem, quemadmodum in apoplexia dixi, dum hæc fiunt, stomacho & visceribus 15 consulere.

Mel Anacardinum.

15. Fotu, lictu, coditu, & pulueribus cardiace.

Lethargus, Caros, Arabibus Subeth, Catoche, Cataphora, Comia, affectiones sunt somnulosæ, in quibus somnus arctius, quam pro naturæ lege, hominem complectitur, ob idque inter morbos, aut morborum sympto-

Αἰνὰ γρη.

mata numerantur. Sed neq; de nominum distinctione, neque de causis satis constat inter Medicos. In Lethargo æger perpetuò in somnum labitur, obliuiosus, stupidus, crebrò oscitans. Sæpe ore hiantē persistit, velut os claudere oblitus. Urinam reddit iumetorum lotio similem:

*Lethargi
signa.*

sumptam matulam quandoque se tenere non meminit, argumentum laxæ potissimum memoriæ, & posterioris ventriculi, aut potius substantiæ cerebri. Lethargi causa ex comm. i. in Prothet sent. i. causa est intemperies frigida & humida cum pituita cerebrum madefaciente, & tumorem frigidum efficiente, quæ incallescens & semper putrescens febrem lentam inducit. Aliquando succedit phrenitidi, febri continenti, & similibus, ob cerebrum impenitus refrigeratum, vel immodicam vacuationem, & natiui caloris imbecillitatem. In Κάρῳ, siue

Κάρῳ.

sopore profundo, somnus altior, quam in superiore, oculi perpetuò clausi, omnis sensus atque motionis priuatio, excepta respiratione, quæ illæsa manet. Vnde perspicuum, cum lethargo conuenire materiâ, crassâque & viscido humore procreari, licet etiam & à crassiore vapore per consensum, vel à toto corpore, vt in vigore & accessibus febrium à pituita, vel ventriculo, hypochondriis, intestinis, medicamentis calidis, aut laxantibus, putredine à vermibus, vt in pueris. Differre aut primum

Cari signa.

loco, quia sit in anteriore cerebri parte, non ventriculo. Sic enim epilepsiâ potius inferret. Deinde, materiæ putredine. Neque enim humorem habet putrescentem, uel cum febre. Postremò, quia sequitur aliquem morbum, sæpius febrem pituitosam & spuriam, vehementiorem tamen febre lethargica, cuius velut symptoma est. Succedit quoque comitiali morbo, cerebri compressioni, fracto cranio, oblatis meningibus, vehementiori in temporibus ictui. In Catalepsi æger exiguum quid aliquando loquitur, aliquando penitus motus &

*Lethargus
& carus in
quibus con-
ueniunt, &
dissident.*

sensus sopiuntur. Ab utrôque differt siccitate. Fit enim
 (si Galeno credimus) à vehementi refrigeratione, cum *Gal. cōment.*
 quadam siccitate. Deinde loco à Caro, quia fit in occipi- *in aph. 3. lib.*
 te. Sed certior distinctio, & patognomonicum signum *2. Apho.*
 est, quòd ægri oculos apertos habeant, atque in eo per-
 maneant habitu, quo correpti sunt, tensione nimirum in-
 ducta à siccitate. præcipuè in musculis oculorum, qui in
 superioribus affectibus humore dissoluti concidunt, &
 eosdem claudunt. Catocke idem significat. Scribit enim
 Paulus, affectum, qui veteribus *καθχος* dicebatur, recen- *Paul. Aegi-*
 tioribus Catalepsim, siue *κατοχλή*, veluti detentionem & *net. cap. 10.*
 deprehensionem, & *κατόχης κατιχμύλιος*, quasi dicas *lib. 3.*
 occupatos, detentôsque nominari. Alij distinguunt, Ca-
 tochem esse *ἄγρυπνον κῶμα*, soporem vigilantē, cū æger
 somno premi videtur, & tamen vigilat, sed nec loqui,
 nec membrum vllum mouere potest, vt scribit Galenus
 Comment. 2. in lib. Prorrh. Cuius affectus cōtrariæ sunt
 causæ, biliosus humor, & pituitosus. Cataphoram Ga-
 lenus 13. Methodi sumpsisse videtur, tanquam genus
 omnium soporum sine febre. Rursus Coma omnem Ca-
 taphoram significat, diuiditurque in vigilans, & non vi-
 gilans, passim apud Galenum. Sed remota omni nomi-
 num ambiguitate, de qua toties ille ipse celeriter ad pa-
 tionem veniendum esse iubet, ne rerum cognitionem,
 de quibus perpetuò agendum, præripiat, Medico ægrum
 sopore correptum cernenti primò considerandum, an
 respiratio læsa sit. Sic enim, erit apoplexia. Sin libera ap-
 pareat, proximum, an oculos clausos habeat, an apertos.
 Clausi lethargum, vel caron indicant. Quod vt distin-
 guatur, videndum deinde, an sit febris, nec superuenerit
 alteri morbo. Sic enim erit lethargus: in quo etiam tre-
 morem manuum, vultum discolorem, turgidum, pulsus
 tardos, debiles, & cætera, quæ notat Hippocrates. At si
 sine febre, & post alium morbum aut accessionem fe-
 bris spuræ, caroticus æger est. Sin oculos apertos hæ-
 beat, & rigidum sit corpus, catalepsim iudicamus. Cuius
 causa (vt dicetur) vel sanguis est, vel melancholia. Si
 partim vigilet, partim dormiat, *ἄγρυπνον κῶμα*. De hu-
 more exuperante deinde iudicandum ex propriis cu-
 iusque signis. Curatio perficitur, primùm sanguinis mis-

sione (si venæ tumeant) è cephalica : deinde vena frontis. Alioqui periculosa sanguinis missio in tanta frigidityte. Clysteribus primùm tenuantibus & alterantibus pituitam, postea trahentibus, & acutis glandibus, frictione vehementi, ligaturis extremorum, auulsione barbæ, capillorum capitis, pudendorum, suffitu ex fœtidis, vntione sinapi facta in palato, aut benedicta, aut hiera picra. Post hæc omnia, sternutamentis. In principio repellentia admouenda sunt sincipiti, licet magis in occipite sit affectus. Est enim rarius, & multis futuris peruium.

Excitatur quoque.] Longè lepidius, non sine tamen medica ratione, Opimum illum auarum apud Horatium Medicus fidelis è somno profundo reuocauit: qui

*Horatius
satyr. 3. lib. 2.*

Quondam lethargo grandi est oppressus : vt hæres
Iam circum loculos & clauas lætus, ouansque
Curreret. Hunc Medicus multum celer, atque fidelis
Excitat hoc pacto : mensam poni iubet, atque
Effundi saccos nummorum, accedere plures
Ad numerandum. Hominem sic erigit, addit & illud:
Ni tua custodis, auidus iam hoc auferet hæres.
Mén' viuo? Vt viuas igitur, vigila.

Non dissimili techna alter vinosus excitatus fuit, cum audiisset vasa sua vinaria vehementius commoueri, atque inde vinum ebibi. Non inutile etiam sonitu tubarum & musica noctu aut interdiu ægrum aliquò, aut per cubiculum ambulantes circumducere. Cæterum notandum, quod admonet Hippocrates 3. de morbis. cum multum liquidumque per aluum deiicit lethargicus, pusillam vitæ spem esse.

*Lethargicis
pusilla vile
spes à liqui-
diore aluo.*

Castores] Mirificè prodest nervosis affectibus, etiam in potu sumptum. Mefue à granis tribus ad quatuor dabat ex oxymelite, idque post vacationes.

Postea cucurbitulis] In statu cum multo igne & scarificatione affigendæ sunt occipiti, non solum ad sanguinem, sed vt inde etiam calor natiuus excitetur, & materia reuellatur. In principio humeris, ad diuersionem & euacuationem.

ANTO. VALETII EXERCIT. VIII.

Lethargus continuus est præter naturam sopor, cum febre lenta & obliuione, vitio cerebri genitus: principe scilicet animæ parte à pituita labefactata, & sensu, motuque oppresso. Pituitosus ille humor, Galeno teste, in cerebro putret, cum febre, & citra febrem, quamuis plerumque lenta febris adsit. Arabes œdematodem esse inflammationem arbitratur. Nonnunquam hoc malum oritur à vaporibus crassius & frigidis è visceribus & præcordiis sublatis, interdum à sola intemperie cerebri frigida & humida, quam medicamentorum impensè refrigerantium vsus, vti accidit in phrenitide, inuexerit. Lethargi signa satis sese produnt. Cognito affectu eiusque causis, indicantia (seruato semper contrarietatis scopo generalissimo) perfacile est reperire, etiam si medicinam huic morbo facere nõ æquè sit facile, cum propter affecti loci præstantiam inter lethales morbos ab antiquis Medicis numeretur. Recta victus ratione, quæ pituitæ generationi aduersetur, præscripta, ex cibis tenuant. incidentib. coctu facilibus, hydromelitis, vel vini alb. oligophori potu, & rebus non naturalibus debito modo adhibitis, de auxiliis etiam atque etiam cogitandum est. Primùm omni ratione à somno excitatus æger, vt antè in apoplexia, vacuabitur venæ sectione, nisi adsint quæ missionem sanguinis impediunt, crudus videlicet humor, puerilis ætas, anni tempus, in quo sit vel extremus calor, vel frigus, vbi ad aciora enemata veniendum præcipit Paulus. Vel hac acriuscula purgabitur portione.

Galen. comment. ad sent.

1. Prorrh. 1. lib. 3. de loc. affect. lib. de differ. sympt.

Lethargi curatio.

Hippoc. lib. de vict. rat. in acut. &

Gale. comment. ad sentent. 1. sect. 3. libr. 1. Epidem.

Hippoc. lib. 2. de Morb. Gal. cap. 21. lib. 3. Meth.

Paul. Aegin. cap. 9. lib. 3.

DE MORB. INTERNIS

℥. hietæ diacolocynth. 3. 2. dissol. in aqu. beton. & ca-
1 Caros à no lendul. addit. syrup. de stœchad. 3. s. f. potio. Vel. *℥. ex-*
mine xāgen, pressionem 3. 3. myrobal. cepul. in aqu. salu. infusar. rhei
hoc est caput, elect. in ead. aq. infus. 3. 1. s. in qua dissol. cathol. & syrup.
nomē habēs, de bizātiis ana 3. s. f. potus. Vel. *℥. folic. senn. mund. 3. 2.*
affect⁹ est ca- agar. recens troch. 3. 4. infundantur in hydrom. cum gr.
pitis, in quo 3. zinziber. In expressione dissol. electar. diacarth. 3. 2. hic-
agri nec sen- ræ simplic. 3. 1. syrup. capill. ven. 3. s. f. potio.

tiūt, nec mo- Conferent reliqua quæ reuellunt, tum etiam cu-
uēse, seruata curbitulæ occipitio admotæ, & initio litus frontis
tamē respira- & temporum ex oxyrhodino, in quo duæ tantum
tione libera. aceti partes, pro 7. olei, adiciantur. Oleū chamæm.
Gal. li. 4. de admiscebitur, vel aqua beton.

Comm. in Postremò digerendus humor sumptis & admo-
21. sent. secū- tis. Sūptis, vt electa. letificante Gal. diamb. aromat.
di de articul. ros. ther. mythrid. cōseru. anth. calendul. ex quibus
vnā eū sensu opiat. vel condita parabuntur. *℥. conferu. anth. &*
motu rati- calendul. ana 3. 2. cōser. ros. 3. 1. puluer. electar. arom.
tionē etiā & ros. 3. 1. acor. condit. 3. 4. cum syru. de stœch. f. opiat.
memoriali di- vel cum sacch. conditū. Admota erūt, litus, vnguent.
scribit. Hic fotus ex oleis digerent. & discutientib. vitatis tamē,
anteriores ce- propter febrem, calidiorib. Galenus tamen sinapis-
rebri partes mo materiam in alto reconditā trahere non refor-
magis affi- midat. Iisdē fermē remediis (excepta phlebotome)
ciūtur. Hu- omnes soporosaē affectiones percurantur.
ius mali cau-

sa materia est
frigida cor-
ruptionis ex-
pers. Fit etiā
à causis ex-
ternis, vt im-
modico refri-
geratiū vsu,
ebrietate, ictu, casu, contusione, arteriarum carotidum & musculorum tempo-
ralium, vel à depresso cranio, dum quis interferrandum grauius opprimit.
2 Materiā, in generatione, non in corruptione: quòd caros febrem minimē ha-
beat symptomaticam. 3 Tunc enim motrix cerebri facultas materia frigida
& humide copiā oppressa iacet, sitq; imaginandi facultatis paralysis.

De 1 Caro. CAP. 9.

Caros cum lethargo ² conuenit, ³ sed ma-
 ior ac profundior sopor est. Stimulati non
 excitantur: interrogati non respondent.

Eadem curatio, quæ lethargi: nisi quodd magis incidentibus & attenuantibus vtendum est.

Est & quoddam genus delirij inter phrenitidem & lethargum ex bile & pituita. Veteres 4 typhomaniam aut typhoniam appellârunt. In qua affectione si superat bilis, coma peculiariter appellatur: si pituita, catochos.

Fit & Coma 5 vbi à calidioribus & humidioribus vaporibus ex reliquo corpore sublatis caput repletur.

Catalepsis nomē ambiguum est. Nam aliquādo subita vocis amputatio, sensus & motus priuatio intelligitur, quam 6 aphoniam Hippoc. vocauit, Græci etiam 7 *ὑπόληψιν*.

Ea interim fit plenitudine sanguinis, quæ vias spiritus animalis intercipit. Sed quæ peculiariter catalepsis dicitur, à melancholico succo aut vapore posterius cerebrum obturante & siccante fit. Derepente muti fiunt: neque concidunt: sed in eodem habitu permanent: apertis oculis, si prius aperti essent: stantes, si starent: sedentes, si sederent: ex quo vulgus credit non dolere, aut ita mortuos viuere: sed (vt loquuntur) raptos.

Consentientibus conditionibus, cephalicam secato, si facies rubet, repleta appareat, liuescat, &c. Clysteres molliores primùm, dein aciores iniiciendi. Vbi calor est in capite, refrigerantibus: vbi frigus, calefacientibus oleis & litibus vtitur.

A purgatione totius corporis commodum erit caput, & totum denique corpus oleo anethino, iasmino, sesamino, aut similibus inungere vel calentes pelles recens detractas inducere.

4 De hac vide Galen. comment. in sent. 1. sect. 1. Prioris Prothetice.

5 Coma Hippoc. in Cont. animaduert.

fit à resolutione, perfrigeratione & oppensione cerebri.

6 Aphoniam nomen apoplexiam, carum, caterasque cum sopore coniunctas complectitur affectiones.

7 Hac secunda apoplexie species existit.

DE MORB. INTERNIS

2. Urinæ quia crassescunt ut plurimum, imperanda quæ tenuent, & urinas moueant. In tremore castoreum ad 3. 1. è multa exhibendum.

EIVSDEM HOLERII SCHOLIA.

Ea interim.] An ab intemperie sola fiat Catalepsis, an cum humore: & si cum humore, quisnam ille sit, non facile est diiudicare. Galenus enim videtur ab intemperie frigida sicca fieri censuisse. Sed cum repente inuadat & desinat, intemperies autè sicca repente induci nequeat, aut tolli, necessario confiteri cogimur aliquem subesse humorem. Aërius præter sanguinem, atram bilem ponit. At si ita res habent, cur non omnes melancholici incidunt in catalepsim, præsertim si fiat in ventriculis? Nisi dicamus in catalepsi non ventres, ut in melancholia, sed venas & arterias, quæ in cerebri meningibus disseminatæ sunt, eo humore repente & affatim impleri, inflatas distendi: inde sequi rigorem totius corporis instar corporum frigore concrefcentium. Fit etiam à sanguine multo & copioso venas inflante, & tensas retinente, sicuti quum humores in conuulsione nervos contrahunt. Eodem ergo modo fit catalepsis, quo apoplexia, nimirum substantiâ cerebri irrigata per defluxionem, vel sanguine, vel melancholico humore.

Secretarius Vasco in febris declinatione, & alui profluuiò, urinis bene coctis, certam valetudinis spem præsentibus, catalepsi deprehensus vno die obiit Anno 1552. Augusto mense. Aperto cadauere pulmones & hepar corrupta inuenta sunt, serum quasi rufum cerebro posteriore contentum, & sanguis concretus in maiore vena, quæ medium caput perrepat.

ANTO. VALETII EXERCIT. IX.

Caros capitis est grauitas, quam inexpugnabilis dormiendi necessitas consequitur. Distinguitur hoc nomine à lethargo, quod lethargus posteriorem cerebri vetriculum, caros anteriores eius.

*Aëtius ca. 4.
Tetrabibl.
2. Serm. 2.*

*Catalepsis
quæ fiat.*

dem cerebri ventriculos obsideat. Differt etiam ab apoplexia: nam hæc (si neruorum sit obstructio, & affectus cerebri proprius.) cerebrum omne occupans, in paralyfim, quum soluitur, degenerat: at illud finitum bona valetudo magna ex parte excipit. Somniculosus eius generis affectibus catoche & catalepsis adscribuntur, quas Gal. appellatione cataphoræ complexus est cap. 12. lib. 13. Meth. Easdem distinxit Paul. Aegineta cap. 10. lib. 3.

Caros vel est primarius cerebri affectus, & causam habet frigidam humidam intemperiem, solam, vel cum materia, qualis infantibus in frigido præfertim & humido aëre diu educatis, necnon iis, qui ædificia recens gypso inducta inhabitant, sæpe accidit, & hic lethargi remediis curatur: alius ex consensu subiectæ partis alicuius, vt ventriculi, materiam aut multitudine vires opprimentem, aut frigiditate humida stupe facientem transmittētis: qui purgantibus cedit, vel etiam alexipharmacis, in illa expellenda materia, si deleteria fuerit, agentibus, profligatur.

Paralytica remedia.

C. A. P. 10.

Paralyfis de qua hîc agimus, familiaris apoplexiæ, resolutio est dimidij corporis, non totius, quarundâ partiû, non omnium, à crasso & frigido humore, à quo neruosum genus remollitur, atque resoluitur.

In his clystere primùm vtendum est, molli quidem, si diutiùs fæces alui substerint: deinde etiam aciori.

à qua suscipitur actio, perreptare nequit.

3 Ac præsertim spinalis medulla nervi.

2 Ei enim succedit paralyfis.

1 Paralyfis
symptomatica
facultatis

animalis, motricis & sensificæ, in qua affecta pars sensu et motu priuatur.

Quum enim corporis totius motus & sensus deperditur, dicitur apoplexia. Pars primario affecta est cerebrum ipsum, aut spinalis medulla principium, vel dimidia tantum eius pars.

Causa paralytica triplex: obstructio, compressio, & diuisio. Fit autem, quando animalis spiritus tota sua substantia ad partem eam,

4 Nec solū partes 4 resolutæ oleo 3 moderato, sed calente, fouendæ sunt.

De phlebotomia non conuenit inter Græcos & Arabes.

Detrahendus quidem sanguis est mediocriter ex cephalica partis integræ, authoribus Græcis. Frigidum enim eorum corpus, frigidus quoque morbus. Itaque larga sanguinis missione languidum calorem extingui metuum.

Rhazes, & qui hunc sequuntur, ex vtrâque cephalica ad tres aut quatuor libras: postmodum etiam ex venis 6 linguæ sanguinem detrahunt. Græcis tutius adhærebis.

Instituendus 7 victus. Primum quidem leuiter incidat, attenuet, & detergeat. Potus sit hydromel ex sexcupla aqua, in qua modicum stoechados, aut acori (vulgaris adstringit & nervi robur addit) aut ireos Florentiæ coxerit: gratia exempli, horum & similium 3. i. in lb. 2. aqua, quale est.

4. rad. ireos Florentinæ 3. i. coquatur in lb. 2. aqua, dum dimidium libræ consumptum sit. In col. dissolu. mellis communis quartarium vnum: despumetur, fiat hydromel despumatum. Vel etiam parabitur hydromel ex radicis acori & saluæ decocto. Poterit & cinamomum & mastix & caryophyllum in aquâ concoqui, atque inde hydromel parari. Loco etiam mellis saccharo (Candum magis exsiccat) vtemur, si febris 8 suspicio est, modicôq; cinamomi, aut rerum eiusmodi vti oportebit. Quale est.

24. aquæ coctæ lb. 1. coletur per manicam Hippocratis cum sacchari 3. 3. & 3. 2. 9 cinamomi.

4 Nec solū partes 4 resolutæ oleo 3 moderato, sed calente, fouendæ sunt.
partes quæ mouendi vim amiserūt, sed radix nervorum, quæ partibus illis vim sentiendi impertit.
5 Ut chama. anethino.

6 Ad amotionem causæ coniunctæ.
7 Deducenda enim cibi affuerit pars altera.

8 Aut si aeger sit ibidus sit.
9 Leuiter scilicet contusi: alioqui enim catarrhum mouet.

Vtatur assis carnibus, quæ caryoph. cinam. & lar-
do configantur: vel lardum, quo figuntur, asper-
gemus, pul. cinamomi, nucis moschatæ, & caryo-
phyllorum.

Vtatur granis 10 pini conditis, & canella tritis.
Abstineant aqua, & vino, & longiore 11 somno.

Materia potionibus 12 incidenda, vt hydromeli-
te (*oxymel noxium, ob acetum*): aceto tamen cum
caryophyllis & reb? capitalibus cocto vti nihil pro-
hibet, maximè verò in viscida materia: quæ non-
nūquam oxymel cum decocto guaiaci parare sua-
der) in quo stœchas, cæteraque eiusmodi coxerint,
vt est serpillum, pulegium, & similia. Deinde pur-
gandum hac potione.

℞. pul. hieræ diacolocynt. 3. 2. mastichis, bdellij
ana 3. 1. nucis moschatæ, spicæ, rosarum ana 3. 1.
omnia incorporentur modico conseruæ borragi-
nis. Vel hac veterum potione.

℞. polyp. quern. 3. 8. sem. anisi & apij ana 3. 8.
fiat decoctio ad 3. 3. quæ coletur per manicam
Hipp. cum 3. 1. mellis albi, cinamomi, 3. 8. In col.
dissol. pul. hieræ diacolo. 3. 4 pul. hieræ picræ 13 3.
2. fiat potus.

Possumus vti & pilulis alephāginis, imperialibus,
assaieret, de agarico, fœtidis, cocciis. Aliis 14 quoq;
suprà descriptis, cap. de soda phlegmatica: vbi etiam
syrupi descripti sunt, qui plurimum conferent, si
per interualla paralyticis imperentur.

Dum hæc fiunt, oleo calente, sed temperie non
ita calida resolutæ partes fouendæ sunt. Stomacho
etiam & visceribus, vt prius, consulendum est.

Conseruæ quoque instituendæ sunt, iuxta, anthos,

DE MORB. INTERNIS

saluiæ, stœchados (*quæ duæ principatum obtinent*) enulæ, gentianæ, acōri, ireos, zinziber conditum, cōdita nux moschata, theriaca, mythridatium. Dosis conseruariū ad ʒ 1. aut 2. quas vtiliter commiscebis cerebro leporis asso, quod peculiari natura conuenire scribunt paralyticis.

4. cons. iuæ, cons. anth. & salu. an. ʒ. i. cerebri le-

15 *Vt eius an- tidoti ana- thymiaßs crassos vapores emendet, Et ad cerebrũ translata, ipsum recreet, materiãque ad exclusionẽ præparet.* poris recenter assi ʒ. ß. cinamomi, nucis moscharæ an. ʒ. i. cū saccharo in aqua iuæ dissoluto fiat elect. secundum artem, vel conditum. Huius 15 detur ʒ. i. vesperi duabus horis antè cibũ, & in ingressu lecti. Theriaca & mythridatium, vt & alia omnia remedia fortiora, 16 magis conuenient post purgationes. Dosis ʒ. 2. vel ʒ. i. quæ interim commiscebis conseruis, aliquando dissolutis in hydromelite, in aqua vel decocto iuæ, calendulæ, rosamarin, salu.

16 *Quæ sint analogã cerebro morbo.* stœchia, aqua vitæ, aut vitis.

17 *Vt sopitã naturam excitent.* Post hæc cucurbitulæ locis affectis sine scarificatione aptandæ 17 sunt, ac deinde collocandæ, sed maximè radicibus 18 neruorum.

18 *Quæ sentiendi facultatem paralyticis membris impertiunt.* Probant quoque vomitiones semel in hebdomada (*quæ tamen à cibo in paralyti lingua noxiæ*) stuphas siccas, & balnea. Stuphæ parari debent ex decocto herbarum conuenientium, maioranæ, saluiæ, origani, calamethi, calendulæ, sarmentorum vitis, pulegij, serpilli, stœchados, & 19 rerum eiusmodi.

19 *Vt radicũ ireos, betonic. ebul. foliorũ lauri, baccarum laur. & iuniper.* Collocabitur resolutũ corpus loco bene concluso, ne fumus decocti euanescat. In decoctum silices candentes iniiciemus, vt fumus fiat. Ex iisdẽ rebus balnea cõparentur. Probant quoq; balneum ex decoctione vulpis integrę cū herbis suprã memoratis, inunctiones, primum molles seu leues, deinde acres

Partes itaque primùm fouendæ oleo cham. de meliloto, anethino, amygdalarũ dulcium, de lilio, hyperico, iasmino, de ²⁰ keyri, de nucibus, de sem. lini, ²⁰ De violis luteis.
de maiorana, de galbano, nardino, cannabino, raphanino, ricinino, de costo, de spica, laurino, de cucumere asinino, sinapino, de pipere, de euphorbio, de pyrethro. Oportetque à leuioribus ad fortiora progredi. Flocci lanæ in his oleis inungendi sunt, & ex his fouentur ²¹ partes affectæ, postea etiam conteguntur.

Olea componuntur ex olei quatuor, aut quinque partibus, aquæ iuæ, aut succi cõuenientis parte vna, & aliorum quorũdam medicamentorum decima, vel duodecima, quale hoc est.

℞. ol. de Iasmino lb. i. aquæ saluiæ, aut succi iuæ, vel vini, in quo iua coxerit, ʒ. ʒ. castorei, pyrethri, euphorbij, piperis, benzoini, assæ fœtidæ, opopanax, galbani, gagatis lapidis, horum vnius ʒ. i. fiat decoctio ad aquæ, succi, aut vini consumptionem. Olea composita. Oleum de scylla (vel oleum antiquissimũ, in quo sit decocta scylla: valde enim incidit) prius descriptum. Aliud.

℞. terebinthinæ ²² lb. 2. laterum antiquorum, aut (ut vult Albucasis) recentium in oleo iasmino extinctorum, macis, styracis ana ʒ. i. benzoini ʒ. ʒ. fiat distillatio in alembico vitreo. Tres humores fluent, quorum tertius erit optimus. Oleum de lateribus lege apud Mesuem.

Balsamum & oleum ²³ balsaminum! mirè commendantur, sed rariora sunt, & tantum Principum. Sed his respondere volunt, quod sequitur.

℞. ²⁴ thuris albiss. mast. ana ʒ. 2. ligni aloës ʒ. i.

²¹ Ut excitetur natura vis & materia vincatur.

²² Veneta.

²³ Cuiusmodi est capite de paralyse apud Guid. Canl.

²⁴ Vel istud. ℞. terebint.

DE MORB. INTERNIS

*Veneta Et ab
ietina an. 3.1
phur. alb. la-
dan. an. 3.3.
nard. indica
3.2. radic. va-
lerian. ange-
li. ireos, acor.
azari, cype-
ri, calam. aro.
an. 3.1. masti.
3.2. galag. ca-
ryophyl. cas-
sia ana 3.3.
nuc. myristic.
3.4. maci 3.
1. B. agallochi
3.2. gummi
elen. 3.6. a-
loës hepatic.
myrrhe an. 3.
B. castorei 3.
10. styrac. ca-
la. laseris an.
3.1. sang. dra-
con. 3. B. flor.
lauendula 3.
4. ol. nucis yn-
guent. lb. B.
reponatur in
alembico.
25 Vt ad lb.
1. B.*

caryoph. galangæ, cinamomi, zedoariæ, nucis mos-
chatae, cubebæ ana 3.6. myrrhæ, aloës, ladani,
sarcocollæ, castorei ana 3. B. baccarum lauri, nucleo-
rum pini ana 3.6. ireos, aristolochiæ rotundæ, dictā-
ni, consolidæ maioris ana 3.1. gummi elenij opopa-
naxis, benzoini ana 3.2. succi iuæ, succi herbæ para-
lysis an. 3.3. terebinthinæ 2; ad pōdus omniū. Om-
nia concorporabis, distillabis in alembico vitreo.

Extillabit aqua primum: deinde veluti oleo-
sum quid: postremò quasi mel.

Probatur & oleum vulpinum descriptū à Me-
sua, & hoc quoque.

℞. vnguenti de bdellio 3.3. liquefiat in vase du-
plici cum olei de terebinthina, de scylla, aut similis
3.3. Ex assata vulpe, vel alioqui cum oleo cocta, in-
farcta prius betonica, saluia, calendula, iua arthriti-
ca, primula veris, moschata, pinguedo elicitur, è
qua cum emplastris mollitoriis vnguenta conficiū-
tur. Poterunt & eadem emplastra conuenientia
aqua vitæ, & saluiæ succo subigi.

Optimum erit corpora paralytica inungi ad 16
ignem sarmentorum vitium.

Aluus mollis perpetuò seruari debet clysteribus,
aut pharmacis lenibus, aut suppositoriis.

Modus operationis medicamentorum, & eorū,
quæ partibus affectis apponuntur.

Vnctionum, dropacum, phœnigmorum, sinapif-
morum, vt pars in ruborem attollatur, non exulce-
retur. Et cucurbitularum brevis mora esse debet,
ne quod attractum est, dissoluatur.

Sunt, qui certum experimentum dicant, si pars
affecta decocto maioris tithymali foueatur: deia-

de folia eius integra parti superponantur.

Errhinis & Apophlegmatismis, vt prius, vt edum est. Apophlegmatismis 27 cum nodulo, aut bacculo ori appposito, vt diximus. Paralyticis, & neruorum ^{27 Vt ex ma stiche, pipere, pyrethr. staphysagria.} doloribus laborantibus vinum prorsus fugiendum est. Potus sit illis mulla, aqua mellita, quæ fit ex partibus octo aquæ, duabus vel tribus mellis albi, vel sacchari. Coquantur omnia simul. Colentur per manicam Hippocratis cum 3.2. cinamomi, vel decoctum acori conditi.

Pilula Coccia Rhazæ, & Mesuai.

℞. pul. hieræ picræ 3.2. interioris colocynthidos ʒ. i. dactidij, ʒ. ss. vel gr. 6. turpethi gummosi, stœchad. ana 3. ss. cum succo fœniculi fiant pilulæ pro duabus dosibus.

Coccia Nicolai, ex Galeo.

℞. aloës, absynthij, pulpæ colocynth. scammonij an. ʒ. i. mastichis ʒ. ss. cum succo fœniculi fiat pilulæ.

℞. aloës, scammonij, colocynthidos, agarici, bdellij, gummi arabici, ana ʒ. ss. & gr. 5. cum succo absynthij fiant pilulæ coccia. Eiusmodi pilulæ & caput purgant, & varios humores detrahunt, nec stomachum lædunt.

RIJSDEN HOLLERII SCHOLIA.

In stupore, seruato motu, aut leuiter læso, sensus amittitur, aut debiliior redditur. In paralyfi vtrôque priuatur pars ægra, illæsis tamen sensibus interioribus. Nō enim, vt in apoplexia, vitium est in cerebri substantia. Si id accadat omnibus partibus infra ceruicem, meninges, aut spinalis medulla in exortu affecta est. Altera corporis parte resoluta, dimidia tantum pars spinalis medullæ afficitur, aut meningum. Si qua verò pars sola

DE MORB. INTERNIS

*Αφωνία.
Απνοία.*

*Paralysis
vitio nervo-
rum quæ fiat.*

(nam partes omnes motu voluntario præditæ, præcipuè quæ proprium nervum & peculiarem habent, huic malo obnoxie sunt) siue in capite, siue infra ceruicem laboret, in illius particulæ nervo, vel eius exortu morbo-
sa est affectio. In *αφωνία*, vocales nervi, per quartam vertebram exorti: in *απνοία*, respiratorij patiuntur. Sic oculorum resolutio, ad nervos, qui à secunda coniugatione è calvaria emerfi, in oculi musculos disperguntur, referenda est: palpebrarum, ad nervum tertiæ coniugationis per foramen ossis orbitæ trāsēntis: labiorum, ad latum musculum, nervos è primis vertebra, & ramos è tertia coniugatione: linguæ denique (quod fit præcipuè in balbis post apoplexiam) ad nervum è tertia, aut septima coniugatione in linguam perreptantem. Eodem modo resoluta manu, in principio ceruicis, vel quinta vertebra affectio subsistit. Sensus tamen aliquis quandoque relinquitur, primæque brachij partes illæ servantur. Minore noxa laborant ob lationem in septimam, aut octavam, sed maximum inde thoraci infertur nocumentum. In resolutione parvi digiti, & media parte annularis, afficitur nervus in cavitate olecrani, siue cubiti, in aliis verò tribus (cæteris illæsis) vulnerata est, aut affecta spinalis medulla, circa principium nervorum brachij. Per defluxionem omnes digiti patiuntur, aut per concussionem. In sectione non est necessarium, quod nervi brachij in principio iungantur, & supra cubitum separentur. Cruribus resolutis, aut pedibus (in quibus facilius curatur hic morbus, quam in manibus, ob ficiorem & robustiorem nervorum, quos habent, naturam) in vertebra lumborum, aut inguinibus consistit affectio. Sua etiam est ano, vesicæ, pudendo resolutio. Si descendat intestinum rectum, musculi suspendentes malè habent, qui sunt in ipsius lateribus. Si excrementa retineri non possunt per aliquod tempus, sphincter resolutus. In resolutione musculi vesicæ, & quum pudendum erigi non potest, existente seminis flatulenti multitudine (quod sæpè contingit ob violentiorem contrectationem, natationem in aqua frigida, refrigerationem circa perinæum, compressionem, equitationem longam, & corporis extenuationem) nervi ab osse sacro, vesicæ incerti ac pu-

dendo sunt in vitio.

Parte affecta hoc modo diligenter obseruata, ad causas veniendum. Continens siue coniuncta necessariò in neruo est, per quem spiritus, tanquam radius, in partes inferiores diffunditur: eaque vel intemperies sola, vel cum humore. Trallianus aliquando fieri scribit ab intemperie sicca & calida sine materia. Vix tamen credendum. A calore quidem fieri posse perspicuum est, emolliendo neruos, humores pituitosos liquando, & aditum humorum defluxioni patefaciendo. Quod vinum sua tenuitate facit calori iuncta, vt Galenus docet. Sed quò subito & còfertim Paralysis hominem corripit, dubitandum non est substantiam neruorum humore per defluxionem imbui, vnde molliores redditi extenduntur, & relaxantur, sicuti & tendones. Quò fit, vt ob plenitudinem & obstructionem spiritu non transeunte, vel quia leuissima contractione est opus neruo ad mouendam partem, membrum concidat, & immobile permaneat.

*Alexand.
Trall. cap. 16
libr. I.*

*Gal. còm. in
aphor. 5. lib. 5*

Sed à quo humore id fiat, non minùs difficile est iudicare. Doctissimis tamen viris non sine ratione videtur, neque à melancholia, neque à bile extra venas excitari paralyfim. Non à melancholia, quia neruos siccatur potius & cogit, quàm emolliat, vt in elephanticeis, quorù membra aridiora facta non resoluuntur; sed imbecillius sentiunt: neque à bile. Cùm enim siccandi vim habeat, & acrimoniam adiunctam, conuulsionem potius inducit, neruos contrahendo & conuellendo. Ergò vel à sanguine solùm (nisi per accidens) vel pituita fieri potest, eaque vel crassa, vel tenui. A sanguine rariùs. Inde tamen oritur, cùm tenuior est sanguis, & multitudine sua viam spirituum intercipit, aut humiditate eosdem extinguit, aut neruos molliendo dissoluit. Idem fit à pituita tenuiore, sed multa, à cerebro defluente, & in neruorum substantiam penetrante. Frequentius autem à crassa, neruo tenaciter inhaerente. Quæ omnia ex humorum in corpore exuberantium propriis notis, ac visu antecedente facillè discernuntur.

*Paralysis
qua fiat ex
materia con-
trouersum.*

*Paralysis fit
frequentius
à crassa ma-
teria.*

Causæ antecedentes sunt, quæcunque neruos còtundere, comprimere, emollire possunt, casus, ictus, contusio, somnus in spelunca, domus recens polita, lunæ ra-

*Paralysetur
causa anteceden-
tes.*

DE MORB. INTERNIS

*Paralysis et
alij morbi fri-
gidi Lutesia
frequentes.*

dius, exercitium a cibo, vel somnus. Sed frequentissime Lutesia noua è gypso politura & huc morbum, & alios frigidos inducit. Arelata grauissima visa est ex leui vulnere, illaeso cranio, sed sanie per meatus suturae sagittalis ingressa sensim ad tenuem meningem, quae cerebri substantiam obuoluit, neruos, venas & arterias sustentat. Vnde primum eiusdem partis resolutio, ex qua mors consequuta est: secto cranio pus inuentum. Quod F. Valeriola, vit Philosophiae & Medicinae petitus annotauit: cuius obseruationes propediè in lucem exituras audio.

Curatio perficitur primum purgato ventriculo, & intestinis, vel pilulis leuioribus, vel clysteribus: syrupis attenuantibus, aperientibus, digerentibus: deinde pilulis paulò fortioribus. Post purgationem, vsu thetiacae per aliquod tempus, inunctione leuiori ad valentiorè progrediendo: repetita purgatione (morbus enim cotumax est, & diurnus) opiat, gargasmat, masticatoriis, pulueribus, diæta in corpore humidior, vnguentis, emplastris, linimentis, balneis, cucurbitulis frequenter adhibitis, exulceratione facta, aquis distillatis, victu tenui. In particulari paralyfi topica adhibenda sunt eo tantum loco, vbi affecti nerui, vel musculi est origo.

Phlebotomia] In plethora, & sanguinea resolutione, contusione, ictu, aut casu, de sectione venae nulla dubitatio, defluxionis praesertim imminente periculo: liberior quoque, si febris iuncta sit, sed in omnibus ad exiguum quantitatem. Venae linguae, si ipsa resoluatur, aperiri debent, praecedente tamen purgatione, & deriuatione.

Acori] Vulgarem intellige, cuius radix leuiter adstringendo, & resiccando, neruis relaxatis addit robur. Iris quoque recens pituitam purgat, & serosos humores: sicca, pituitam attenuat, & incidit.

Partes primum oleo, &c.] Olea calida, parum exsiccantia non conueniunt, vt de lilio. Cum enim nerui constitutio frigida sit & sicca, ab ea indicatione sumpta, emollientibus non est vtendum. Admiscenda etiam tandem erunt, quae leui adstrictione & temperato calore partem affectam roborent. Foucantur partes oleo: deinde pelibus agnorum pinguium, aut vulpis, odore conuenienti imbutis ad ignem inuoluantur. Sequentibus saepe vsus

sum prosperrimo cum successu.

℥. vini rub. ℥. i. olei lumbricorum ℥. 2. aquæ vi-
tæ ℥. 2. corniculorum cerui magis spongiosorum
℥. 3. pulueris chamæmeli ℥. 1. salis ℥. 6. mastiches 3 6.
bulliant omnia in duplici vase ad vini consumptio-
nem. Probè misceantur.

*Hollerij ex-
perimenta ad
paralyfin.*

Ciconia implumis, sed viua, tandiu coquatur,
dum carnes ab ossibus recedant, in mortario tera-
tur: rursus in oleo coquito: coctâ sacculo fortiter co-
lato, & abiectis reliquiis, Ceræ, colophonix, seui, o-
lei laurini ℥. 2. olei mastichini, medullæ cerui, adi-
pis vrsi an. ℥. i. galbani, terebinthinæ ana ℥. 4. con-
iungantur. Emplastra molliora, diachylon, resum-
ptuum, &c. soluta in oleo cham. vel nardino: po-
stea quæ discutiant, vt acopa: postremò attrahen-
tia, & roborantia, vt metasyncritica.

ANTO. VALETII EXERCIT. X.

A Nimalis facultatis symptoma est paralyfis, in
qua motrix & sensifica facultates sunt læsæ.
Læsionis causæ intemperies, morbus in compo-
sitione, vnitas soluta. Vel enim nerui immodice refri-
gerantur & humectantur: vel resolutio humore cras-
so in eorum principum incumbente replentur, vt
post apoplexiam: vel fit obstructio circa colli verte-
bras, aut partes inferiores: vel denique ab externa
aliqua causa, vt duri corporis compressione, laqueo,
percussione, luxatione, fractura, vulnere, afficiuntur.

*Gal. cap. 6.
lib. 1. de loc. ;
mal. aff. &
cap. 10. lib. 3.
itemque cap.
5. lib. 1. de
caus. sympt.*

Paralyfis alia particularis, quæ partem tantum
aliquam, vt brachium, linguam, prehendit: alia ab-
solutè dicta paralyfis, quæ dimidiati est corporis,
dextri, vel sinistri, ex obstructione in spinalis me-

*Paralyfis
duplex.*

DE MORB. INTERNIS

dullæ processu facta.

*Paralys. cura-
ratio.*

Curatio vt optimè progrediatur, victus calfaciens, siccans, & pituitæ generationem prohibens deligendus. Vinum perinitia noxium, quia tenuitate sua partes neruofas faciliè permeat & implet: quanquam declinante morbo discutiendo & desiccando mirificè prodest.

Si plenitudo adest, sanguis ducitur, sed mediocri quantitate, ne corpus nimium perfrigeretur. Si cacochymia prægrauat, purgatio præfertur.

℞. aquar maioran. & beton. ana ʒ. i. f. infunde agar. rec. troch. ʒ. 2. In colatur. dissol. diaph. ʒ. 2. syr. laxat. ros. pall. ʒ. 6. f. dos. Vel his pilulis vtiſor. ℞. specier. hieræ picræ dupl. aloë ʒ. ʒ. massæ interioris pil. de agar. & sine quibus ana ʒ. i. Ex cipientur melle rosato, vel aqua salu. f. pil. moll. à primo somno exhibendæ.

Pars primariò affecta, vt summa ceruix, totaque spinalis medulla, oleis calentibus & calefaciētibz, vt aneth. chamæm. & simil. quibus lanæ floccus madesiat, fouenda. Interim pituitosus humor quia denuò purgandus, præparatione eget. vt. ℞. radic. pæon. mar. rusc. asparag. ana ʒ. 6. passul. mund. ʒ. i. summitat. hyssop. beton. iux arthrit. primul. ver. an. M. i. semin. quat. calid. maior. ana ʒ. 2. flor. stœchad. anth. & cardiac. ana p. i. f. decoct. ad tb. i. In colatur. dissol. syr. de duab. radicib. de bizantiis & de stœch. ana ʒ. 2. F. apozema in quat. doseis, quod condiatur ʒ. i. cinam. vel electar. aromat. ros. Sumat æger quatuor sequentibus matutinis: postea purgetur, vt antè. Nec omittenda sunt toto morbi tempore enemata, si aluum contigerit adstrictiorem esse.

His artibus perpurgato diligenter toto corpore, affecta pars subinde fouebitur hoc decocto.

℞. maioran.

℥.maioran.beron.falu.mentaſtr.primul.ver.iuæ ar-
thrit.ana.M.i.thym.epith.flor.stœchad. & anth.ana p.i.
f.decoct.in aqua,addita sub fin.tertia vini albi parte, pro
fotu ceruic.cum ſpongia. A fomento ſequatur litus.

℥.olei coſtini,vulpin.& chamæm.an. 3.i. cum vnguen-
to Martiato,vel Aregon. f.linimentum. Fortius hoc erit
vnguentum.℥.olei coſtini & rutacei an.quart.i.fuc.rut.
ſalu.ana. 3.2. Bulliant ad ſuccorum conſumptionē: adde
adip.anſer.& œſyp.ana 3.i.ammoniacy in aq. vitæ diſſo-
luti 3.i.caſtorei,euphorb.ana 3.i.cum cera f.vnguent.

Oleis,linimentis, vnguentis cōmodè ſuperimpo-
nitur vulpina pellis ſuffrūmigata, vel (vt loquūtur)
ſinapizata ex thur.maſtich.myrrh.caryoph.cinam.
nuc. moſch. lign. aloës, cyper. ſaluia, æquis ſingu-
lorum partibus.

Roborabuntur vires conſeruis,iuæ arthrit.ſalu.
enul.camp.anth.stœch.mythridatio: vt ſi mythrid.
& duarum ex illis ana ſemidrachmam ſumpſeris,
& bolū cōfeceris,quem poſt primūm des ſomnū.

Si contumacior eſt paralyſis,& longior,prode-
rit guaiacy decoctum vel per ſe, vel cum radice Cy-
naræ,aut Salſę Parillæ propinare. Si paralyſis acci-
derit ex lapſu, arcenda, vel etiam, ſi iam adſit, cu-
randa, phlegmone. Si particularis ſit,non alia ſunt
remedia, præter forſan errhina & apophlegmatif-
mata,inſtituenda.

De conuulſione canina. CAP. II.

Spaſmus 1 caninus ſubita eſt cōtractio, vel
tempore facta 2 reſolutio muſculorū ma-
ſticatoriorum, & eorum, qui peculiariter
lati appellantur.

Animaduertendum itaque,vt ſit reſolutio 3 ſit,
an 4 conuulſio.

1 Quo inſtar
riſus canini
facies conuel-
litur.

2 Nam vbi-
cūque mu-
ſculi conge-
neres in op-
poſiti parti-
bus numero
ſunt pares,
magnitudine
& rol orz, al-
terius partis
reſolutio con-
uulſionem fa-
cit alterius.

3 Vt reſoluta
parti reme-
dia adhibeā-
tur.

4 Et vtrum
conuulſa pars
ſue cōuulſio-
nis cauſam
contineat in
ſe, repletionē,
aut inanitionē.

DE MORB. INTERNIS

In resolutione pars affecta, laxa, mollis, à sana trahitur. In conuulsione, dura & contenta trahit sanam. In paralyfi siue resolutione saluatio multa: in conuulsione, non ita. In materia frigida, efficiente causa huius passionis, si nihil repugnat, sanguis mittitur, sed moderatè. Primùm quidè è s. cephalica: deinde è venis sub 6 lingua. A sanguinis missio- ne, incidendum, 7 & attenuandum hoc modo.

5 *E directo partis conuulsæ.*

6 *Si tamen lingua intumuerit.*

7 *Quod crassa sit materia.*

8 *Ex decocto capitali, hiera picra, & diacolocynthide.*

9 *Hoc remedium præparatur conuenienter utriusque conuulsioni.*

10 *Quod folium desideratur, substitui potest cinamomum.*

11 *Præstiterit tamè dissolui in syrupo de stæch.*

12 *Ut diacarthamo, diaphanico.*

℥.acori, & stæchados ana. M.℥. fiat decoct. in q. s. aquæ purissimæ. Colaturæ addatur mellis communis ℥b. ℥. plus, minúsve, fiat melicratum despumatum, aromatizatum cum 3. i. nucis moschatæ. Quòd si res vrgeat (acuta enim hæc, & tarda ali- quando passio est) clysteres acres 8 iniicies.

Purgabis ex hiera Pachij, ex descriptione Scribonij, cuius hæc est descriptio.

9 ℥.pulpæ colocynt. 3.4. opopanax & sagapeni ana 3. i. & 7. marrubij, stæchad. agaric. chamædryos ana 3.4. petroselini, aristolochiæ rotundæ, piperis albi an. 3.2. cinamomi, spicæ nardi, myrrhæ electæ, 10 folij, croci ana 3.℥. & 4. Opopanax, & sagapenum in mortario tundantur, cum affusione modici mellis liquidi, aut syrup. de stæchade. Reliqua puluerata misceantur, cum mell. q. s. fiat electarium.

℥.suprà dicti elect. 3.2. ℥.castorci 3.℥. dissoluantur omnia in suprà dict. 11 melicrato, q. s. fiat potus. Vide Scribonium largum. Alioqui alia conuenienti potione 12 purgabimus. Partes affectæ, & tota ceruix oleo aut vnguento inducenda sunt, quale hoc est.

℞. 13 rad. althææ 3. l. sem. fœnugræci conquassati 3. 8. fiat decoctio, in olei conuenientis q. 3. aque saluæ quart. 1. Fiat fortis expressio. Inungatur locus, & tota ceruix. Deinde cum lana insuccata in hoc oleo, partes affectæ & ceruix muniantur.

Postea verò licebit vti oleo de cucumere asinino, de scylla: & in his liquefacere duodecimā partem ammoniaci, bdellij, opopanacis, galbani. Post hæc apophlegmatismis, caputpurgijs, 14 & alijs, quæ caput partim euacuant, partim corroborant, vtendum erit.

Nodulo itaque folijs lauri pleno, & in decocto conuenienti madefacto, palatum illinendum erit, quale hoc est.

℞. nucis moschatæ, pyrethri ana 3. 2. sinapi, piperis ana 3. 1. decoquantur omnia in mulsæ 3. 4. Ex eadem mulsâ poterunt fieri caputpurgia. Probatum hoc caputpurgium.

℞. 15 anagall. panis porcini, nucis Indicæ, nucis moschatæ, cucumeris asinini, piperis, acori, pyrethri ana 16 3. 8. Conquassata omnia bulliant in olei de keiry lb. 2. aquæ maioranæ q. 3. vel in sola aqua maioranæ.

Vt tempore resupinetur æger, & stomacho vacuo, quinque aut sex guttæ naribus instillantur: aut sæpius nares interiores inungantur. Oleum verò vñctioni occipitij, colli, regionis sub mento, & affectæ partis conuenit.

Teneat in ore acorum 17 conditum, zinziber conditum, nucem moschatam. Frictiones quoque auertendæ materiæ conueniunt. Sic etiam cucurbitulæ, quæ primæ, & secundæ vertebræ cerui-

13 Hoc linimentum conuulsioni tantum, quæ per se fit, conuenit, non item ei quæ ex euentu. Fit autem per se conuulsio, quæ pars conuulsa suæ conuulsioni causam in se continet.

14 Si modo peculiaris ægri natura est affectio non te auocet.

15 Et eius quidem, quæ cœrulei est floris.

16 Duplo minori dosi sunt hi pulueres præscribendi.

17 Vt materia euocetur, & suauis anathymiasis rerum aromaticarum caput recreetur.

18 *Modo á* cis 18 admouendæ sunt.

resolutione

*partis oppo-
site per acci-
dens non fiat
conuulsio.*

19 *Pyrotica*

*potentialia,
presertim
quæ sunt ex
capitello.*

20 *Ad con-
uulsionem ex
euētū, vt ma-
teria euoce-
tur, pars con-
seruetur, ca-
lor excitetur.*

21 *Si lana
succida car-
pta.*

Inueterato atque cōtumaci morbo Rhazes pro-
bat 19 cauteria post aures, & in ceruice.

Dropace quoque simplici 20 vtendum erit ex pi-
cis 3. 4. olei liliorum 3. 1. liquefactis & extensis in a-
luta.

Castoreum quoque teneatur sub lingua. Hinc ad
sinapismos, & phœnigmos deueniendum est.

Victus instituatür incidens, & attenuans, qui in
media materia temperetur. Cibus sit liquidus.

Quæ topica admoueuntur, 21 conseruentur
calida. Nam refrigerata vehementer nocent.

Loco tepido, lucido, stragulis quoque mollibus
decumbat. Madefactionibus capitis abstinendum
est, quia caput replent.

IIIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.


Quæ ad huius morbi exactam cognitionem perti-
nent, sequentis capitis scholiis explicabuntur.

ANTO. VALETII EXERCIT. XI.

Oris distorsione seu conuulsione affligitur, cui
os ad alterum latūs contorquetur, & oculum,
ad quem illud conuellitur, occludere nequit. Expi-
rante ægro flatus ab altera tantū parte prorumpit
& efflatur. Fit, vt plurimū, ex nerui muscu-
lum mouentis repletionē, à qua nerui eiusdem bra-
uitas, & eius, quam mouet, partis contractio. Cu-
ratio ex cap. de paralyſi repetenda. Priuatim tamen
hic ægi ceruicis vertebrarum, necnon faciei &
frontis inunctione frequentiori ex costino oleo y-
timur. Porro de oris conuulsione, quæ paulatim,

non subitò inuadit, qualis est, quæ phrenitidi perniciosæ, alijsq; acutis morbis, morte iam imminente, superuenit, hîc non agitur: talis enim insanabilis.

De 1 conuulsione. CAP. 12.

 Onuulsis eadem ferè ratio vitæ 2 instituenda est, vt etiam phebotomiæ: siquidē à plenitudine crudorum humorū contracta est.

Initiò ceruicem, & vicinos musculos laxante 3 & emolliente oleo, eòque tepido fouebis, lanâque in eo immersa conteges. Atque, vt calor conseruetur in parte, vesicam ex dimidio plenam oleo tepente superpones, aut eiusmodi sacculos.

℥. sem. lini leuiter 4 conquassati M. ℞. furfuris 5 frixi, florum cham. & anthos ana P. i. salis communis torrefacti, & puluerati 6 ℥. ℞. fiat sacculus, aut plures eiusmodi sacculi, qui subinde recalcrafti calorem in parte retineant. Leues 7 sint sacculi, & ea omnia, quæ læsis partibus, atque dolentibus superponuntur. Clysterum quoq; mollium vsus est, vt huius antiquorum.

℥. rad. althææ 3. 2. sem. leni. & scœnugr. an. 3. ℞. fiat decoctio in aqua ad ℥. ℞. cui adde olei communis ℥. ℞. fiat clyster, tepidus iniiciatur.

Articuli corporis linteis calentibus fouendi sunt. Materia hystopi decocto in mulsâ, & 8 rebus eiusmodi incidenda est.

Deinde 9 purganda vt priùs, in spasmo canino, & soda phlegmatica, aut agarici, aut diaphœnici

candâ partē. 6 Vel 3. i. 7 Ne suo pondere naturam opprimant. 8 Vt hydromelite origanato, decocto stœchados, betonica. 9 Vt electario, bolo, pilul. syrupo solenni, cephalico phlegmagogo, accomodatâ materia morbosâ, partibus affectis, & viribus agri.

Gal. cap. ult. li. 12. Meth.

1 Quæ est à repletio. e

musculosi generis, quæ sola curationē

recipit. Quæ enim conuulsio

facta ob immodicam eua-

cuationem, est exitialis.

Gal. côm. in aph. 1. li 5.

2 Modò nalla fractura

luxatio- nis excusatio

possit afferri.

3 Vt mucaginibus althææ extra-

ctis in aqua chamemeli

& saluie, oleo liliaceo,

adipe anserino.

4 Vt vires suas exerat.

5 Ad exhauriendâ materi-

am. & sic-

DE MORB. INTERNIS

- 10 *Vel so-* 3.3.in conueniente mulla dissolutis.
lum taxoni- Molliter fricetur cernix, spina, spatulæ cum vn-
num adipem ctionibus conuenientibus, quales sunt.
misce cum 2. olei terebinthinæ, olei lumbricorum an. 3.2. a-
oleo rosaceo, xungia humanæ 3.1. simul misce, liquefiant simul.
Chapsus co 2. olei de costo, cum quarta parte pinguedinis
imbuatur, vt castoris, lutræ, melis, 10 quem Taxonem, aut Blere-
hoc. lum vulgò vocant.
2. olei de co- 2. vulpem bene pinguem, corio detractò, & exé-
sto lb. s. adi- teratam, confixam caryophyllis, infarctam 11 hoc
pis Taxonis modo, & assatam,
3.1. lb. Misce, 2. rad. althææ & liliorum an. 3. s. rad. acori, ircos
illinatur af- ana. 3.2. chamæpyth. herbæ costi, maioranæ, calen-
fecta partes. dulæ an. P. 2. florum anthos, meliloti & chamæ. an.
11 *Vt lauro,* P. 1. styracis, ladani pinguis, mastichis, castorei an. 3.
angelica, bac 3. Omnia in mortario contundantur cum oleo de
cis lauri. vermibus.
12 *Ne exitu* Malaxentur, farciatur vulpes, & 12 benè consua-
habeat farci tur, assetur cum aspersione aquæ vitæ. Quod distil-
men. latur pingue, excipiatur subiecto vase, in quod infu-
13 *Ad inci-* sum sit 13. acetum.
dendum ma-
gis. Deinde vulpes in aqua coquatur: quod superna-
14 *Vt simili* tabit pingue, tū in aqua, tū in aceto, vsui referuetur.
calore recre- Vtilissimum est post vnctionem pellibus hædo-
tur. Noster rū, agnorum, luporum, vulpium, arietum, recens ex-
enim natiuus tractis, atque etiam dum calidis 14 partes inunctas
calor simili contegere. Quod si pelles iam refrixerint, immer-
gaudet ca- gendæ sunt 15 oleo calido, vt recalescant. Aliud.
lore. 2. vini rubri lb. s. ol. liliorum lb 2. rasuræ mollioris
15 *Vt ane-* partis, & magis spongiosæ cornu cerui 3.1. salis. 3.1.
lino simplici, florum cham. 3. 6. mastichis. 3. s. bulliant omnia
Iiliac. aut
chamame-
lino.

in vase duplici ad vini consumptionem. Hinc ad
 16 vnctiones calidiores transeundum est, de qui-
 bus supra.

Balneum quoque commendatur ab antiquis, ad
 vmbilicum ex hydrelæo, cuius modus est ex æquis
 partibus aquæ & olei. Perseuerante malo, olei bal-
 neum conuenit calidum, & domicilio calido, quod
 ita præparabis. Quintam partem olei calfacies, &
 quatuor 17 partibus non calfactis commiscebis.
 Alioqui ex decocti scœnugræci in aquæ tribus par-
 tibus, & olei tertia parte balneum præparabis, quo
 totum corpus immergatur.

Sed balnei modum esse oportet, ne 18 vires re-
 soluantur. Itaque solis 19 irrigationibus vtendum
 erit, vbi vires non 20 sinunt.

A balneo tempestiua est 21 vnctio (ex supra di-
 ctis oleis, aut in quo ruta, conisa, rosmarinus, arte-
 misia, fœfeli cum modico cinamomi coxerint, qui-
 bus aliquando decima, aut duodecima pars casto-
 rei adiicienda est.

Veteres omnes & recentiores Medici castoreum
 propinant è mulla. Dosis castorei à ʒ.2. ad ʒ.2.

Cucurbitulæ partibus affectis, sed cum 22 scarifi-
 catione, admouendæ: sed iam progressu morbo,
 & benè purgato corpore.

Aurelianus in accessione, leuibis: in dimissione,
 cum scarificatione vtitur, occipitio & collo defixis.

Remedium Hippocratis 23 est aqua frigida, in
 iuvene bene carnosæ, & ætate media.

Paulus, Celsus, Aurelianus, tota denique poste-
 ritas 24 reprobauit. De excitanda febre non con-
 uenit. Qui prouocant, vtuntur autoritate Hippo-
 cr.

16 Cuiusmo-
di balsamum
factitium, ab
Authore pro-
positum cap.
de paralyssi.

17 Simplex
enim oleum
omnis est ca-
loris impa-
tiens.

18 Corporis
nimis rari-
tate.

19 Particu-
laribus.

20 Multis
enim effæta
languent pe-
culiari natu-
ra, corporis
raritate, spi-
rituū oppres-
sione.

21 Vt ex oleo
irino cum ca-
storeo.

22 Sublato
tamen omni
fluxionis me-
tu.

23 Aphor.
21. lib. 5.

24 Sed sal-
sū.

DE MORB. INTERNIS

cratis, Aphor. 70. lib. 5.

Herophilus quoque febriculam laudauit: Asclepiades simpliciter febrem. Auicennas & Arabes febrem prouocari nolunt, nisi diariam.

Cum melle castoreum, aut sagapenum, aut opopanax auellanæ magnitudine febrē excitare scripsit Celsus: sed hoc non caret periculo.

Cæterum ex Gal. sic habeto. In morbis frigidis, quos humor crassus, contumax & multus generauit, febris satis vehemens excitari potest. Leuis enim nocet, nec prodest, exemplo filij Numeni: cui, cum apoplexia correptus esset, febris accessit mediocris: quæ cum noceret, & per infirmitatem caloris non prodesset, mors sequuta est. Oportet enim febrem fuisse magnam, quæ talem humorem calfaceret, incideret, concoqueret, & discuteret. Itaque ut sit materia, ita febris consilium temperandum est, sitque non minor, quàm quæ prosit, neque maior, quàm quæ lædat.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA,

In paralyfi resoluuntur nervi, & languidiores humore flaccescunt, ita ut concidant in partem sanam: in conuulsione, contorquentur muscoli simul cum nervis & tendonibus, contrahunturque præter voluntatem ad suum principium, & partem sanam secum in angustum adducunt. Exempli gratiâ. Conuulsis temporalibus musculis, contrahuntur dentes, ac strident resolutis, hiatus fit oris. Proinde si *σπασμὸν* nervorum distentionem, ut Celsus interpretari velis, ambigua vox erit cum paralyfi, cum distentio & contractionem, & extensionem significet. Hinc quoque perspicuum, paralyfim à siccitate vix, aut nunquam fieri. Siccitatis enim ea est natura, ut absorpta pororum humiditate corpus contrahat, nunquam relaxet, nisi fortasse per accidens, ut si ob sic-

Cornel. Celsus capit. 8. lib. 2.

citatem nerui spiritu priuati non turgcant, neque dilatentur, sed flaccescant. At si paulò diuturnior sit, & intemperantior siccitas, haud dubiè, vt æstus chordas citharæ impensius resiccatas tendit ac rumpit, sic neruos eadem, aut similis in corpore siccitas, præsertim calori iuncta, flectet, contrahet, & tandem etiam disrumpet, non autem relaxabit. Humiditas tamen vtrûq; efficit. Nam & tendit solidam substantiam penetrando ac dilatando, vt pluuioso tempore eadem chordæ inflantur: & relaxat leniendo, vt si quis corium resiccatum pinguedine oblinat, vel humore imbuat. Quare tam conuulsionis, quàm paralyseos humiditas causa esse potest. Sed in illa neruos contrahit ob plenitudinem: in hac relaxat ob maiorem. Siccitas autem nunquam efficiet paralysem, nisi *ἡ σπασμωδική*. Inde etiam efficitur, humorem in paralyse tenuiorem esse debere, quia in solidam substantiam neruorū penetrat: in conuulsione verò crassiorem, quia tantum replet.

Duplex alia difficultas. Vna, quòd cū in conuulsione affectio sit sæpius in neruis, quàm in musculi corpore, nihilominus musculi, non nerui, morbus esse dicatur. Altera, quia definitur per motū, cū tamen pars læsa ita immobilis rigeat, vt in cōtrariū nullo modo flecti possit. Hoc fit, vt dicam verbo (non enim argumenta soluere, nostri est instituti) tonico motu, de quo Galenus lib. i. de Musculorum motu. Illud verò, quia musculus proprium est motionis instrumentum. Quomodo autem ad proprium cuiusque particulæ organum morbus referri debeat, Galenus copiosè docet de morborum & symptomatum causis. Nobis satis fuerit morbi huius notionem primū animo complecti: deinde partem affectam nosse: tertio affectionis causam: postremo curationis summam. Quæ omnia breuiter sic habero.

Cū vel corpus, vel illius membrum aliquod repente cōtortum & inflexum apparuerit, perinde ac si in naturali situ esset, rigidum tamen est, nec ab eo situ potest dimoueri, etiamsi eò vi inflectere coneris, quò, cū secundum naturam habebat, pro arbitrio dirigebatur, cōuulsionem esse suspicandū est musculorum, vel pluriū, vel alicuius, qui ad sua ipsorum principia cōtracti, partē

DE MORB. INTERNIS

simul, cui inferuntur, adducunt, immobilémq; reddunt, ita, vt vel recta, vel inflexa, vel contorta videatur. Hoc tamen obseruato, ne id articulorum ossium vitio fiat. In his enim sæpe vel callus gignitur, vel delapsus humor intra cauitatem prohibet liberam in iuncturis motionem. Quod intelligetur, si nec repentè, nec affatim, nec post febrè ardentè affectio inciderit: si luxatio fuerit in particula læsa, non rectè curata: si contusio, aut aliquid simile antecesserit. Tunc enim musculi primariò non afficiuntur, sed flecti ossa in iuncturis nequeunt, licet ipsi quoq; tandè trahantur in còsensum. Cum enim diu manent immoti, otio proprià mouèdi vim tandè amittunt.

Partis affectæ dignotio est huiusmodi. Si totù corpus subito còuellitur, vt in epilepsia, neruorum principium patitur. Si caput antrorsum curuatur, & mentum annectitur pectori, duo musculi anteriores caput flectentes laborant, èstq; ἐμπροσθίου. Si in dorsum & scapulas còtorquetur, ex duodecim musculis caput extendentibus in posteriore parte colli, vel aliqui, vel omnes afficiùtur, diciturq; affectio hæc, ὀπισθίου. Quando cernix recta & immobilis manet, in neutram partem curuata, vtriq; musculi & anteriores & posteriores τήρων efficiunt. Si oculus còtorquetur, σφαγισμὸς erit, musculis, qui ipsum mouent; conuulsis: si mandibula, τρισμασ temporalibus contractis, vel neruis è secunda & tertia còiugatione. Si labra & nares, & pars contracta sanam ad se adducit, in vitio est latus musculus, ex quo musculi narium, superciliorù, & labiorù fiunt, vel nerui à primis vertebis & ramis tertiæ còiugationis, Græcis κωμικὸς σπασμὸς nominàtur. Si vtrâq; pars, dextra scilicet, & sinistra lædatur, musculi vtrinque contracti, Sardonium risum faciunt, maxillares nimirum in latera, os & labra deducentes, ita vt ægri perpetuò ridere videantur. Idem iudicium de cæteris partibus. Semper enim affectio ad musculum authorem illius motus, qui læsus est, referri debet.

ἐμπροσθίου.

ὀπισθίου.

τήρων.

σφαγισμὸς.

τρισμασ.

Sardonium
risus.

Conuulsio à
siccitate &
inanitiõe le-
thalis.

Fit autem hic affectus neruis, vel musculis aut exsiccatis, vel calefactis, vt à vulnere, & post largam sanguinis missionem, febres ardentes, meningum inflammationes, vel cerebri. Atque sic lethalis est. Aut congelatis: vt ob refrigerationem humorum, vel sudorem refrigeratum,

vel ventum frigidiorē : aut inflatis : vt à pituita viscida (nam rarò fit à sanguine) vel post morbum non satis exsiccatum, vel sanie collecta in aliqua parte capitis, vt meningibus, ob vulnus; vel à flatibus medicamenti, vel agitatione materiæ, vt post hellebori potionem. Ab ebrietate, crapula, suppressa vacuatione consueta, exercitatione intermissa, phlegmone, dolore, consensu vteri, morsu, puncto nervo, aut tendone, affecto ore ventriculi ab æruginosa & biliosa materia, vermibus, fungis, ab ictu feræ venenatæ, & similibus.

Hippocrates hæc omnia ad duas causas reduxit, inanitionem & repletionem. Terciam recentiores addiderunt per condolentiam, affectumque vocant non proportionatum ad materiam, cum mouetur cerebrum in sese, vt expellat, quod noxium sentit, vt dolente nervo ob puncturam, aut alicuius animalis venenosi morsum. Sed hanc Galenus ad inanitionem: alij, quia materia venenosa est, licet pauca, ad plenitudinem referunt. Hellebori quoque potio ad vtrâque causam reduci potest. Ex antecedente vita, vel morbo, vel habitu corporis omnia facile discernuntur.

Hippo. aph. 39. lib. 4. & Gal. Cömen. 1. in Prorrh. sent. 27.

Attamen Galenus comment. in aph. 2. lib. 5. dicit conuulsiones fieri ex vulneribus, ratione inflammationis ipsa sequentis, & ad nervosas partes pertingentis.

In curatione torturæ oris superiore capite descripto vtendum clystere, deinde coquentibus pituitam: in plenitudine sine cruditate, sectione venarum linguæ, gargarismatis digerentibus, formulis in ore retentis aqua vitæ formatis, quibus nihil præstantius, inunctionibus, sacculis, suffumigiis, emplastro ex gummis calfacientibus.

Ab inanitione non curatur: sed prohibendum ne fiat, sublata causa, vt in febre ardentissima & phrenitide, si à nimia siccitate periculum imminet conuulsionis, spinam inungendo, ne nervi exsiccentur, vel irrigatione ex refrigerantibus ob febrem, & humectantibus, ob nervorum siccitatem.

A vomitu, aut immodica vacuatione curari potest, humiditatem reparando per humectantia, & quæ hec-
eis profunt.

DE MORB. INTERNIS

Si à punctura fiat, vulneri latiori reddito & aperto oleum de terebinthina imponendum, vel de euphorbio, cum emplastro de Galbano, sedandus dolor, vulnus ad cicatricem non ducendum, nisi post multum tempus. Extremum remedium est, tendonem vel neruum ictum abscindere in parte supra puncturam.

A venenosi animalis morfu, cucurbitula cū multo igne suprā partem affigenda, vel cauterium, vel antipharmacum. Intrò sumenda theriaca cum herbæ decoctione, quæ sit veneno accommodata, theriaca etiam vulneri imposita prodest.

A sanguine, sæpius repetenda est venæ sectio, & oleis medijs vtendum. A pituita, curatur coctione materiæ & eductione, vt de Paralyfi dictum est, additis malacticis ad inunctiones, balneis, & similibus.

In conuulsionibus capitis & humorum refrigeratione, calidioribus vtendum, partes lana succida inuoluendo, cucurbitulis, sectione quandoque illius venæ, quæ supra primam dorfi vertebam apparet.

A meningum punctura, aperiendum cranium trepano, aut alio instrumento, vt materia transpiret, aut epipalticis trahenda, nisi subsit plenitudo.

A ventriculo, tutius clysterib⁹ acribus, aut pilulis vtimur, quàm vomitu, ne os ventriculi contactu veneni laedatur. Conueniunt etiam spinæ inunctiones.

Vnctione conuenienti.] Sequens medicamen excellentissimum est in resolutione linguæ, oculi, labiorum, risu Sardonio, tremore capitis & totius corporis, ac omni capitis percussione inflatis præcordiis, & similibus.

℞. cinamomi, croci nardi, costi, styracis rub. opopanax, myrrhæ, melanopiperis, seminis rutæ, succi abrotani an. 3. 9. dauci 3. 4. 8. moschi, benzoini an. 3. 1. mellis q. s.

Pinguedini anserum syluestrium quos vocāt Otidas, & Phalacrocoracum (vulgò Cormoranos nomināt) plurimum tribuunt leniendis doloribus Sortilegi. Parāda autem est eo modo, quo Gattinaria ex Nicolao Forentino docet de anser vulgari, capite de Spasmo. Sumatur anser pinguis, & euisceretur: dein ælurus (cattum vocāt) minutim incisus in anseris ventrem cum lardo, thure & myrrha recondatur, suatur anseris venter, veru ad co-

quendum configatur. Interim vero vas aceto albo semiplexum supponatur, cum pinguedo vera ab anseri liquefcens decidere cœperit, quæ aceto supernatans referuabitur. Alius subinde anser in eodem aceto incoquatur, indeque pinguedo plurima enatabit: ex qua cum priore mixta parabitur litus. Idem artificium in Otide, phalacrocorace, & aliis. Oleum de enula, irinum, de ligno sancto, crocinum Mesuzi, lumbricorum, axungia humana, de styrace, de euphorbio, de castoreo, piperib', philosophorum, de costo, cum parte illius pinguedinis, aut mellis, & modico castorei, piperis, euphorbij conueniunt.

Cucurbitula.] Cauendum, ne tendonibus affigatur, sed musculi principio, aut medio, ad iuuandum eiusdem actionem. Quibusdam locis commodè adhiberi nō possunt, vt labris, superciliis, digitis, vbi sanguisugæ: aut earū loco, vt in palpebris, & lingua, scarificatus erit ex usu.

Aqua persusio, febris.] Hæc duo remedia à veteribus multum commendantur. Periculosa tamen sunt, vt ratio & experientia demonstrant. Timendum enim in persusione frigida, ne materia magis inde refrigerata, aliùs impingatur. Si tamen spes certa subsit calorem à frigore, quasi antiperistasi quadā, intrò posse cogi, vt in principio, ætate media, iuvene bene carnosio, non omnino negligendum. Febrem quidem Hippocrates dixit morbis à crassa pituita mederi, rigore & calore: quia rigor materiam commouet, exagitat & purgat: calor coquit, tenuat, incidit, resoluit. Sed cum, si vehementior sit, tollat ægrum, minor verò coquendo morbo non sit satis, longè tutius est eam vitare, nisi sponte superueniat. Difficile enim fuerit in medio consistere.

*Hipp. apho.
26. lib. 1.*

ANTO. VALETII EXERCIT. XII.

Conuulsio deprauatus est motus, quo fit partis vnius instrumentariæ, aut plurium, suam versus originem præter voluntatem contractio. Atque ea quidem vel per se, vel per consensum. Per se, ex repletione aut inanitione nerui, vt est comment. 1. in

*Gal. côm. in
sent. 4. sect. 1.
lib. 3. Epid.*

sent. 27. prioris Prorrhet. Per cōsensum, vel ab humore tenui, acri & æruginoso, ventriculū lancināte, vt cap. vlt. lib. 12. Meth. vel à potu frigida, vt cap. 5. lib. 9. Meth. vel à crapula, vt lib. 3. de Temper. & aph. 5. lib. 5. vel à diaphragmatis, aut vteri inflammatione, vt comm. in sect. 2. lib. 3. Epid. vel ex maligna assumpti medicamenti qualitate, vt apho. 25. lib. 7. & aph. 1. lib. 5. aut à forti frigore, & humoris crassi sanguinem congelantis copia, vt commen. in sent. 27. lib. 3. Prognosticōn : vel à vulnera, ratione consequentis inflammationis, quæ in neruofas partes irrepserit, vt comm. in aph. 2. lib. 5. vel denique ab ictu, morsu &c. De his fusiùs Hollerius.

*Gal. cōm. ad
aphor. 57.
lib. 4.*

Conuulsiones, quæ ab initio inuadunt, ferè omnes à repletionē originem ducunt, & communem habent, vti antè dictum est, cum paralyfi curationem. Aduertendum tamen linimenta iis, quæ fieri debēt in paralyfi, hac in re contraria esse, quod propter contractionem vehementiorem emollientia esse oporteat, & fomenta minimè adstringentia.

*Gal. cōm. in
sent. 24. &
57. sect. 2.
lib. 1. Epid.*

Adhæc conuulsionib⁹ opportunissimi sunt pueri, præcipuè dentitionis tempore, ob neruosi generis imbecillitatem, & voracitatem. Sed hæ immixtis clysmatis, fotu ceruic. ex oleo iasmino, aut lumbricorum, calente, non omisso interim ventriculi litu ex oleo stomachico, facillè sanescunt.

De angyglossis, seu mogilals. CAP. 13.

Angyglossi difficulter pronunciant. L, R, K, atque in loquendo restitantes loquelam præcipitāt. Gal. comment. 2. lib. 1. Epidem. *ῥαυλῶς* appellat, qui ex musculorum linguæ vitio

balbutiunt. Nascitur enim id vitij, aut quia breuior lingua, vel quòd imbecillior ab intemperie humida, vnde & mollior, vt in quadam paralyfi: nōnunquam ex intemperie sicca, frigore, ira concitatore, calore. At sæpiùs hic nascitur morbus ab adstrictione membranae linguae subiacentis.

Purgandum corpus: parcìus viuendum, vt minor sit copia sanguinis: refrænantibus sanguinem alimentis, frictionibus reuellendum.

Albucasis parte 2. incisionem secundum latum instituit, & ab arteria, quæ illic est, sectione cauet, hæmorrhagiæ metu. Colluit statim aqua ros. aceto, aq. frigid. vitata posca. Sed in mediam incisionem inducit linamentum, ne rursus pars ligamenti reliquo ligamento consuescat. In hæmorrhagia lenticulari cauterio inurit.

Quòd si breuioribus nervis, qui ad motum in palatum & dentes feruntur, id acciderit, res incurabilis, vt quum breuior lingua. Aliquando siccioribus iisdem, nec ita sese extendentib' accidere potest.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Eo morbo laborans Episcopus Senësis, frater domini de Beauuour, cum medicos impostores ad curationē adhibuisset, cōsumpra grandi pecunia nihil profecisset, ac tandem me vocasset, aperto malo, & variis cōmemoratis causis, quas medici suspicaretur: cūmq; vnicā causam esse adstrictionem membranae, quæ sub lingua est, vnde prohiberetur motus linguae, qui ad primores dentes extenditur, indicassem, necnō vnicū esse remedium scriptū à Celso, Paulo Æg. Aëtio, & recentioribus medicis, cognitum etiam vulgo, vt membrana illa succideretur, miratus quod affirmarem eam causam vnicam & curationem ab omnibus scriptā medicis, ignoratam ab iis, qui-

Episcopus Senensis mogilatus.

Corn. Cels.
cap. 12. lib. 7.

bus sese commiserat, omninò sese consiliis nostris sub-
misit. Monui, nam peregrè proficiscebatur, vt experto
chirurgo vteretur: qui volsella prehasas mēbranas (fi-
lum vulgus appellat) succideret, ne altiore plaga hæ-
morrhagia moueretur. *Qu*anquam scribit Celsus no-
uisse quendam, qui succisa ea membranâ nihilo melius
sit loquutus. Adeo (inquit) in medicina etiam, vbi per-
petuum est, quod fieri debet, non tamen perpetuum est,
id quod sequi conuenit. Sed et priusquàm ad incisionem
veniretur, suasi totius corporis & linguæ resiccationi in-
cumbere. Ille autem interceptus negotiis de morte fra-
tris cæsi, & inde contra homicidam cōmota causa, abiit.
Adhæc quibusdam incisum est filum, sed māsit interme-
dius callus, non caro mollis: vnde nihil effectum fuit.
Quod chirurgis diligenter considerandum.

ANTO. VALETII EXERCIT. XIII.

DE angiglossis seu mogilalis tractatio quanquā
chirurgica est tota, committere tamen non
potui, vt hoc loco supprimeretur, cū & manu-
scripto exemplari appicta sit, & historia non vul-
gari locupletata.

De incubo.

CAP. 14.

¹ Ex Paulo
Aegin. cap.
15. lib. 3.

IN cubus, qui ἐφιάλτης, ἐπιβολή, à The-
mione πνιγυαλίων dicitur, neque deus, ne-
que semideus, neque Cupido, quod vete-
res crediderunt, neque dæmon, quod Theologi
existimant, neque incubans vetula, sed vapor qui-
dam crassus, qui partim vias spiritus animalis inter-
cipit, vnde & loquendi, & respirandi difficultas:
partim animæ offunditur, vnde phantasia, & spe-
ctrum quoddam, quale ² frequens est in somniis.

² Praesertim
melancholicis
& pueris.

Sed ideò incurfare, atque etiam opprimere tho-
racem,

racem, constringere collum, præcidere vocem, apparet, quia his maximè partibus labor est. Pueros & 3 *Vbi materia exitum non habet.*
 3 obesa corpora aliquando suffocat: alioqui epilepsiam denuntiat.

Incubus enim epilepsia quædam nocturna est. Multos olim Romæ, quod scriptum reliquit Syssimachus, vno anno cōfecit. Itaque qui incubo opprimitur, statim excitandus est. Postea videndum, ne affectio eiusmodi redeat.

Imperanda est sobria vita, cœna frugalis, vitæ ratio è media 4 materia, frequens ablutio extremorum. Sæpe etiam pectendum caput est ex ebore, in 5 posteriorem partem ducto pectine.

Melicratum plus minúsve dilutum pro 6 ratione, in quo radix sceniculi, asparagi, petroselini, graminis, acetosæ, cichorii, endiuia, radicis capparis, hyssopus, buglossum, borrago, endiuia, summitates lupuli, fumaria, 7 cetherac, 8 scolopendrium, capillus veneris, cuscuta, passulæ mundatæ ab arillis, pruna, scabestæ, flores anthos, violarum, borraginis, decoxerint. Quale hoc erit.

℞. rad. sceniculi, radicis graminis ana 3.℔. summitatum lupuli P.ij. hyssopi, trium florum cardiacorum, passularum, glycyrrhiæ an. P.i. fiat decoctio ad lib. i.℔. in col. dissol. 9 mellis albi, sacchari albissimi ana 3.2. fiat melicratum.

Deinde purgandum corpus hoc modo.

℞. cassiæ, vel cathol. 3.10. dissolue in sero lactis caprini, vel alterius, cū 3.℥. syrupi. violati fiat potus.

Pro ratione materiæ licebit uti fortioribus, quæ partim in capite de epilepsia, partim in capite de melancholia dicentur.

4 Neque humida, neque sicca, sed temperata: ut carne vitulina, pane medio, eoque bene fermentato.

5 Occiput versus.

6 Temperamenti & cœli.

7 Verum scolopendrium.

8 Phyllitis Matthioli.

9 Vel potius syrup. violacei & capill. ven. an. 3.2.

DE MORB. INTERNIS

10 *Vt si ve-* Nec omittenda phlebotomia, si res 10 exigat.
na sint san- Clysteres quoque & frictiones ex usu sunt, quia
guine disten- fumos reuellunt. Errhina quoque & apophlegma-
se. 11 Vt ma- tismi ex leuiori 11 materia. Cucurbitulæ in cruri-
stiche, salua, bus & omoplatis, pulueres quoque, maximè à ci-
maiorana. bo, qui fumos prohibeant 12 & morbo conue-
12 Vt pulvis niant. Qualis hic est.
ex corallo, 2. 13 coriandri præparati 3. 2. specierum diamarg.
saccharo ros. frigidi, & diarhodon Abbatis an. 3. l. sem. nigri pæo-
& margari- niæ 3. 2. coralli rub. 3. 3. macis, cinamomi an. 3. l. cū
tis confectus. modico sacchari rosati, fiat mixtura, vtatur post pa-
13 Vel hunc stum cochlearis dimidio.
prescribes. Bibere quoque medio 14 pastu, non in fine, hoc
2. coriandr. adiuuat.
prepar. 3. 2. Cucuphæ quoque parādē sunt ex floribus anthos,
corall. rabr. stœchados, & cæteris rebus capitalibus, vt prius.
margar. ele- Dropax quoque 15 simplex tum hypochondriis,
ct. rum an. tum etiam capiti commodè aptari potest. Calidus
3. B. rasura applicatur, & ne pertinaciùs inhereat, linteolum ra-
eboris, oss. de rius, & vehementer attritum 16 interponendum
corde cerni est. Componatur dropax ex quinque partibus pi-
ana 3. l. cina cis, & vna olei de spica, vel mastiche.
mom gran.
6. sacch. ros.
3. 4 f. pulvis
subtiliss. vta
tur à pastu
cochlearis di
midio.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

14 *Vt iactis* Επιάλιν ἀπὸ τῆς ἐφ' ἀλλω, quoddam qui eo affectu laborât,
cibi funda- noctu quiddam sibi incumbere existiment, à quo inua-
mentis. dantur & opprimantur cū difficili respiratione, immobi-
15 Ex pice. litate, ac voce præpedita, vt propè suffocari videâtur. vn-
16 Inter pi- de & à Themisone, epistolarū lib. 11. (teste Aureliano) πικ-
cē & cutem. γαλίον ἀπὸ τῆς πνιγνῆς. Ex veteribus etiam nonnulli ἐπὶ το-
Aureliū ini- λῶ nominârunt, quod Aurelianus quoque refert. De
tio cap. 3. lib. parte primariò affecta non omnium idem iudicium. In-
1. Chronion. terpretes Arabum priorem cerebri ventriculum, vel spi-
 nalis medullæ exortū vapore crasso, aut etiam humore,

qui tamen facile dissoluatur, oppleti aiunt. Posidonius non humore, sed crasso & frigido vapore spiritus animales per nervos ferri prohibete. Vtrunque minus probabile. Alioqui enim inde necesse esset vel epilepsiam, vel apoplexiam, vel eorum generati, aut saltem respirationi tantam noxam non inferri, aut thoraci: à quo cum totius mali origo ducatur, graviusque ceteris laborer, in eius venis summam plenitudinem esse consentaneum est. Quod & symptomata indicant, pondus nimirum *Ephialtēque sequatur symptomata.* thoracem opprimens, & difficilis motus eiusdem inter dormiendum, vel inchoata coctione, ex fumis nimirum, & flatibus, qui tum excitantur, pulmones & seprum transversum prementibus, præsertim cum non tam libera sit respiratio per somnum, quam inter vigilandum. Quod autem in eo lædatur imaginatio, quæ est in prioribus ventriculis, id fit per consensum, ut in melancholia hypochondriaca. Fumi enim ex crassione sanguine sursum lati timorem animo incutiunt, variæque imaginatione afficiunt, ut docet Galenus de locis affectis: atque hinc fit, ut quidam Dæmonē esse putent. Si diu tamen perseveret, frequentiusque repetat, cerebro fit essentialis, degeneratque in apoplexiā, vel epilepsiam, vel melancholiā.

Causæ antecedentes sunt, crapulæ & cruditates, pessima victus ratio, multitudo crassi sanguinis, suppressi menses, aut hæmorrhoides, & similia. Summa curationis (mutandæ tamen pro causarum varietate) est huiusmodi. *Ephialtis causa.*

Clyster discutiens flatum & euacuans in paroxysmo, sanguinis missio in plenitudine è basilica, vel mediana, præsertim si sanguis crassior appareat, & sine pituita, pituitæ coctio, euacuatio, opiata quibus flatum discutientia misceantur, pulveres flatum discutientes, unctiones pectoris, sacculi cordi applicati, parciore cœna, vel nulla, cibi minimè flatuosi, decubitus in latus.

Quod Theologi existimant. Non omnino certè cõtēnenda est veterum Theologorū auctoritas, omniumque gentium cōmunis ille consensus de incubo & succubo, *Theologi re- cū etiam attestatur experientia. Memini enim me in teres quid de incubis & succubis senserint.* in Ecclesiæ historiis legisse Cathecumenos huiusmodi dæmonū ludibriis vexari solitos, qui deinde exsumptione liberabātur. Multa quoque sunt apud D.

DE MORB. INTERNIS

Augustinum de incubis & succubis lib. 15. de Ciuitate Dei, vt hinc ferè cogamur fateri incubum alium dæmonis arte induci, alium corporis morbum esse. Nisi quòd summa Christi luce nobis affulgēte, ab his tenebris nūc non est metuendum. In Gentilitiis illis ceremoniis multa huiusmodi deliramenta reperiuntur de Sympythis, & Pythone, spiritu diuinatore occupatis, sed multò lepidiora in Hebræorum Rabbiniis. Scribunt enim huiusmodi phantasmata ex semine Adam procreata fuisse centum illis & triginta annis, quibus ab vxore abstinuit, postquā Cain fratrem interfecit. Pro singulari remedio iubent circulos septem circum sepulchrū fieri, ne cadauer intro-mittendum subeant, eoque ad nocendū vtantur. Alcinous in dogmate Platonis retulit ad yaticinia, oracula, somnia, &c. Sed & in veterum Medicorum libris multa remedia reperiuntur ad Sympythos, & dæmone occupatos, & incubos, vt apud Actuarium & Alexandrum. Qualis est illa Hipp. antidotus; territis lemuribus & dæmonio occupatis, lunaticis cum spuma tauri, quæ in codicem manu scripto sic legitur.

℥. nuces cupressi ʒo. Caricarum pinguium sine nucleis, pass. mund. ab arillis an. 3. 12. (fortasse 3. 12.) ladani, styracis opt. myrrh. asphalti, bdelij, radicis asphodeli, enulæ an. 3. 7. cardamoni 3. 5. sabinæ 3. 4. folij, costi, spicæ, ros. baccarum iuniperi ana 3. 3. schœn. cal. lentisci an. 3. 2. croci, cyperi, lybistic. ana 3. 1. vini optimi & mellis q. s. Nuces cupressi fractæ triduo macerentur in vino optimo: coque lento igne ad vini consumptionem aliquā, & cola. Tum in vini lb. 2. carnes ficuum tritas diu cōtere vino, & additis mellis lb. 2. iterum coque ad mellis crassitudinem, & sacculo excola: tum adde passulas, & dactylorum carnem, & in mortario diu contere. Hinc styracem, ladanum, terebinthinam cum modico melle diu terendo in mortario misce, ex quo pulueres coniunge sedulò, & vitro reponere. Da 3. 2.

vel 3.3. in catarrhis, fluxionibus, mulierum morbis à frigore & flatu.

Non iniucundum est, quod medicus quidam scribit contigisse nuper apud Aruernos in Cœnobio quodam. Cùm enim Pharmacopola, quem secum habebat, inter dormiendum incubo laborasset, qui in eodem cubiculo erat, accusauit. Se enim ab illis noctu propè iugulatum fuisse, constricto collo. Quod cùm socij audacter negarent, totàmque in eum culpam reiicerent, qui noctem in somnem furore quodam percitus duxisset, iussus deinde est solus, lautè cœnà sumpta, exhibitis etiam flatuosis alimentis, dormire, cubiculo vndique optimè clauso. Rediit paroxysmus, dæmonem esse iurauit, cuius etiam faciem & gestus mirificè depingebat. Neque vnquam illi aliter persuaderi potuit, nisi vbi curationem inito cōfilio adeptus est.

*Pharmacops
la incubo
corrupt.*

ANTO. VALETTI EXERCIT. XIII.

Incubus, symptoma facultatis animalis obstructionem cerebri meatuum consequens, ab elato vapore crasso, spiritui viam præcludente ortum habet. Hinc musculis edendæ respirationi & voci dictis illata noxa vocis interceptionem, aut eius incertæ, indiscretæque efformationem, difficilem cū tremore motum, suffocationem imaginabundam, clamandique desiderium inducit.

Putatur nonnullis proprius ventriculi & diaphragmatis affectus, quod supinis dormientib⁹ crassiores persæpe cibi os ventriculi & diaphragma premât, vnde efflatio & respiratio præpediantur.

Magna huius affectus habêda ratio, quia grauioribus morbos, epilepsiàm (vnde epilepsia nocturna appellatur) apoplexiam, maniam denique prænūtiat. Crassioribus naturis, vt etiam pueris, familiaris est, ob meatuum angustiam: itémque literarum

*Incubus quibus maxime
familiaris.*

DE MORB. INTERNIS

studioſis, quibus minuitur concoctio, & quorum cerebrum ſtudioſum aſſiduitate debilitatur.

*Incubi cura-
tio.*

Iuuatur victu tenui, non flatulento, eupepto, non vaporoso. Potus ſit vinum album, tenue, ſubad- ſtringens & dilutum, vel hydromeli. Vapores vt inhiſceantur, vacuandi ſunt humores, è quibus ſuſci- tantur, catapotiiſ, aut potionibus hieram recipien- tibus: qui ſi lent ſint, ſic præparabuntur.

*1 Vniuerſi,
eæque typica,
cum mentis ſen-
ſuum obla-
ſione.*

℥. hyſſop. paſſul. mund. an. M. i. f. decoct. ad quart. 3.
In colatura diſſol. oxymel. ſimpl. vel compoſit. vel ſcyl- lit. 3. 4. f. zulap. clar. pro doſib. 3.

*2 Nam quæ
vicina ſunt,
quæque com-
munia (vt ſu-
prâ cõmemo-
ratum) eſt ea
primùm ma-
ximèque af-
fici ſolent.*

Mox purgetur. Poſt purgationẽ, atq; etiam venæ ſectionem (ſi plenitudinis notæ eam præceperint celebrandam) ventriculo ſumptis & admotis pro- ſpiciendum: caput quoque roborandum, priùs ta- men vaporibus, ſi qui in cerebro conſtiterint, diſ- cuſſis.

De epilepſia.

CAP. 15.

*3 Doloris vi,
& labefacta
ta ſeu reſolu-
ta inſtrumẽ-
torũ ſperma-
ticorum reſen-
trix facul-
tate.*

Epilepſia cõuulſio eſt 1 corporis. Naſcitur, vbi humor craſſus & frigidus offarcit ante- riores ventriculos cerebri, ex quo vniuer- ſus motus, & veluti raptus totius corporis. Con- torta 2 facies, inuoluntaria 3 ſeminis effuſio, & in- terim affectio, quæ apoplexiæ proxima eſt.

*4 Cum ſepti-
meſtres ſunt.
5 Galen. cõ-
men. ad aph. 5
ſect. 1. lib. 6.*

Pueros ferè vexat, quo tempore dentire 4 inci- piunt, vnde puerilis 5 morbus ab antiquis appella- tus. Vt etiam lunaticus, quia interlunio nati ob- noxiũ huic morbo exiſtimantur, vt & qui concepti ſunt fluentibus 6 menſibus.

*τὸν ἐπὶ τῷ
μῶν.*

6 Ob impuritatem ex ſynathriſmo.

7 Perseuerat hic morbus ad 8 annos pubertatis, solusque consuevit in masculis, cum semen emittere incipiunt. In mulieribus, quum primum effluunt menses: quos annos si superat, desperata res est.

7 Aph. 45. li. 2. & 7. li. 5.
8 Si achorii capitis copia morbi occasione non tollat.

Nascitur aliquando consensu 10 stomachi, aut aliarum partium corporis. Aliquando spiritu quodam 11 virulento ex partibus inferioribus sublato in caput. Sæpe etiam primarius 12 cerebri affectus est.

9 Quod impressa maneat maligna in cerebro qualitas, que natura beneficio non potuerit emendari.

Quos vexat paroxysmus, sic habeto. Corpus, quod rapitur, loco lucido & 13 mediocriter calido collocato. 14 Sublimiori capite, ex quo membra 15 supernè deorsum confricari debent.

10 ut in pituita, & cholico.

Dentes, quos sæpe 16 constringunt, vnde etiam imminet 17 suffocatio, vel manibus, vel quauis alia ratione 18 diducendi sunt.

11 ut à corruptione seminis in mulieribus histericis.

Ex quo hac formula, & lingua, & palatum illinenda 19 sunt.

℞. theriacæ vel mythrîdatij ʒ. 4. dissolu. in ʒ. i. succi rutæ, cum penna, vel linteolo extremitati baculi alligato, palatum & lingua affricentur. Tum.

12 A pituita, & melancholico humore.

℞. benzoini, mumia, picis nigræ ana ʒ. i. vniantur cum succo rutæ, fiat suffumigium pro naribus: aut eadem simul liquefacta naso interiori inungatur. Vomitus, si fieri potest, excitetur oleo ex penna illito interiori parti oris. Alioqui perseuerante paroxysmo.

13 ut foras euocetur humor.

℞. cast. ʒ. 2. benzoini ʒ. i. diss. in oxymelitis scyllæ

14 ut reuocetur humor.
15 ut natus excitetur calor.

poralis muscoli, qui primum affici solet ob cerebri affinitatem. 17 A suppressione excrementi fuliginosi: vnde salina à spiritus prohibitione crassescit. 18 ut exitum habeat fuligo, & cerebrum aëris inspiratione recreetur. 19 Ad correctionem presentis symptomatis.

16 Ex conuulsione temporalis.

litici §. 1. β. cum cochlearidistractis dentibus ingeratur in gulam.

Dydimus Medicus extracto sanguine è pedis pollice labra epileptici inungebat. Orpheus & Archelaus contaminabant faciem ex quacunque parte corporis ducto sanguine. Atque ita statim exurgere epilepticos testati sunt. Pueris autem, sublato paroxysmo, remediis iam præscriptis prohibenda est mali generatio ac labes, abstinentia vini, usu frequenti pulueris confecti ex pœoniæ radice & semine. visco quern. puluer. contrà vermes, & saccharo candó: quibus etiam soluentia misceri possunt. vt. ʒ. rad. & sem. pœoniæ an. ʒ. 2. sem. contrà verm. ʒ. 2. rhei elect. ʒ. 2. sacchar. ʒ. 2. f. pulnis subtiliss. Detur ex cochleari semel aut bis in hebdomade, sereno cœlo, declinante luna, cum iusculo. Post paroxysmum clyster iniiciendus, qualis hic veterum.

ʒ. decocti aristolochiæ, centaurij minoris, vel calamenthi ꝑ. 1. in quo dissol. pul. hieræ picræ, pul. hieræ diacoloc. ana ʒ 3. olei cham. ʒ. 3. sacch. rubri, mellis communis ana ʒ 2. salis ʒ. 3. Post clysterem refouendi sunt cibus boni succi. Ex quò melicratum imperandum est ex hyssopi decocto, stœchados, calamenthi, aut syrupus acetosus, oxymel simplex, oxymel scylliticum.

Deinde purgandum erit cum hiera picra, & hiera diacol. Hæc enim purgatio maximè probatur antiquis.

Nec omittenda phlebotomia, si omnia consentiunt.

Iis verò, quibus inueteratur Epilepsia, ad cau-

20 Si magnitudo causæ hoc postulet, materia organica, cerebrum oppressio, hypochondriorum obstructio.

tionem, venam ²¹ è malleolo diuides veris initio. Iam progressio vere, melicrato hyssopi, aut simili præparabis, & vt prius, purgabis. Aut, vt veteres voluerunt, amplissimam colocynthida cauabis, reiectis seminibus, & interiore materia: tum vndique ²² induces pasta. Deinde cauatam colocynthida, passo, aut alioqui vino dulci implebis, adiectis quatuor foliis rutæ, & ²³ obolo cinamomi, efferuetur vinum in calidis cineribus: deinde per noctem finetur in colocynthide. Postridie per linteum benemundum percolabitur, & bibetur.

Post purgationem reficiendum corpus est. Post tres dies, inde cucurbitulæ in hypochondriis affigendæ: deinde sacapulis cum scificatione. Aliquot diebus interiectis, iterum purgandi sunt, ex eoque cucurbitulæ occipitio affigendæ: caput radendum est, aut certè derundendum.

Comparanda ²⁴ cucupha, & per interualla purgandum, vt etiam Autumno ad helleborum veniendum sit. Hoc modo veteres helleborum propinabant.

℥. fibrarum radices hellebori ʒ. 2. distemperentur in ʒ. i. melicrati: deinde siccentur in vmbra, & puluerisentur: tum adiecto eodem pondere piperis, modico melli misceantur, vel è mulla propinentur. Galenus libro primo de compositione medicam. *℥. τοπος* plurimum commendat hieram ²⁵ vt pil. ex hier. pura.

Quinetiam in epilepsia à pituita inueterata hac præsertim veteribus solennia fuisse remedia. vt. *℥. ther. veter. mybri-dati, an parteis aequal. rad. enule-camp. n. lb. b. salvia, stachados, beton. ana ʒ. lb. Temperetur per noctem* vino maluatico: deinde fiat aqua stillatitia, manè vtatur. Aliud ex Aëtio. cap. 16. Tetrabibl. 2. Sermon. 2. *℥. veratr. nigr. castorei, scam. ana ʒ. 2. opopanax. cumini thebaici siue regii, centaur. nitr. sulph. viui, abroton. ammoniaci thymiamatis, sem. ruta syluestr. ana ʒ. i. confusa & cribrata excipiantur mulla organata. f. pil. ad magnitud. fabæ Aegyptia.*

DE MORB. INTERNIS

diacolocynthidos, quæ helleborum recipit. Tentatis itaque lenioribus remediis, non est metuentus 26 vsus hellebori. Post hæc sternutatoriis, quæ puluerem 27 rad. pœoniæ recipiant, & masticatoriis vtendum erit.

26 Cum delectis prescripti.

27 vt vene nata aura ex hauriatur.

28 Ratione vsus veneris, nõ spermatu.

29 Cum tantum agitur de vi cerebri restituenda.

30 vide Rhazem lib. 9. ad Almanf. cap. de Epilepsia.

Sanguisugæ etiam fronti, & per ambitum capitis, affigendæ sunt. Fuerunt in veteri Medicina, qui eunuchismum, id est, castrationem 28 maximè probauerint.

Formula sternutatorij.

℞. pyrethri, pul. rad. pœoniæ ana ʒ. 2. nucis moschatæ ʒ. 1. hellebori nigri puluerisati ʒ. ʒ. fiat puluis, qui insuffletur in nares. Eadem quoq; præter helleborum, mastiche incorporata masticatorium efficiunt. Vsus conseruæ acori, aut stœchad. theriacæ, mythridatij, maximè conuenit, idque 29 iam purgato corpore. Electariû quoq; Rhazæ, cuius 30 hæc est descriptio.

℞. pyrethri, seseleos, stœchados ana ʒ 10. agarici ʒ. 5. cordumeni recentis & acuti, assæ optimæ, aristolochiæ rotundæ ana ʒ. 1. ʒ. excipiâtur omnia melle scyllitico. Detur auellanæ magnitudine ieiunis.

Galenus in libello de consilio in comitialibus cõquassatam scyllam in vase melliteo, id est, in quo antea mel repositum fuerit, aut alioqui coctum, recondit: vas pelle inducit, & fideliter occludit: tum meridiano soli obuertit, prohibetq; Aquilonibus: subinde aliter atque aliter obuertit, vt omni ex parte radij solis vas calfaciât. Scyllam colligit sub cane, quo tempore mel scylliticum præparatur, sinitque quadraginta 31 diebus. Postremo aperto vase, liquor, qui è scylla desudauit, excipitur, & melle ad-

31 Toto tempore canicula.

dito dulcatur. Dosis paruulis 3.℔. aliis, 3.2. Materia reliqua scyllæ cum melle subigitur, atque eodem modo, sed non tam vtiliter epilepticis imperatur. Alii succum scyllæ pari mellis ponderi commiscēt, vt fiat mel scylliticum. Efficacissimum istud erit electarium,

℥. ossis caluariæ humanæ 3.℥. seminis pœoniæ mascul. radic. eiusdem pœon. an. 3.2. saluæ. hyssop. rut. sicc. ana 3.℥. flor. rub. anagall. & borrag. ana p.℥. seminis atriplic. 3.℥. vngul. asini tusæ, talisuiilli an. 3.2. rasuræ eboris, cornu ceru. corall. rubr. an. 3.2. daimargarit. frigid. & calid. an. 3.℥. f. puluis ex omnibus. Deinde incorporentur in conseruæ anth. & borragius an. 3.℥. f. mellis cum aceto scyllitico ad crassitudinem cocti 3. 2. theriacæ & mythridatij ana 3. 2. Pueros vero clementiùs habere oportet.

In primis vitæ ratio nutrici 32 instituenda est, quæ generet lac vtile, ac paulò calidius, & siccius, quàm temperatum sit. Pueri corpus molliter 33 fricandum est, & inungendum, tum etiam caput detonsum ex oleo anethino, rutaceo, de maiorana, irino, adiecto pulueris momento, cyperi, aut ireos. Cucupha quoque comparanda.

32 Condiantur. tusculana hyssopo, saluia, & similibus.
33 vt fiat corpus & detonsio-
gitur.

℥. cyperi, ireos florentiæ ana 3.2. sem. seseleos, & pœoniæ ana 3.℥. capill. ven. flor. anthos, & chamæm. ana 3.℥. macis, cinamomi ana 3.8. Fiat puluis pro cucupha. Sedes pueri 34 inungatur melle, & succo rutæ, vel salis granum immittatur podici.

34 vt ei feratur aluus. Qui enim crassiores sunt, aluo quoque adstrictiore, q̃, vt plurimū, sunt epileptici.

Paretur electarium ex butyro, & saccharo, quo etiam nutrix papillas mammarum illinat.

Comparetur mel passulatum hoc modo.

℥. aga. trochiscat. 3.℔. infundatur in aquæ 1℔ 3.

DE MORB. INTERNIS

agaricum detrahatur in eadem infusione: detracto agarico, passulæ bene pingues distemperentur, dum turgeant: turgidæ in noua aqua coquantur: ad extremum coctæ exprimantur in aqua, in qua coxerint. Expressio cum aqua rursus coquatur ad mellis crassitudinem. Paulò adultiores, vt qui secundum, aut tertium annum superant, passulis, prunis, ficibus eo modo maceratis vti possunt.

Iisq; electariis, & passulato melli puluis pœoniæ & hyssopi adiici potest. Purgentur ex 3.3. cassiæ,

35 Cassia nō 35 ex manna, & penidiis præparatis, vt antè dictum est.

Radix pœoniæ in taleolas discisa, & ita transfixa, filo suspendatur è collo.

Syrupus acetosus, melicratum, absynthij decoctum, cicerum rubrorū, vomitus iisdem cōueniunt.

EIVSDEM HOLERII SCHOLIA.

Caducum, à cadendo, Comitalem, à Romanorū Comitibus, Lunaticum, quòd motu lunæ commoueat, vel interlunio natos corripiat, vulgò hunc affectum vocant, Auicenna puerorum matrem, nominibus impositis, habita ratione, vel symptomatum, vel loci, vel causæ efficientis, vel eorum, qui eo frequentius solent corripì, vt pueri. Apud Græcos tamen ferè semper à magnitudine nomen accepit. Επιληψία enim dicitur, quòd sensum atque mentem pariter apprehendat, Antiquioribus *ἰεὺς νόσος*, id est, sacer morbus, quòd eius magnitudinem, vt ait Galenus, designarent: *ἰεὺς* enim magnitudinē significat. Quamquam significationem etiam alij afferunt, vel quòd diuinus sit morbus, & à diis immissus in vindictam: vel quòd sacrum occupet animam, vel in capite fiat, tanquam animæ loco sacro. Ob eandem causam Hippocrati *Ἡρακλεία νόσος*, nominatur: non quòd Hercules, vt ait Galenus, eo morbo laborârit, sed vt eo

Επιληψία.

Gal. cōment.

6. in libr. 6.

Epid. sent 7.

Ἡρακλεία νόσος.

nomine τὸ Ἀνοκταμᾶχτον designaret: licet, authore Aristotele, reuera Hercules epilepticus fuerit, veteribus *Aretaus ad- Elephantiſm* quandoque dici, quòd nullo remedio ſu- *dit.* perari queat. Ab omnibus morbis frigidis capitis distin- *Aristot. ini-* guitur potiſſimum vehementi & inæquali corporis cõ- *tio ſect. 30.* cuſſione, & ſpumâ in ore collecta. Quæ tamen nota in *Problem.* leuiori morbo non apparet, vt eo, qui excitatur ob tenuiorem materiam, & fumû acrem. Facile enim & citò ſoluitur. Eſt autem conuulſio omnium partium corporis non perpetua, ſed per interualla, cum mentis & ſenſus oblæſione. De cuius cauſis, generationis modo, ac loco non eadem eſt omnium ſententia. Veterum enim præ- *Epilepſia* pè omnium communis conſenſus eſt, ab humore crasso, *cauſa.* viſcoſo, & ferè ſemper frigido procreari, obſtruente (vt quibuſdam placet) medium ventriculum cerebri, vel (vt aliis) poſteriorem, vel vtrûmque, vel modò vnum, modò alterum, vel etiam primum: atque ita fieri, vt interceptis viis, ſpiritui ad neruos non pateat aditus. Addunt nonnulli, non ſine probabili ratione, quandoque id cõtingere ob anguſtiam meatus à poſteriore cerebro ad ſpinam, vel imperforatam, aut ſtrictiorem lacunam ad palatû, aut ad nares. Et certè Galenus de vſu partium ſcribit optimè comparatum eſſe à natura, vt per decliues cerebri meatus, tum per palatum in os, tum per corpus narium, oriſiciis perſpicuis ac magnis, pituita, aut alia cerebri excrementa excernantur, ne animal frequenter corripiatur epilepſia: videmûſque per illam viam expurgari materiam, quæ epilepſiam excitauit, ac ſpumam ex ore educi. In contrarium tamen multa à doctis afferuntur.

Primum ab intemperie fieri non poſſe videtur, ſine *Epilepſiam* vapore aut humore. Citiùs enim interirurum eſt animal, *à ſola nō fieri* quàm ad tantam perueniat intemperie. Hoc enim mo- *intemperie.* do corpus non cõuelleretur: ſed ab omni proſus actione deſiſteret. Licet Hippocrati duæ conuulſionis cauſæ ſint, plenitudo & inanitio. Quod de particulati intèlligendum videtur. Hæc autem & vniuerſa eſt, & mentem ſenſûſque omnes oblædit. Nam ſine mentis læſione cõuulſio, etiamſi totius ſit corporis, epilepſia non eſt. Neque ab humore crasso. Cita enim ſolutio, materiæ & pau-

DE MORB. INTERNIS

citatem & tenuitatem indicat, quòd crassa difficilè moueantur. Idem demonstrant oscitatio, sternutatio, spumę per os exitus, tenuioris materię indicia. Fit enim spuma, cùm frequenti inspiratione & expiratione, violentoque motu aqua tenuis agitur, & spiritu, aut substantia quadam vaporosa comprehenditur. Accidit quoque frequentius ingeniosis hominibus, ob tenuem cerebri substantiam valde sensilem, victus rationem vaporosam, flatus, vinum fumosum, & similia. Adde omnem epilepsiam per consensum à tenui substantia oriri, vt vaporibus bilis flauę & porraceę, eorundem agitatione & acrimonia, fumis, odoratis, aëre, vel vento per nares concepto. Videtur ergò causa esse pituita tenuis, spumosa, bilis flaua, atra tenuior, aut eius ichor, vapor acris, odor ob cerebri exactiorem sensum. Neque etiam fit obstructione spirituum transitum impediēte. Oporteret enim vel motum in vniuersum prohiberi, vel minui, quātitate spirituum, qui transeunt, non sufficiente ad partes inferiores mouendas. Sed vehementior, quā antè, apparet concussio, & motus inæqualitas. Probabilius multò, cerebrum in seipsum contrahi, vt expellat, quod noxium est, sicuti in sternutatione, quę veluti parua quædam epilepsia est, vt rectè dixit Auicenna. Sed in hac excutitur, quod est in anteriore parte cerebri iuxta narium foramina. In illa, quia in posteriore parte materia subsistit, difficilior materię dissipatio, vnde pars affecta, & generationis locus intelligi possunt.

*Auicenna
seu. 1. libr. 3.
Tract. 5.
cap. 8.*

Cognoscimus à pituita fieri, si æger frequenter expuere solet, si somnus longior, & profundior, si ingenium stupidius, ex victus ratione, excrementis, actionibus, colore, & similibus. Contraria fiunt in biliosis. De ea, quę per consensum fit, dicetur sequenti capite.

A dextra parte incipiens cum tinnitu aurium, clamore, stridore dentium, eiectione seminis, vehementi concussione: & quę ab ineunte ætate consenuit, aut hæreditaria est, grauissima, & quę vix curari vnquam possit.

Contra, breuitas paroxysmi, accidentium paucitas, recordatio, verecundia, & si sine spuma fiat, facilèq; rutę, vel hyssopi, aut similium odoratu recedat, hæc omnia morbi facilitatem indicant. Soluitur aliquando, mutata

etate, victus ratione, & superueniente quartana: in grauidis, edito foetu, mensium profluuiio.

In pueris, quos hic morbus frequentius corripit, nutrici imprimis prospiciendum. Utatur nutrix incidente & attenuante victu, ut lac subtilius, & calidius efficiatur, ut nuper diximus. Fiant sacculi apponendi capiti è cypero, iride Florentina, capill. ven. Ex iisdem cum oleo anethino, rutaceo, irino, aut amaracino calidis inungatur caput, non abluatur. Sed prius detergentibus melle & aphronito cum tepida leniter eluatur, siccat.

Quæcunque potu iuuant epilepticos, facultatis sunt incidentis. Interim tamen quæ vires robovent non omit-tenda. Cruditas vitetur.

*Gal. lib. 10.
de simpl. me-
dicam. fac. °*

Conueniunt in maioribus natu, & à sanguine, clysmata, sanguinis missio è cephalica, prouocatio hæmorrhoidum, mensium: in pituitosis, oxymel scyll. syrup. de pomis comp. pil. ante cibum, syrupi concoquentes, purgato à pituita & cruditate ventriculo, prouocatio vomitus (licet Galenus contra Erasist. vomitionibus, interdicit, quia manifestè caput replent) repetita purgatio, pilulæ addito castoreo, theriaca, mythri. (nisi metus sit à calidis) opiatæ, diætæ, caput purgia cum succo sampsuchi, pyrethro, zinzibere, radice pœoniæ, suffumigia, cauteria. Nocent Cassia, Catholicon, radix, vel succus api, quo tamen Galenus vitur in consilio epileptico.

A tota proprietate valent, & huic affectui maximè accommodata sunt, scylla, enula câpana, syrupus de pomis, pilulæ de euphorbio, pœoniæ radix & semè luna descre-scète collectû, viscus quern. maximè verò eius radix, selseli, coagulû leporis, cinis cuculi, cranium hominis, ossa humana nesciëtibus data potui (valent etiam in arthritide) cornu alces, aqua gallitrici, theriacalis, agar. troch. semè palmæ Christi, vngula asini, vesica apri, talus suillus, cor talpe, flos anagallidis rub. corallus, smaragdus, hyssopus, inquinatio oris è sanguine ægri, splen equi, cerebrû cameli, & mustellæ, lapis pulli hyrundinis, oleum phil. de gagate. Nō video tamè cur Gagatinû oleum epilepsiâ tollat, cum scripserit Aretæus in principio capitis imperfecti de comitiali morbo rerû graueolentiâ, ut Gagatis lapidis odoratum, homines nonnullos prosternere, & epi-

DE MORB. INTERNIS

lepsiæ præcípites dare : nisi fœtore suo iam accessione conflictatû agrum excitet : vel (quod scribunt, rei Chymisticæ professores) quia epilepticam materiam oleum istiusmodi attenuat, digerit, siccât. Ex Euanonymo cap. de oleis è metall. laterib. succino & gagate. Balsamum, ol. de piperibus, de cucumere asinino naribus inditum, vtil.

Cæterum lapidem pulli hyrundinis sic comparabis. Dissectis ex prima fœtura hyrundinum pullis ante plenilunium, in ventriculis eorum lapillos duos inuenies, alterum versicolore, alterum vinicolore. Hos, priusquàm terram contigant, in cerui aluta colligato. Brachio & collo gestati epilepticis medentur, attestante

Dioscor. cap. Dioscoride.

49. lib. 1.

Pueros saepe vexat] Pueris familiaris duabus de causis: vna, ob multitudinem humoris & vaporum, vnde etiam in illis somnus multus, & profundus, vt scribit Arist. de somno & vigilia: alterâ, ob vermiû putrescentium tetrum vaporem ad cerebrum ascendentem, aut eorundè viuorum, sed materiam commouentium. Auicenna scribit, ab epilepsia ferè tutos esse, quibus in capite fiût vlcera, apostemata, fluxus narium. Nutrici imperandus aquæ

*Aristot. sub
finem libelli
de somno &
vigilia.*

potus, vt etiam Arist. præcepit, vel hydromel, victus attenuans, abstinentia à coitu, ne lac corrumpatur, aut eius materia alteretur, purgatio humoris peccantis, exercitium, electaria, lac asininû, in quo cocta sint, vel infusa, quæ affectui conueniunt. Pueris verò puluis cum melle aut lacte, cauterium in posteriore parte capitis, præsertim si sint obesiôres, puluis inspersus capiti. Grandioribus, clysteres leuiter purgantes & attenuantes, syrapi, potio purgans, bolus. In vermibus, quæ necant vermes, vnguenta ex amaris admota non ori ventriculi, sed vmbilico. Mythrîdaticum & theriacam, tanquàm fortiora, Galenus vituperat loco superiùs citato.

Scapulis cum scarifica.] Petrus Merenda scribit in comitiali morbo admodum vehementi, exiguo interuallo sæpiùs repetête, nec aliis remediis cedente, se quàmplurimos per admota collo propè scapulas rubrificatiâ medicamenta, donec vesicæ excitarentur, breui temporis spatio ad priistinum rationis vsûm frequêter perduxisse, & ab accessionibus liberâsse, qui deinde decenti curatione,

tionē, ad integram sanitatem perducti fuerunt. Sed hoc faciendum esse post purgationem, nisi morbus virgeat. Sed neque hæc, neque setones, neque cauteria conueniunt circa caput, nisi morbus cerebro sit essentialis, vt fiat diuersio à cerebro.

ANTO. VALETII EXERCIT. XV.

EPilepsia morbus est quodammodo apoplexiæ proximus, cū idem locus in vtrōq; patiatur, & idem humor in causa sit. Verū apoplexia ob omnimodam carentiam illius, quæ ad neruos defluit, potentiæ, epilepsia propter motum vitiosum generatur. In hac enim cerebrum (si primarius sit, & per cerebri essentiam affectus) materiam sua vel crassitie medium & postremum cerebri ventriculos obstruentem, vel maligna qualitate obludentē, excutere nititur: vnde omnium sensuum & facultatū animalium offensio, saltuosorum motuum, atq; conuulsionis corporis totius consequutio affertur.

*Gal. comment.
ad aphor. 45.
lib. 2.*

*Galen. cap. 5.
lib. 3. de loc.
mal. affect.*

Epilepsia aliàs grauior, interdum mitior. In qua stertor, dentium stridor, partium faciei peruersio, corporis totius iactatio vehemens, spuma multa, seminis effusio, & in ipso casu acclamatio, ea grauis admodum cēsetur, & ferè incurabilis. Statim enim iugulat & accessionum continuatione, & symptomatum vehementia. Vbi verò vel multa, vel pluri-
*Paul. Aeg.
cap. 13. lib. 3.*

In curatione duo tempora maximè obseruanda, Epilepsia paroxyismi vnum, intermissionis alterum. In priori videndum, vt quàm citissimè paroxysmus soluatur: quod fiet, si corpus primū colligatur, mēbra extendantur, iniiciantur primū vincula dolorifica

curatio.

in articulis brachij, & crurum: theriaca, mythrid. confectio hieræ simplic. sinap. in os indantur: in aures & nares oleum rosmarin. aut anisi, aut saluæ arte chymica factum immittatur: eodẽ futuræ coronalis & lambdoïdes inungatur. Hũc pertinebũt & artuum frictiones, vt in apoplexia, & clysteres, cũ in ipsa accessione, tum extra accessionem iniiciendi. Qualis hic est.

℞. radic. fœnic. ireos, pœon. ana ʒ. 2. rute, absynth. salu. beton. hyssop. maioran. ana M. ʒ. flor. stœchad. vtriũque & beton. ana p. 1. f. decoct. & col. ad ʒb. 1. In qua dissolue confect. hier. & diaphœnic ana ʒ. ʒ. sacchar. rubr. ʒ. 1. vel ʒ. 10. ol. chamæ. & rut. ana ʒ. 1. ʒ. sal. gemm. ʒ. 2. f. clyster.

In intermissionis tempore prouidendum ne repetat paroxysmus. Id cõmodissimè fiet victu calfaciente & exsiccante, purgantibus medicamẽtis, sed apparata prius cum syrup. accõmodatis & cephalicis aquis materia, vel hoc apozemate.

℞. radic. scyll. præparat. angelicæ, enul. camp. pœon. mar. acor. radic. ireos. Florent. ana ʒ. 1. polypod. quern. semin. cartham. passul. mund glycyrrhiz. ras. ana ʒ. 6. beton. hyssop. thym. chamædr. chamæpyth. visci querni, melissophyll. ana M. 1. seminis seseleos, pœon. mar. ana ʒ. ʒ. semin. anis. fœnic. ana ʒ. 2. flor. anth. genist. cardiacor. ana p. 1. ʒ. salu. maiora. ana M. ʒ. f. decoc. ad ʒb. 1. In colatura diss. syr. de hyssop. de bizaantiis, & oxymelitis simpl. ana ʒ. 1. F. apoz. clar. conditum cinam. vt dec. pro dosib. ʒ.

Ex huiusmodi decocto licebit syrupũ solutiuum, magistralem vulgò dictũ, conficere. Vt si in quartar. 3. colaturæ superioris infundantur turpethi benè gummo. ʒ. ʒ. cum tantillo zinzib. folicul. senn. mundator. ʒ. 2. agar. ʒ. 1. cinam. parũ: & expressione post leuiusculã ebullitionem facta, addatur syr. laxa. ros. pall. ʒ. 2. sacch. q. ʒ. Huius syrupi ʒ. 1. ʒ. vel ʒ. 2. dabuntur bis in mense cũ aq. buglos. vel beton. Quæ dosis

aluū si ſegniū moueret, diaphœn. 3. 2. addi poſſent.
Sed & poſt inſtituti apozematis uſū ſic purgabitur.

℥. radic. & ſemin. pœon. mar. ſem. ſœnic. ana 3. 2. fol.
hyſſop. beton. capill. ven. ana M. i. flor. cardiac. p. i. f. decoct. ad doſ. In colatura infund. agar. trochiſ. ʒ. 4. fol.
ſenn. mund. 3. 2. cinam. parū. In expreſſione diſſol. hier.
ſimplic. 3. 2. ſyrup. capill. ven. 3. ʒ. f. potio.

A purgatione ſi miſſione ſanguinis opus videatur,
ſecabitur malleoli vena, vt ex lib. Galen. de cur. rat.
per ſang. miſſion. præcepit Autor. Mox verò robur
capiti conciliandū eſt ſumptis & admotis. Sumuntur
electar. conſeru. opiat. condita, quæ non modò
vires reſciant, ſed etiā morbi cauſam oppugnēt. Vt.

℥. conſeru. bugloſſ. borrag. anthos ana 3. i. ʒ. conſect.
alkerm. 3. 2. electar. læt. Gal. & de gemm. ana 3. ʒ. pulu.
radic. pœon. ariſtolo. ana ʒ. i. raſur. ebor. corn. ceru.
corall. ana ʒ. 2. cum ſyrup. de hyſſop. f. opiata.

Hanc dicebat Syluius ſibi omniū ad epilepticos
confectionum inſtar eſſe. Dabat ad nucis auellanæ
magnitudinē manē, aut veſperi dormituro. Huius
loco hæ tabellæ uſui erunt. ℥. myrrh. elect. corall.
rub. raſur. corn. ceru. & ebor. ana 3. ʒ. ſemin. pœon.
mar. viſc. quern. & cran hum. interioris ana ʒ. i. cum
ſacchar. in aq. bugloſſ. diſſolut. f. tabell. pond. 3. 2.
Aeger cap. vnam manē, aut ſerò.

Interim errhina & apophlegmatifmata ad pituitæ
deriuationē: ſacculi, ſuffitus, lixiuia, litus ex oleis
conuenientib. ad confirmationē capitis conferent.

His omnibus ex arte adminiſtratis ſi perſtiterit
affectus, oportunum erit guaiaci decoctū, vel radic.
Cynaræ, vel Salf. Parillæ (addit. radic. pœon. angelicæ,
& al. cephalicis) bis in die, manē & veſperi,
dare: quod præterquā quod incidit, tenuat, exſiccet,
malignam quoq; qualitatem, quæ hîc ſuſpicionem non

caret, abigit. Dein iterāda purgatio. Postremò his si remediis æger non leuetur, ad cauteria cōfugiendū carneā brachij parti, vel extremo occipiti, vel post aures, admonēda, aperto diu vlcere, recidiuē metu.

Cæterum, si infans fuerit qui ægrotat, quanquā nihil moliendum videatur, quòd ætate ad biliosiorē siccioremq; statum transcente, & victu moderatiore adhibito, sua plerunq; sponte morbus euanescat, proderit tamen puero certā vitæ legem nutritrici præscripsisse, vini & veneris vsuram subduxisse, imò & catharticum exhibere. Quinetiam puero aliquid syr. laxat. ros. pallid. cum pulce poterit exhiberi. Mox infantuli caput hoc inungetur linimēto.

℥. ol. iirini & aneth. ana ʒ. ʒ. rad. acor. fol. absynth. & rut. puluerat. ana ʒ. ʒ. cum cera pauca f. linim.

Nec omittenda sunt τὰ φυσικὰ βοηθήματα, quæ appellant amuleta, diligenter ab Autore è veterum monumētis petita. Hunc nodulum Syluius præscribebat, cuius vaporem demissis in sinum naribus epilepsiæ obnoxius inspiraret.

1 Ad reuocandum cursum, & prohibendā generationem. ℥. semin. pœoni. & rad. visc. quern. corall. rub. ana ʒ. 2. f. nodul. aut saccul. collo gestandus, &c.

De epilepsia per consensum à stomacho. CAP. 16.

2 Si nō detur secandi venā occasio. S Anguis è 1 poplite, vel malleolo trahatur, aut eodem 2 loco fiat scarificatio: sæpe repetitā purgatio ex his 3 pilulis.

3 Cum cephalicis, tum stomachicis. ℥. pul. hieræ picræ ʒ. 2. agar. trochis. rh. electi ana ʒ. 1. mastichis, santal. citrini, macis, ros. ana. Gr. 6. cum succo citri fiant pilulæ: 4 aut idem puluis incorporetur in ʒ. ʒ. catholici, vt fiat bolus.

4 Hæc quoque spectant catapotia ex rheo & aloë confecta. Aut omnia dissoluantur in sero caprino, vel decocto cicerum rubrorum. Inungatur stomachus

Paul. Aeg.
cap. 13. lib. 3.

cum olei mastich. 3. l. coralli rubri, & pul. rad. pœoniae ana ʒ. 2. Corallus, radix pœoniae, Iaspis viridis, 5
 ē collo suspendantur, vt contingant stomachum. *Vt materia morbifica generatio prohibeatur, tollaturque collectio.*

Cæterum materiæ morbi habenda 5 ratio est. Quibusdam enim 6 gracilibus & iracundis in icinio influit in stomachum admodum sensilem sanies biliosa. Quibus panis per se, si non siciunt, 6 Quibus alioqui ex vino albo tenui, diluto, austeriusculo, aut lata sunt venæ vino granatorum remedio est. *na.*

Aliquando crapula in causa est. Nonnunquam humor crassus, & frigidus. His supradicti syrupi 7 incidentes conueniunt, eadem quoque 8 purgatio, & vomitus. Quod si ex spiritu venenoso, qui ex parte aliqua in caput attollitur, præliganda 9 pars est, Cucurbitula affigenda loco. *7 Vt oxymel. simplex & scylliticū. 8 Ex hiera vtrâque. 9 Vt aditio ad cerebrum prohibeatur spiritus ille venenosus.*

Locus 10 theriaca, mythridatio, contrita anagallide ruffa inducendus est: vicinia in vesicam attollenda ex sinapi, pipere, euphorbio, incorporatis 10 Vnde tollitur aura venenata. theriacâ, vel melle anacardino.

Quod si locus præligari non potest, vt matrix, renes, cucurbitulis vtendum erit cum scarificatione. 11 Pilulis iâ. Postea purgandum 11 est, si fuerit opus: & emplastrum, vt prius, ad regionem partis 12 apponenda. *12 Et, si histerica sit mulier, histerica erunt præscribenda remedia.*

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Epilepsia aliquando fit in cerebro tantum, sine vlla partium subiectarum cōcussione, sed solius capitis. Quod rarum est, à me tamen annotatum & obseruatum in sacerdotē quodam annos 30. nato. Illud Medicis visum est cōtingere maligna aliqua materiâ in dextro ventriculo contenta, præsertim cum in dextrâ partem caderet. Sæpissimè fit per cōsensum, tū ob causas superius dictas, tum propter auram ex aliqua parte ad cerebrū sublata.

DE MORB. INTERNIS

Scoti epilepti ei historia. Florentis ætatis nobili Scoto, Iacobo de Flamin, pilo rufo, è sura dextra, veluti gutta crâpa (vt vulgò appellant) incipiebat: inde totius corporis concussio cum spuma. Soluebatur vomitionibus biliosis, eòq; affectu corripiebatur declinante luna ad interlunium. Monachus. De chantecler Parisiensi, annorum 30. corpore nigro & piloso, è malè curato liene in febre continua vapor quidâ menstruis interuallis cum tumultu exiliebat. Qui vbi ad sinistram mammam peruenerat, modò pronus, modò supinus concidebat sine sensu & motu. Postea confriatis aceto temporibus, oculos aperiebat, manu locum dolentem ostendens, & pavos, non loquens. Liberatus paroxysmo noctem consequentem insomnem ducebat. Carnotensi adolescèti è minimo digito sinistro ad regionè cordis perueniebat: vnde palpitatio. Hinc ad caput, vnde casus. Aurâ ascendète manus conuellebatur. Alteri Scoto annorû 20. incipiebat à tremore dextrî brachij, ad mammam progredièdo: vnde cõuulsio sine sensu, memoria, & voce. Renocabatur cibo & potu, quæ non sentiès quoque deglutiebat. Multis fit primùm tremor & conuulsio brachij, deinde capitis cõcussio. Anno 1555. Martij. 8. die, in adolescente Picardo annos nato 15. à torpore manus dextræ initio accepto, contrahebantur tres primi digiti: index vi extèdebatur. Ita cadebat obtorto obliquè brachio, & corpore inflexo. In alia, ab articulo kumeri mali initiû: deinde tremor totius brachij: ex quo adstrictio dentium & casus. Multis à crapula, aliis à venere, aliquando à tumoribus commouentur cõuulsiones epilepticæ, Sæpissimè ab vtero, vel ob imprægnationem, vel retentionem aut corruptionem spermatis, vel secundinæ. Ab inedia etiam huic morbo inimicissima, vt quæ inter ea, quæ caput replent excellat; vt inde quoque brachia, manûsque vehementem tensionem sentiant, & imbecillior. Stomachus grauitè offendatur, vt scribit Galenus.

Gal. cap. 5. lib. 1. de loc. aff. & cap. 7. lib. 3.

Varia est horum omnium curatio. Ligatio suprâ locû, sanguinis missio è vena proxima, cauterium, vel vesicatoriû in parte affecta, ita vt vulnus diu relinquatur apertû, oxyrhodinû capiti affusum, frictiones in paroxysmo, fumigia, succus rutæ vel trifolij naribus impositus, vel, vt

vult Apuleius, succus anagallidis rub. cum melle, vel ireos, vomitiones ventriculo pleno (alioqui noxiæ, vt Gal. docet) sternutatoria post purgationem: in ieiunis, vel ira melicratum, vel mica panis vino intincta: in ventriculo affecto, leuia medicamenta (nam à fortioribus semper læditur) pilulæ, opiata, pulueres à pascu, emplastra, sacculi, tryphera persica in vteri affectibus, pessaria, eductio eius, quod retinetur, corroboratio vteri: in grauidis, emplastrum pro matrice, vnctio, sacculus, &c.

Agarici.] Non ita magna vis purgandi inest agarico, nisi in magna dosi. Huic affectui mirum in modum conuenit. Ventriculo tamen infirmo, colicis doloribus opportunis, nauseabundis initio morborum phlegmaticorum non exhibendus. Propterea Auicenna in quartanæ phlegmaticæ curatione gradatim peruenit ad agaricum, cui suffragatur experientia.

ANTO. VALETII EXERCIT. XVI.

Epilepsiam esse per cōsensum à ventriculo, mor-
dicatio, nausea, cibi inordinati appetētia, osten-
dunt. Eius curatio traditur à Gal. cap. 5. lib. 5. de loc.
mal. affect. cum historiam de Grammatico recitat.
Humor vitiosus, qui ventriculo continetur, hac
potione excluditur.

*Epilepsia ex
consens. vtr.
curatio.*

℞. hieræ simpl. & diaphœn. an. 3. 2. syrup. de absynthi
vel ment. 3. 1. vel 3. 6. aquar. beto. & hyss. an. 3. 1. ℞. f. potio.
Vel si vomitus satis esse videatur, cōcitabitur ex pé-
na oleo illita, & in œsophagum immissa, vel vomito-
rio. Subinde etiam idem ventriculus repurgādus.
Roborabitur assumptis, electar. aromatic. ros. dia-
rhod. triasantalo: admotis, vt litu ex oleo nucis mos-
chata, mastich. cydon. &c. Quod si sit epilepsia à
venenata aura ad cerebrū conscendēte, fortis supra
transmittētem partem ligatura, eaque altior paulò,
ad vaporis ascensum inhibendum, conueniet, & le-
pidium emplastri modo parti adhibitum, quò virus

*Epileps. à ve-
nenosi vapo-
ris ad cerebr.
ascensu cura-
tio.*

DE MORB. INTERNIS

1 *Quæ deli-* exhalare cōmodè queat. At si caput iam obfessum
viū est febris sit; emplastra ex alto trahentia, aut ruptoria, ad co-
expers cum ronalem futuram admouenda. Interim cardiaca,
tristitia & cū sumpta, tum applicita iuuabunt.
metu sine cau-

sa manifesta
coniunctum.

2 *Suo tēpera*
mēto imutati

3 *Non pitui-*
tam. Sanguis

enim materia
est humoris

melancholici,
tūc venenata

qualitate af-
fecti. 4 Hu-

moris sangui-
nei soboles

per adustione
5 Quorū sus-

fusio stabilis
est ex natura

lis vitio acco-
nomia.

6 *Per syna-*
thrismum seu

collectionem.
7 Per genera-

tionem.
8 Et ij distē-

tas habēt san-
guine venas,

cum habitu corporis extenuato, squalido & sicco. 9 Ex melancholici humoris

in hypochondriis synathrismo. Hæc verò melancholia ructus & flatus cū di-

spepsia habet conuinctos. 10 Qui liber Galeno tribuitur. 11 Ad declinatio-

De 1 Melancholia. CAP. 17.

Melancholia nonnūquam vitio cerebri 2 &
 capitis, quod cū calidius fit, sanguinem 3
 adurit, atque eo adusto fumi melancholici
 animum exagitant. Eiusmodi enim facie ferè sunt
 admodum rubente, rubore quidem saturato, & tã-
 dem liuescente. Quibus etiam aliquando adnascū-
 tur 4 pustulæ. Deinde etiam, qui flauo sunt 5 colo-
 re, quibus caput calidius, bilem adurit.

Alij verò 6 vitio lienis, aut 7 hepatis, melancho-
 licum sanguinem toto corpore 8 colligunt.

Tertium genus melancholię est, quæ hypochon-
 driaca dicitur. Horum omnium signa & phantaf-
 mata ex libello de 10 melancholia Aëtius trāstulit:
 quædā etiam Aurelianus annotauit in Chronicis.

Itaque initio mali repellentibus vtēdum est, oxy-
 rhodino, aut mixta materia media, vt chamæmeli-
 no, & quæ de Soda dicta sunt: multò magis, si non
 intemperies sola adsit, sed & aliqua obstructionis
 suspitio comitetur. 11 Phlebotomiam omnes ferè
 imperant, atque in primo genere 12 cephalicam:
 in 13 secundo ac 14 tertio, mediam præferunt.

15 *Medianā vulgò dictam, quā æquè vacuatur à capite, ac è toto corpore, ad*

Hippocrates in libello de virginibus scripsit vir-
gines interim fieri melancholicas, resistente men-
strua purgatione: idque multò magis, si vruntur a-
moribus. Idem quoque viduis accidere consuevit,
dum curis & mœrore animum conficiunt. In his
enim ex vehementi animi motu cerebrum laborat,
atque ideò infirmatur. Refluit ab vtero ad cor san-
guis vitiosus, atque ita animã corrumpit. His vena
malleoli 15 aperienda est, aut idem locus per inter-
ualla, repetita scarificatione vulnerandus. Probatur
etiam vena 16 quæ inter annularem & minimum,
vel medium & annularem digitũ excurret. Perse-
uerante malo vena in fronte diuiditur. Oportet au-
tem latum 17 vulnus inferre venæ, &, si quidẽ san-
guis crassus est, semel ac plurimum detrahère: si mi-
nus crassus fluat, depletis vnciis duabus, abstinendũ.

generationē
prohibendam
Et corrigendũ
symptoma.

15 Vt fiant
menstruales,
Et fiat humor
κατὰ φύσιν,
qui erat
ἀνά φύσιν.

16 Præstite-
rit medianā,
aut basilicā
pertundere.

17 Vt exitum
habeat cras-
sius sanguis.

18 Hac ad
generationē
melancholici

humoris pro-
hibendā per-
tinēt. Cũ hac
verò victus
ratione, lactis,

asinini vsus
(si minus ob-

murmurēt hy-

pochondria)

mirificè con-

fert. Ite bal-

neum aqua
dulcis egeli-

de, diuturn⁹
syrup⁹ viola-

cei vsus vere

18 Alimenta è media 19 materia instituēda sunt.
Panis triticeus bene coctus: vinum album, tenue,
odoriferum. Omnino cruditas 20 vitanda est, &
potus sine 21 cibo, vel in fine pastus.

Clysteribus per interualla vtendũ est: primũ
quidem leuioribus, qualis hic est.

℞. furfurum hordei M. i. summitatum anethi,
chamæmel. meliloti, an. M. ss. semin. rutæ, & fœnic.
ana 3. 2. Fiat decoctio ad ℥b. i. In colatura dissolue
mellis anthosati, sacchari rubri an. ʒ. ss. ol. 22 ʒ. ʒ. Po-
stea verò decoctioni adiiciemus polypodij ʒ. i. atque
aliquando dissoluemus cassiæ, 23 aut cathol. 3. 6. aut
hieræ 24 picræ vnc. ss. vel diaphcenici, vel diapruni

19 Neque imbecilli, neq; forti. Dicuntur autem media, quæ sunt succi
satis alibili: vt pipiones, perdices, vitulina caro. 20 Quòd obstructiones pa-
riat. 21 Id in omni melancholia genere. 22 Vt olei violacei. 23 Vel vtriũs-
que ʒ. ss. 24 In opiata, non in puluere.

25 *Vsu clyste* tantundem. Ex quo materia 25 purganda est. Sed
rum melacho præparanda prius leuioribus 26 quidem remediis,
lica collectio quæ in epilepsia diximus, & capite de Incubo:
vacuanda. cum his etiam.

26 *Vi decocto* 27. succi borrag. succi buglossi, depuratorum ana
polypodij, lup 28. succi pomorum odoriferorum (curtipendula
pul. scolop. vocant) lib. 3. foliculorum sennæ 3. 4. sem. anisi &
borrag. radi fœniculi an. 3. 2. Senna distemperetur diem integrum
cularum ape in succis: deinde leuiter bulliat, & cum sacchari lib.
rientiis, cum 1. 6. fiat syrupus clarificatus, & aromatizatus. Dosis
syrupo capill. 3. 2. 27 cum aqua buglossi, borraginis, lupulorum, fu-
ven. de bisan mariæ, cuscutæ, aut sero lactis. Melancholia leuiter,
tiis, oxymel. & per interualla purgari debet. Itaque foliculorum
scyllitico, mo sennæ 28 3. 6. 3. 1. in iusculo galli decrepiti, galli-
dò in hypo næ, pulli, aut alterius carnis, vel pisci, decoquimus.
chondriis nō Deinde sorbetur iusculum. Alioqui foliorum sennæ
fit sinathris- 3. 6. sem. 29 anisi, cinamo. an. 3. 6. florum anthos &
mus. borraginis, florum violarum an. P. 1. fiat infusio, vel
27 Vel 3. 3. decoctio in sero caprino. Aliquando semunciam
28 In singu- 30 cassiæ, aut catholici adiciamus. Galenus & reli-
las doses. qui Medici probant purgationem ex pul. hieræ pict.
29 Ut discu- 31. pul. epithymi 3. 2. Sed hæc purgatio æstate non
tiatur flatu, conuenit, potiusque vtendum erit cassia, aut cath.
quos senna dissol. in sero lactis. Vbi cholera & pituita salsa exu-
excitat. perarit, confectio hamech ad 3. 1. vtiliter præscribe-
30 Vi. 27. tur. Decoctum, in quo medicamenta dissoluuntur,
cass. recens hoc modo melius fit.
extracta 3. 6

31 *Vi. 27.* 28. summitatum absynthij & fumarie an. P. 1.
cass. recens trium florum cordialium an. P. 6. Fiat decoctio, aut
extracta 3. 6 infusio supra calidos cineres. In col. expressa dissol-
f. bolus. De- ue 31 medicamenta.
tur, et super-
bibet dilutū
3. 3. foliorum
senna in deco
cto prunorū
damaſcenorū
infusorum, et
ebulitorum.

31 *Vi. 27.* 28. dissolue catholicum cum dupla senna & rheo.
ut tryphe
ra persica, si
siccotumacior
humor. Vel infunde in decocto conuenienti, aut caprino sero, folio.
sennæ 3. 1. 6.

Vbi vigilæ vrgent, potius hoc imperare licet.

℞. triphera Persicæ vnc.ß. specierû hieræ picr. Galen. 3.6. epith. pul. foliorum fennæ ana ʒ.4. cum modico sacchari violati fiat mixtura. Dosis ad ʒ.ß. dissolutam in sero caprino. Ad somnum verò conciliandum sequentia imperabis.

℞. chamæmel. anethi, violar. an. M. i. flor. alb. nymphetæ, calic. papau. ana M. i. folior. salicis vitis, malu. ana p. i. f. decoctio, qua abluantur manus, pedes, &c.

Ex philonio ad lenticulæ magnitudinem, caphu-
ræ pauculo & albumine oui fit elychnium in na-
res immittendum ad somnum. Pulueres quoque
subinde imperandi sunt, & condita, vt.

℞. pul. elect. lætificantis ʒ. 3. sacchari rosati, &
violati ana ʒ.ß. dentur ʒ. 4. in cochleari cum modi-
co vino albo odorifero. Aliud.

℞. elect. lætificantis 32 & diamargarit. an. ʒ. 2. se. citri, melonum, cucumeris, citrulorum ana ʒ.ß. sacch. rosati, quod sufficit, fiat mixtura: aut, si vis, incorporentur in conf. borraginis, buglossi, ros. an. ʒ.ß. Fiat conditum. Pleresarchontica serò & mane cum vino, confectio alkermes, diamargarit. calid. Theriaca, aromaticum Galeni, è citro, diagalanga, diacuminum (præsertim in hypochondriaca) dianthos, electarium de gemmis, è moscho, cum aqua buglossi. & vino odoro proderunt.

33 Balnea temperata per interualla conueniunt.

Cucurbitulæ leues in hypochondriis, quæ discutiant flatu: atque vbi dolor est, cū 34 scarificatione. Vbi verò pertinax morbus est, secūdæ 35 venæ capitis

32 Rhazes lib. 5. Continentis, Et lib. 9. ad Almanforem.

33 Confectio alkermes cū quadrupla borraginis cō

serua sit tibi omnis instar cōditi. Vt. 24 confect. alkermes ʒ. i. f. conf. borrag. ʒ. 3. f. mistura. Detur ad magnitudinem nucis auellane.

34 Hæc scarificatio inutilis. 35 Recta frontis,

aut vena puppis, quæ in occipitis est.

36 *Hæc po-* 36 & sanguisugæ affigendæ. Aperiendæ infernæ
 37 *riſſimum lo-* 37 purgationes, vis pharmacorum augenda 38 est,
cum habent imperandæque hiera diacol. quæ epithymum, aut
in melanco- fennæ puluerem, deinde etiam quæ helleborum
lia, qua loca recipiat.

lem habet in Helleborismis 39 quoque vtendum est. Nec enim
cerebro gene- frustra dictum est ab antiquis indigere helleboro,

37 *Vt hæ-* qui mente non ita cōstarent. Itaque sic imperabis.

morrhoidum, 40. pul. hieræ diacol. 3. 4. pul. epithymi, & folio-
mēstruorum, rum fennæ an. 3. 2. Excipiantur modico melle. De-
ſi ſuppreſſa inde in ſero caprino diſſoluantur. Fiat potus.

37 *Vt æquali* 40. ramentorum 40 helleb. 3. 1. Fiat infuſio per tres
medicaminū dies in aquæ pluuiæ 3. 4. deinde lento igne deco-
exceſſu con- que ad tertias. Col. addantur mellis optimi deſpu-
trarius natu- mati 3. 2. Huius mellis cochleari puluerem hieræ
ra exceſſus diacol. miſcebimus. Reliquum mel ſeruabimus,
abigatur.

38 *Purgatio-* & per interualla cochleare dabimus, diſſolutum in
nibus ex hel- pingui iuſculo, vt incitetur 41 vomitus. Alius helle-
leboro albo, borismus.
aut nigro.

40 *Albi qui-* Raphanus acerrimus in taleolas diuidatur. Ra-
dem, ſi pu- mentorum hellebori 3. 3. Taleolæ configuntur:
gnandum ſit transfixas ſub dio per noctem collocabis. Poſtridie
cum ſympto- ramenta detrahes, & ita diligenter, vt nihil rema-
mate nigri ſi neat hellebori. Ex quo taleolas in oxymelite tri-
cū ſynatroiſ- bus horis macerabis: maceratas comedes, & oxy-
mo. mel ſuperbibes.

41 *Ex hel-* Poſt horas aliquot vomitum ciebis. Quod ſi
leboro albo. venter flatuoſus eſt, fouebis 42 oleo, in quo rutæ,
Cæterum nō anethi, dauci, cumini, & ſimilium ſemina coxerint.
datur helle- Eadem ſemina in puluerem redacta, adiecto pipe-
bori ſubſtan- ris & cina. momento, melle anthoſato excipies, &
tia, ſed tantū que hic quidē omnibus: vt nec pueris, nec ſenibus. 42 Aut decoſto ſtomachico

ita exhibebis.

Dropax 43 calidus proximè descriptus breuibus
interuallis ventriculo affligetur, & toti metaphreno.

43 Ex pic.
naval 3. 4.
olei rutace
3.1.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Melancholia differt à phrenitide, quia sine febre est, & furor: à mania, quia cum metu & tristitia. Fitque vel ab intemperie frigida & sicca, & humore melancholico eiusdem temperiei, siue cerebro primariò affecto, siue à toto corpore, siue ab hypochondriis. Quæ postrema flatuosa magis est. Atque hæc est vulgaris omnium ferè sententia. Quæ tamen ita accipienda nobis haudquaquam videtur, quasi nulla melancholia cum febre sit, aut ab intemperie frigida semper oriatur. Experientia enim constat in febre hominem melancholicum sæpe reddi, aut post febrem, vel alium morbum. Dico timidum, tristem, sine furorè, multa falsa, ridicula, & ab omni ratione aliena animo mouentem, læsa imaginatrice, & ratiocinatrice facultate. Quæ propria sunt melancholiæ symptomata, neque phrenitidi veræ, neque mania, neque *παγε-φροσύνη* cõmunia. In febre ardente Burgundus quidam Lutetiæ ad ædem S. Iuliani multis clarissimis Medicis astantibus mortuum se affirmabat simul cum fratre ibi decumbente. Postea phantasia mutata declamabat: præcabaturque Medicos, ne ampliùs animæ impedimento essent, quò minùs è purgatorio euolaret ad Deum. Aliquando imitabatur moribundum, quasi efflaret animam: monebat, ut spectarent expiratum: postea summo timore, & omnium desperatione corripiebatur. Tandem opportunis remediis adhibitis, & hæmorrhoidum profluvio liberatus est. Alius itidem se mortuum, & sine animo putabat, ob idque cibum omnem reformidabat, quòd mortuos edere negaret. Tandem optimo consilio effectum cadauer, mensæ accumbens, cuius exemplo cibum sumpsit. Quidam, ex Aëtio, neque omninò caput se habere putauit, ad quem excogitalle dicitur Philotimus supra reliquam curationem plumbeum pileum, à quo grauatius habere se caput intelligeret. Artemidorus

Melancholia
à phrenitide
& mania
distincta.

Melancholia
omnis non fe-
bris expers.

Burgundus
ex ardente fe-
bre melan-
cholicus.

Aëtius Serm.
2. Tetrab. 2.
cap. 9.
Artemidorus

DE MORB. INTERNIS

Grammat. Grammaticus cū in littore viso Crocodilo expauisset, quod faciliè sit & maximè melancholicis, omnium literarum oblitus, putauit tota vita alterum crus & manum sibi exempta. Multa similia quotidie experimur ex quibus intelligi potest melancholiam sæpe fieri, vel calore resoluta, vel calidiore cerebro, aut corpore colligente melancholiam, non adurète tamen: alioqui in Maniam degeneraret. Humor enim hic, vel à partis intemperie generatur, vel relinquitur post inflàmationes, vel crassior in obliquitate venarum inclusus, ac torpidus malignam aliquam qualitatem contrahit, & vapore atro (est enim maximè vaporosus) spiritus vitales, & animales inficit, vnde metus, tristitia, palpitatio cordis, inflatio carotidum, pulsatio in multis corporis partibus, alius dura, macies corpore refrigerato, & cogitationes somniantibus similes cōsequuntur. Qui si in cerebro obstructio-

Melancholicus

Hipp. sub finem sect. 7. nem fecerit, epilepsiam: si in mentem repat, vt ait Hipp. id est, cerebri & spirituum temperamentum mutet, melancholiam pocreabit. Ob idque ab vno horum duorum morborum in alterum facilis est mutatio. Sunt tamen duo perpetua, & pathognomonica signa, metus & tristitia sine causa. Quæ à solo humore melancholico pendent, siue per se, siue alijs mixto, superante tamen, vt neque de materia, neque de parte affecta dubitare possumus. Sanguis enim, cū mobilis sit, suauis, & lucidus, hominem potius in spem erigit, ac lætitiā & comitatem inducit bilis: acrimonia, calore & mobilitate, præcitem hominem efficit, & ad sæuitiam, non metum prouocat. Adusta, *σφοδρὰ καὶ πυκνὰ* Melancholia, colore atro timorem ac tristitiā: firmitate & crassitie, in opinione suscepta, quantumuis ridicula, cōstantiam affert.

Atoto corpore fieri intelligimus ex causis præcedentibus, signis melancholici sanguinis in toto corpore aparëtibus, victus ratione, missione sanguinis crassi, tempore anni, regione, ætate declinante, temperamento, mensibus aut hæmorrhoidibus suppressis, varicibus curatis, corpore gracili, nigro, hirsuto, venarum latitudine, distentione ob flatum, sanguinis copia, curis, laboribus, victus ratione tenui, sordida. A cerebro verò, si mœror & tristitia perseverarint, sine tali corporis cōstitutione.

Conueniunt clyster (nam in omnibus aluus adstricta est & flatibus distenta) sanguinis missio, syrapi, purgatio, cremor hordei, veratrum, opiatæ, epithemata, inunctiones, foris, topica, balneum, lotiones capitis & pedum, cauteria, trepanum, masticatoria, sternutatoria, errhina embrochæ. Humida lætificandi vim habentia, & spleni propria. Valet ad melancholicos cum metu, & anxietate electarium sequens mihi vsitatum.

℞. emblic. 3. 10. ros. 3. 6. caryophyll. nardi, cyperi, asari, mastichis, myrobalanorum ana 3. 3. cinamomi, zedoariæ, an. 3. 2. nucis mosc. macis, cardamomi, capthuræ, moschi ana 3. 1. syrapi rosa. vel mellis ros. q. s. fiat elect. Dosis 3. 3. cum liquore conuenienti.

*Electarium
ad melācho-
licos Autho-
ri vsitatum.*

Tertium genus] Hypochondriaca melancholia non fit à succo frigido, sed fumis malignis & acrioribus ad cerebrum elatis, quādo scilicet venæ mesaraicæ inter ventriculū & hepar ardore quodam effervescent, & obstructione aliqua laborant, vnde humores crudi & melancholici illuc conclusi flatus multos procreant, & ad caput elati melancholica symptomata ac difficultatem anhelitus inducūt. Percipitur rugitus, & veluti murmur quoddam (est enim hoc signum maximè proprium) circa hypochondria, modòque incipit ab hepate, modò à liene, cum humor ille inter lienem & ventriculū subsistit in venis. His enim duobus locis fieri potest, vel ab intemperie, vel ab obstructione, vel ab utròque. Cōtingit frigido ventriculo existente, & calido hepate. Inde sequuntur cruditates, refrigeratio corporis & sanguinis, macies, sudor, plurimum sputum, sed imprimis, vt dixi, perpetui rugitus circa hypochondria, & somnia turbulenta cum metu, & tristitia. Quibus duobus signis collegimus morbi essentiam in nobilissima muliere, quam Medici alij frustra curauerant, vt imbecillitate stomachi laborantem. Summa erat macies, vehemens extremarū partium frigus, sibilus auris sinistræ, somnia turbulenta. Curatio absoluta fuit minoratio ex Catol. & diaphœ. syrapi & apozematibus melancholiam ad expulsionem præparantibus, foribus hypochondriorum, vnetio-

*Melancholia
hypochondri-
ca.*

*Mulier me-
lancholica ex
frigidiorē
ventriculo,
& hepate
calidiori.*

nibus, pharmaco ex hiera diacoloc. Potest etiam fieri hypochondriaca melancholia à partibus inferioribus ventris, quæ calida intemperie laborant, vel effusa bile atra per mesenterium, & partes ventris, magno intestinorum calore adurente chylū. In cruditate optimum, arctius ventriculum ligari, vt flatus impediuntur, & melior fiat coctio.

Hellebor] In hoc duo cauenda. Primum, ne detur in substantia, sed vel in decoctione, vel infusione, idque post vniuersalem purgationem. Alioqui conuulsionem affert, vel iugular. Deinde, ne misceatur myrobalanis, aut adstringentibus, ne diutius retineatur in corpore. Ex hieris accommodatæ sunt tantum huic affectui, quæ vetatrum, aut colocynthidem recipiunt: sed in constitutione humida tantum, & pituitosa, quia nimis exciccant. Hieria Logadij, qua utebatur Ptolomæus Rex ad omnia vitia melancholica, probatur Alexandro.

Datur ad 3.3. vel 4 cum calida. Melancholicis, elephantiticis, morpheæ, impetigini, venenis, nephriticis, lethargicis, ischiadicis & epilepticis auxiliatur. Huius descriptionem hanc in modum. Nicol. Myrepsus concinnauit.

*Nicolaus
Myrepsus
Section 23.*

℥. agaric. elater. sal ammoniac. absynrh. ammoniac, folior. indicorum. hellebor. nigr. scyllæ tostæ, dactidij, myrrhæ, zinziberis ana 3.6. aloës flauæ, euphorb. an. 3.8. polij herb. casia, chamædr. centaur. hyperic. bdell. marub. ana 3.5. piperis alb. cinam. opopanax. sagapen. piperis long. croc. petros. Macedonic. ana 3.4. castor. pip. nig. aristoloch. rotundæ 3.3. seminis colocynth. polypod. ana 3.8. spicæ nardi & grani cnidij ana 3.6. Hæc trita in pollinem madefacito cum melle Artico despumato sufficienti. Opopanacem, sagapenum solue in mortario cum melle, & probè confectam reconde in vase, & vtere.

ANTO. VALETII EXERCIT. XVII.

Melancholia morbus deprauata est imaginatio, quæ cerebri intemperiem humori melancholico congenerem sequitur. Hic enim humor ater animæ domicilium obtenebrans, terrorem incutit,

cutit, alienasque cogitationes absque euidenti causa menti iniicit: vbi inter cætera animi pathemata, metus, mœstitia, odiūque hominum præualent. Tri- *Hippo. aph. 23. lib. 6.*
 plicis melancholiæ, primariæ scilicet, seu cerebri
 propriæ, hypochondriacæ, & totius vitio corporis
 factæ, causæ, signaque quibus inter se distinguantur,
 desumpta sunt ex Galeno li. 3. de loc. mal. affect.

Curatio perficitur enematis, zupapiis, aut apoze- *Melancholia curatio.*
 matis, contumacem humorem apparantibus, pur-
 gationibus, blandis primum, dein valentioribus,
 sanguinis missione, balneo, spirituum recreatione.

Enemata ex decocto remollientium, & discu-
 tientium flatus, qui hic sæpe colliguntur, cum la-
 ctis sero, dissolutis melanagogis, comparantur.
 Zulapia ex syr. de lupul. fumaria de bizant. cum
 stillatitiis liquoribus bugloss. cichor. &c. Vel hoc a-
 pozema præscribitur.

℞. radic. aper. & polypod. quern. ana 3. 6. cortic.
 radic. cappar. thamarisc. fraxin. ana 3. 8. asari, acor. ana
 3. 2. cichor. tot. quinque capill. borrag. summit. lupul.
 fumar. thym. epithym. melissophyll. ana M. i. semin. anis.
 fœnic. melon. cucum. acetos. citr. glycyrrhiz. ras. ana 3. 2.
 flor. cardiac. genist. & epithym. ana p. i. f. decoct. ad lb. i.
 In colatur. dissolu. syr. de lupul. de fumar. & de bizant.
 ana 3. i. f. apozem. clar. & cond. vt decet, pro dosib. 3.

Mox purgatio subsequetur, ex catholico, dia-
 phœnico, confect. hamech, & aliis id genus me-
 lancholicum succum trahentibus, instituenda, vel.

℞. polyp. quer. passul. mund. glycyrrhiz. ras. ana 3. 2.
 summat. lupul. adhiant. agrin. scolop. ana M. i. folicul.
 semz mund. 3. 2. semin. anis. & fœn. ana 3. i. flor. bor-
 rag. & bugloss. ana. p. i. f. decoct. in sero lactis ad dos. i.
 In colatura dissolue expressionem 3. i. 8. rhei elect. in-
 fusi, vt decet, cathol. & syr. viol. ana 3. 8. f. potio.

Pauperibus, folia sennæ ad 3. 2. vel 3. infunduntur in hydromelite, aut conuenienti decocto: quibus expressis adduntur 3. 2. s. confectio. hamech oxymelit. simpl. 3. i. syr. laxat ros. pall. drach. 6. Vel carapota de fumaria. Inda, exhibentur: quam liquida medicamenta in hoc affectu præferenda. Subinde repetentur, hæc purgantia, ob humoris pertinaciam, qui non nisi sensim educi potest.

*Gal. cap. 4.
lib. 3. de loc.
mal. aff.*

Quod ad phlebotomiam attinet, eam Galen. non desiderat in melancholia, quæ primaria cerebri est affectio: quamuis ad præcautionem, & propter plenitudinem mitti sanguis non incommode potest. In alijs melancholiæ generibus magis conferet venæ sectio, presertim si melancholicum sit corpus totum, sed iis cautionibus adhibitis, quas ibidem Gal. præcipit obseruandas. Citandæ hæmorrhoides, si eò natura vergat. Hinc illud Hippocratis. Maniacis, siue melancholicis, si varices superueniant, fit maniae solutio. In mulieribus restitantes menses si mali huius occasioni sint, malleoli vena pertundenda. Ex melancholia verò hypochondriaca quia lieni labes & ventriculo sæpius inuritur, consulendum est his potissimum partibus fomentis litubus, scutis vulgò appellatis, ex lienis & ventriculi affectuum curatione repetendis. Recreabuntur vires electariis, conseruis conditis, ab Authore imperatis.


*Hippo. aph.
21. lib. 6.*

Balnea aquæ dulcis, in quibus refrigerantia & humectantia incocta sint, mirificè prosunt, moliendo perspirationem: quæ prohibita biliosos facit melancholicos, per adustorum fuliginosorum

excrementorum retentionem. Itaque his frequentibus, victuque humido & euchymo se multos perfunasse melancholicos professus est Galenus.

Maniaci melancholicis similiter curantur, nisi forte maniae causa à melancholia euariet, ut ferè fit ab acribus & mordacibus succis, feruidiore sanguine & bile: & tum ut phrenitici curantur.

De Catarrho. CAP. 18.

 Atarrhus nomen generale, ² defluxus, aut destillatio est. Nam κατάρρεω verbum id sonat. Peculiariter fluxio est à capite in fauces. Catarrhus verò alius pituitosus, tumque distentio est, faciei pallor, frigiditas capitis, ad somnum inclinatio, piger motus, ³ hebes anima, & sensus. Voxque ⁴ per nares obmurmurat, intercepta via. Adde ⁵ temperamentum, locum, anni ⁶ constitutionem, rationem vitæ. Urinæ quoque crudiores sunt.

Alius calidus est, ferè à pituita salsa, aut alioqui acri humore. Hic totius capitis ⁷ dolor est. Rubent ⁸ oculi, interiores partes oris ⁹ exulcerantur. Adde & cætera externa, & urinas magis coloratas. Catarrhus aliquando per venas & arterias diffluit in corpus. Hic ferè ceruicis, scapularum, membrorum & lumborum ¹⁰ dolor est.

Catarrhus, ¹¹ ubi levis est & frigidus, totum ¹² capitis, sed sine frictione, ex linteis calentibus, ut

plegiam inducit. ¹¹ Generatione causa, & symptomate. ¹² Ut sacculis ex milio, surfure & sale.

¹ Propriè ut catarrhisti-
cus usurpato

² Fluxus
humoris à ca-
pite in totum
corpus aut a-
liquam cor-
poris partem.

³ Ingenij
tarditas.

⁴ Quod vo-
calis materia

non habeat
liberum exi-
tum faucibus
interceptum.

⁵ Frigidum
& humidum

⁶ Frigidâ,
humidam, a-
quiloniam.

⁷ Ab hu-
morum acri-
monia &

meatum ob-
structione.

⁸ Suffusione
subtilissimi
humoris &
caloris secun-
dum menin-
ges.

⁹ Serosi hu-
moris acri-
monia.

¹⁰ Et para-

calor in profundum 13 subeat, leui gargarismo, caput purgiis curari potest. Ita tamen fouebis caput, vt nullo modo frices. Nam in catarrhis frictione capitis non est vtendum. Leuis medicina.

13 Atque humorem concoquit.

14 Gargarismus ad fluxum in asperam arteriam, aut nares prohibendum.

15 Vel maiorana succus per nares educatur.

16 Ne superpressa aluo, augeantur capitis symptomatica.

17 Ne in alimentum vertatur.

18 Vt si quis in sole iter fecerit.

19 Modò non sit ager in xpo xolos ayw.

20 Generatione, causa & symptomatica.

21 Qualitate contraria & vtendi assiduitate.

14 Rosarum M. i. fiat decoctio in aqua & modico aceti, vnde leuiter colluat os, vel vtatur modico conseruæ rosarum, vel syrupi de rosis siccis. Caput purgium.

24. seminis nigellæ romanæ 3. 2. seminis anisi 3. 1. conquassata frigrantur in sartagine, cum leui aspersione aquæ maioranæ. Fiat nodulus: 15 applicetur naribus. Quòd si resistat venter, 16 seminiæ cassiæ quarta parte 17 horæ ante cibum im-

perabis. Interea proderit sacculos capiti instituere, qui ad exhauriendam materiam vitium facientem sint accommodati. Qualis hic est.

24. milij, aut auenæ conquassat. & torrefact. M. i. furfuris macri frixi p. i. sali torrefacti & puluerati 3. i. f. sacculus capitis commissuræ admoüendus.

Vbi verò 18 calidus est, sed leuis, balneum aquæ dulcis sat esse potest, vbi corpus non fuerit neque plethoricum, neque cacochymum, aut inunctio capitis, aut frontis, è rosaceo, è caseo molli & recenti, è cauliculis lactucarum subactis, è posca, Sacculus è rosis. Quòd si purgatio imperanda est, quia resistit aluus cassiam, 19 mannâ imperato.

Vbi verò 20 vehementior catarrhus est, 21 maiora remedia ex vsu sunt. Quòd si ex vehementia catarrhi, quod sæpe fit, 22 præsens suffocatio immi-

22 Materia in pulmones prolapsa.

net, clysteribus 23 acriusculis statim vtendum. In quibus hieræ picræ semuncia dissoluta sit.

25 Quòd si corpus 24 sanguineum & bene carnosum est, vena in brachio angusto 26 foramine aperienda est.

Cucurbitulæ magnæ scapulis & brachiis affigendæ. Totus thorax ex oleo de liliis, de lino, amygdulcium. Chamæ. butyro recenti, 27 cocta radice althææ cum axungia gallinæ, vel simili, vel butyro malaxata 28 inungendus est. Gargarismata 29 quæ reprimant fluxionē, caputpurgia, frictiones & vincula, quæ eandem diuertant, imperanda sunt. Vbi verò 30 nullum tale accidens interturbat curationem carharri, frugalis 31 vita imprimis imperanda, cœna nulla, aut pauca, declinatio 32 à ventis, solis & lunæ 33 radiis, abstinencia à 34 vino & rebus vaporosis, à 35 somno diurno, qui etiam noctu breuior esse debet. Vtantur hordeato, auenato, vbi reficcandum est. Conuenit 36 orizogala, amygdalogala cū sacch. ros. vbi retinēda defluxio, incrassanda, & coquenda. Aqua frigida ore colluta in calidis: subtepidam in frigidis fluxionibus, conuenit.

Secunda mensa carne cydoniorum, piris acriusculis & coctis, post etiam coriandro vti oportet, vt confirmetur venter, & fumi prohibeantur. In frigido, vino quidem vti licet, verum modico. In palu medio non frigido, sed refracto, aqua sub-

23 In quibus vis sit ex alto reuocandi ac reuellendi.

24 Ipsiusque catarrhi qualitas agri natura sit contingente.

25 Ad prohibendam generationem, materia reuulsionem, et funesti symptomatum correctionem.

26 Ne spiritus natiuique caliditatis dissipentur, qui cum catarrhi materia pugnant.

27 Hac sub cineribus stipa inuoluta coquitur.

28 Ad eius coctionem,

quam excipit, materia, & eiusdem exclusionem.

29 Cuius-

modi ex syrupo myrtillorum cum decocto plantag. hordei. 30 Vt cum suffocatio non est in metu, sed solius catarrhi curationis est habenda ratio.

31 Vt assueta vite portio deducatur. 32 Quia humores fundunt.

33 Quia exprimunt. 34 Ratione fluxionis, non materie. 35 Qui corrumpit, non concoquit. 36 Si non adsit capitis dolor.

37 Ne inci-
tetur catar-
rhus.

38 Quatuor
hæc sunt cor-
poris plet ho-
ra, generatio
ab hepate ca-
lidiora &
sanguine sub-
tilissimo, pro-
lapsus in par-
tem cuius of-
ficio vita ca-
rere nequit,
febris cõiun-
ctio.

39 Ut dia-
carthamo.

40 Ad in-
fringendum.

41 Ad le-
niendum.

42 Ad de-
rivandum &
cerebrum re-
creandum.

tepida, aut pane tosto. Clysterum vsus, sed 37 mol-
lium probandus est. Phlebotomia à Græcis ferè o-
missa est & Arabibus, nisi ubi ea adsunt, 38 quæ
Mesuæus annotauit in capite de catarrho.

Purgationes initio leuiore, qualis est cassia ad 3. i.
aut 3. x. imperata, ac per interualla vsurpata. cui ali-
quando in fluxione calida addere licet elect. de suc-
co ros. 3. 2. Iam progressio morbo, & ubi signa co-
ctionis apparent, poterit catholicum imperari ad 3.
6. adiecta infusione 3. 2. agarici, & 3. 8. rhab. Non-
nunquam etiam in his catarrhis imperamus rhab.
infusi 3. 4. puluerisati verò 3. 2 qui dissol. in hac de-
ctione.

℥. passul. hordei ana P. i. trium florum cordialiū,
liquiritiæ rasæ ana 3. i. fiat decoct. pro vna dosi, in
qua dissol. rhab. & c. vt dictum est. Post hæc etiam
iam benè maturato morbo, 39 fortioribus vti lice-
bit, qualia in Gatinaria. Peculiariora verò remedia a-
lia 40 continentur ore, alia 41 deuorantur: nōnul-
la 42 natibus applicantur: ea quæ aut retinēt, aut le-
niunt & concoquunt, aut repurgant. Retinent, vt.

℥. ros. hordei, agrimonie ana P. i. sem. plantag.
pap. albi, portul. ana 3. i. fiat decoctio ad 3. 4. In col-
disso. diamoni 3. i. vini granatorum 3. 8. Aliud.

℥. aquæ hordei non excorticati 3. 3. dianuci 3. i.
Aliud.

℥. zulauij rosarum 3. 3. syrupi myrtillorum 3. i.
Aliud.

℥. aquæ rosarum 3. 3. caphuræ 3. i. Aliud.

℥. corticum papaueris albi, rosarum siccarum an.
P. 2. boli armenæ 3. 2. fiat decoctio. Hæc ore conti-
nemus, & inde os leuiter colluimus. Alioqui fiunt

pilulæ, quæ in ore continentur.

℥. boli armene lotæ cum aqua ros. terre sigillatæ lotæ cum decocto papaueris ana ʒ. i. elect. diatragacanthi frigidi cum oui albumine dissol. ʒ. ʒ. cum modico syrup. ros. de ficcis fiant pilulæ ad magnitudinem lupini.

Vel. ℥. succi rosarum ʒ. ʒ. bol. armene tantundem, fiant pilulæ tres horâ decubitus capiendæ. Mirificæ sunt facultatis ad aciores fluxiones retinendas. Conserua rosacea cum mastiche, bolo Armena, terra sigillata ad id instituti apprimè confert. Vel etiam trochisci eiusmodi.

℥. anisorum, coriandri præparati ana ʒ. ʒ. macis, cinamomi, spicæ, ireos, coralli rubri ana ʒ. i. semin. papau. albi, in vino cocto macerati ana ʒ. i. gummi tragacanthi, mastichis ana ʒ. i. omnia incorporentur in succi liquiritiæ ʒ. i. cum leui affusione syrupi myrrillorum. Fiant trochisci pondere ʒ. ʒ.

Possumus vti solo tragacantho, terra sigillata, & in frigido catarrho spica. Vbi leniendum est, glycyrrhiæ succus maximè conuenit, aut decoctio pectoralis, vt decoctio pectoralis Rhazæ.

℥. iuiubas N. xx. sebesten xxx. passul. enucleat. ʒ. i. viol. siccarum ʒ. ʒ. liquiritiæ rasæ. ʒ. ʒ. caricas 10. Fiat decoctio in tribus libris aquæ, dum redeat ad vnam. Adde, si vis, semen bombacis, capillorum ven. & alia, quæ incidunt, aut repurgant.

Decoctio pectoralis ex Rhazæ.

Post initia, vtendum est elect. diatreos, commiscendumque est diatragacanthum ad ʒ. i. Quale hoc est.

℥. diatragac. frigidi ʒ. i. diatreos simplc. ʒ. ʒ. fiat pul. Teneat in ore. Verùm, vt minuitur catarrhus

& maturatur, plus diaireos miscendum erit. Retinendum est, cum fluxio vehementior & periculiosior. Aut etiam ubi levis est. Sed hinc ferè sine purgatione corporis, illic post purgationem. Vtuntur suffumigiis, quale hoc est.

℥.olib. sandaracæ ana ʒ.2. fiat decoctio in vino adstringente excipiatur fumus. In frigida.

℥.ligni aloës, costi ana ʒ.2. galliæ moschatæ ʒ.ʒ. olibani, sandaracæ ana ʒ.1. cum styrace liquida fiant pilulæ, & super prunas suffumigium. In calida, suffumigia fiunt hoc modo.

℥.santali citrini ʒ.ʒ. ros. violarum ana P.2. fiat decoctio in aqua, & inde suffumigium. Utendū quoque pomis odoratis est, ut prius Cucuphis & aliis rebus roborantibus cerebrum. Ligatione in duobus digitis manus dextræ, stuphis siccis, postremo etiam cauterio hoc modo. Radatur caput in syn-cipite medio; qua parte futura coronalis est, fricetur locus calente linteo. Sinapismus, aut phenigmus applicetur: vesicæ excitentur & diu contineantur, ut fluant. Caules itaque ad ignem tabefactos axungia porcina inunges, & superpones loco. Quibus si nihil proficitur, cauterio utendum erit.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Nulla ferè corporis humani ægritudo est, quæ non defluxione humoris alicuius è capite aut excitari, aut incrementum accipere possit. Atq; id generalius sumpto nomine: κατάρρεος Græcis appellatur. Propriè tamè cum in nares defluxio fit, κέρυξα, in fauces, βεγγχος: in gurgulionem, σαφυλή & κίων, dicitur. Causas omnium, signa, & remedia persequi, longius esset, quàm pro instituto. Hoc admonuisse satis fuerit, distillationem eiusmodi, non solum, ut multi scribunt, à cerebri intemperie frigida

κατάρρεος.
κέρυξα,
βεγγχος
σαφυλή καὶ
κίων,

& humida, aut ab omnibus, quæ replent caput, originē *Catarrhos à*
 habere. Nam sæpe calidius cerebrum plus vaporis at- *sola intempe-*
 trahit, qui deinde, vt in aëre pluuia, superueniente fri- *rie frigida ce-*
 gore concrescit, atque exprimitur: calore & siccitate, *rebri nō fieri.*
 veluti quodam naturæ circuitu tandem absumitur. In
 omnibus tamen catarrhis capitis repletionem esse certū
 est, quæ hanc defluxionem parit, idque à vaporibus ali-
 menti, humorum, viscerum vitio, caloris capitis imbecil-
 litate, quia non conficit alimētum, aut vapores non dis-
 soluit, defectis alimenti proprii, atque inopia, vt in ven-
 triculo. Sed duo perpetua ferè sunt huius mali semina- *Catarrhi*
 ria, calidius hepar, ventriculus frigidior, adiuncto par- *duo perpe-*
 tium mittentium robore, cum imbecillitate recipientis: *tua semina-*
 quibus additur, pulmo, vterus, lien, &c. Aër deinde ex- *ria.*
 ternus, frigidus quidem, aut exprimendo, aut calorem
 intrò cogendo: calidus verò & austrinus, caput replen-
 do, & humores liquando, ac dissoluendo. Frequentius
 tamen materia cerebro conclusa per æstus in superficie
 per frigora, in medium corpus, & partem imbecillio-
 rem delabitur. Cutis quoq; desitas & alui astrictio plurimū
 accelerant catarrhum.

In calido, venæ sectio aliquādo conuenit, diuersio per
 clysteres, leuis purgatio, gargarismata ad astringēdum,
 Errhina ad diuertēdū, suffumigia ex ligno aloës, benzo-
 no, styrace, olibano, gallia moschata, sandaraca, carioph.
 lauro, baccis iuniperi: in calido, vapor humidus ex aqua
 ros. viol. santal. caphura, sacellationes, formulæ in ore,
 incrassantia, alterantia: in frigido, magis cōstringentia,
 & calida, pilulæ, theriaca, cucuphe, sacculus siccans, inspi-
 rationes incidētes, poma odorata, exulceratio in interio-
 re brachio, seton syncipite medio, qua parte coronalis
 pilus raditur frictio, sinapismus, phænigmus, vesicatoriū,
 cauterium, frictiones vicinarū partium & capiti consen-
 tiētiū, meliores, quā capitis, nisi bene puro corpore:
 ordo à cruribus ad spinam, brachia, ceruicem, iugulares,
 post aures, occiput, synciput, frictio capitis cum spongia.

Vapor non modò prohibēdus in fine pastus, sed dum
 sit concoctio. Tum enim eleuatur plurimus, vt ex ructi-
 bus apparet. Quo tēpore fluxio excitatur, magis stipticis
 vtendum, vt vesperi: manè verò lenientibus, coquētib;

DE MORB. INTERNIS

expurgantibus thoracem. Galenus sub finem 6. Epid. scribit catarrhum, asthma, conuulsionem sanari febre, ut inde intelligamus calidis & siccis potius in hoc affectu esse utendum. Assuescendum emungendis naribus potius, quam expuitioni: quia per nares crassa & tenuia expurgantur sine damno reliquarum partium: per os tenuia tantum, & cum periculo pulmonum, ac ventriculi. Adde quod consuetudine facta expuitioni, per somnum, & occupato animo, materia in inferiores partes ab ore delabitur.

Cibi parcitas præsertim vesperi, panis sicci esus, declinatio nocturni aëris & radiorum lunæ, potus paucus, præsertim materia existente cruda, quo tempore sitis quoque minor est. Supinus decubitus oculis confert, sed catarrho noxius. Pilulæ Mesuici de cynoglossa valde nobis probatæ, sed quarum non una est apud omnes descriptio: cōserua quoq; rosarum cum mastiche, bolo Armena, syrupo myrellorum, terra sigillata, & quod sequitur.

℞. anisi, coriandri ana 3.℔. macis, cinamomi, ireos Florent. coralli rubri, spice nardi, ros rub. ana 3. i. mastiches 3. 2. gummi drag. malaxati cū aqua ros. 3. i. omnia incorporentur cum succo glycyrrhizæ. Fiant trochisci ponderis 3. i. teneat sub lingua.

Ad destillationem vixæ & faucium, suffumigium.

℞. styracis liquid. ficuum pinguium, florum amygd. seminis hyoscyami ana 3. 4. cum ficu & styrace diu terendo incorporentur. Fiant trochisci. Ter in die, mane, in meridie, & vesperi fiat suffumigium. Deinde interpositis tribus diebus idem fiat.

ANTO. VALETII EXERCIT. XVIII.

Catarrhus propriè dictus defluxio à capite ad partes subiectas perhibetur, estq; symptoma de genere immodicè excretorum. Ut enim se habet in leienteria vèrriculus, ita & cerebrum in destillationibus. Catarrhi causæ efficientes vel sunt à cerebro ipso, vel ab inferioribus partibus. A cerebro

*Gal. lib. 3. de
caus. sympt.*

quidem, ob eius intemperiem calidam, aut frigidā. *Catarrhi causa efficiētes.*
 Calida ex euentu catarrhum ciet, plus scilicet attrahendo, quàm concoquere, & in halitum digerere possit. Frigida per se catarrhi causa est, quia alimentum ad cerebrum delatum, non cōficitur, nec per halitum diffatur. Huic quoque causæ famulantur partis raritas, quæ promptè pituitam suscipit, magnitudo viarum in cerebro, cerebri situs, ad quem vapores facilè conscendunt. Itaque scriptum reliquit Hippocrates, cerebrum tanquam magnā glandulā esse, & caput, ὡς περ σιλύα τῷ σώματι incubere: idēq; ἐξ αὐτῆς ἀνθρώπων νοσημάτων esse. Cū autē à partibus inferioribus oritur, & efficientis intrinseci rationem habet, vel vētriculus intemperatus, vel calidum iecur reperitur. *Catarrhi externa causa.*
 Extrinsecæ causæ sunt, aëris calidi intemperies, falsorum, & (ut loquuntur) excoriantium catarrhorum parens: vel frigida, crassorum soboles: affectiones animi spiritus refrigerantes, aut etiā resoluentes: ocium, à quo excrementorum congeries, & spirituum torpor: vigiliæ, quæ eisdē spiritus absorbent: somnus nimius, qui refrigerat, maximèque pomeridianus à pastu, quia tunc violento motu calor ad interiora retrahitur, ac spiritus crassiores & frigidiores fiunt: immodicā venus: denique inanitio & repletio.

Signa calidi catarrhi sumenda sunt ex faciei & oculorum calore, rubore, tenui materiæ consistentia. Item ex odore, quum in nares fertur, putido: ex sapore, cum in fauces, acri, falso, erodente, siti: ex subita generatione, visus, atque auditus minore læsione, cum in ventriculum. Frigidi contraria sunt signa. *Signa calidi et frigidi catarrhi distincta.*

*Catharrhi
curatio.*

In curatione res imprimis non naturales optimè sint compositæ. Esus largior, potus parcius impetur, quòd ex humidis vapores faciliùs succrescât. Somnus breuior, iis præferim, quibus hepar est præcalidum: talibus enim per somnum repletur caput. Iisdem inedia longior malo est: quia cibo & potu non refrigeratum hepar vehementiùs incallescit, vnde omnia vrit. Obesos abstemios esse oportet. Fugienda quæ caput calfaciunt, opplent, balnea, lotiones capitis, integumenta nimia, &c.

*Gal. lib. 5. §
13. Method.*

Considerata fluxionis natura, quæ est à parte vna ad aliam expulsio, indicatio prima sistendam fluxionem suadebit. Atque interim ad duos terminos respiciendum, vnde scilicet fluxio oritur, & in quem definit. Prior, qui membrum mandans appellatur, duas exhibet indicationes, vt excrementum auferamus, quod expellitur, & vitium, ex quo excrementa progignuntur emendemus. Recipiens quoque pars geminam præbet indicationem, vt eam roboremus, ne recipiat, & id quòd fluit aliò trahamus.

Vacuabitur materia, cadémque opera sistetur fluxio, sanguinis missione, nisi humores planè sint crassi, & à sanguinis natura plurimùm distantes: vbi reuulsione per ligaturas, frictiones & clysteres, materiæ præparatione, & per conuenientia medicamenta expurgatione contenti sumus.

Si tenuis & calida sit, syrupis adstringentibus & incrassantibus apparatur: vt iuiub. nenupharino, de portul. papauer. qui in tussiendo labore grauiore dantur è cochleari. Sedata fluxione purgatio præscribatur.

℥. fol. oxalid. scariol. portul. ana M. ss. polypod. quer.

contus. glycyrrhiz. ras. passul. mund. ana 3.3. salu. beton. faluiz vitæ, flor. viol. an. M.ß. f. decoct. vt est artis ad 3. 5. In col. fiat leuis ebullitio 3. 2. felic. sennæ orient. & ð.ß. semin. anis. in qua colata infunde rhei elect. 3. i. cinam. gr. 4. In expressione dissol. syr. de cichor. compos. cum rhab. 3. i. f. potus.

Si crassior sit materia, præparabitur & purgabitur vt in pituitosa cephalalgia.

Non omittenda interea, quæ vaporum ascensum ad cerebrum inhihent, vt pulueres, opiatæ, cõseruæ, electaria. vt

℥. conseruæ rosar. siccæ 3. ß. coriand. præparati 3. i. anis. cond. 3. ß. puluer. ros. sicc. 3. i. bol. armen. purgatæ ð. 4. puluer. electar. diaireos simplic. 3. i. diatragacanth. frigid. 3. i. sacch. ros. q. l. vt 3. 5. f. puluis. Post paltus singulos detur è cochleari.

Ex iisdem & conserua rosar. antiqua in eundem vsum opiata concinnari potest.

Remedia particularia vt errhina, apoph. & similia, non nisi consideratè vsurpanda, quod sæpiùs humores liquando & dissoluendo catarrhos commoucant.

De 1 ophthalmia.

CAP. 19.

Phthalmia, inflammatio est eius tunicæ, quæ corneæ adnascitur. Coniunctiuam² vocant. Hæc producitur à pericranio, à quo vasa deducuntur in oculum, per frontem mediam & tempora. Itaque ferè superficialis inflammatio est cum rubore, dolore, tensione, quæ vt augmentur, ita affectus magnus est. Exiguus, vt minuentur. In exigua inflammatione, maioribus⁴ remediis nõ est opus. Sed rosarum succo, oui liquore tenui, aqua ros. aut plantaginis, lacte mulieris,

¹ humidâ, nõ autem sicca.

² Quod cõnecit oculo cõ sua orbita.

³ Cuius generatio & affluxus materia non est perennis.

⁴ Vt phlebotomia, purgatione.

vel asinæ curari potest. Oportet hos succos instillare oculis, eosdem contegere pāniculo lineo, iisdem liquoribus insuccato. Postea verò iam declinante malo, santalos citrinos, modicum maceris, aut spicæ in aqua rosacea feruefacta s adhibebimus.

5 Ad humoris
concocti dige-
stionem.

6 Perenni ge-
neratione af-
fluxus causa,
& sympto-
matum vehe-
mentia.

7 Ad genera-
tionem prohi-
bendâ, mate-
ria cursum
reuocandum,
causamq; con-
iunctâ amo-
uendam.

8 Cuiusmodi
sunt frôtalìa
vulgò dicta.

9 Vt si mor-
bi species, ma-
gnitudo, cau-
sa & sympto-
ma desideret,
& ex afflu-
xu materia
ab orgasmo
magna sit
ophthalmia.

10 Vt calor
côtra naturâ
evanescat.

11 Sape ad li-
pothymiam
vsque.

Vbi verò 6 grauius malum est, 7 phlebotomia, arteriotomia, cucurbitula, sanguisugæ, scarificatio, purgatio, cauterium, paracenthesis, fortiora collyria, & localia 8 remedia instituenda sunt.

Phlebotomia, vbi 9 cætera consentiunt, vt ætas, vires, tempus, regio, & si dolor vrget vehementius, ac rubor & tensio maior est, subducta sponte sua, vel molliori clystere aluo, Cephalicam aperito eiusdem lateris 10 amplo vulnere, & quantum tolerât vires, 11 sanguinem educito: tum si fuerit opus, paululum recreatis viribus, & leui pharmaco purgato corpore. Hipp. de locis in homine metuit, ne fortiori pharmaco humores corporis agitati confluant in oculos. Quod consilium multis è recentioribus Medicis probatum est.

Itaque si biliosus sanguis est, quem ferè dolor acerbior sequitur, rhab. cassia, manna, catholico, electario de succo rosarum, hiera picra ventrem subduces. Dissolue æstate in sero lactis, decocto violarum & hordei. Reliquis temporibus, in decocto pectorali. Fortiores sunt pilulæ aureæ, pilulæ lucis, hiera diacolocynthidos. Si pituita, ex hiera picra, pilulis elephang. agarico mixtis formentur pilulæ. Diaphœnicon quoque ex vsu est, pilulæ fœtidæ, & coccæ.

In melancholicis, hiera Ruffi, hiera diaco. addito epithymo, aut foliis fennæ. Per interualla, clysteres

& suppositoria loco purgationum esse possunt.

Alioqui reuocandæ sunt purgationes. Iam bene purgato corpore, ¹² cucurbitulæ scapulis, & initio ¹² *Ad reuocandū fluxum;*
¹³ cervicis figendæ sunt, vbi & ¹⁴ scarificatio con- ¹³ *Quinetiā occipiti & to to capiti sunt cornicula asfigenda.*
 uenit, si quidem locus admixta cucurbitula vehementer intumescit, atque vbi grauitas est capitis. Perseuerante malo, vena frontis, vel quæ in syncipite apparet, quæ post aures, quæ in temporibus, in quibus ea eligenda est, quæ tumet, rubet, pulsat magis cæteris. Reliquias inflammationis vacuat ea, quæ ad maiorem angulum est. Loco phlebotomiæ nō nunquam hirudines inducuntur. Cartilago quoque auriculæ scarificatur. Quæ vena ad pollicem vergit, mediæ ramus est, quæ initio secta plurimum diuertit, & viribus ¹⁵ minùs detrahit, quàm secta cephalica. Arteriotomia locum habet, vbi calidus & spirituosus sanguis est. Huius rationem describit Galenus ad finem libr. 14. Methodi medendi, & Mesuæ cap. de ophthalmia. Cauteria tamē ad coronalem suturam, vt priùs post aures in occipitio, è regione oculi labotantis in cervicis initio imprimi possunt. Vt in syncipite medio, qua parte coronalis, raditur capillus, & cauterium applicatur. Eidem frictiones, sinapismi, phœnigmi, vesicationes institui poterunt.

Paracenthesis fit hoc modo. Prehendes digitis cutem cum carne, quæ initio cervicis est ad cauum occipitiij: tum acum tractam filo serico satis crasso transfiges. Et ita locum peruium ad triginta aut quadraginta dies permittes, per intervalla sublato, ac deinde reposito filo. Topicis vero hoc modo vtendum est. ¹⁷ Initio quidem reprimendum: ¹⁸

¹⁷ *Cum materia fluit, & tantum pars calet, & rubet.*

¹⁸ *Cum materia pars alia qua fluxit.*

DE MORB. INTERNIS

19 *Id fluxio-
nis initio.*

augmento, aliquid coquentium & reprimentium miscendum est. Vt verò procedit morbus, hæc augenda sunt, & minuenda, quæ reprimunt. Postremò roboranda pars est. Fouentur itaque 19 oculi ex decocto violarum, rosarum, sem. psilij, papa. albi, corticis radices mandragoræ, foliis: populi, salicis, rubi, myrti & similibus, distincta ratione ex natura humoris, qui fluit.

In augmento, decocto maluarum, althææ, cydoniorum, adiecta modica quantitate eorum, quæ reprimunt.

Procedente morbo, flores chamæmeli, anethi, meliloti miscendi sunt. Postremò etiam fœnugræci decocto vtendum. Vbi reprimendum, ex aqua communi, aqua rosarum, aut plantaginis, decoctio fit.

In augmento, lacte, postea etiam vino diluto.

20 *Si calida
sit materia.*

Itaque vbi topicis vtendum est, fouendus locus decoctione frigida, aut tepida, si leucæ adsunt, & pertinaciùs inhæret pituita, tum 20 medicamentum oculis instillandum. Postea gossipium madefactum in liquore conuenienti linteolo lineo inuoluitur: linteolum similiter insuccatur, & ita oculo insternuntur: tum ita alligantur fasciæ, vt ne oculus grauetur, aut doleat. Oportet enim quæ oculis adhibentur, læuia esse, molliâ, præterea sine morfu, sine emplastica & viscida natura, quæ pertinaciùs inhæreat, & celerius indurescat.

21 *Imò decies
22 Vt secun-
dum pericra-
nisi tunica.*

Quater in 21 die remedia innouantur, aut etiam sæpiùs, si vrget dolor. Quod si per 22 extetiores partes, quod sæpè fit, fluxio est, frons & tempora reprimente emplastro inducenda sunt.

Conue-

Conueniunt itaque initio 23 aqua rosarum, oui liquor tenuis, lac muliebre, aut alinæ. Succus rosarum, conferua rosarum, cum oui albumine, mucago sem. psilij, & similia. Vel hæc composita.

23 Ad reprimendum.

℥. succi mororum agrestium resiccati 3.4. (plus, minusue) quas cum oui albumine commiscebis, & siccabis rursus. Vfus tempore, 3.2. pulueris in lacte muliebri & aqua rosacea dissolues. Vtèris autem, vt supràdictum est, scilicet, instillando cum gossipio insuccato. Oui albumen agitaturn, & despumatum cum decocto papaueris albi, aut aqua rosarum, vtile est. Aliud.

℥. mucaginis sem. psilij, seminis cydoniorum, extractæ in aqua papaueris ana 3.1. liquoris tenuis oui 3.6. caphuræ Gr.8. croci Gr.4. Vbi dolor vrget vehemētius, vtendum est opio. Sed ab eius vsu, oculus decocto meliloti tepido, aut simili 24 fouendus est.

24 Vt corrigatur intemperies, quæ induxerit opio.

Collyrium album Rhazæ.

℥. gummi arabici, tragacanthi, amydi an. 3.1. cerusæ lotæ 3.1. β. opij Gr.7. Cum oui albumine fiat collyrium. Vfus tempore 3.2. in lacte muliebri dissolue. Crescente morbo.

℥. cerusæ plumbi lotæ cum aqua rosarum, & persiccata 3.2. caphuræ 3.β. cum oui albumine fiat collyrium. Vfus tempore dissolue in lacte.

Toto reliquo tempore morbi licebit vti si es, id est, collyrio albo cum opio, si vehemens dolor est: imminuta dosi opij, si non tam vehemens: omnino sublato opio, si levis est.

Sed addere oportet in 25 augmento sarcocollæ nutritæ in lacte mulieris 3.1. Et vt procedit mor-

25 In quo par cura digerendi ac repellendi esse debet.

DE MORB. INTERNIS

bus, in declinatione augenda sarcocollæ dosis est, ac tandem sola sarcocolla nutrita in lacte, & vino, vel aqua fœniculi dissoluta vtendum est.

26 Vbi tantū repellendum.

27 Vbi modicē digerendū.

28 Ex lacte muliebri, vel asina.

Mucago psilij 26 initio : 27 cydoniorū, in augmento : lini aut althææ, in statu : fœnugræci, in declinatione conuenit. Sed ab vna ad alteram paulatim transeundum est. In declinatione.

℥. sarcollæ 28 nutritæ ʒ. 3. s. croci, spicæ, ana ʒ. 3. aloës ʒ. ʒ. Aloë lauetur in aqua fœniculi. Huius pulueris ʒ. 2. in aqua fœniculi dissolue, aut aqua rosarum, si quid ruboris & caloris superest. Aliud.

Ouum crudum coctum, & ita induratum, calidum per se, vel è lacte muliebri subactum applicabis.

Pulsis citrinus, quo vtendum est in augmento & statu.

℥. sarcocollæ ʒ. 5. aloës lotæ in aqua rosarum drach. i. tragacanthi ʒ. ʒ. opij. ʒ. ʒ. vel Gr. 6. Quo tempore ouum crudum integrum sine testa per se, vel cum lacte muliebri, exceptum gossipio apponi potest. Roborando oculo vinum 29 adstringens dilutum aqua fœniculi, in qua spica aut stœchas coxerit, competit.

29 Aut collyriū ex quarta aquæ rosarū parte, vna vini, Et pauco mastiche confectum.

Anacolle mata, siue Frontalia.

℥. mannæ thuris, mastichis ana ʒ. 2. agitentur ex oui albumine. Aliud.

℥. farinæ fabacæ M. i. cum oui albumine fiat emplastrum. Aliud.

℥. emplastr. contra rupturam ʒ. 2. subigantur cum oleo rosaceo, & fiat anacollema. Aliud.

℥. myrrhæ, thuris an. ʒ. 2. farinæ volatilis. M. ʒ.

cum oui albumine fiat frontale. Aliud.

℥. boli armēnæ ʒ. i. aquæ ros. ʒ. 3. aceti ʒ. i. cum duobus albuminibus ouorum, fiat frontale.

Sic etiam ex farina fabacea aut siliginea cum oui albumine & modico croco frontale compingi poterit lana vel linteo excipiendum.

Balneum in declinatione imperari potest. 30 Er- 30 Propter
rhina quoque, gargarismi & masticatoria. Neque oculorum &
omittendæ sunt frictiones initio ductæ supernè narium sym-
deorsum ad diuertendum. Vide Aëtium. pathem in
ophthalmia

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Morborum oculi ut infinita propè multitudo est, ita in illis distinguendis maxima confusio, præsertim iis, qui ad ophthalmiam similitudine quadam accedunt, & inflammationem annexam habent, quales sunt, τῆς αἰθῆς, Montani opῆ
φίμωσης, χήμωσης, & ὀφθαλμία propriè dicta. Montanus nio à Gracis
vir alioqui doctissimus quanquam cæteris accuratius aliena.

hæc distinxisse epistola quadam videtur, à veterum tamen sententia, ut Galeni & Pauli Æginetæ, longè discedit. Scribit enim χήμωσιν palpebrarum inflammationem esse, licet aliquando partes cæteras in consensum trahat. At Paulus Ægineta χήμωσιν appellari ait, ὅταν Paul. Æg.
ὑπὸ φλεγμονῆς ἰσχυρᾶς ἀμφότερα τὰ βλέφαρα ἐκτραπῇ, ὡς cap. 2. 2. lib. 3.
μέλις ὑπ' αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καλύπτει· καὶ τὸ λαυρὸν ἢ ὀφθαλμοῦ μὲνισθῆται ἢ μέλανος γίνηται, καὶ ἐρυθρὸν, καὶ πολυμειῶς ὑπερλαμβανῇ ἢ μέλατος. Id est, cum utraq; palpebræ ex vehementi inflammatione inuersæ fuerint, ut vix oculi ab ipsis contegantur, & album oculi nigro sublimius euaserit, rubrumque etiam magna ex parte nigrum occupari.

Vidius quoque (ut doctissimè Ioannes Goræus annotauit) negligentius εἰς τὸ κατ' ἰντερίον legit χήμωσιν ἀντὶ τῆς φίμωσης. Sed his prætermisissis omnia facillimè sic distinguuntur. Sileus quædam inflammatio, & veluti phlegmōnes principium sine discrimine partes oculi in-

τάραξις.

uadens primo intuitu appareat, cum rubore quidem, sed exiguo, quem dolor mitis cōsequatur, *τάραξις* erit duntaxat, id est, oculi perturbatio. Hæc enim certissima signa sunt, quod hic affectus, neque phlegmone sit cōfirmata, neque vnus magis, quàm alterius partis proprius, neque vehementem dolorem habeat, aut tumorem.

Quibus si adicias à causâ externa excitatum fuisse, vt sole, fumo, puluere, oleo, radiis lunæ, vino, esu, cæparum, crucæ, aliorum, sinapi, ictu, quæ omnia ab ægro diligenter exquirenda, tum nulla in iudicando dubitatio esse poterit. Paulus à manifesta tantum causâ fieri vult. Experientia tamen constat non rarò ab interna excitari, præcipuè vitio ventriculi, & post egregiam potationem, neque tamen propriè esse ophthalmiam, licet aliquâdo in corpore cacochymo, & si negligatur, in eam faciliè degeneret. Si verò palpebræ tantum inflammationem patientur, atq; in sese concidât, vt oculus aperiri nequeat,

φίμωσις.

φίμωσις erit, id est, præclusio quædam, & quasi ligatio eorum, quæ secundum naturam aperta & reclusa esse debent, siue cicatrice, aut carnis incremento partes coalescant, vt labra vteri: siue inflammatione, vt palpebræ oculorum. Contrà, si oculus apertus maneat, nec claudi possit, albo nimirum oculi in tumorem sublato, atque eminente, nigro verò subsidente, & veluti hiatum quendam efficiente, *χίμωσις* est. In qua præter ruborem & inflammationem, pathognomonicum signum est, palpebrarum, vt ait Paulus, *ἐκτροπή*, id est, conuersio, quia adduci non possunt. At si coniunctiua tunica, siue adnata phlegmone laboret, cum tumore, tensione, dolore, calore & rubore, ophthalmiam esse nō dubitandum. Ergo *τάραξις* (quam ophthalmiam non veram vulgò appellant) affectio est omnium oculi partium externarum cōmunis: *φίμωσις*, palpebrarum: *χίμωσις*, albi oculorum: ophthalmia, adnatæ membranæ propria.

Sæpe omnes inter se vel plures commiscuntur.

Ophthalmia
sanguinea si-
gna.

Fiunt ophthalmiæ, vt cæteræ inflammationes, à sanguine, bile, pituita, melancholia, flatu. Sed frequentius à sanguine, aut bile.

Sanguineæ signa sunt, tumor maximus in loco rubor, tensio, lachrymæ crassiusculæ, quæ faciliè exsiccantur, for-

des molles in aculorum angulis. Quibus adde redundantis sanguinis in corpore indicia.

*Ophth. bilio
sa signa.*

Biliosæ, tumor moderatus, in superficie, color subpalidus, dolor acris & mordax, lachrymæ vel nullæ, vel parvæ, falsæ, amaræ, statim concrecentes, sordes in angulis siccæ & asperæ, vigiliæ, extremæta biliosa, corpus gracile, quâdoque febris tertiana, si materia fuerit in vëtriculo.

A pituita, tumor maior, sed laxus, color albus, lachrymæ plurimæ, tenues, insipidæ, sordes vel nullæ, vel molliusculæ, corpus pituitosum, &c. A flatu rara est, tensionemque habet sine gravitate.

Ophthal. pituitosa signa.

Per defluxionem fieri intelligimus, cum repentè inuadit, nec præcesserunt lachrymæ, sordes, erosiones à quolibet aëris excessu. Per essentiam verò ex cōtrariis signis, & si dolor ad interiores capitis partes non perueniat, à quibus adnata mēbrana nascitur. Humidior autem efficitur ob materiæ multitudinem, tenuitatem, loci affecti raritatem, caliditatem aëris, virtutis expultricis robur, & retentricis imbecillitatem. Sicca quam Græci

*Ophthalmia
per essentiã
facta, ab ea,
quæ per defluxionem, & lib
stincta.*

ξηροφθαλμίαν vocant, contrariis causis constat, periculosiorque est ob materiæ acrimoniam, qua sæpe vlcus inducit.

*ξηροφθαλ-
μία.*

Sedato capitis dolore, si adsit, conueniunt sanguinis missio sæpius repetita, cucurbitulæ cum scarificatione, elyster, topica repellentia, collyria anodyna, purgatio, balnea meri potio, emplastra. In taraxi, subducto ægto à causa externa ablatur oculus tepidâ primùm, deinde frigidâ, abstinencia à cibo, somnus. Perpetuò & subinde imponenda medicamenta, quia eluuntur nouo humore, & lachrymis affluentibus. Nonnulli è recentioribus Hippocratis autoritate moti, fortiores purgationes nõ

*Hipp. lib. de
locis in homi-
nib. ne.*

probant, quòd sic commotus humor defluat in oculum: alij contra. Vidi contumaces ophthalmias non potuisse curari sine fortium catapotiorũ vsu, hiera diacolocynth. & similibus id genus vehementioribus medicamentis. Sed omnia pro humoris quãtitate & qualitate tēperāda.

[Amplio foramine.] Tum vt crassior sanguis exeat, tum vt maturius animi deliquium sequatur. Quod plurimũ conferre ostenditur historiã adolescentis, de sanguinis missione, 6. Epidimion, 13. Methodi, 2. ad Glauc. Aëtius è 3. Tetrab. 2.

*Aëtius ferm.
3. Tetrab. 2.*

fronte, & angulo maiore. Sed hoc post sectionem cephalicæ, perseverante dolore. Tunc enim primum vena frontis, ac tandem, quæ est in maiore angulo ad nares, secari potest. Cæterum ramus mediæ initio diuertit, & minus detrahit viribus, quàm cephalica.

Oportet hos succos instillare oculis.) Satius erit plurimum diluere oui liquore optimè confrecto, vt nihil habeat visceri, & lacte mulieris iuenculæ, deinde etiam fœnugræci decocto. Aut rosas, myrtos, tubos, & similia cū fœnugræco, chamæmelo, seminib⁹ lini, & similibus in aqua simplici aut plantaginis incoquere. Deinde pannis molli-
libus ad oculi magnitudinem complicatis, insuccatis & admotis partes vicinas fouere, Æstate quidem frigidis, Hyeme verò calidis, sæpius innouatis. Lenta Galenus laudat, quia aspera oculum offendunt, Periculosa tamen sunt, si nimis corpulenta & viscida: quia frequenter loco adherent, aut exsiccantur, aut putrescunt, sed tum maxime si pustula aliqua sub sit. Narcotica, si acrior dolor sit & humor, effluxum prohibent, acrimoniam retundunt, & oculi sensum hebetiorem reddunt. Sed his neque

Narcoticis in principio, neque ante purgationem est vtendum, *quando sit* idque necessitate cogente, vt docet Gal. commen in aph, *dum ex Ga-* 31. libr. 6. vbi addit etiam tunc eas indurari, & adstringi.

Vitriolum humidioribus oculis nonnulli inspergunt, alij tritum oui albumini inspergunt, idque aqua calida coquunt dum concreuerit tum exprimunt, & liquorem oculis infundunt. Ab acrimonia tamen cauendum. Cerasa Venera (Galenus Rhodiacam vsurpabat) optima est dissoluta in lacte decoctionis foliorum capitum seminis papaueris: pulicula è semine papaueris albi, & hyoscyami, decoctam foliorum papaueris, capitum seminis, & inde foras. In fœnugræco bene loto & macerato magna vis inest. Bene purgatur, multum abluatur, maceratur per diem in aqua purissima, in fictili bene coquitur: abiecta aqua, alia infunditur, coquitur puro igne, idque ter faciendum affusa semper aqua noua, vt omnis amaritudo eluatur. Coquitur verò ad liquidi mellis spissitudinem operto vase. Sine expressione colatur linteo. Colatura seruatur vsui ad tertium diem ad summum.

ANTO. VALETII EXERCIT. XIX.

Cum adnata oculi membrana, quæ natura alba est, ob sanguinis affluxum cruenta apparet, ex oculis lachrymæ resudant, & in canthis maioribus sordes quædam colliguntur, ægrum ophthalmia infestari certum est. Huius causæ externæ, internæ. Externæ, fumus, Sol, corporis motus, casus, percussio, &c. Internæ, plenitudo, humorum acrimonia, distentio à crassis & viscidis succis, aut à spiritu flatulento. Eò cõfluit humor aut à pericranio, vel à cerebro: & tum dolor capitis interior est, sternutatio frequens, curandi maior difficultas. Expectatam opem requirit hic affectus, quòd, negligenter si curetur, facilè in suffusionem, pupillæ dilationem, nonnunquã in tabem, seu corrugationem desinat. Itaque antequam ullus topicis oculorum remediis sit locus, toti corpori atque capiti sectione venæ humeralis patienti oculo è directo oppositæ, aut eius, quæ in extrema manu pollici est vicina, prospicitur: deinde purgatione. Educendus humor, si biliosus, ut sæpius esse consuevit, ita vacuetur.

*Ophthalmia
causa ex
Gal. cap. 22.
lib. 3. Meth.*

*Ophthalmia
curatio.*

*Rhaz. cap.
15. lib. 9. ad
Almansorec.*

℞. express. 3. 3. myrobal. citr. in aq. cich. bugloss. vel borrag. infusar. rhei elect. seorsim similiter infus. 3. 2. cinam. ʒ. i. In qu. dissol. cathol. & syr. acetos. simpl. ana ʒ. ʒ. f. potio.

Pauperibus electar. de succo ros. syr. laxar. ros. pallid. diluuntur aquis suprà dictis. Si permista sit puita multa, pilulæ è hiera simplic. coctiæ, de agar. lucis, utiliter præscribuntur.

Mox topica veniunt usurpanda. Ac quidem iniitiis phlegmones collyria ex repellentibus & anodynis oculo imponenda: cataplasmata ex adstrin-

gentibus, quæ vias contrahant per quas fluit materia, fronti & temporibus aptanda. vt.

℥. mucag. sem. psilij in aqu. plantag. aut rosar. extractæ ʒ. i. s. cum albumine oui in lacte muliebr. agitato, vel cum aqu. ros. q. s. f. collyr. vel. ℥. trochisc. albor. Rharzæ ʒ. i. s. pompholyg. lotæ, sacchar. cand. ana ʒ. s. aquar. plantag. & rosar. ana ʒ. i. mucag. superioris ʒ. 2. f. collyr. addita pauca caphura, si vrgeat dolor.

Fronti imponitur cataplasma ex bol. arm. terr. sigill. mastich. ana q. s. except. albumine oui. In incremento quia non modò repellendi, sed etiam digerendi, cura incumbit, superioribus mucaginibus & aquis adiicientur aquæ fœnic. euphras. verben. chelidon. maioris: mucagines lini, althææ, fœnug. Et, si simul detergendum sit, proderit nonnihil syrupi ros. siccarum immiscere. In statu præualebunt digerentia. vt

℥. aqu. euphras. fœnic. & chelidoniz ana ʒ. i. aloës lotæ in vino albo ʒ. i. s. tuth. præparat. ʒ. s. sacchar. cand. ʒ. 2. syrup. ros. siccar. ʒ. s. f. collyrium.

In declinatione vacuabitur materia reliqua ex oculo fomento & decocto seminis fœnugr. meliloti, aquæ calendulæ cum sponsia, aut linteolo molli.

De I Debilitate visus. CAP. 20.

MYopas Græci vocant, qui à primo naturæ ortu non nisi admota oculis cernunt: eaque² exertis propè oculis, palpebris contractis, atque conniuentibus. Id quod efficit³ tunicarum oculi raritas, tenuitas humoris, subtilitas spiritus visorij, qui priusquam angulum faciat, dissolvitur atque evanescit.

1 Quæ sit febris expers, cuius causa vel in cerebri vitio consistat, vel spiritus animalis, vel tunicarum & humorum oculi.

2 Propter spiritus visorij paucitatem, tenuitatem, & tunicarum raritatem.

3 Præsertim cornea, & vasa.

Sunt, qui eo nomine vespertinā etiam 4 aciem appellant, cum interdiu obscure: noctu & sine lucerna, acutius videant. Rara affectio hominibus ab eadem causa, nisi quod illuc infirmitas maior est: hic luce quidem diffluit spiritus, nocte cogitur, atque temperatur. Contrā verò Nyctalopes interdiu vident, 5 caligant ad lucernam: quanquam & hoc nomen nocturnæ cæcitatē ad Myopas etiam trāferant, ut Octavius.

Amaurōsim verò & Amblyōpiam, hebetudinem, atque obscuritatem visus ita distinguūt: quod illius multæ causæ notæ sunt: huius nulla 6 causa manifesta. Quia cum pupilla pura sit, neque vitium ullum appareat in oculis, videndi tamen libertas intercepta est. Huius tamen 7 coniectura quadā curationem admolimur, medicamentis, quæ ὀξύδορ-
κῆν, ἢ ὀξύδορρικὰ φάρμακα appellantur, quia videlicet, cum nullum accidens manifestum insit oculis, acuunt tamen visum, atque instaurant.

Causæ tamen utriusque mali, vel in humoribus oculi, vel in natura visorij spiritus, vel in tunicarum habitu recondita est: vel quia interceptus est, aut resolutus nervus opticus. Summatim in iis, quæ natura ad legitimam videndi facultatem instituit, spiritus neque 8 crassior, neque tenuior esse debet, sed æria tum naturā, tum substantiā, tum qualitate moderatus, iusta etiam quantitate, quæ omnia pendet à natura sanguinis & pituitæ, in quibus substantia est spiritus. Temperatus enim sanguis eundem spiritū gignit: intemperatus verò vitium reddit. Subtilior spiritus obscuro loco melius habet, ut in vespertina acie. Tenebris enim colligitur, crassescit, &

4 Quod amblyopie aëre crassiore animalis spiritus cogatur.

5 Quia spiritus eorum visorij crassior est, non æreus.

6 Unde hæc à recentioribus gutta serena dicta, quod nullo, quod in oculo cerni possit, vitio, videndi facultas amittitur.

7 Ut cum clauso altero oculo, pupilla non dilatatur: unde nervi optici obstructionis sit significatio.

8 Aut impurior, ut scilicet contiguus aëre illustrare non possit.

9 *Galen.ca.
I.lib. I. de
symptom.
caus.*

frigidior redditur. Idem efficit, ut minima 9 cernamus, & pingamus calamo: sed tantum ea, quæ in proximo sunt. Contrà verò crassior spiritus, ut in senibus, remotius posita intueri potest, tantum cernit maiuscula, eademque calamo pingit. Ex quo inuenta est ratio Opticorum in specularibus, ut cœuexa, minores: concaua, maiores: plana, æquales formas & literas representent. Vt enim oculares radij maiorem minoremve angulum describant, ita formæ oculis proponuntur.

10 *Id est,
cacitatis no-
cturna, desi-
derata ratio-
ne & ouuav-
yais in spi-
ritu animali.*

Curatio 10 Nyctalopis & debilitatis visus.

Hæc vitia magna ex parte ab humorum vel vaporum crassitie excitantur: multò maximè, si drepentè orta sunt, & 11 grauitas sentitur in radice oculorum.

11 *Quæ si-
gnū est par-
tis ab humo-
rū copia op-
pressa.*

Aperiatur itaque primùm cephalica, si res postulat. Alioqui, si 12 cacochymum corpus est, purgetur hoc modo.

12 *Et si hu-
mor crassus à
concoctione
segregatus
videatur.*

℞. pul. hieræ picræ Gal. ʒ. 2. pul. diacol. 3. β. casto. ʒ. β. sem. fœniculi, nucis moschatae an. Gr. 6. cum succo rutæ formentur pilulæ. Possunt & pil. cocciis, pil. lucis, elephanginis, mixto agar. purgari. In glaucis oculis, quique venas plenas & amplas habent, mitioribus pharmacis uti oportet. Mollis tenetur alius pilulis factis ex aloës 3. l. terebinth. 3. 2. vel ex cassia. Alioqui 13 polypodio, cnico, mercuriali, multa borragine, iusculo concoctis. Tum 14 errhinis, apophlegmatismis, sternutatoriis utendum erit.

13 *Si pilulis
stomachicis
uti non licet:
ut in hamor-
rhoidas ha-
bentibus.*

14 *Errhinis
minimè uten-
dum, nisi su-
blato omni
inflamationis
metu.*

Cucurbitula occipitio fixa cum scarificatione ea vi obstructions liberat, ut ea ipsa etiam dum hærente aliquando visus restitutus sit.

Constrictio colli ita spiritum impellit in oculos, ut inde ampliatis viis & spiritu liberiore, visus redatur, aut certè acuat. Post hæc extrahendus sanguis ex angulis oculorum. Rhazes etiam è fronte, Mesuæus è naribus sanguinem educit.

Topica.

Infinita propè describuntur, quæ ex variis authoribus colligi possunt. Tradunt capras nō minùs noctu cernere, quàm interdiu. Et ideo caprinum iecur, si vescatur, restituere vespertinam aciem iis, quos Nyctalopas vocāt. Idem iecur assum & cum sale comestū iuuat, aut sanie, quæ inde effluit, dum assatur, oculos illinunt. Alij vaporem elixati iecoris oculis excipi iubent.

Sunt qui hirci potiùs, quàm capræ, & hirci mortani iecur imperant. Nonnulli configunt caryophyllis: alij irrorant aqua fœniculi: hocque remedium cōmune faciūt Myopibus, qui tantum noctu vident, Octavius & Herophilus, quod non probat Aëtius. In senectutis magis, quàm oculorum vitio succum mali granati optimo melli æqualiter commiscebis: aliquot dies insolabis, aut calidis cineribus coques. Conuenit pictoribus, lectoribus, & scriptoribus.

Alij granatum acidum, deposita duriore testa, contundunt: melli miscent: concoquūt, ac tandem vehementer exprimūt, eidem remedio, fœtori oris, firmadis dentibus, gingiuis, ozænis, quando carnes quædam adnascuntur dentibus. Herbæ cōueniunt, fœniculus, ruta, chelidonia, euphrasia, verbenæ, asparagus, betonica, chamædrys, raphan⁹, balsamita, pimpin. caryophyllata, apiū, maiorana, martubiū,

15 *Nec est
probandum.
Non enim
myopibus
collyria oſu-
dogrū sunt
prescriben-
da, sed in cras-
santia.*

DE MORB. INTERNIS

parietaria, hyperici flores, meliloti, rosmarini. Aromata, macis, cinamomum, nux moscata, lignum aloës, spica, fantali. Conseruæ, enulæ, acori. Horum omnium vsus est, vel quia eduntur, vel quia musto feruent, aut in puluerem redacta sicca collyria faciunt. Aut cum melle commiscantur, & eorundem succus: aut in alembico distillantur. Redditur aqua efficacior, si quid mellis liquidioris commisceas, dum distillantur. Atque hac etiam fortior, cum mel scylliticum in alembicum coniicitur. Laudata est olim lactuca sylvestris. Cuius rei argumentum, quod Aelianus scribit, Accipitrem tinnunculum (*Quercellam vocant*) acerrimo lactucæ syluaticæ succo oculos illinire, atque ita laborantem aciem instaurare. Quod deinde Medici secuti sunt. Atque hinc oculorum medicina Hieracia, quasi Accipitraria, vocata est.

*Aqua, quam scribunt restituisse visum
cæco nouem annorum.*

℞. succi apij, fœniculi, verbenæ, chamædryos, pimpinellæ, caryophyllatæ, saluiæ, chelidoniæ, rutæ, centinodiæ, morsus gallinæ, caryophyllorum, fari-næ volatilis, ana ʒ. i. piperis crassiusculè triti, nucis moschatæ, ligni aloës ana ʒ. ʒ. Omnia immergâtur in vrina pueri incorrupti, & sexta parte vini maluat-ici. Bulliant breui tempore: tum exprime, & percola. Repone vase vitreo bene obturato. Horâ somni singulas guttas singulis oculis instilla.

Dum effervescent mustum, euphrasia iniicitur. Vinum repurgatum asseruatur singulari remedio. Eiusdem herbæ puluis sorbili ouo inspergitur, aut inde sal oxydorcicum paratur.

16 *Præfer-
tim Narbo-
nensis, quod
thymum re-
dolet.*

℥. salis communis ʒ. i. euphrasie siccae ʒ. ii. macis, cinamomi ana ʒ. i. misce.

Flores rosmarini amphorâ vitrea concluduntur: quæ duplicato linteo cerato obteguntur in arena, ut mos Chymicis. Liquor redditur efficacissimus oculorum claritati. Accipitur (*Emerillon vulgò*) unguento susino decoquitur: vinum absynthites, aut rhodinum, antimonium, tuthia in aqua fœniculi extincta. Pica avis in testaceo vase cremata, & in cinerem redacta, vehementer laudatum remedium à Practicis.

℥. Sileris montani, maioranæ, euphrasie, rutæ, chelidonie, summitatum fœnic, ana ʒ. ʒ. zinzib. spicæ nardi, piperis longi, caryop. tuthiæ extinctæ & nutritæ, sarco. nutritæ in lacte asinæ, ligni aloës ana ʒ. i. fellis aquilæ aut accipitris, balsami ana ʒ. ʒ. mellis ros. ʒ. i. conquassanda conquassentur, liquabilia liquefiant, misceantur: & Aestate quidem, quadraginta diebus insolentur, semper agitando & obuertendo vas. Hyeme in cineribus moderatè calidis, simpliciter macerentur. Reponantur vase vitreo ad usum. De esu viperarum alio loco. Ut vis medicamenti penetret, aqua tepida è gossipio, vel molli linteolo fovebis oculos. Frequens usus trypheræ minoris, chebuli conditi, mythridatii & theriacæ: sed magis Hyeme commendatur. His autem uti oportet iam bene purgato corpore, ut etiam sinapismis & cauteriis. Rationem vitæ, & reliqua remedia localia ex aliis colligito.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Αμϰλνωπία, & Αμάνρωσις morbosæ sunt oculorum affectiones, cum visus vel hebetior est, vel omninò subla-

Αμϰλνωπία.
Αμάνρωσις.

DE MORB. INTERNIS

tus, sine tamen villo oculi manifesto affectu, aut vitio, in partibus oculi, quæ sub aspectum cadunt, nobis apparente, solâque causarum intensiōe & remissionē differunt: quòd illa imbecilliores: hæc vehemētiōres, & iam confirmatas causas habeat. *Μυωπία*, vel *Μυωπίασις* est, cum visus non omninò quidem sublatus, aut hebes & obtusus, ut in superioribus, sed diminutus ita, ut propius admota, etiâ minima, æger cernat, & exactè distinguat: ad remota tamen, & paulò longius distita penitus illi caligent oculi. Malum à natura sæpe contractum, quo laborantes Budæus Lusciosos, & Luscitiosos, & Nuscitiosos vocat, quales ferè, cum paulò diutius legerint, aut oculos aliquò coniectos habuerint, exhausto spiritu tenuiore cœcutiunt, aut limis, semiclusisq; oculis volitantia quædam in aëre corpuscula sese intueri putant. In Nyctalope visus itidem diminutus est, sed symptomata diuersa, quòd interdiu videant, Sole occidente obscurius, noctu nihil, quasi *ὁ τῆς νυκτὸς ἀλαός*, id est, noctu nihil videns. Atque hæc sunt affectiones, quæ visum solent intercipere, nullo manifesto affectu in oculo apparente, sed pupillâ planè pura, atque incolumi, si adicias quosdam, qui noctu melius vident, quàm interdiu, quod rarissimè contingit. Dux priores affectiones ferè sunt in neruis opticis, aut cerebro: posteriores in humoribus, tunicis, sed frequentius in spiritibus. Verùm & locum affectum, & causas affectus remota penitus nominū ambiguitate & confusione, quòd non omnes (ut in cæteris ferè paulò difficilioribus) in eadem significatione usurpent, ita distinguere licebit, & quasi typo, ut Aristoteles loquitur, depingere. Si æger vel nihil omninò vider, vel diminutè, sed semper æqualiter, & vno oculo clauso, alterius pupilla non dilatatur, nullo, scilicet, irridente in eam spiritu, signum est spiritum transire non posse ad oculum per neruos opticos, aut si transeat aliquis, non sufficere tamen ad oculum illustrandum. Idquæ fiet vel vitio cerebri, vel meningum, vel nerui optici.

Spiritui visorio ad oculos deducendo quæ necessaria instrumenta.

Hæc enim sunt ad spiritum vel generandum, vel deducendum necessaria. Si vitio cerebri spiritum non supeditantis, aut corruptantis, ut post insignem euacuationem, longum morbum, maxime in senectute, in

cæteris etiã sensibus læsio aliqua percipietur. Nam cùm omnes sensus inde prodeant, tanquam riuuli, quomodo vni morbum, quo afficitur, communicare poterit, cæteris integris manentibus? Ergò si simul cum visu cæteri quoque sensus afficiantur, & grauitas capitis percipiat, (additis semper causis antecedentibus & externis, obseruatisque diligenter partium, quæ cum cerebro cõsentiant, affectibus) de cerebro læso coniecturam certissimã habemus: siquidem quæ generali illo axiomate, tanquã fundamento firmissimo, nititur, membrum esse sanum, cuius actio sana est: læsum, cuius actio læsa. Si in meningibus, ad oculorũ radices percipietur dolor, aut grauitas: sin minùs, in neruo erit, vel resolutio, vel obstructio, vel contortio. In contortione vident obliquè: in obstructione, si perfecta sit, nihil: sin minùs, parum, sed eodem semper modo sæpiùsque repentè, & vno impetu incidit ab humore, aut spiritu, vt post excrementa alui retenta, cruditates, insolationem, capitis ardorem (quod in pistore vidimus iuxta furnum ignitum repentè cæco facto) ictum, casum, concubitus, & similia, quæ caput replere, aut humores commouere possunt. Resolutio fit in neruis per inanitionem, aut repletionem, de qua satis in superioribus. Hæc omnia in vniuersum causæ sunt & signa ἀμελυσίας, καὶ τῆ ἀμαρτυρίας. In spiritibus affectiones ex eorundem naturali constitutione deprehenduntur. Debent enim moderati esse in subtilitate, crassitie, fulgore, obscuritate. Paucitatem & multitudinem adderem, nisi quia vix vnquam sat multi esse possunt. Qui multos subtiles & lucidos habent, atq; in vnum cõactos, nullo aliunde impedimento accedente, hi omnium vident acutissimè. Cæteri sunt præter naturam. Quorum variæ differentiæ constitui possunt. Sed precipuè, quæq; *Spiritus videntur frequētius, sunt huiusmodi. Subtilis, paucus, lucidus: crassus paucus: crassus multus. Quia enim subtilis, paucus & lucidus, subtilitate facillè dissoluit, paucitate resoluitur, ac luce maiore offenditur, inde hæc symptomata consequi necesse est, vt ita affecti remota intueri nequeant, propinqua exactè discernant, obscurior paulò aëre oblectentur, nec diutius legere, aut oculos in rem aliquã intentius defixos habere possint. Quibus*

DE MORB. INTERNIS

*Visio absoluta
taquâ fiat.*

*Myopibus
ab ortu quid
maximè con-
ferat.*

si accedat pupillæ amplitudo paulò maior, parùm abe-
runt à cæcitate. Vt enim visio absoluta fiat, in fœtum &
densum conum spiritus coire necesse est, qui pupillæ
amplitudine diffunduntur ferè in meatu. Quo fit, ut ita
laborantibus nullum (si ab ortu contractum sit malum)
præstantius remedium afferri possit, ocularibus ad oculi
formam cauis, & circumferentiâ densioribus, quò spiri-
tus in centrum, tanquam pupillam, cogantur, & confer-
tim prodeant. Quod in multis feliciter sumus experti.
Atque hæc est causâ propria *μυωπίας*. Si verò pauci sint
spiritus & crassi, paucitate hebetior visus est, crassitie ob-
scurior, ob idque egent lumine externo, ut illustren-
tur. Hinc fit, ut interdiu satis acutè cernant, occidente
sole obscuriùs, noctu nihil, aut parum. Quod de Nycta-
lope diximus. In quibus verò multi sunt spiritus & cras-
si, ij longiùs posita meliùs circumspeciant, quia opus est
multa luce, proindeque interuallo longiore ad illustra-
tionem. Crassities autem omnis aliquando à crassiore
sanguine, aut alimento originem habet, sæpe à vaporib-
us, aut humiditate cerebri. Et si ad maiorem angulum
fiat fluxio, è syncipite: ad minorem, è venis post aures,
& quæ in temporibus. Vnde etiam efficitur, in his noctu
obtusiorum esse oculorum aciem duabus de causis:
tum quia sufficienti lumine destituuntur spiritus: tum
quia eo tempore lunæ influxu humor accrescit. Cui cõ-
sentaneum est, quòd in plenilunio habent deterius.
Quòd si qui noctu videant clariùs, quàm interdiu, vna
ex duabus causis contingere poterit: aut quia igneos
habent oculos, ut experienciâ in quibusdam animalibus
obseruare licet: aut quia subtiliores spiritus, qui crasse-
scunt nocturno aëre, & cogantur, nec dissipantur. Qui-
bus omnibus fidem facit experientia & curatio, quæ sin-
gulis causis ingeniosè accommodata nunquam fallit:
sed longior ac difficilior, quàm ut breui annoratione
comprehendi queat. Sunt & aliæ causæ imbecillitatis
visus, in crySTALLINO humore, rhagoide humore, qui cry-
STALLINO prætenditur, ut infringat vim splendoris exter-
ni, & madefaciat crySTALLINUM, cicatrix inducta cor-
neæ, & similia. Sed hæc omnia iustum commentarium
desiderarent.

Οξυλογον, &c.] Huiusmodi sunt collyria quædā apud *ὀξυλογον*
 Gal. 4. *ῥῖν* & *ῥῖν*. Similia sunt sequentia. Viperas qui *remedia.*
 dam fimo sepe liunt: gignuntur vermes, inde aqua di-
 stillatur mirabilis. Ab aliis viperinus adeps, cum viperis,
 theriaca & rebus ocularibus distillatur. Viperarum ca-
 pita cremantur ollā. Cinis cum cremore lupinorum sub-
 igitur, & illinitur temporibus. Vina factitia, rebus cōue-
 nientibus cum musto coctis & racemato. Mel anthosa-
 tum distillatum cum suis floribus & cacuminibus ros-
 marini. Hyrundinis cerebrū ex melle tritum, vel exuiū
 serpentis ex melle quoque tritum. Nux moschata con-
 dita diuitibus, aliis ex vino manē & horā somni odora-
 ta, inspirata. In Nyctalope hepar hircinum affato, & cre-
 morem fluentem illinito: ipsum verò hepar edendum
 præbeto. Columbinum sanguinem illinito: aut fel capre
 hepar caprinum coquito: obuelato capite, & in ollam
 aduerso, fumus oculis excipiat: ipsum verò hepar as-
 fiduē edendum præbeto. Aut idem hepar concisum pi-
 pere longo, & sale gemmæ conspersum in carbonibus
 affato: excipiat fumus. Ex hoc citò auxilium percipi-
 tur. Succus recens stercoris asini, fel vulturis illitum, vel
 cum succo porri, cōmixto melle. Peucedani succus cum
 succo sceniculi. Anagallidis succus tertio quoq; die ocu-
 lis iniectus idem præstat, & pannum iam factū in oculo
 consumit. Pulli hyrundinis acu ex ære in nido excæcan-
 tur, signantur, vt internosci possint. Tertio die capita præ-
 ciduntur: incenduntur, pulvis cum balsamo in oculum
 instillatur. Vasa ænea ocularibus medicamentis proba-
 ta. Apodes (vulgò Martinets vocant) vescuntur chelido-
 nia. Cinis vsus est: aqua hyemē. Aquæ potus. Argumen- *Hydropota*
 to, quod qui aquam bibunt, acutius vident, vt scripsit *acutius vi-*
 Arist. in Probl. Inspirationes, quàm fortis meliores, Sed *dent.*
 ante masticanda sunt ocularia medicamenta. Lingere
 oculos catelli linguā, vel pueri. Scarificatio auricularum,
 & perforatio, Barbatorum more. Parum bibendum in
 humidioribus oculis & excrementitiis. Emunctioni as-
 fuescendum sine vi. Vapor è decoctione rutæ, marrubij,
 sceniculi, euphrasie, chelidonie, ligni aloës, croci, cocto-
 rum in aqua & vino. Ex his cum melle distillatio. Decu-
 bitus, cum legit æger, & caput erectum, non demissum.

DE MORB. INTERNIS

Butyri magna vis. Illitum mollit, lenit, polit, laxat, resoluit, coquit: ideoque hebetudini, præsertim à siccitate, prodest: cicatrices & albugines exterit, declinationem calidarum fluxionum iuuat: soluitur: & linteo inde madefacto fit forus. Caput mundum & pedes.

Hieracia.] ἀπὸ τοῦ ἱεράκου, id est, Accipitre. Apud Galen. num 4. τῶν 27. τῶν 7. cap. 7. & Cornelium Celsum, reperitur Hieracis collyrium, ad obscurum visum & scabras affectiones. Inde etiam nomen herbæ, quam rustici corrupto vocabulo ichoream luteam vocant, à florum colore, in pratis frequentem. Accipitres autem scalpendo eam, succoque oculos tingendo, obscuritati visus mederi, ob idque vocant ἱεράκιον.

ANTO. VALETII EXERCIT. XX.

*Galen. init.
lib. I. de caus.
Sympt.*

OMnis visionis imbecillitas, si oculo propria existat, aut est à primarij eius instrumenti, humoris videlicet crystallini, morbo, aut à vitio facultatis, vel à partium humori crystallino inferuentium affectu. Causæ sunt, spiritus crassior vel tenuior, paucior vel vberior, interceptus in optico nervo: humores quoque oculi crassiores, aut tenuiores, tunicae eodem modo affectæ. Aliàs verò accidit hæc affectio ex subiectarum partium, ut pote ventriculi, consensu: interdum à toto corpore atrophia defecto: Quæ per idiopatheiam oculi fit, operosiorrem curationem requirit, ut quæ per consensum, leuiorem.

Victus tenuet & siccet, ut causam coniunctam oppugnando, & antecedentem prohibendo prosit, vapor aditu ad caput prohibeatur. Hinc blando aliquo cathartico exhibito, ut pilul. stomachic. catholic. vel simili, materiam aparato zulapiis è syr. de hyssop. stœchad. oxymelite utroque, aquis scenic.

beton. euphrasæ, & aliis id genus ocularibus, concinnatis: & subinde purgato.

℞. pilul. elephang. 3. i. agar. trochif. 3. i. excipiantur aq. euphrasæ, fœnic. vel chelidon. f. pil. molles.

Efficaciores erunt additis aliquot dacrydij granis, aut trochisc. alhandal. Vel, cum materia fuerit radicitus extirpanda, cocciis, vel foetidis uteris. Si æger catapotia abhorreat, potio imperetur.

℞. agar. trochif. 3. i. s. rhei elect. 3. 4. macerentur seorsim in aqu. fœnic. & beton. vel hyssop. In express. dissol. diaphœnic. 3. 2. syr. è stœch. 3. s. f. potio.

Quod ad particularia attinet remedia, infinita ferè ex Aëtio, Paul. Aeg. Trallian. Rhaze, Gattinaria, Arculano, ab Hollerio recensentur, in quibus tota curationis momenta sunt.

De Catarrhacta.

CAP.

21.

Catarrhacta præcipité 1 decubitus humo-
ris significat: hocque nomen positum à Pra-
ceticis, quia suffusionem existimarent fieri
defluxu aquæ in oculos, vnde & aquam descen-
dentem in oculum appellant. Galenus 2. de sym-
ptom. causis, & 7. de placitis Hipp. & Plato. suffu-
sionis causam facit crassitudinem 2 tenuis humo-
ris, qui pupillæ meatum intercipit, ne possit com-
municare radius externus cum crystallino humo-
re. Tenuis is humor albugineus à quibusdam Me-
dicis est inter rhagoïdem & crystallinum humo-
rem, quo crystallinus humor, præcipuum instru-
mentum visus, partim fouetur, partim minuitur, ut
lux refringatur, nec lædat crystallinum.

1 Ex cere-
bro perneruū
opticum, vel
inter corneā
& rhagoïdē
membranas,
ad pupilla fo-
ramen.

2 Concrescit
hic humor a-
queus senuo,
aut febre, aut
epilepsia, aut
melancholia,
aut gravi ali-
quo affectu,
qui aut præ-
cessit, aut cō-
mixtus est.

Pupillæ foramen via est spiritus animalis, aut etiam radiorum, qui à rebus externis ad videndi facultatem importantur. Præclusa itaque viâ, quia, videlicet, humor ille albugineus longè crassior se-
 3 *Dum fu-* ipso factus est, suffusio fit, quæ 3 *ὑπόχρους* &
 4 *Dum con-* 4 *ὑπόχρμα* dicitur à Græcis. Nascitur hoc vi-
 firmata, & tiū sāons nun- tium sæpe consortio 5 stomachi: sæpe etiam pri-
 capatur. 6 vitio cerebri. Atque priusquam ad cura-
 5 *Vt in vo-* tionem accedas, id ipsum diligenter distinguendū.
 mituris vom- Distingues autem ex cap. i. lib. 4. de locis affectis.
 itione critica, Quod si vitio 7 stomachi, vomitu, purgatione ex
 vt in cardio- hiera picra, frugaliore vita & integra concoctione,
 gmo. consensu Græcorum & Arabum curari debet.
 6 *Vt ex epi-* Oportetque & vomitum & purgationem ex hiera
 lepsia Et me- læpius reuocari.

In alia verò, quæ primario cerebri affectu fit, natura suffusionis primùm consideranda est. Nam vel incipit, vel ad statum progreditur, vel omni-
 8 *Nisi ope* nò confirmata est. Et hæc 8 quidem desperata
 chirurgica de- est.

Itaque pupillam primùm aspicio. Colorem suffusionis, concretionem, motum, magnitudinem distinguo. Si quid 9 præcessit, aut adest, interro-
 9 *Vt si epi-* gato. Aetatis, temporis, conditionis totius oculi ra-
 lepsia, melā- tionem habeto. Desperata suffusio est, quæ pupil-
 cholia, car- læ figuram commutauit. Pura atque pellucida tum
 diognos, pul- pupilla, tum suffusio.

Suffusionis color cæruleus, aut auri similis, aut ferri nitentis, aut aquæ maris, curabilis est. Quæ verò grandinem refert, aut gipsum, 10 quæ nigra est, in summa, quæ sine splendore cernitur, incurabilis est, ferèque confirmata ad candorem

3 *Dum fu-*
gax est.

4 *Dum con-*
firmata, &
tiū sāons nun-
capatur.

5 *Vt in vo-*
mituris vom-
itione critica,
vt in cardio-
gmo.

6 *Vt ex epi-*
lepsia Et me-
lancholia.

7 *Aut etiā*
pulmonū, ex
Hippocrate

lib. 3. Progn.

8 *Nisi ope*
chirurgica de-
tarbetur, si
modò curatio

nē possit re-
cipere. Paul.

Aeg. lib. 6.

9 *Vt si epi-*
lepsia, melā-
cholia, car-
diognos, pul-
monis itē af-
fectio præces-
ferit.

10 *Quæ me-*
lancholicis cō-
tingit ex me-
lancholia de-
cubitu.

vergit 11 sine splendore.

Concretionem ita distingues. Oculo incolumi clauso, suffusum digito apprimes: si humor ille tenuis consistit, neque ampliatur, quia minimum concreuit, 12 desperatio est: si diffluit & dissipatur, sed statim, ut prius, coit, desperata nondum res est. Si verò dilatatur quidem, sed non dissolvitur, maturitas est, ut punctione, id est, acu vacuari possit.

Catarrhacta, quæ locum mutat, 13 incurabilis, hoc est, quæ hâc atque illâc conuertitur. Quæ verò compressa dilatatur, non etiam commutat locum, melior est.

Exigua facilius, magna difficilius curatur.

Interrogabis autem, num præcesserit gravis aliquis morbus, acerbior capitis dolor, vel ictus. Tum enim, ut etiam si adsunt, peior suffusio est. Aetate media facilius curatur. Prima & extrema, difficilius. Cælo sereno & tranquillo, atque etiam temperato commodius curatur.

Addunt Astrologi decrescente lunâ: coeunte verò, aut eadem plena, atque ubi vel in ariete, vel aliis eiusmodi signis, curationes differunt. Nec omitendum, quod Galen. 14 Meth. docet, ut oculus sanus claudatur atque exprimatur. Si enim oculus suffusus inde non tumet, nec pupilla ampliatur, desperatio est. Alioqui vitio succurritur. Phantasma tum splendores & idolorum, quæ suffusis oculis obuersantur, lege 2. de sympt. causis.

Principiis 15 ergo obstandum est. Demosthenes apud Aëtium, & alij quidam Græci venam secant in cubito. Clysteribus 16 acribus, iisdemque pur-

11 Tū enim ipsius oculi vnguentis significatur.

12 Hac desperatio est ex magnitudine causæ & adynamia curandi.

13 Quod sit perfecta concretio.

14 Gal. li. 4. de loc. affectu

15 Atq; ad eam demum catarrhactâ medicina insitutuenda, in qua nulla desideretur ratio, neq; concretio, neque magnitudo, neque loci & motus, neq; vlla fontis perennis affectio, melancholica, nec epilepsia, aut obstructionis nervi optici excusatio possit afferri.

16 Ut ex de cocto cephalico cū hiera trāque.

DE MORB. INTERNIS

17 *Ad materia, quæ in oculis fluit, reuulsionem.*
 18 *Vt qui per eas ad oculos defer- tur vapor, intercipiatur.*
 19 *Cuiusmodi est hydromel simplex, aut origanatum, loco vini, parata iuscula ex hyssopo & salua, abstinentia rerum acrit & piperatarum, deductio alterius cibi assueti, cibi autem simplicis, & omnis alienæ mixturæ expertis.*
 20 *Vt dormiendo coactō calore natino anathymiasis ad ce-*

gationibus, sed exigua quantitate & per interualla repetitis, Cucurbitulis in occipitio cum scarificatione affixis, Apophlegmatismis, Errhinis per interualla vti iubent. Cornel. Celsus addit sectionem venæ frontis, sanguinis detractionem è naribus, v-
 sionem 18 venarum temporalium, quæ certè locum habere possunt, vbi grauis capitis dolor est, atque inde defluxio in oculos. Optim⁹ victus, 19 qui pituitam extenuat, sine vaporibus. Vitandum vinū est, pisces, liquidiora omnia iuscula. Assa elixis meliora.

Collyriis primū leuioribus: deinde paulatim maioribus vtendum est. Clysteres è Centaurij decocto, vel similium comparandi sunt. Alioqui vel hieræ picræ 3.6. vel hieræ diacolocynth. semuncia, aut alia eiusmodi pharmaca in clysteribus dissoluenda sunt. Purgatio ex hiera picra, cui aliquid hieræ diaco. admixtum sit. Exempli gratia.

℞. pul. hieræ picræ ʒ. 2. pul. hieræ diacol. ʒ. 1. cum succo fœniculi formentur pilulæ: capiat horā 20 somni. Hæc purgatio decimo quōq; aut decimoquinto die reuocanda est. Per interualla mythridatij 21 aut theriacæ 3.ʒ. aut ʒ. 2. aliàs ieiunis, aliàs horā somni, aliquando 22 quatuor horis ante pastum imperanda sunt semel in hebdomada. Poterit aliquando imperari ablutio capitis ex decocto absynthij, betonicae, stœchados,

rebrum feratur, quæ incidendo, tergendo & attenuando, materiam præparet, præparatamque ad ventriculum euehat, vt euacuari possit.

21 *Vt ℞. conseruæ beton. & anthos an. ʒ. 1. ʒ. mythridatij 3.ʒ. f. bol.*

22 *Sunt enim alexypharmaca longè à pastu, & ante pastum imperanda.*

maioranæ, fœniculi, in lixivio facto è cineribus fermentorum, adiecta etiam vini portiunculâ, quarta aut sexta parte.

Collyria è melle, succo fœniculi, aut herbarum superiore capite descriptarum comparari debent. Adiciatur quoque 23 fellis aliquid lenioris, aut fortioris, semper habita ratione mollitiei, dunitiei, temperamentum oculi. Alia enim remedia pueros aut senes, ruficos & vrbanos, cœruleos & fuluos oculos, cœsios & nigros iuuare possunt.

23 *Vt fellis lucij, non accipitris, & u rapacis auis reliquarum.*

Hæc verò priusquam adhibeantur, opportunū fuerit post purgationem fomentum affectæ parti instituere. Vesicula piscis plena decocto fœniculi tepidè oculo applicetur pro fotu. Sed lauanda prius vesicula.

In pueris lactantibus aliquando nutricis inspiratio satis esse potest. Nutrix itaque mandat dentibus semen fœniculi, sagapenum, ammoniacum, galbanum, aut eorum aliquid, quæ suffusos iuant: atq; vbi os incaluit, leuiter inspiret hialitum oculo lactantis. Hoc consilium etiam adultis prodesse potest. Secundum est, vt ex 24 eadem materia oculos suffumiges. Aqua è melle destillata & suffusiones, & albugines interim percurat.

24 *Vt ex herbis, seminibus, aromatis & gummiophthalmicis.*

Quæ distillatur è melle rosato, lenior est. Deinde quæ ex melle communi. Post etiam è melle scyllitico.

In his aquis aliquando modicum sacchari candi liquandum est. In distillatione proximo capite numeratæ herbæ & materia, tum etiam sagapenum, ammoniacum, galbanum, commisceri possunt. Aut si iam distillata aqua est, in ea macerentur. Si-

DE MORB. INTERNIS

militer & vis aquarum, fœniculi, maioranæ, & cæterorum augeri potest. Collyria fortiora.

℥. fellis accipitris, balsami ana ʒ.2. adde, si vis, hellebori albi, piperis ana ʒ.1. cum aqua raphani fiat collyrium. Aliud.

℥. terebinthinæ lb.β. sulphuris viui ʒ.2. mellis ros. ʒ.4. plantaginis & arnoglossi ana M.2. fiat distillatio in alembico. A fortioribus collyriis, si mor- detur oculus, statim ovi candido, aqua ros. aut la- cte muliebri temperandum malum est. Plura re- media ex proximo capite & 25 aliis repetes.

25 Cuiusmo-
di est collyrium
Iohannis de
Vigo.

Punctionis verò, quæ acu fit, tempestiua occa- sio est, cum materia suffusionis mediocriter con- creuit. Cuius formulam descriptam habes cap.21. lib.6. Pauli, & lib.7. Cornelij Celsi, & 14. Methodi ad finē, & apud Albucasim, vbi fingitur 26 Almag- dan quod vocant.

26 Instrumē-
tum est chi-
rurgicum Cæ-
terum dū pu-
gitur oculus,
obliquo lumi-
ne ager sede-
re debet, vt
immutus ma-
neat.

℥. frumenti crassiusculè conquassati, M.2. sul- phuris viui. ʒ.1. sagapeni ʒ.6. salis, piperis, ana ʒ.2. mellis lb.β. terebinthinæ ʒ.2. cum urinæ pueri lb.2. fiat distillatio in alembico.

℥. fabarum fresarum M.2. conquassentur in mellis lb.2. terebinthinæ ʒ.3. gūmi elenij ʒ.1. in suc- co fœniculi & marrubij an. lb.2. fiat distillatio. Vel.

℥. frumenti crassiusculè conquassati, hord. ana M.1. mellis, lapid. calaminar. ana ʒ.2. sulphur. ʒ.1. salis ʒ.β. distemperetur in vase æneo cum aqua fœ- nicul. & plantag. succo granatorum, deinde fiat fortis expressio.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Distinguendum initio, sitne ὑπόσφαγμα, ὑπόπνον, ὄνη, γλαυκώμα, an ὑπόχυμα. Deinde si ὑπόχυμα, siue suffusio,

an primò & per se, an per consensum. Postemò, sive in principio, incremento, statu, aut penitus confirmata. Ὑπόσφαγμα, sugillatio est, sanguinis nimirum effusio per tunicas in spatia, quæ venis circumiacent. Principio rubet: progressu temporis liuescit: postemò nigrorem contrahit. Multitudine & diuturnitate temporis aliquando in pus vertitur, ut sanguis omnis per grumos collectus sub cute in aliis corporis partibus. Tunc fit ὑπόπνον, pus nimirum sub cornea, dimidium nigri occupans, aut per totam corneam tunicam pellucens, unde dolor pulsatorius, vehemens, rubor totius oculi, & temporum dolor. Fit etiam aliquando ὄνυξ, cum ab ulcere (ut ait Aëtius) profundiore pus defluens, & inter tunicas delapsus, ac in circulo iridis figuratum, unguis resercti imaginem refert, differuntque ferè in sola unguis similitudine. Ex quo intelligi potest, id symptoma, quod Galenus de symptomatum causis sugillationi tribuit, ut ita affecti, quæcunque videant, rubra esse putent, haudquaquam esse perpetuum, sed in principio tantum apparet. Nam aliis temporibus subnigrum quid ob oculos volitare existimant, quod multi sæpe similitudine decepti suffusionis principium esse credunt. Causæ sunt, ruptio vasorum, contusio, ictus, plenitudo, dolor capitis, lippitudo, inflammatio prægressa. In Glaucomate crystallinus humor densatur & resiccatur, neque unquam curari potest. Alij putant viridem quendam humorem crystallino permisceri, atque inde fieri glaucum colorem ex viridi & albo. Ab omnibus differt Suffusio siue catharracta, & loco & causa. Sugillatio enim est in tunicis & à sanguine: Glaucoma in crystallino humore uniuerso, & à siccate: suffusio intra corneam & crystallinum humorem, ab humore potissimum aqueo ibi concresecere: prætenditurque ille humor aliquando toti pupillæ, & visum adimit, aliquando parti tantum. Per consensum fit, cum per intervalla visa quædã visis propriè suffusorũ similia obuerfantur ob oculos. Idq; vel à bilioso humore è vetriculo, vapore ad oculos sublato: vel à cerebro, fumis ab vsto humore delatis per venas & arterias cum spiritu, ut in phrenitide, & febriũ ardentium vigore: vel à toto corpore, ut instante crisi. Per consensum fieri in-

Ὑπόσφαγμα.

ὑπόπνον.

ὄνυξ.

Aëtius ferm.

3. Tetrabib 2

Gal. lib. 1. de

sympt. causis.

γλαύκωμα.

Suffusio per consensum quæ fiat.

DE MORB. INTERNIS

Suffusio primaria à secunda suis signis distincta. dicant, si altero tantum oculo incipiat, perpetua non sit, post cruditatem augeatur, pupilla non obscuretur, crisis instet, febris vigeat. Contraria oculum primario affici demonstrant, tumque in principio veluti fumus est, quem si acu delere velis, diuulsus recutret, aut in particulas tenues dissectus visum grauius offendet, multiplicia obiecta pro vno representans. Sub statum concrevit in nebulam, tumque ferè sine dolore acu dimouetur à pupilla. Vbi obduruit, acu si pungatur, tunica simul adducit & lacerat, vnde periculum cum dolore maximo consequitur.

Purgato corpore conueniunt collyria fortiora ex felibus, ad discussionem, ruptorium, cauterium post aures, sanguisuga in temporibus, ibidem emplastra, venæ sectio, masticatoria, potius quam Errhina, pulueres à pastu, condita, fofus, acus. Post aures in ceruice cauterium, aut funiculus setaceus in occipite plurimum confert, si inter corneam & albugineum humorem intercipiatur nebula. Sed quæ inter crystallinum & pupillam hæret, non ita dissolui potest sine acu. Sit acus paulò minor longitudine minimi digiti, crassitudine, vt cætera, è materia firma, ne frágatur intra oculum, manubriolo striato, ad comprehensionem firmitatem. Albucasis cõpungit acu per cauam acû ducta, vt per cauitatem aqua defluat, nec in reliquum oculum incidat. Punctio in pleniori oculo tutior, iam cõtracta catarrhacta, sed ferè aliquid albuginei humoris dissoluitur, & manet oculus minor. Remedium à capra inuentum, quæ stipite confixa in suffusione visum recuperavit, vt Galenus docet initio

Quibus in oculis tutior sit ad catarrhacta punctio.

Punctio oculi remedium à capra inuentum.

Isagoges. Aliquando tunica imbibita humore exturgescit, & indurescit, vbi emolliendum, laxandû prius quam resoluendum. Barbari ad claritatem visus aures perforant annulo immisso, ne foramen claudatur. Fellium genera, præsertim gruis, galli veteris, tauri, hirci, lac equinum cum melle illitum, sterco lacertæ, hyrundinis. Sed acribus non vtendum, nisi paulatim assuefacto oculo, vt ærugine, cuperosa, &c. Sinapismus è stercore columbino, hederæ terrestres decoctum, donec quarta pars superfit, ad fofum per dies 25. Aqua mellis cû radice ireos, conizæ, chelidonizæ, triticum cum sale & melle in vase æneo insolatum, & liquor expressus, succus hederæ, eo-

cta faba in hydromelite, deinde cum melle rosato pistata, & expressa, iade oculorum illitus, pulvis ex seminis raphani ʒ. i. cū ammoniaci aridi ʒ. ʒ. & balsamo. Vitriolum albū in lacte aut aqua euphrasie, fœniculi, & similibus, addita aloë, sacculus plenus maiorana, naribus & oculis admotus, serpentaria in materia Chirurgica describenda, soluta succo anagallidis rubræ, stercus corui, aut fel cum melle. Quidā succum rutæ, fœniculi, saluie, vel herbas cum tritico & sale incoquūt vino albo, & ita sumunt. Decoctum fœniculi, guaiaci, euphrasie, rutæ, feseleos, aromat. cum macere, ex eodem fœtus & potio. Collyrium siccū ex macere, semine fœnic. feseleos & euphrasie, aqua distillationis hyrundinum vel picarū. Vidua oeconomi Regij de Chaulmōt Lutetiæ aqua è phœnicea anagallide distillata multos curauit. Potest distillari cum melle, sicuti & Monachus quidam salis M. i. in vino albo nouem diebus agitato in vase æneo, donec virescat. Sequentia quoque probantur, ad obtusum visum, & catarrhætam.

*Anagallidis
phœnicea aq.
stillatitia
multos suffu-
sione libera-
uit.*

ʒ. baccharum lauri purgatarum ʒ. 4. Tere cum vrina pueri impubis, fiat fortis expressio. Deinde cum mucagine gummi arabici, vel tragac. extracta cum aqua argentar. fiat illitus.

ʒ. rad. ireos recentis ʒ. i. fortiter pistetur cum succo fœniculi depurato per residetiam, deinde addito modico sacchari candi, & mucag. fœnic. fiat linimentum.

ʒ. succi chelidonie & conizæ an ʒ. i. mellis ʒ. 2. &c.

ANTO. VALETII EXERCIT. XXI.

QUOD Græcis *ὑπόχυμα*, Latinis suffusio appellatur, morbus est in compositione, seu in numero, cum videlicet aliquid toto genere præter naturā succrescit. In hac etenim affectione serofus humor inter crystallinum humorem & corneam tunicam colligitur, qui paulatim cogitur, & densatur. Quum primū aduentat, tenuia, lucentia, atq;

*Hypochy-
ma morbus
in compo-
sitione.*

etiā caliginosa corpuscula perperā ob oculos ægris videntur obuersari. Quod etiam iis accidit, quibus per consensum ventriculi oculus utrūque suffunditur. Verū affectus utriusque dignotio ex Gal. cap. 2. lib. 1. de caus. sympt. & cap. 1. lib. 4. de loc. mal. affectis satis manifesta.

Gal. lib. 13.

Method. &

Paul. Aeg.

ca. 22. lib. 3.

*Hypochyma
tis curatio.*

Incipiens hypochyma aliquando digeritur: sed si diutius constiterit, & quasi limus factus fuerit humor, sola punctoriij styli mucronis per corneam pertusione curari potest.

Apparabitur humor, ut antè in visus imbecillitate, deinde educetur. Et quia iterata purgatione est opus, hanc pilularum massam, in plureis doses utendum, imperare licebit. ℞. massæ pilul. lucis maior. & cocc. an. 3. 2. specier. hieræ. dupl. aloë. 3. 1. agar. troch. rhei elect. an. 3. 1. aqu. fœnic. chelidonie infusionis. 3. 1. turpethi benè gummosi cum tantillo zinziberis, f. massa pilul. adiecto, si velis, syrupo de stœchade. Dosis erit ʒ. 4. vel, si parū mouerit, gr. 2. aut. 3. dacrydij adiicietur. Vfus sit semel in hebdom. Si plethora adsit, aut si quæ inflammatio suaserit, vena cubiti pertundetur: quanquam Rhazes ægro prohibendum censeat, ne cucurbitulis, neque ex venis in manum distributis, sanguinem extrahat, ne scilicet humor magis congeletur, exhausto per phlebotomen spiritu, à quo discuti deberet. Itaque cucurbitulæ sine scarificatu sæpe ac sæpe hîc vtiliter apponuntur.

Antequam verò ad topica & collyria ab Authore præscripta veniatur, fomentum oculo instituitur ex decocto huiusmodi.

℞. fœnic. virid. parietar. & beton. an. M. 1. semin. fœ-

nugr. 3. β. flor. chamæm. & meliloti an. p. i. f. decoct. in aqua & vino alb. pro foru oculi cum spongia, vel gossipio: vel demisso cap. excipiat vapor.

Comparantur collyria ex exsiccantibus & incidentibus, qualia è fellibus siccis cum marrubij succo dissolutis. De his Gal. libr. 4. de compos. pharm. *ἡ τοῦ 85.* Memorabile est, quod à clarissimo viro, D. De Montifaut, accepit remedium, mihi que commune fecit, Petrus Morellus Genabensis Medicus exercitatissimus, amicus vnicè charus. Ouum recens sub cineribus ad duritiem coquitur: medium diuiditur: detracto vitello, puluere è vitriolo albo & saccharo cando confecto impletur: ambabus partibus arctissimè colligatis maceratur in aqua ros. aut euphras. per 4. dies: expressione facta fit collyriū. Huius præstantiam experientia confirmat.

Non prætereunda sunt, quæ caput roborant, & materiæ reliquias discutiunt, vt sacculi antè commemorati, & quæ in eum vsum assumuntur opiatæ, electaria, pulueres, vt. *℞. conseru anth. 3. i. spec. electar. diamarg. calid. 3. i. conser. rosa. 3. β. misce.* capiat per se, vel dissolu. in aqua. beton. fœnic. Cæterum si suffusio sit per consensum ventriculi, facilem habet curationem, purgatione ex hiera imperata. Si suffusioni similis eruptio sanguinis, aut alterius humoris ex ictu, aut plaga, vt in suggillatis, curanda proponitur, secatur imprimis vena: mox sanguis turturis, aut columbæ ex tenellis alis expressus, in oculum instillatur.

De hæmorrhagia.

Cap. 22.

Hæmorrhagia Græcis peculiariter intelligitur profluium sanguinis è naribus, vt constat ex

Hippocrate sect. 3. lib. 6. Epidem. sent. 21. Quanquā ex vocabulo, quodcūque sanguinis profluuium intelligi potest. Quale est 1 è sede, 2 vtero, ore. Rarum est, quod quibusdam contingit peculiari natura, vt aperta è trunco corporis, hypochondriis, thorace, facie, venæ clausura, redundantem sanguinem depleant. Quibus eadem remedia conueniūt, quæ in hæmorrhagia è naribus.

1 Vt in dysenteria aī-
ματόδα.
2 Vt purgatione mē-
strua, pro flu-
uio muliebri,
lochia.

3 Vt in iuue-
nibus, in fe-
bre ardente.

4 Vt in pur-
gatione, &
iuuenum hæ-
morrhagia,
mutilorum dy-
senteria, hæ-
bosa, vt si-
gnum, & vt
causa.

5 Ad remul-
sionem obscu-
ram.

6 Vulgò ag-
glutinantia
appellant.

Hæc autem aliàs 3 critica est: aliàs ex 4 consue-
tudine naturali. Nonnunquam omninò præter na-
turam est. In duobus primis generibus sanguis sup-
primi non debet, nisi viribus iam metuitur. Multò
etiam minùs, ac tardiùs ætate iuuenili, temperamē-
to sanguineo, aut vbi consueta aliqua vacuatio in-
termissa est. Quales sunt hæmorrhoides, vomitus
sanguinis, phlebotomia, & mēstrua in mulieribus.
Vbi verò suppressendus est, remedia sunt 5 vincu-
la, cucurbitulæ, phlebotomia, Sanguisugæ, 6 ana-
collemata indita naribus, aut admota reliquis cor-
poris partibus. Vincula ergo digitis pedum & ma-
nuum, testiculis, articulis intervallo trium digito-
rum, auriculis iniiciēda sunt. Frictiones etiam deor-
sum ductæ, immersiones extremorum in aqua ca-
lida, vel frigida, conueniunt.

Phlebotomia è cephalica eiusdem lateris, aut
utrāque, si utrīque profluit sanguis: idque angusto
vulnere, ne tanta fiat vacuatio. Tutiusque aliquo-
ties diuersionem repetere, quàm semel ducto san-
guine animi deliquium excitare. Quod tamen ani-
mi deliquium Paulus & aliquot alij probauerunt.
Gal. in Prothetico non expectandam animi deie-
ctionem præcipit. Atque experimento certum est,

animi deliquio sanguinem non restitisse. Sanguis-
 gæ post aures, aut in sede, iis maximè, quibus con-
 suetæ supprimuntur hæmorrhoides. Cucurbitulæ
 statim post vincula, & ante phlebotomiam hypo-
 chondrio eiusdem lateris affigendæ sunt. Affigun-
 tur & scapulis, & summæ ceruici, etiam cum scari-
 ficatione, si opus fuerit, & vires tolerant. Anacolle-
 mata verò, & quæ induntur naribus, magna ex par-
 te refrigerant: quorum vsus 7 post alia supradicta
 remedia tempestiuus est, iam reuulsa in partes con-
 trarias materiâ, id est, in 8 partes inferiores corpo-
 ris, aut posteriores capitis. Alioqui vsu refrigerantiû
 plurimi quidem deterius habuerunt: inde conuulsi,
 aut oborta spirandi difficultate suffocati. Et hæc re-
 media infirma omnia comperit Gal. præ maiori-
 bus 9 illis remediis, ex quinto Methodi, ex Pror-
 rhetico, ex lib. de sang. missione. Anacollematis er-
 gò, & aliis topicis post reuulsiones vtendum erit,
 habita ratione naturæ capitis & partium, quibus
 admouentur. Anacollemata fiunt ex argilla, farina
 volatili, farina triticea, incorporatis cum oui albu-
 mine, addito momento aquæ rosar. & aceti. Potest
 quoque aliquid adici boli armenæ, sang. drac. &
 rerum eiusm. quæ adstringunt, quale hoc est.
 ℞. 10 argillæ 3. 2. boli armenæ 3. ʒ. acaciæ, hy-
 pocystidos ana 3. 2. cum oui albumine & modico
 aceti fiat emplastrum, applicetur fronti & tempo-
 ribus. Induntur in nares, quæ refrigerant, adstrin-
 gunt, inuiscant, aut crustam ducunt, interim mixta
 11 portiuncula narcoticorum. Verùm & narcotica,
 q. s. cum his mace. etur sanguis draconis. Excipiantur singula gossipio carpto,
 & nari indantur. 11 Vt hyoscyami, opij.

7 Ne san-
 guis in aspe-
 ram arteriâ,
 aut œsopha-
 gum procum-
 bat, vel caput
 afficiat, &
 parotidas
 excitet.

8 Vt in mu-
 lierum hæ-
 morrhagia.

9 Quæ pu-
 gnant cū can-
 sa coniuncta,
 generationē
 prohibendo,
 intercipiēdo.

10 Vel ℞. ar-
 gille, farin.

volatilis an.

5. i. miscan-
 tur cum albu-

mine oui, &

tātillo aceti.

Imbuantur

gossipio car-

pto, naribus.

que imponā-

tur, ad pro-

gnandū cum

anastomosi.

Vel ℞. succi

lanceole (id

est plantag.

acutioris) bur-

sa pastorie

DE MORB. INTERNIS

12 *Præfer-
tim lanceola,
& fructus
rubi imma-
turi.*

13 *Aqua e-
tiam stillati-
tia ex nua-
mentis sali-
cis.*

& caustica cum periculo esse solēt. Sine metu sunt,
12 succus plantaginis, succus rubi, mespilorum, cor-
norum, & alij eiusmodi. Lanugo arboris, quæ foliis
insidet, aut quæ veluti nucamenta pendent è spe-
cie populi, 13 vel masculi salicis (quem Galli *Mar-
sault* appellant) medio mense Martio colliguntur,
macerantur in aceto, siccantur, & vsui asseruantur.
Vsus tempore induntur per se naribus, aut conue-
niente medicamine imbuuntur, atq; ita imponuntur.

Athanasia Nicolai cum succo pentaphylli. Ale-
xandri pulvis, qui ita paratur. ℞. consolidæ, sangui-
nis drac. carab. ana 3. i. hæmatit. corall. cornu. ceru.
vsti ana 3. 2. f. pulu. Datur ad 3. 2. vel 3. i. cum liquo-
re conuenienti. Alius.

℞. rutæ vstæ 3. i. sarcocoll. lithargyri, sang. dra-
con. ana 3. 4. f. pul. vulneribus etiam immixtus san-
guinem mirificè sistit. Alius.

℞. testæ pectunculi marini vsti, sanguinis dra-
con. carabe ana 3. i. spongiæ nouellæ vstæ nostro
more, punic. vsti ana 3. 3. Licinium oui albumine
imbuitur, superaspargitur pulvis, & naribus, vel vul-
neri immittitur.

Spongia aceto acerrimo imbuitur: imbuta pice
liquida circumducitur: tum fictili vase reposita cre-
matur: in puluerem redigitur. Pulvis efficacissimus
est, & per se insufflatur naribus, vel liquidis medi-
camentis commiscetur. Aliud.

℞. thuris 3. 2. aloës 3. i. cum oui albumine incor-
porentur. Penicillus è mollissimis pilis leporis, aut
floccus è lanugine, aut nucamento supra dicto, in
eo medicamento incoquitur, & ita naribus impo-
nitur. Penicilli etiam conueniunt è tela aranearum,
cui insi-

cui infideat farina volatilis.

℞. succi basil. 3.6. aceti 3.2. caphuræ 3.2. misce.
Linamēta hoc medicamento imbuta induntur na-
ribus.

℞. aquæ planraginis, ros. an. 3.6. aceti, vini albi
adstringentis ana 3.3. caphuræ 3.1. misce, & in mi-
scella madefac linteamina, quæ collo inuoluas, he-
pati, pedibus, testiculis, & mammis.

℞. aquæ panis porcini 3.1. caphuræ 3.2. attra-
hatur in nares. Terra sigillata, bolus armena, san-
guis draconis, Trochisci de carabe, oui albumine &
aceti momento dissoluntur.

Hinc madefactus penicillus naribus imponitur.

Radix 14 pœoniæ subiecta linguæ sanguinem si-
stit: herba verò fronti imposita, aut naribus indita.

Fragaria herba trita similiter iuuat.

Vtile est etiam olfacere caphuram in aceto dis-
solutam.

Quidam temerario remedio, cum reliqua om-
nia non iuuissent, eum, cui profluebat sanguis, in
balneum deduxit, atque demersit ad collum, & ita
restitit sanguis. Verum ab hoc remedio certum exi-
tium est, si vires vehementer laborent.

Vulgus vitur corallo è collo suspenso.

Lapides, iapis, onyx, hæmatites, id est, lapis san-
guinariis, eodem remedio esse creduntur.

Sunt, qui applicent parti, vbi debet fieri reuulsio.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Galenus scribit comment. 1. 7. 7. ἐν τῇ ἀντιπυρίῳ, apud Hip-
pocratem τὸν αἰμωρροϊκὸν nomine profluuium san-
guis è naribus intelligi, si per se ponatur, non ex-

14. Sic equi-
feti radice
trita, & na-
ribus imposi-
ta efficacissi-
ma ad san-
guinem sistē-
dum.

Gal. comm. 1.
in li. 1. Epid.
sent. 9.
αἰμωρροϊκῶν.

Hæmorrhagia modi quatuor.

αἰσώματος.
διαπιδνσης.

ἐκτῆς.

διὰ τῶν σπλ.

pressa particulâ, vnde effluit. Alioqui nomen generale est in omni sanguinis vacatione, siue per crîsim fiat, siue symptoma sit læsæ arteriæ, aut venæ. Sed ex arteria exilit tenuior, flauior & cum saltu. Quatuor in vniuersum modi sunt. Referatio oris vasorum per *αἰσώματιν*, ab eodem imbecillitate, sanguinis copia, acrimonia: transcolatio, sudoris instar, per *διαπιδνσιν*, à raritate tunice, sanguinis tenuitate vel sero, graciliûm vasorum apertione. Diuisio tunicæ, à vulnere, contusione, ruptione per *ἐκτῆν*. Postremo *διὰ τῶν σπλ.* eiusdem, id est, exulceratio aut erosio, intrinsecus facta à vitioso succo & acri: extrinsecus à valentibus medicamentis, aut igne. Vix tamen ab externis venis sanguis profluuit, nisi vel erodantur, vel runpantur ob densitatem in cute externa.

Si per *διαπιδνσιν* profluat, serosorum humorum purgatio, venarum densitas, sanguinis crassities procuranda. Si per *διὰ τῶν σπλ.* crustam inducentia erunt vsui. In cæteris vacuantia, repellentia, refrigerantia, adstringentia, obstruentia, resiccantia, sanguinis missio, diuersio, ligaturæ, cucurbitulæ, frigidiorum perfusio, epithemata, & similia.

Laudatur sanguinis profluuium post partum, tempore mensium, in synochis febribus, & aliis per crîsim, è naribus post capitis dolores, modò affectio frigida non sit. Proinde remedia nulla postulat, nisi immoderatum sit, vires superet, & futuræ hydropisis, aut cachexiæ periculum minetur.

Hæmorrhagiam sistenda.

Profunt succus caudæ equinæ in vino, puluis Alexandri, Trochisci Rhazæ, de terra sigillata, de carabe, soluti in oui albumine, ex Heraclide, manuum, cruris, articularum ligatio, frictio, cucurbitula supra vmbilicûm, nisi sit imbecillior. Porri succus auxilium est sæpe probatû. Nonnulli accipiunt porros nouem, aut decem recentes, medios transfigunt filo, folia extrema amputant, vt odorè inspirent, circumdât collo obuersis foliis naribus, & deorsum versis capitibus. Stercus asini odoratum, expertum etiam reiicietibus sanguinè, vrtica Græca trita, fronti alligata, cherephyllon ex oleo nucû, plantaginis, millefolij succus, herba trita, caphura aceto soluta, sanguis agni.

Avaritia Paulus explicat agglutinamēta. Fronti enim applicantur, habentque agglutinandi & obstruendi facultatem, cuiusmodi sunt tela aranearū, farina volatilis, emplastrum Comitissæ, & similia soluta oui albumine. Sed inutilia, cum per venas & arterias interiores humor decurrit.

Paul. Aeg. sub finē cap. 16. lib. 7.

ANTO. VALETII EXERCIT. XXII.

Hæmorrhagia symptoma est, quod sub genere excretionis immodicæ continetur: fitque vel venę tunica diuisa, vel vasis ore reſerato, vel sudoris modo sanguine transmiſſo.

Gal. lib. 3. de caus. sympt. & lib. 5. Meth. Hemorrhagia cause.

Eius causæ sunt, externæ, internæ. Externæ, quæcūque rumpunt, incidunt, contundunt, clamor magnus, & acutus. Internæ, sanguinis copia, praua qualitas, vasorum infirmitas, facultas excretrix immoderatiùs mota. Vbi copia sanguinis mali huius causa est, atque etiam acrior eiusdem qualitas, nullum præſentiùs remedium reperitur venæ ſectione: quæ tum præſertim celebretur, cum moderata sanguinis copia effluerit, & fortis ſationis impet⁹ perſtiterit. Ducetur paulatim, & per interualla sanguis, niſi viribus min⁹ metuarur. Quod ſi citatior hæmorrhagia iam vberiorē vacuaret, cucurbitule magnæ hypochondriis è directo affixæ, dein ſcapulis & ceruici, artuum frictio, deuinctioque ſatis erunt. Mox properandū ad ea, quæ calorē cohibent, proptereaq; sanguinem refrigerant, & ad motum reddunt ineptiorem. Huius generis infinita cum aſſumēda, tum ad mouenda cōparari poſſunt. Sumuntur ſyrupi myrtill. roſ. ſiccar. de papauere, de nymphaea, granator. cydoniorum, & ſimiles, cum aquis centinodij, plantag. portulac. arnogloſſ. vt.

Gal. cap. 10. lib. de curad. rat. per ſangu. miſſionem.

Gal. lib. 14. Meth.

24. ſemin. plantag. portul. lactucl. ana 3. 3. roſ. rubr. roſ.

DE MORB. INTERNIS

trāsmarin. ana p. i. f. decoct. in aqu. chalybeata ad quarr.
 3 In colatura dissolue zuplij ros. syr. cydon. ana 3. 2.
 puluer. trochiscor. de carabe 3. i. f. zupliū pro dosib. 3.
 Vel. 2℥. puluer. trochisc. de terra sigillata 3. i. coralli rub.
 cornu ceru. vsti ana 3. i. syr. myrtill. 3. i. aqua, vel succ.
 plantag. ros. vel nymph. 3. 2. vel 3. f. zupliū: exhibeatur.

Vel ex conferu. ros. symphyti, additis bol. arm.
 terr. sig. lotis, corall. rub. lap. hæmar. cornu cerui v-
 sti, seminib. plantag. & lactuc. cum syr. myrtill.
 parabitur opiata.

Eodem pertinet ciborum refrigerantium & in-
 crassantium vsus.

Sed hæc refrigerantia non nisi post sanguinis
 fluxum aliò reuulsum imperanda sunt. Neque verò
 fronti atque capiti illicò refrigerantia topica adhi-
 benda: alioqui enim conuulsio, suffocatio, dyspnœa
 plerunque accideret, aut ipsa etiam hæmorrhagia
 adangeretur.

Hoc emplastrum fronti & temporibus apposi-
 tum, sua lentitia meatus obstruendo sanguine exi-
 tu prohibebit.

2℥. bol. armen. sang. drac. ana 3. 3. mastich. farinæ vo-
 lanilis ana 3. 2. cum oui albumine, vel cum plantaginis
 succo f. emplastrum.

Proderit etiam contortum ad ellychnij formam
 linamentum in nares immittere, quod in hac mer-
 sum sit mistura.

2℥. bol. arm. terr. sigill. ana 3. i. aloës & pilor. lepor. mi-
 nutim concisorum ana 3. f. excipiantur cum albumine
 oui & oxycrato, & in formam linimenti redigantur.

Sunt, qui rutam, aut vriticam viridem aceto ma-
 ceratam naribus imponunt: alij spongiam eodem
 aceto imbutam. Lapidis molaris fructu facti, & aceto
 acerrimo extincti vapor naribus exceptus, præstan-

issimum creditur asferre remedium.

Escharotica, vbi prædicta omnia nihil promouerint, ex vitriol. chalciti. gyps. & gummi æquis partibus, vel per se in nares insufflanda, vel linamento capta indenda. Sed hæc, vt etiam narcotica, nõ nisi summa vrgente necessitate sunt vsurpanda.

Quod si ab hepate, aut liene, feratur sanguis, epithema ex aq. plantag. cich. ros. oxalid. ana ʒ. 2. aceti ʒ. 1. santal. citr. vel diamargar. frigid. ʒ. 1. comparabitur: quo imbuta linteola hypochond. admovebuntur.

Denique post sanguinis fluxum optimè repressum utilis erit purgatio, quæ tollendæ sit hæmorrhagiæ causæ. Et quia, vt plurimum, biliosus, acer & mordax est humor, cholagogum huiusmodi poterit imperari.

ʒ. prun. damasc. tamarind. ana ʒ. ʒ. ʒ. semin. melon. cydon. plantag. ana ʒ. 1. flor. violar. & nenuphar. ana p. 1. f. decoct. pro dosi. In colatur. infunde rhei elect. ʒ. 2. santal. citr. ʒ. 1. In expressione dissol. iulep. ros. vel syrup. cydon. ʒ. 6. f. dosi.

De Angina.

CAP. 23.

Angina inflammatio est fauciu, aut musculorum, qui ad fines asperæ arteriæ siti sunt. Nonnunquam etiam exteriorum ceruicis. Desperatio est, 2 cum nusquā apparet. Cum grauisissimus dolor est, febris, cum os hiat, lingua exerta est, intercepta deglutiendi via, & potus per nares 3 refluit, aut si ad initia ceruicis cavitatis est, intrò ad ducta vertebra. Hæc vt minuuntur, ita leuior morbus est. Oportet ergo statim initio collocare ægros loco satis 4 amplo, 5 nec frigido: ita residere in lecto, vt 6 caput altius attollatur. Liquidiora 7 sunt.

1 Quæ tumor est cõtra naturã, cum rubore, dolore, calore, et fluxu cõmictus.

2 Quod si quĩ euaserit, peripneumonicus fit, & intrã dies 7 moritur aph. 10. lib. 5.

3 Obstructo scilicet æso-phago.

4 Vt liberè aërem ducãt.

5 Ne cõstringatur meatus iam obsessus.

6 Nam non nisi ceruice recta spirare quẽ orthopnoici.

7 Qualitate & consistentiã humida, qualia sunt ptisana, colatitia, pulli insculi & carnis vitulina, gelatina, quaque sit cinamomis expers.

- 8 Vel dies aliquot omnino à cibo abstineat, si vires valeant sine infirmitatis metu.
- 9 Ut omnia piperata, & aromaticà.
- 10 Hæc enim homines faciunt pneumaticos.
- 11 Ad evacuationem materię coniuncta, & antecedētis reuulsionem.
- 12 Ex morbi essentia, symptomatum prementia, dignitate partis, causæ materiali, & effectrice desumpti.
- 13 Quia mulier grāuida secta venâ abortit, præsertim si fetus grandior sit.
- 14 Quod ita comparata sit mulierum natura, ut sanguine abundet.
- to alimenta. 8 Parcissimè viuant, quantum vires tolerare possint. Abstineant iis omnibus, quæ 9 fluxiones incitant, quale vinum, vaporosa, & calida ferè omnia. Vitent enim 10 glutinosa, quæ cum etiā non detergeant, vias iam oppressas angustia interceptiunt. Primis diebus, atq; adeo initio morbi, 11 sanguis detrahendus est, adhibito prius hoc consilio. Mulieribus tum grauidis, tum quibus menses supprimuntur, angina fit aliquando. In grauida, sanguinem detrahes nullo metu ad tres, quatuorve vncias, plus minusve, ut scopi 12 phlebotomiæ indicabunt. Minus, si fetus 13 maior est, ut post septimum mensem. Quod si mulieri grauidæ etiā tum menses fluunt, 14 multò liberius sanguinem è cubito detrahes. Hic enim & ab angina matri, & ab abortionē fetus periculum est. In iis verò, quæ uterum non gerunt, & menses supprimuntur, venam è crure vulnerabis, copiosiusque detrahes. Tū ad brachij venas, quæ morbo cōueniunt, phlebotomiam transferes. Hoc consilium multis aliis morbis, quibus corripuntur mulieres, commune est. In aliis, si quidem manifesta signa plenitudinis appareant, è saphena: si mediocria, è media cubiti. Alioqui è cephalica sanguinem detrahes mediocri vulnere, ne si amplius sit, nimium viribus detrahatur. Si angustius, effluat tenuis sanguis, crassus relinquatur. Hymene, ubi angina ferè phlegmatica, parciore tractio, sed foramen maius esse debet. Vere, & reliquis temporibus copiosior, vulnusque angustius imprimatur. Cucurbitulæ ex libro de cucurb. collocentur.

Mollis 15 aluus esto leuibus 16 clysteribus, mul- 15 Omnis
 to magis si febris est. In quibus interim dissolues ^{enim angina}
 cassiæ fistulæ 3. i. vel 3. ß. cathol. vel hieræ 17 picræ. ^{alai proflu-}
 Huius hieræ summa vis probata. Nam cum ang- ^{uiud desiderat.}
 na multos Romæ suffocaret, eaque veluti pestis ^{16 Vt fiat}
 tota vrbe grassaretur, inuentum remedium à Me- ^{decoctio ex}
 dicis, vt post frugalem cœnam 3. 2. pul. 18 hieræ ^{sero lactis: in}
 in pilulas coactos exhiberent. ^{qua dissolu-}
^{tur castia, aut}
^{catholicū, pro}

Quo auxilio quicunque vsi sunt, periculum de- ^{clystere.}
 clinârunt tam atrocis morbi. ^{17 Non, si}
 Paulus in nonnullis, omiſſa 19 phlebotomiâ, ^{febris adſit.}
 acrioribus clysteribus vtitur dissolutis 3. 3. hieræ dia- ^{18 Simplicis,}
 colocynthidos. Sed quod antè dictum est, priusquâ ^{ad exclusionē}
 iniciamus clysteres 20 acriores, leuioribus vti oport- ^{pituita sal-}
 tet, qui inueteratū stercus emolliant & detrahant. ^{se, per deri-}
^{uationem in-}
^{aluam.}

Purgationes quoque leues ex cassia, manna, ad ^{19 Sed &}
 3. i. aut eo plus in 21 decocto passularum, hordei, ^{ante venæ}
 florum cordialiū, tamarindorū, sebesten, prunorū. ^{sectionem hic}
 Suspectum pharmacum, quod Asclepiades im- ^{gargarismus}
 perauit ex aloë & colocynth. tum quia in 22 pilu- ^{iperadus. 2.}
 las conformat, tum quia fortius est. ^{aque hord.}
^{lib. 1. aq. ros.}
^{& plantag.}

Dissoluta enim liquoribus, non coacta in pilu- ^{ana 3. 2. succi}
 las, pharmaca magis conueniunt, propter difficul- ^{granatorum}
 tatem deglutiendi. ^{3. i. f. garga.}
 Atque dum hæc fiunt, gargarismis vtendum ^{Post sectionē}
 est, initio quidem repellentibus: deinde admixta ^{verò venæ, ex}
 vi detergente, & resolvente: post etiam, si fuerit ^{latte calido}
 opus, maturantibus. ^{imperabitur.}

Atque vbi dolor grauior est, & sentitur exulcera- ^{20 Vt qui}
 tio, lenientibus, quorum materiâ & compositionē ^{fiunt ex de-}
 utraq. 21 Vel in decocto pulli, aut carnis vituline. 22 Quas angino- ^{cocto capita-}
 sus deglutire non potest. ^{li & hiera}

repetes ex 6. $\chi\tau^1$ τόπος, & cap. 43. octauī Aētj.
Recentiores Medici iisdem etiam vtuntur, vel his.

\mathcal{V} . decoctionis rosarum sicc. 3. 4. cum diamor. 3.

2. Ex sorbis, cornis, moris rubi, aut alioqui immaturis, è granatis acidis poterit exprimi succus, & quarta parte sacchari, aut mellis rosati dulcari. Dianucū & diamoron initio dissoluantur in duplo liquore adstringente, quales sunt supradicti succi. Decoctū rosarum, plantaginis, sorborum, cornorum, mespilorum, & similium adstringentium, vel in aquis inde distillatis. Conferuæ sunt coronorum, sorborum, mespilorum, mororum immatutorum, quarum vncia in duplo liquore adstringente dissoluta

reprimentem 23 gargarismum efficit. Et hic quoque laudatus reprimendo & leniendo.

\mathcal{V} . 24 succi expressi è cassia fistul. 3. 1. decocti rosarum aut aquæ plantaginis 3. 2. vel decocti sebesten. 3. 2. aquæ è sorbis, cornis, aut mespilis distillatæ 3. 4. misce pro gargarismo.

Vt augetur morbus, ita repellentium 25 modus minuendus, & augendus resoluentium. Itaque plus mellis admiscemus: vtimurque hydromelite, plus minusve diluto, in quo rosæ 26 præbullierint, syrupo rosato, syrupo etiam de papauere, vbi fluxio tenuior est. Vbi his remediis nihil proficimus, venæ sub lingua incidendæ sunt. Alij ex Archigene & Asclepiade venā frontis, & quæ ad angulum oculi pertinet. Hippocrates lib. 3. de morbis venam quæ sub mammis est, in paracynanche, quæ leuior est angina, pertundit. Nonnulli venas ceruicis.

Cæl. Aurelianus capite 4. lib. 3. Acut. sanguinem trahere è locis sub mammis constitutis, noxium

23 Quo venturæ inuenit angina, præsertim aestiua.

24 Vel \mathcal{V} . decocti sebesten. 3. 2. aqua è sorbis aut cornis 3.

4. f. garg.

25 In quantitate, qualitate & usu.

26 Huius hæc erit componendi ratio.

\mathcal{V} . rosæ sicc. M. lib. fiat decoctio in tribus libris aquæ. In colatura ad lb. 2. dissol. mell. 3.

3. vel 3. 2. fiat hydromel.

esse atque putidum contrà Hippocratem contendit. Ac noxium quidem, quòd plurima oporteat corpora diuidi, cum neque facilè sub visum venæ possint deuenire. Putidum, quia vlla sine difficultate, profundiore facto foramine, iusta sanguinis detractio è venis humeralibus approbatur.

Verùm tutius est post vniuersalem vacuationem perseverante malo cucurbitulas cum scarificatione ad initia ceruicis adfigere, &c. Postea venas sub lingua, vel phlebotomo aperire, vel cultello scarificare.

Sanguisugæ iisdem locis, quibus cucurbitulæ, affigi possunt: quæ vbi detractæ fuerint, cucurbitulæ inducuntur, perpetuò habita virium ratione.

De cinere hyrundinum, humano stercore, canino, & aliis, quæ melli mixta, aut aliter præparata anginæ conueniunt, lege postremos lib. Galen. de simplicibus, vt de assellis & aliis remediis, commentarios secundum locos.

Lenies dolorem & asperitatem gutturis aqua, in qua mica panis albissimi coxerit. Aut panis ita coctus vehementer exprimatur: colluatur succus. Eodem modo è fursurum, tritici, pinguium cremore. Lac etiam per se, mucago semin. cydoniorum, lini, althææ, aut hic Sorani efficacissimus gargarismus.

24. glycyrrhizæ recenter rasæ & conquassatæ 3.3. mellis rosati 3.1. aquæ fontanæ lb. 8. coquantur omnia ad crassitudinē, è colatura fiat gargarismus.

25. Penidia quoque in lacte dissoluta, pisanæ succus, hordeatum, lac amygdalarum dulcium similiter colluatur. Maturant.

27 Vel fiet
cataplasma
ex radicibus
liliorum &
althææ, car-
cis pingui-
bus, cum buty-
ro, farina
lini, oleoque
liliiaceo.

℥. ficuum pinguium 3.3. hyssopi P.I. fiat decoctio ad dimidias, colaturâ colluatur.

In periculo suffocationis.

Anginosi sæpissimè periculo suffocationis laborant. Quòd si periculum inde natum est, quia erupit tumor, & sanies in pulmones & cor defluxit, desperatio est, nisi summo

18 *Vt expectorato, aut alui profluuiio, aut vrina purulenta excludione.*

29 *Impeditur enim actio, per quâ est vita.*

30 *Vt maiorem attrahendi vim habeant vacui fugâ.*

beneficio naturæ adiuuentur. Alioqui sæpe fit, vt cum nimis increuerit tumor, omnino intercipiat vias spiritales, 29 vbi certa mors est, nisi occurramus. Itaque extremo malo extrema remedia tentanda sunt. Repetenda sectio venarum sub lingua. Cucurbitula magna & cum 30 multa flamma initio ceruicis affigenda est. Collum & thorax onere leuanda sunt, atque inungenda oleo de liliis, aut scœnugræco.

Caput his attollendum est, vt probè sedcant. Aër frigidus introducendus est. Locus sit lucidus & perspiratus. Cucurbitulæ quoque in pulpis scapularum, sub mento, in mento, & maxillis. Alij etiam in sutura coronali, & sub mammis coaptant. Rhazes etiam vesicante phœnigmo vtitur initio ceruicis, tumque gargarismis acrioribus vtendum est, vt hydromelite, in quo pugillus hyssopi, aut origani coxerit, aux radix gentianæ, cucumeris agrestis, iridis. Aut.

℥. seminis sinapi 3.2. canquassentur, & in aceto acerrimo macerentur. Incorporentur cum modico melle. Deinde dissoluantur in 3.2. mulsæ, ad gargarismum.

Quòd si his artibus nihil proficimus, vtimur auxilio Asclepiadis. Vtendum est tum etiam omnibus ferè medicamentis.

Hiante ore lingua deprimatur : culter ligneus acutus indatur in guttur, vt tumor disrumpatur. Tum prono capite sanies repurgetur. Vbi in faucibus manifestus tumor est, vellicandus est vnguib, aut ferro aperiendus.

Alij in spongiæ partem ad magnitudinem avel-
lanæ suspendunt e filo, & ita ab ægro deuorari iu-
bent. Intumescit spongia, atque dum vi retrahitur,
tumorem rumpit. Hoc alij bolo carnis falsæ semi-
coctæ ita suspenso & deuorato, tum vi retracto,
moliuntur. Alioqui scarificandus locus est sub ma-
xillis, sub mento, in collo, vitatis semper neruis &
arteriis. Sic enim aliquando sanies effluit. Alioqui
cucurbitulæ scarificatis locis apponendæ sunt.

Enido hyrundinis in aqua decocto, aut oleo
communi, vel chamæmelino emplastrum faciunt,
quod inducunt collo. Alij è stercore humano re-
centi. Quidam, quod tolerabilius est, è lana succida
insuccata in oleo communi, oleo liliorum, chamæ-
meli, aut simili, quorum consilium est, vt foras ma-
teriam euocent.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Anginæ species quatuor à Paulo constituuntur, qui-
bus quintam etiam recentiores addiderunt. Omnibus
communis est inflammatio aliquando cum tumore, de-
glutiendi difficultas, impedita respiratio, dolor circa la-
ryngem & œsophagum. Differunt parte affecta. Fiunt
enim in musculis vel colli, vel gutturis, vel vtriusque. *Σωάριον*
in musculis pharyngis: *παρεγκύωρον* in musculis fau-
cium externis: *κωάριον* in musculis internis laryngis:
παρεγκύωρον in externis. Quinta fit luxatis vertebriis ad
anteriora. In qua locus cauus apparet cum dolore, mu-
sculorum circumiacentium tumor, respiratio difficilis,

31 Nonnulli
etiam panis
crustâ deuo-
randam præ-
bent.

Paul. Aeg.
cap. 27. lib 3.
statim in ini-
tio.

Anginis o-
mnibus quid
commune.

Σωάριον
Παρεγκύωρον
κωάριον
παρεγκύωρον

Aët. serm 4. hiatus oris, lingua exerta, & à sua radice mota, solâque
Tetrab. 2. veteribus Κρυκχ^η dicebatur, vt scribit Aëtius. Periculo.
cap. 47. fissima omnium, & quæ eodem die iugulat, si neque in
 faucibus, neque in ceruice tumor aut rubor apparet, si
 dolor vehemens, violenta inspiratio, cibi & potus reflus
Hipp. lib. 3. xus per nares, & similia ab Hippocrate scripta in Pro-
Prognost. sen gnosticis. Distinguitur à peripneumonia & pleuritide,
sent. 16. & quia dolor in gutture maximus cum angustia, nullus in
sequentibus. thorace. Vbi pulsus magnus & vndosus, peripneumonia:
 durus & tensus, conuulsio metuenda est. Imminere suffocatione paucus & rarus: agêribus animus, creber & inæqualis apparet. Cuidam in musculis dextæ parris laryngis cum orta esset inflammatio, neque appareret, sed tactu duntaxat externo dolorem præ se ferret, mors subita tribus horis à missione sanguinis consequuta est. Alius iussit sibi gurgulionis finem amputari absente Medico, cum inde suffocaretur, & seruatus est. Quod mirum certè videri non debet. Nam & Antonius Beniuenius medicus eruditissimus de Nicolao Rota angina laborante idem fermè cōmemorat. Hic cum opperrunis præfidiis nihil leuatus esset, & arescēte corpore, pallente facie, ac vertentibus oculis spes salutis adempta foret omnis, ne æger Deo & naturæ incuratus dimitteretur, ad insolitum, vtile tamen, auxilium visum est confugere. Locum iussit altioribus plagis sub ipsis maxillis acetiam supra collum scarificari: ex quo cum sanies multa prorupisset, adeò morbus sedatus est, vt faucibus ipsis spiritum simul & cibum captantibus, facilis dein ad bonâ valetudinem ægro ipsi data sit regressio. Post febrem repentè inuadens, & non apparens, lethalis. Si ad pulmonem conuertitur, septem diebus interimit.

Hipp. aph. Remedia sunt sanguinis missio è cephalica dextra, repellentia intrò sumpta, gargarismata, sectio venarum
to. lib. 5. sub lingua, clysteres ad reuulsionem, inunctiones, vnguentra, syrapi, potiones, lohor. Mulier quædam superstitiosè butyrum mense Maio asseruabar, & colligebat tribus diebus rogationum, viris è lacte vaccæ, quæ mater peperisset, mulieribus, quæ scēminam. Virgēte malo inungebat collo, ceruici partibus vicinis, carpo pluri-

mum fricando. Aque hac ratione non paucos sanitati restituit. Datur diacodion, vbi somnus conciliandus, & tenuis fluxio. Vbi educendum, magis cum melle. Potest addi glycyrrhiza, interdum sapa, & mel.

ANTO. VALETII EXERCIT. XXIII.

Συνάγχη affectio Latinis angina dicta, musculorum gutturis interiorum, seu faucium est inflammatio, in qua nullo existente in thorace, vel pulmone vitio, difficilis redditur spiratio. Anginae species ex differentiis symptomatum, partium laborantium natura, causae duplicis distinctione, periculo maiori aut minori petitas, videre est apud Hippocratem sent. 16. 17. & sequentib. lib. 3. Prognosticon: & apud Gal. cap. 4. lib. 4. de loc. mal. affect. & comment. in aph. 34. lib. 4.

Gal. lib. 13.
Metb.

Acutissimus est hic morbus, primo, secundo, tertio interdum die iugulans, ob interceptam respirationem. Quocirca quum primum respirationis & deglutitionis difficultas obrepit, venae sectio in cubito, subducta prius blando clystere aluo, praesentaneum est remedium. Verum sanguis non subito ac semel, sed pluribus interpositis vicibus, euacuandus: ne cummulata, semelque facta vacuatione, anima aegro deficiente, suffocationis periculum superueniat, dum materia in affectam partem collectim prorumpit. Altero a venae sectione die lenis purgatio exhibeatur: quam si sumere aeger nequirit, acrior clyster iniicietur. Mox, fluxio si penitus constiterit, vena sub lingua pertundatur. Quinetiam in ipso anginae principio, vt & inflammationum reliquarum, indicatur affluentis humo-

Anginae curatio.

Paul. Aeg.
cap. 27 lib. 3.

ris repulsio. Hæc perficitur repellentibus, non foris adhibitis, siquidem materia intrò regerenda non est, sed ore tantum contentis gargarismis, quales ab Hollerio parantur multi. Hic omnium instar esse poterit.

℥. agrim. & plantag. ana M. i. granor. berber. cortic. mal. granat. semin. acetos. & portul. an. 3. 2. ros. rub. hord. integr. ana p. i. passularum non mundatar. 3. ʒ. f. decoct. & colatura ad lb. i. In qua dissol. diamor. dianuc. & succi granator. ana 3. i. ʒ.

Huius partem ore continebit æger ad leuiorem gargarizatum. Vehementior enim partes affectas mouet, quibus incalescentibus augetur fluxio.

Vigente, aut inclinante morbo & laryngi impactam materiam concoquere, & dissipare oportebit. Itaque ad gargarismū parabitur decoctum ex maturantibus & discutientibus, vt ex beton. hyssop. organ. florib. chamæm. melilot. feminib. lini, fœnugr. cum glycyrrhiz. & passul. mund. in quo dissoluetur mellis rosacei, aut syr. ros. quantitas proportioni decocti respōdens. Extrinsecus verò eiusmodi applicabitur cataplasma.

℥. sem. lini, fœnugr. ana 3. ʒ. coq. in hydromelite: adde olei amygdal. dulc. & dialthæ. q. s. f. cataplasma.

Fit etiam emplastrum è medulla cassiæ cum oleo cōmuni, vel chamæm. adiecta portione dialthæ, vel emplastri de mucaginib. vel de meliloto. Vel

denique vsui erit topicum ex sterco. canino albo medicamentum Musæ, quo fortius nullum nouisse se, neque in angina, neque in magna tonsillarum inflammatione, aut iis, quibus ex glandulis suffocationis periculum immineret, Galenus ingenue professus est.

Gal. parti. 4.
cap. 2. lib. 6.
de cōpos. ph. a.
τὸ 205:
cap. 19.
lib. 10. de
simpl. medic.
facult.

Illis causa sola 2 intemperies, partium 3 cō-
sensus, vt lumbricis, vel humore acri, stoma-
chum infestantibus, & quod sæpe fit, à ce-
rebro defluxio, aliàs calida, aliàs frigida, tum etiam
humor in pulmonibus conceptus, aliàs crassus, aliàs
tenuis, interim viscidus, nonnunquā etiam asperi-
tas 4 arteriæ. Vt rectè cures, causa cognoscenda est.

Intemperies 5 frigida, quod sæpe fit, hyeme 6 ri-
gente, domicilium calidum, animæ retentio, vini 7
dulcis & calidi potus, partium pectoralium muni-
tio ex linteis calentibus, 8 pedum calor & capitis,
sufficienti remedio esse possunt.

Defluxio tenuis, maximè si copiosior est, retinen-
da est incrassantibus: multò magis, si acris est. Id
quod intelliges ex oculorum & faciei rubore, titil-
latione, aut etiam mordicatione oris interioris, sa-
pore, vrinis multum coloratis, tum etiam antecede-
ntibus causis. Hæc enim tussis, etiam si initio levis
est, 9 tabem denuntiat.

Itaque statim initio medicamentis vtendum est,
quæ inspissent & obtundant materiā. Conueniunt
itaque aqua hordei, syrupus violatus, de papauere,
mucag. psilij, se. cydoniorum, decoctum papauerū,
adiecta sapa, vt & somnum concilies, & fluxionem
incrassatam cohibeas, nec attenues. Melitismis plu-
a maligna destillatione. 6 Tempestate præsertim Aquilonia repenti ob-
orta. 7 Ex lib. 3. de diata in morb. acut. 8 Nam venarum, quæ ad pe-
des feruntur, continuitate calor superiores petit partes.

9 Quæcunque enim destillationes à capite tussiculosos & rancos homines
redunt, nisi tempore conquiesuerint, alteram faciunt tabis differentiam.

1 Ex suffla-
tione vehemē
tissima, qua
spiritus mul-
tus celerrimè
foras erūpit,
ad exclusionē
materia, qua
pulmones la-
cescit, et vias
intercipit.

2 Frigida scō
licet. Gal. cō-
mēt. 1. in lib. 1.
Epid. sent. 12.
3 Vt hepatis
& vetriculū.

vel etiā alia-
rum affectio-
nū metastasis
et translatio
symptomati-
ca, vt in plem-
ritide, et hy-
drope.

4 Que sicca
tussis causa
vna existit.

5 Cuius signū
est tussis leni-
ter irritans,
quæ tacendo
cesset, fiatque
à spiritu, non

rimum vtuntur Medici in tussi, quibus tamen abstinendum est, vbi fluxio est tenuis. Mel enim attenuat. Sed loco mellis vti oportet vocato melle passulato, ficato, quod syræum nonnulli vocant, succo glycyrrhizæ, aut prunorum. Hæc autem ita comparabis. Passulas, ficus, pruna, iuiubas, sebesten, horum aliquot in aqua coques ad putrilaginem: tum vehementi expressione percolabis, & iterum coques ad mellis crassitudinem.

Hic etiam vtimur mucagine gummi tragacanthi, gummi arabici extracta in aqua rosarum, & incorporata in aliquo succorum prædictorum. Vt gratia exempli.

10 Item ad
sistendum fe-
runt catar-
rhum hoc po-
terit comode
prescribi. 24
syrup. ros. de
succo cu qua-
drupla infu-
sione ros. 3. b.
pilul. de cyno-
glossa gr. 4.
aut 5. excipia-
tur cochlear
vnum ante
horam somni.
11 Vena se-
ctio & ad ca-
tarrhi gene-
rationem prohi-
bendam, et ad
fluentis ma-
teriam auersio-
nem confert.

24. mucag. gummi tragacanthi extractæ in aqua rosarum 3. 6. incorporantur in mellis passulati, succi glycyrrhizæ, aut similis 3. i. b. Quod si vigilæ vrgent, & dolor maior est, misce pilularum de cynoglossa 3. 2. & affunde aliquid syrupi de papauere, violati, aut rosati. Finge pilulas pondi vnius scrupuli, quas contineat 10 in ore. Atque vbi maior fluxio est, secta 11 cephalica diuertenda erit. Deinde etiam purgatione è cassia fistula, manna, aut penidiis admixtis. Vt.

24. cassiæ 3. i. penidiorum 3. 6. dissoluantur in aqua hordei, passularum decocto, aut glycyrrhizæ. Sæpe vtendum est hordeato cum saccharo violato. Partes quoque colli & thoracis, si incaluerint, illinendæ.

24. ol. viol. 3. 2. mucag. sem. pfilij extractæ in aqua vngulæ caballinæ 3. i. ceræ lotæ in aqua viol. quantum suff. fiat linimentum.

Nimis vrgente malo, cauteriis etiam vtendum est, cum in syncipite, tum etiam in ceruice & scapulis.

Multi

Multa repetenda ex capite de Catarrho.

In materia frigida neque phlebotomia, neque purgatione utendum est, nisi corpus ¹² admodum plenum sit, tuncque cassia, addita terebinthina, ut sint cassiæ drach.6. terebinthinæ drach.3. fiat bolus cum saccharo, vel dissoluentur in ficuum decocto, vel simili.

Possimus quoque uti ¹³ agarico, inde pilulis formatis cum rhab. cum pul. hieræ pictæ, hieræ diacoloc. cum elephang. pil. aut etiam fortioribus.

Sed melius fuerit uti prius ¹⁴ melicrato, in quo vel hyssopum, vel thymum, vel marrubium, aut aliquid tale incoxeris. Alioqui uti ¹⁵ syrupo capil. ven. de hyssopo, de marrubio, & similibus. Iam purgato corpore incidendum, detergendum, siccandum. Sed in desiccantibus cautio est, ut ne nimium calfaciant, qualia sunt acria, diuretica, inimicissima ¹⁶ expuitionibus è thorace. Nec statim initio utendum est, maximè si materia crassa, aut viscida est. Præterea utimur semine apij, vrticæ, nasturtij, scyllæ, erysimi, raphani, fceniculi, & torrefiunt, atque in puluerem rediguntur: tum horum 3.2. commiscuntur 3.6. mellis despumati.

Laudant, ut per intervalla bis aut ter in hebdomada mythridatiū aut theriaca ad magnitudinem auellanæ ex vino albo exhibeatur.

Ambarum ex cōuenienti decocto datum, utpote passul. mund. aut simil. tussis à tenaciore materia nueteratæ præstantissimum erit remedium.

¹⁶ Itaque hic poterit syrupus præscribi ℥. pruna damasc. Et iunbas an. num. ¹⁴ passul. mund. 3. i. s. ficus ping. dactylos an. num. 3. bechij, scabiosæ, ana M. s. hyssop. i. glycyrrhizæ ras. 3.6. f. decoctio: in colatura ad lb. i. dissolue sac-

¹² Et ea caco chymia plethora per oppressionē diaphragmatis, atque pulmonum, morbum augent.

¹³ Ut ℥. agarici troch.

rhei electi,

hieræ pictæ

an. 3. i. mala

xentur aqua

hyssopi infu-

sionis agarici

f. pilula.

¹⁴ V. ℥. hyssop. orig. ana

M. s. coqua-

tur in tribus

lib. aqua fons-

tana: in cola-

tura ad lib. 2

dissolue mel-

lis 3. 3. f. meli-

cratum.

¹⁵ Vel ℥.

oxymel. sim-

plic. syrup.

capil. ven. Et

de hyssop. an.

3. i. dissolue

in decocto pas-

sularum &

glycyrrhizæ,

f. inlepus.

DE MORB. INTERNIS

char. albiss.
 quart. 3. ele-
 ctarū diasi-
 reos sim-
 plicis 3. 2
 vel 3. 3. f. syr.
 17 Ne faciāt
 homines pneu-
 maticos.

Animaduertendum quoque hoc loco liquidio-
 ribus potius vtendum esse, quàm crassis & solidis
 medicamentis, vbi repurgandi consilium est. Con-
 tra verò solidis, vbi coquendum. Deinde etiam non
 vtendum esse viscosis, nisi habeant 17 aliquid de-
 terfionis, vbi exasperata arteria est. Conueniunt vi-
 scosa sine mordicatione, quale est tragacanthum,
 gummi arabicum, oui luteum sorbile, butyrū, muc-
 ago sem. cydoniorum, lac per se, mel passulatum,
 succus iuiubarum, ficuum, daetylorum veterum, nō
 recentium (recentes enim exasperant) hordeatum,
 lac amygdal. dulcium, penidia, saccharum viola-
 rum, alphenia ex dulci oleo, medulla Articaulis vul-
 gò dicti cum butyro, pineol. amygdal. cum butyr.
 Vbi coquendum est, aliquid croci, thuris, myrrhæ,
 & eorum quæ leniunt, medicamentis adiiciendum
 est, vt semen irionis, vrticæ. Detergent mel & sac-
 charum. Desiccant aromata, sed non nisi liquore
 aliquo diluta, imperanda sunt.

Plura remedia capite de asthma & pleuritide.

Suffumigia initio quidem, si modica fluxio est,
 nec est capitis plenitudo. In fine verò, roborando
 capiti & thoraci.

Senestussiculosi, ex 3. de victus ratione in mor-
 bis acutis, potu vini dulcis tepido, butyro recenti,
 addito saccharo, dulcoramentis, condimētis, atque
 interim decocto 18 caulium, leuibusque remediis
 curandi sunt.

18 Praesertim
 rubrorum: in
 quo saccharū
 sit dissolutū.

Narcoticis aliquando vtimur, vbi tussis molestior
 est, & perpetuæ ferè vigiliæ. Illicitur ergò syrupo
 de papauere cum decocto palmularum, aut pilula
 de cynoglossa, pondere scrupuli semissis. Aut his.

℥. spicæ celticæ ʒ. i. cinamomi ʒ. 2. croci gr. 8. castorei gr. 6. opij in sapa macerati gr. 4. Omnia excipiantur melle, fiantque parvæ pilulæ pondo ʒ. i. teneat in ore.

Tutior est usus narcoticorum iam purgato corpore, & thorace non ita pleno. Vehementer commendant syrupum myrtillorum sedandæ tussi. Calidæ quidem, cum iulepo rosato: frigidæ, cum decocto passularum aromatizato modica spica.

Adhæc voci læsæ à frigido diaireos Salomonis: à calido diapenidion & diatragacanthum frigidum cum syrupo violaceo vtiliter accommodatur.

Optimum contra tussim siccam, exasperatam arteriam, & raucedinem istud est electarium.

℥. penidiarū, succi glycyrrhiz. an. ʒ. i. amygdal. purgatar. nucleor. pini, passul. enucleat. tragacanth. ana ʒ. i. rhodomel. q. s. f. electar. Datur ad ʒ. 3.

Comparatur etiam antidotum, quod ad tussim ita confert, ut vnica portione liberet ægrotantem. Quale est. ℥. castorei, an. ʒ. 4. succi bacchar. lauri, cinamom. spicæ, succi mandragoræ, cardamomi ana ʒ. 2. croci, cassiæ lign. dauc. an. ʒ. i. β. costi, myrrhæ, galbani, piperis alb. ana ʒ. i. mellis q. s. Dato ad magnitudinem castanæ cum tepida. Idem pleuriticis & empyricis maximè iuuat.

Diapente asthmaticis, tussientibus, & omnibus affectionibus pectoris & pulmonis instituitur.

℥. styrac. optim. bdellij, tragacanthæ, galbani, opij ana ʒ. 6. olei nardini q. s. detur in modum auelanæ. Sed & ad siccam tussim sequens formula multum proderit.

℥. radic. pulegij ʒ. i. apij virid. M. i. infundan-

DE MORB. INTERNIS

tur hor. 24. in mellis optim. ℥. i. aceti ℥. ss. coquantur lento igne ad crassitudinem : dein linteolo transfundes. Dabis cochlear vnum, vel duo, per se, vel cum decocto passul. mundatar. Idem è decocto fœnugr. sæpiùs loti, & reiecta aqua, addito melle subquadruplo, vel inde facto syrupo.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

*Tussis quæ
excitetur.*

*Tussis causa
multiplex.*

*Gal. cōment.
2. in libr. 6.
Epidem. sent.
24.*

Vt in sternutatione cerebrum, in vomitu ventriculus quod noxium est, concitato quodam naturæ imperu expellere conantur, ita in tussi, pattes thoracis simul insurgunt, concutiunturque muscoli, vt vel quæ catui suæ molesta sunt, in pulmonum artetias expellant : vel quæ in aspera artetia præter naturam continentur, foras eiciant, non per contractionem, sed confertim emissio per eius interiores ductus plurimo spiritu, haud secus ac si quis, quæ in fistulæ cavitare hæret, afflatione vehementi expurgare velit. Causa est, vel humor, vel corpusculum aliquod, vel inæqualitas ab intemperie liberum spirituum exitum prohibens, vel compressio diaphragmatis à tumore. Humor est aliquando viscidus & lentus, siue sit infarctus pulmonib^{us}, meatus expirationis & inspirationis opplens : siue defluat à capite in asperam artetiam, vt in catarrho, pituita : siue è thorace educatur. Aliquando verò tenuis defluxio substantiæ, quæ cum à spiritu comprehendere non possit, sæpiùs reperitur tussis, vt quum serosa humiditas in hydrop^e, & tenuis quædã materia, aut sanies in pulmonū inflammatione (præsertim in principio) vel pleuritide, vel tabe resudat in asperam arteriã. Potest in meatu illius panis aut potus portitacula, aliqua illapsa contineri, vel tuberculum, vel vlcus, vel cum defluxio diutius restiterit, in pulmonibus crassior reddi, & quasi lapidescere, vt expurgari non possit, vel, vt in gibbosis, tuberculum in spina, quod si non ita durum sit, aliquid desudet in arteriam. Potest nasci, materia è cerebro in spinam delapsa per tussim, aut inde augeri, Intemperies vel frigida est, quæ sola interdum, si levis fuerit, spiritus cohibitione, ore & naribus clausis suppressitur: vel

ficca, vt in heccticis, aut cum columella exesa est, vel diuisa. Opprimitur diaphragma tumore, vt hepatis, in eiusdem inflammatione, quā sequitur tussicula, vel tussis sicca: quæ in scirrho non ita apparet, fortasse quia nulla sit resudatio. Cognoscitur tensione ac duritie hypochondriorum, & signis ex recrementis.

Tollenda causa per contraria. Remedia sunt, sputum prouocantia, inspissantia, attenuantia, detergentia, pilulæ, syrapi, lohot, vel eclegmata, bechica, tabellæ, trochisci, narcotica, suffumigia. Sed in his, quæ sistendis fluxionibus è capite in asperam arteriam & stomachū imperantur, videndum, ne tam naribus hauriantur, quàm ore. Non enim viam naturalem, qua diuerſi debet, præcludere oportet, aut adstringere: sed quæ descēdunt, per palatum nimirū, nisi maior noxa suppressa, quàm procedente materia, metuatur.

ANTO. VALETII EXERCIT. XXIIII.

FErinas è capite in pectus & pulmones destillationes sæpe sequitur tussis, nonnunquam aliquam intemperiem. Calidam quidem, vt in febribus: frigidam, vt Aquilonia tempestate, eaque magis est sicca. Aliis quoque morbis, quibus coincidit, tussis symptoma efficitur, vt pleuritidi, hepatitidi, tabi. Si à simplici sit intemperie, facile suo contrario oppugnatur.

*Paul. Aeg.
cap. 28. lib. 3.*

Si coniunctam habeat materiam, vti frequentius habet, ea fluere parata conuenienter apparabitur: crassa & frigida tenuantibus: incidentibus & tergentibus lenta: calida frigidis atque incrassantibus: mox purgabitur, vt in capite de catarrho. Quibus autem præſidiis concepta pulmonibus materia expui facilis reddi possit, in pleuritide dicetur.

Tussis curatio.

DE MORB. INTERNIS

De 1 Asthmate. CAP. 25.

1 Pathemate
primigenio
febris exper-
te, nō sympto-
mate aut à



pulmonis tu-
berculo aut e-
tiam à labefa-
ctata vi mo-
trice in cere-
bro et cernica
libus nervis.

2 Adest enim
sūma spirādi
difficultas,
vt non nisi e-
recto corpore
spirent.

3 Quæ vel lo-
calē in cere-
bro habuit
generationē,
vel è cerebro
defluxit.

4 Quibus
aër recipitur
& fuligo ex-
cluditur.

5 Propter
pulmonū cō-

pressionē. 6 Non enim senes firma habēt latera ad materia, cuius sit uis & ratio
pūs, exclusionē: quia cerebro sunt humidiorē, excrementitio, sicciore temperamē-
to, & pulmones in his infirmiore calore languēt. 7 Quod venenata metallorū
aura pulmones & vim cerebri motricem, atque cernicalū neruorū resoluat. 8
Ad vitandum rheumatismū. 9 Vt foco luculento, aère tenui, non caliginoso. 10
Ad mūdificandā materiam frigidā, quæ cōtumaciter bronchiis pulmonum adhe-
rescit. 11 Vt residendo cubet, nō iaceat. 12 Quā deducitur altera pars cibi as-
sueti, simplicis & euchymi. 11 Neque crassi, neque austeri: nam tale meatus in-
tercipit. 14 Id enim pulmones recreabit malē affectos, alas pulmonū explicabit,
materiāque preperabit. 15 Modò biliosus non sit & sitibundus. 16 Cuius-
modi ex butyro, medulla, sapa. 17 Vt iuscula ex hyssop. thymo, satureia.

2 Sthma, 2 suspiriū Latinis, à pituita 3 cras-
sa & viscida, inclusa 4 bronchiis pulmonis.
Vnde anhelitus molestissimus, magisque
5 iacentibus, quā in sedentibus. Affectus 6 senibus
familiaris, & iis, qui metalla, 7 hydrargyrum, & ar-
rhenicum, & alia eiusmodi tractant. Hyeme ma-
gis, etiam extrema, & phlegmatica conditione ex-
citari solet.

Curatio.

8 Superiore cœnaculo, loco 9 lucido, & calore
10 plusquam temperato, altioribus, 11 mollibusque
stragulis, capite & thorace subleuato, multò etiam
magis, cum dormiunt, collocare oportet.

Frugalis 12 vita, porus 13 vini tenuis, & veteris 14
dulciusculi, mellita 15 alimenta, vel condita 16 iis re-
bus, quæ leniunt, incidunt, 17 tergent citra manife-
stum calorem. Iam liberalior potus esse debet, cum
repurgandi consilium est. Omininò abstinendum
frigidis, adstringentibus, minúsque calfacientibus.

Vitanda asthmaticis, ex comm. 3. lib. 6. Epid. acria,
vt allium: dyspeptra, vt bubula, ouilla, suilla, om-
nis denique cacochymia, vt & ea, quæ tensio-
nem facere sunt nata, qualia flatuosa. Nec minús
Ad vitandum rheumatismū. 9 Vt foco luculento, aère tenui, non caliginoso. 10
Ad mūdificandā materiam frigidā, quæ cōtumaciter bronchiis pulmonum adhe-
rescit. 11 Vt residendo cubet, nō iaceat. 12 Quā deducitur altera pars cibi as-
sueti, simplicis & euchymi. 11 Neque crassi, neque austeri: nam tale meatus in-
tercipit. 14 Id enim pulmones recreabit malē affectos, alas pulmonū explicabit,
materiāque preperabit. 15 Modò biliosus non sit & sitibundus. 16 Cuius-
modi ex butyro, medulla, sapa. 17 Vt iuscula ex hyssop. thymo, satureia.

fugiendæ animi perturbationes, motus vehemens, clamor, ira, & similia. Phlebotomia concedi potest ætatibus mediis, si nihil est in scopis vniuersalibus mittendi sanguinis, quod repugnet.

Si vehemens malum est, si suppressi menses, aut hæmorrhoides: alioqui inedia, aut vita parcissima aliquot diebus imperanda est, & clysterum frequens, vsus vtilissimus. Leuiter mollienda aluus est.

Materia in thorace concepta, incidenda, abstergenda, 18 diluenda, repurganda tum pharmacis catharticiis, tum iis, quæ sputa ducunt. 19 Materiâ repurgata, desiccantibus vtendum est. Roborandæ sunt partes. Peregrinatio, nauigatio 20 in mari, vctatio è curru, aer maritimus, alia quoque eiusmodi, quæ calfaciunt & siccant, sunt præcipienda. Clysteres primùm molles sint, ex remollientium decocto cum cassiæ 3.6. in ea dissolutis. Aliqua verò ex parte præparata & purgata materiâ dissoluemus semunciam diaphœnici, 3. 3. hieræ diacolocyn. 3. 6. benedictæ, in pectorali decoctione.

Leuiter aluum remollies 3. i. cassiæ, & 3. 8. penidiorum, dissolutis in hac decoctione.

℥. glycyrrhizæ. passul. enucleatarum ana 3. 3. iubarum, sebesten, ana N. 6. florum anthos & borraginis ana P. i. spicæ 3. i. fiat decoctio. In col. dissol. & c. vt cassiæ, penidiorum, & cæt. Laudatur melicratum hoc modo paratum.

℥. fœnugræci M. i. hyssopi P. 2. ficus N. 6. Fiat decoctio ad ℥b. 8. In col. dissolue mellis crudi 3. 4. Parari quoque poterit syrupus ex succo radicum enulæ camp. hyssop. aq. vngu. caballinæ, & scabiosæ, di sunt homines tibi obnoxij) perniciosus perhibetur.

18 *Vt ex facili expectetur.*

19 *Ad hanc conferet oxymel simplex Gal. vel hyssopo conditū, melicratum, syrupus de hyssopo, de prassio, syrup. capil. verner. violac. vt 2. syrup. violac. de hyssop. oxymel. simpl. an. 3. i. Misceantur. Viatur loco lohot.*

20 *Vt sine spirandi difficultate moueatur corpus. Vide tamen ne rabidus sit æger. Nauigatio enim vomitū inducit, quæ πλεγματική (id est ei, cui extant atque eminent scapulae) retrorsum in modū alarū excarnes, cuiusmo-*

vel ex herbarum succo extracto, aquis additis, & melle albo.

Laudatur quoque ius galli decrepiti, tum quia morbo conuenit, tum etiam quia ventrem leuiter subducit.

Oribasius hoc modo incoquit. Gallum rufum & decrepitum infarcit sale: tum incoquit cum porro, anetho multo, & oleo. Loco olei, butyro utitur, aut oleo pingui. Potest & concoqui cum polypodio, semine carthami, cumino, aniso, hyssopo, thymo, satureia, & aliis eiusmodi. Decoctio quoque poterit dulcari melle albo, aut saccharo. Per interualla quoque fortioribus purgationibus utendum est, ut pil. factis ex pul. hieræ picræ, & agarici trochisc. ana ℥. 2. aut pilulis elephanginis, mastichinis, de hiera, assaieret, cocciis, & similibus. Massa earum pilularū ℥. 2. cum 2. ℥. agarici. Ex oxymelite scyllitico formantur in pilulas.

Pulueris quoque hieræ diacol. ℥. 2. agarici trochiscati 3. ℥. coniungitur ex syrupo de hyssopo. Alioqui.

℥. catholici 3. 6. diaphœ. 3. 2. cum infusione ℥. 2. agarici, modico spicæ, & hydromelite sufficiei fiat potus.

Iam bene purgato corpore, thorax repurgandus est, cui rei materia conuenit ex lenientibus, incidentibus, detergentibus, postremò etiam siccantibus. In viscida enim materia & crassa tenuare & adstringere, in tumoribus tenuia siccare expedit.

Passulæ, ficus, sebesten iuiubæ, glycyrrhiza, penidia, saccharum, Alphenia, semen althææ, lini, & similia leniunt.

Incidunt verò & terget aristolochiæ radix, gentianæ, enulæ, centaurij, semen melanthij, scyllæ, irionis, vrticæ, bombacis, origanum, thymum, saturæia, calaméthum, pulegium, bralsica, absynthium, abrotonum, hyssopus, allium, porrum, piper, castoreum, gutta ammoniaca, serapinum, & à proprietate, aselli, vermes serici, pulmo vulpis & erinacij, stercus lacertæ, vermes subiecti vrticis, interiora oculi Philomelæ cremata, & in puluerē redacta, Guaiacum quoq; , siue lignum sanctum manifesta ratione hîc conuenit.

Desiccant sulphur viuum, & arrhenicum rubrum.

His autem sic vti oportet. Nam è radicibus, herbis, seminibus decoctis melicratum parari debet: deinde reliquorum, quæ à proprietate iuuant, in puluerem redactorum 3.2. plus, minúsve, melicrati vnciæ inspergi debent.

Alioqui ex aliis succus expressus melli commiscetur, aut horum puluerum 3.2. mellis 3.2. commiscentur, quale hoc erit.

℥. hyssopi M. i. ficus 6. fiat decoctio ad ℥b. β. in qua dissol. mellis 3.3. aut 4. aut 2. fiat melicratū, cui insperge pulueris facti è pulmone vulpis 3. 3. pro duabus dosibus. Aliud.

℥. pul. gentianæ, enulæ, aliptæ moschata, diaireos 3.2. mellis quantum sufficit.

Optimum est vti melle scyllitico per se, vt cum decoctione pectorali, melicrato hyssopi, aut simili.

Per internalla quoque theriacæ aut mythridatij 3. i. per se aut cum modico aquæ scabiosæ, vngulæ caballinæ, vino albo tenui, veteri, plurimùm

conuenit.

℥.styracis pinguis, terebinthinæ ana ʒ 4. spicæ ʒ. i. cum melle despumato fiat electarium. Sed interim dum hæc fiunt, thorax fricandus est, atque inungendus oleo amygdalarum dulcium, chamæmelino, anethino, de keiri, iasmino, de lilio, laurino, irino, costino, de spica, ordine ducto à leuioribus. Aut poterit ex his linimentum fieri cum æquali parte mucaginis seminis lini, althææ, fœnugræci & cæræ quantum sufficit. Gratia exempli.

℥.ol. iasmini ʒ 1. β. mucag. seminis althææ ʒ. i. mucag. seminis fœnug. extractæ in aqua scabiosæ ʒ. β. cum cær. quātitati. sufficiet, Fiat linimētum pro thorace. Post vnctionem lana molli, gossipio, aut lana sordida thorax contēgendus est.

In periculo suffocationis, & nimis oppresso spiritu, cucurbitulæ scapulis affigendæ & cruribus. Dandæque, vt ore contineat, aquæ hordei ʒ. 3. sacchari ʒ. i. croci Gr. 4.

℥.oxymelitis ʒ. 2. salis ammoniaci ʒ. i. croci Gr. 3.

℥.salis ammoniaci, sem. nasturtij, pulmonis vulpis an. ʒ. i. croci Gr. 4. dissol. in iulepi violati ʒ. 4. pro duabus dosibus.

Tūmq̃ue frictiones & vincula extremitatū conueniunt, & ea, quæ in angina iam dicta sunt.

Desiccandum iam bene purgato corpore & thorace hoc modo.

℥.styracis, mastichis, terebinthinæ, arrhenici rubri ana ʒ. 4. incorporentur in vitello oui. Deinde cum hoc medicamento frustula ligni iuniperi illinantur: postea siccentur: ex siccatis fiat suffumigium, quod per tubulum ore excipiat. Similiter fiat ex sulphu-

ris viui & arrhenici rubri pari pondere.

In debilioribus arrhenico abstinendum est, vtemurque solo sulphure incorporato in terebinthina, styrace, mastiche.

Iam bene procedente morbo, cucurbitulis sub mammis, sed breui mora vtendum est, vt tantum attrahant, non etiam discutiant.

Similiter Dropaces, Sinapismi, Phœnigmi, exulcerantia, thoraci aptanda sunt.

Extremum est, cauteriū in medio pectore. Crudelius est auxilium vstionis, quod ab Aëtio describitur, cap. 57. Sermonis quart. Tetrabibl. 2.

In vigiliis dabis 3. β. philonij, quod etiam anhelitum iuuabit.

In siti vehementi, aquā hordei, cum saccharo, vtendum item iulepo violato, glycyrrhizæ succo; sed ore contineatur tantum, non etiam deglutiatur.

Adhæc in abscessu triticea farina in marrubij decocto coquitur, & inde pectus fouetur salutari asthmatici auxilio. Et illud quoque parabitur.

℞. scabiosæ M. i. iuiubar. ficuum, dactyl. an. n. 6. glycyrrhiz. 3. 2. bull. in aqu. f. in colatura dissolue mellis optimi 3. 2. penidiar. 3. 1. oxymelit. simpl. 3. l. f.

℞. diaireos Salomonis 3. 2. incorporentur in 3. 2. butyr. loti cum aqua scabios. carduj, &c.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Asthma, difficultas respirationis, qualis iis, qui diu cucur- *Ad. quæ.*
currunt. Ex quo ἀσπναιεν, anhelare, quod à cursu, &
vehementi exercitio commouetur.

Angustia quoque fit peripneumoniciis, supparatis & *Alexand.*
Pleuriticis, sed cum febre. Hic autem eam spirandi diffi- *Trall. cap. 4.*
cultatem, quæ cum respiratione densa, & sine febre est, *lib. 5.*

DE MORB. INTERNIS

intelligimus. Cuius causa licet in multis præsens semper adsit, grauius tamen spirant commota materiâ, vt & in pleuritide. Duo habet perpetua symptomata, & signa, quibus faciliè ab omnibus vel solo intuitu internosci potest: angustiam seu arctationem partium thoracis, quam ægri sensu manifesto deprehendunt:

*Asthmatis
duo perpetua
symptomata.
Οξόπνοια.*

Οξόπνοια, id est, rectam spirationem, quod ægri non nisi recta ceruice spirare queant. Cum enim aspera arteria à gutture in pulmonem porrecta, ibi scindatur in multas propagines, per quas spiritus diffuit, si thorax cum collo curuetur, meatus comprimi necesse est, ac spiritum magis intercipi, vnde capite & thorace subleuato stare coguntur.

*Asthmatis
causa dua
vulgò sta-
tuuntur.*

Causam duplicem quidam constituunt, crassum & viscosum humorem, non in leuibus, sed asperis arteriis, quæ sunt respirationis instrumenta: vnde obstructio sufficientem efflationem & inspirationem prohibens, quæ facit vt parua sit, densa, & velox respiratio. Velocitate enim, & densitate compescere nititur natura, quod deest ad refrigerationem cordis, aut excrementorum fuliginosorum excretionem, ob paucitatem aeris ingredientis, & expirationis. Altera causa est tuberculum aliquod crudum in pulmonibus genitum. Causam tamen huius

*Asthmatis
causam non
semper in pul-
monum cau-
tatibus con-
sistere.*

symptomatis, siue morbum ipsum, non semper in fistulis aut cavitatibus pulmonis consistere, experientia constat. Anno 1549. mense Septembri Monachus quidam in Collegio d'Arras breui asthma interijt. Corpore dissecto abscessus repertus est in vena arteriosa, & sine pari, integris omnino pulmonibus. In quodam (nomine Britio) asthma mortuo in via Calendæ, pulmo, tanquam spongia, imbutus multo humore pituitoso inuentus est. Fit & à resiccatione, vt in aurificibus, chymistis, fabris ferrariis, & similibus. Quibus addi possunt, inunctiones & remedia à morbo gallico. Rhazes libro quarto continentis adiecit pectus strictum, & paruum pulmonem. Qui naturalem constitutionem habet, iugiter (inquit) fit asthmaticus. Hippoc. verò Apho. 46. libr. 6. fieri significat aliquando à tuberculo nato in spina, vt in gibbis. Quod si magnum est, & durum, siue crudum, asthma facit: si non ita durum, & aliquid desudat in ar-

*Monachus
asthmate su-
blatus.*

*Britioi asth-
mate mortuo
inuentus pul-
mo multa pi-
tuita imbutus.*

*Asthma etiã
fieri à resic-
catione.*

teriam, tussim. Aliquādo etiam suppuratur, & interimit. Si fuerit in collo, asperam arteriam contrahit: in dorso, pulmonem & vicina corpora: sub septo, renes & lumbos: urinam quoque intercipit. Huiusmodi tuberculorum materia potest cieri è cerebro in spinam per tussim. Vel causæ sunt, ictus, casus, non conueniens decubitus pueris, incōcinna deligatio, gestus deformis. Moriuntur ferè suffocari pure, vel cum adolescunt, ad incrementū cordis & pulmonis non accrescente thorace, iugulantur. Philotimus ab influente sanguine, sed contra rationem, fieri scribit. Sunt igitur in vniuersum Asthmatis causæ, crassus humor, vel tuberculum in cavitatibus asperæ arteriæ: bronchia intercepta multa & viscida materia: resiccatio vehemens: abscessus: strictura pectoris, & pulmonis compressio: tubercula in spina, siue sponte enata, siue à causa externa: flatus multi septum trāsuersum distendentes, ex quibus sequitur, viis interclusis, neq; expirationem, neque inspirationem satis conuenientē fieri. Periculum autem maximum imminet, cum omnes musculi intercostales, superiores scapulæ, & omoplatae trahuntur, virium imbecillitas, vehemens calor, angustia partium spiritalium conspicitur. Vbi omnes, aut plures concurrunt, æger morti proximus est: vbi duæ, non facile seruari potest.

*Asthmatis
causæ in vni-
uersum quæ
sint.*

In abscessu, totius corporis habita ratione, attenuantibus, vt aromatis & siccantibus: in crassis & viscidis humoribus, attenuantibus sine manifesto calore, & detergentibus vtendū. Syrupi, pilulæ, purgantia, cōseruæ, eclegmata, vnguenta, apozemata, flatus discutiētia. Augenda vis medicamentorum, si materia non in bronchiis pulmonis, sed in spatio thoracis, & membrana succingente hæret. Suffumigia, dropax, sinapismus, phœnigmus, cucurbitulæ sub mammis. Quidam in medio thorace cauterium laudant, alij vnum in brachio quatuor digitis sub osse scapulari, alterum in crure quatuor digitis supra genu inter duos musculos. Clysteribus vtendum, potu pauciore, sed paulò crassiore, dum materia coquitur: largiore & dilutiore, dum expurgatur: phlebotomia ætate media, suppressis mensibus, hæmorrhoidibus, & si febris adsit.

Dyspnœæ genus est asthma, motricis facultatis symptoma, in quo crebra tussis correptus æger spiritum sine sonio & anhelatione ducere nequit. Huic malo causa est & flatus, pituitæque multæ, crassæ præsertim & viscidæ, è capite in pulmonis bronchia per asperam arteriam delapsus, vel pleuritis in ea translata. Eò confluentes, aut ibi sensim congesti humores, cum efferuescunt ac tumēt, asperam arteriam haud aliter occupant, quàm quum arietinum pulmonē cum aspera arteria elixamus: quo tempore cogimur ipsum asperæ arteriæ caput extra vas deducere, vt conceptæ intus pituitæ multæ sit exitus.

*Gal. cōment.
ad sent. 30.
Prorrhēt. 2.*

*Asthmatis
curatio.*

Labóriosa & difficilis est asthmatis curatio. Etenim neque venæ sectio, nisi æger sanguine abundet, hîc multum iuuat, quòd quæ obstruit materia, viscida sit & crassa: neque purgantia medicamenta, quia vix ad pulmones pertingunt: neque clysteres, qui aluum distendendo diaphragma premunt, & grauiorem inducunt spirandi difficultatē. Dant tamē inducias affectu apparabitur ad educationem infarcta pituita hoc apozemate.

℞. radic. petros. scænic, asparag. seminis cartham. ana ʒ. i. rad. ireos, serpentariæ maior. enul. campan. ana ʒ. ʒ. thym. epithym. hyssop. marrub. scabios. tussilag. capill. omn. bugloss. borrag. ana M. i. iuiub. sebesten. dactyl. ananum. 12. passul. mund. ʒ. i. semin. quat. calid. maior. & alth. malu. bombac. vrtic. an. ʒ. 3. glycyrrhiz. ras. ʒ. ʒ. flor. cardiac. anth. & genistæ ana p. i. f. decoct. ad lb. i. In colatura dissolue syrup. capill. ven. & de hyssop. ana ʒ. 2. f. apozema conditum triasantal. & diatreos simpl. ana ʒ. i. pro dosib. 4.

Ab his pugatio sequitur. Quæ quia sæpe iteranda est, ex superiori apozemate, additis semi. cartha. & folior. sennæ mundat. ana ʒ. i. agar. trochiscati ʒ. ʒ. syrupus solennis bis in hebdomade ad ʒ. 2. vel 3. in singul. dos. cum aq. hyssop. aut scabios. exhibendus, præscribetur. Vel hæc cōcinnabuntur catapotia.

ʒ. puluer. hieræ pictæ ʒ. iij. agar. recens trochif. ʒ. 2. rhei elect. in oxymelit. infusi ʒ. i. pulpæ tamarindor. & salis gemm. ana ʒ. 2. succi glycyrrhiz. ʒ. ʒ. cum syrup. de hyssopo f. massa. Detur ʒ. i. semel in hebdomad.

Conferent interea, quæ materiam fluere paratam auertant, errhina, apophlegmatismi, caustica, de quibus cap. de catarrh. & tussi. Hæc etiam pertinebunt sputum promouentia, vt syrup. thoracici, de glycyrrhiza, hyssopo, iuiub. prassio. & linctus, quæ vulgò lohot seu eclegmata appellatur. Quanquam hæc peritioribus quibusdam Medicis non ita probantur, quod lentore suo in ipso transitu adhærescant, & propterea expectorato viam minùs liberam relinquunt.

Euporistum est, & Græciæ plebeculæ hac etiam tempestate vñitatum remedium ad pulmones infarctibus à crassis humoribus liberandos: quod ipse aliàs ab Angelo Vergecio natione Græco, Regio nuper Scriptore, viro omnis cultioris literaturæ Protomystæ, & mihi studiosa necessitudine coniunctissimo, accepi. Animalcula Millepedæ & aselli Latinis, Græcis *ὄροι*, Gallis Cloportes appellata, quæ sub aquariis vasis stabulantur, panno lineo involuta in vino albo macerantur, hinc facta expressio potui datur. Dictu mirum, quàm breui saburra-
De millepedis vide Dioscorid. ca. 34. li. 2. Et Gal. lib. II. de cōpos. phar. & TORDVS.
 tos pulmones depleat. Id quod obseruare licuit in

DE MORB. INTERNIS

Ludouico Iouin, scriba & bibliopola, in ædibus D. Ioannis Lateranens. è regione collegij Triquetici: qui tamen inueteratò tandem asthma contabuit.

Probatum est ad leuandum asthma quantumuis magnum, tabellam vnā diatragacanthi guttulis aliquot olei saluie, anisi, aut rosmarini arte chymica extracti, irrigatam, præsentaneum afferre adiuuentum. Optimum quoque erit thoracem totum illinere, vt sese facilius explicare atque colligere adspuitionem queat.

℞. olei liliacei & amygdal. dul. ana ʒ. 2. butyr. recent. axung. gall. & anser. ana ʒ. 1. mucag. semi. lini & scæneg. cum aq. Vngul. caball. extractæ ana ʒ. 6. hyssop. sic. enul. campan. ana ʒ. ʒ. cum cera pauc. & croco f. linimentum.

Dein veniendum ad suffumigia, quæ materiam reliquam absumant, & cerebri catarrhum haud aliter absorbeât, quàm si quis colluuialem in cloacam viam calcem iniiciat. Ore per tubulum excipiuntur. Iisdem capitis integumenta suffiuntur. Interdum capiti emplastrum aptatur sistendæ fluxionis gratia.

℞. pic. naual. mastich. ammoniac. ana ʒ. 2. emplastr. contr. ruptur. ʒ. ʒ. nuc. mosch. ʒ. 1. ex his emollitis f. emplastrum.

Adhæc si subitaneum ab asthma periculum immineat, nec superioribus detur locus remediis, quamprimùm cucurbitulæ lumborum partibus paulò supra renes, quò diaphragma peruenit, & pulmonis portio, admouendæ, quia conscendentem ad asperam arteriam pituitam promptissimè reuellunt.

De 1 pleuritide.

C. N. P. 26.

1 De inflā-

matiōe tuni-
ca costas suc-
cingenti, aut
etiam muscu-
lorū interco-
staliū, qui-
b' illa adha-
ret tunica.2 Vehemens
& intolerā-
bilis, qui suū
celeriter ab-
soluit histo-
riam.3 Ob mem-
brana natu-
ram.4 Ob cordis
viciniam &
pericardij.5 Est enim re-
spiratio par-
ua & frequēs.6 Ob natu-
ram mēbra-
ne, & mate-
riae copiam.7 Pleuritis
noctū magis

Pleuritis dolor est lateris 2 acutus, 3 pun-
gens, cui 4 assidua febris, 5 difficultas spi-
ritus coniuncta sunt. Pulsus 6 durus & ser-
ratus, supinus ferè decubitus. Nam in latus sanum
conuersis tumor suspenditur, atque ita distenditur
membrana, quæ patitur, ideòque ita asperatur do-
lor. Vbi verò ægro lateri incumbunt, ex eo, quòd
subiecto corpore supprimitur, ampliatur doloris
sensus, fusa latius materia. Tum quia pulmo lateri
affecto innititur. Hic tamen decubitus altero tole-
rabilior est. Optimus autem, qui in asthma præ-
scriptus est. 7 Noctu ferè exacerbatur, ac diebus
imparibus. Ab exercitio frigida 8 potus, vini 9 in-
temperantia, inspiratio 10 gelida & Aquilonia, mul-
tò magis, si præcessit Auster, ac de repente succedit
frigus, venena 11 interim, concussio etiam externa
huic malo occasio esse consueuerunt.

Materia ferè 12 biliosa, aut sanguinea, quod par-
tim sputis, partim aliis 13 excretionibus & antece-
dente vitâ coniucies. Rarò pituitosa & 14 melan-
cholica. Interrogandus æger est, num suppressa sit
solennis aliqua purgatio, vt in mulieribus menses,
ingrauescit, quòd in somno partes interna & viscera magis incalescant, cum
calor à superficie corporis ad centrum se recipit. 8 Quia frigida, constri-
ngendo meatus, sanguinem in costas exprimit. 9 Vnde materia ὀξύχμος,
& catarrhi generatio. 10 Præcipuè si Auster antè diu flauit. Nam cum
Austriua tempestas bellum cerebro indicat, corpus replet humoribus, quos
Aquilonia constringendo exprimit: tum verò dum frigus ipsi thoraci no-
cet, fluxioni excipienda fit idoneus, hinc pleuritis. 11 Vt Leporis marini
usus. 12 Quòd tunicam costas succingentem, quæ densa est, crassa mate-
ria subire nequeat. 13 Vt alui, & urinarum. 14 Quæ ferè funesta,
quòd pepasmi expers.

- in viris hæmorrhoides, aut anniuersarium profluuium, aut alioqui statim certis interuallis, vt ex aluo, naribus, vlceribus. Ex his enim vitium lateri contrahi potest, præcipuè 15 quibus ea pars infirma est. Quæ etiam hyeme ideo facilius patitur, quod infirmatur frigore. Frigus 16 enim omnibus partibus thoracis inimicissimum est. Hoc modo igitur methodum distinguendæ pleuritidis instituito.
- Quæ pleuritidem imitantur.*
- 17 Quod ani Quibusdam corporibus à natura datum est, vt
maueritisse 17 hepar fibris quibusdam costis inferioribus co-
se literis mādauit Syluius puletur. Itaque laborante hepate imago pleuritidis
i latomo quo repræsentatur. Aliis materia quædam crassa & vi-
dã, cuius be- scida in membranis pectoris colligitur, toto etiam
par cū nothis thorace, vnde dolor grauis, tussis, 18 dyspnœa, &
costis vincu- 19 ficta pleuritis Nam nec pungit dolor, nec febris
lis & fibris incenditur, vt nec si flatus membranis, aut interco-
colligabatur. stalibus musculis impactus est. Aliquando etiam
18 Parua Et muscoli inflammantur, 20 sed pulsus hic alius, nem-
frequens spi- pe mollis. Dolor grauis est, non pungens, & omnia
randi diffi- ferè leuiora sunt. Membranæ quoque thoracem
cultas. distinguentes, si inflammantur, par negotium vitæ
19 Neq; ma- faciunt, atque verus lateris dolor. Sæpe etiam infe-
teriã, neque rioribus costis inflammatis, diaphragma, atque hinc
loco vera. stomachus grauiter laborat magno periculo. Mor-
20 Inflam- bus hic proximo vere, Anno 1551 ante Pascha, plu-
mati-musculi rimos, & eos maximè, qui vel temerè, vel negligenter
magnus est curati sunt, sustulit. Omnia ergo viâ ac ratione
pulsus & fre distinguenda sunt, vt etiam vniuersalia 21 morbi
quens: tunica temporis, è sputis maximè, tum vrinis, alui excretio-
verò inflam- nibus, & aliis, de quibus Apho. 12. lib. 1. & com-
mata paruus mentario lib. 2. Prognost. & Crisæon. 1. Ex his enim
& durus. 1. & 2. & 3. & 4. & 5. & 6. & 7. & 8. & 9. & 10. & 11. & 12. & 13. & 14. & 15. & 16. & 17. & 18. & 19. & 20. & 21. & 22. & 23. & 24. & 25. & 26. & 27. & 28. & 29. & 30. & 31. & 32. & 33. & 34. & 35. & 36. & 37. & 38. & 39. & 40. & 41. & 42. & 43. & 44. & 45. & 46. & 47. & 48. & 49. & 50. & 51. & 52. & 53. & 54. & 55. & 56. & 57. & 58. & 59. & 60. & 61. & 62. & 63. & 64. & 65. & 66. & 67. & 68. & 69. & 70. & 71. & 72. & 73. & 74. & 75. & 76. & 77. & 78. & 79. & 80. & 81. & 82. & 83. & 84. & 85. & 86. & 87. & 88. & 89. & 90. & 91. & 92. & 93. & 94. & 95. & 96. & 97. & 98. & 99. & 100. & 101. & 102. & 103. & 104. & 105. & 106. & 107. & 108. & 109. & 110. & 111. & 112. & 113. & 114. & 115. & 116. & 117. & 118. & 119. & 120. & 121. & 122. & 123. & 124. & 125. & 126. & 127. & 128. & 129. & 130. & 131. & 132. & 133. & 134. & 135. & 136. & 137. & 138. & 139. & 140. & 141. & 142. & 143. & 144. & 145. & 146. & 147. & 148. & 149. & 150. & 151. & 152. & 153. & 154. & 155. & 156. & 157. & 158. & 159. & 160. & 161. & 162. & 163. & 164. & 165. & 166. & 167. & 168. & 169. & 170. & 171. & 172. & 173. & 174. & 175. & 176. & 177. & 178. & 179. & 180. & 181. & 182. & 183. & 184. & 185. & 186. & 187. & 188. & 189. & 190. & 191. & 192. & 193. & 194. & 195. & 196. & 197. & 198. & 199. & 200. & 201. & 202. & 203. & 204. & 205. & 206. & 207. & 208. & 209. & 210. & 211. & 212. & 213. & 214. & 215. & 216. & 217. & 218. & 219. & 220. & 221. & 222. & 223. & 224. & 225. & 226. & 227. & 228. & 229. & 230. & 231. & 232. & 233. & 234. & 235. & 236. & 237. & 238. & 239. & 240. & 241. & 242. & 243. & 244. & 245. & 246. & 247. & 248. & 249. & 250. & 251. & 252. & 253. & 254. & 255. & 256. & 257. & 258. & 259. & 260. & 261. & 262. & 263. & 264. & 265. & 266. & 267. & 268. & 269. & 270. & 271. & 272. & 273. & 274. & 275. & 276. & 277. & 278. & 279. & 280. & 281. & 282. & 283. & 284. & 285. & 286. & 287. & 288. & 289. & 290. & 291. & 292. & 293. & 294. & 295. & 296. & 297. & 298. & 299. & 300. & 301. & 302. & 303. & 304. & 305. & 306. & 307. & 308. & 309. & 310. & 311. & 312. & 313. & 314. & 315. & 316. & 317. & 318. & 319. & 320. & 321. & 322. & 323. & 324. & 325. & 326. & 327. & 328. & 329. & 330. & 331. & 332. & 333. & 334. & 335. & 336. & 337. & 338. & 339. & 340. & 341. & 342. & 343. & 344. & 345. & 346. & 347. & 348. & 349. & 350. & 351. & 352. & 353. & 354. & 355. & 356. & 357. & 358. & 359. & 360. & 361. & 362. & 363. & 364. & 365. & 366. & 367. & 368. & 369. & 370. & 371. & 372. & 373. & 374. & 375. & 376. & 377. & 378. & 379. & 380. & 381. & 382. & 383. & 384. & 385. & 386. & 387. & 388. & 389. & 390. & 391. & 392. & 393. & 394. & 395. & 396. & 397. & 398. & 399. & 400. & 401. & 402. & 403. & 404. & 405. & 406. & 407. & 408. & 409. & 410. & 411. & 412. & 413. & 414. & 415. & 416. & 417. & 418. & 419. & 420. & 421. & 422. & 423. & 424. & 425. & 426. & 427. & 428. & 429. & 430. & 431. & 432. & 433. & 434. & 435. & 436. & 437. & 438. & 439. & 440. & 441. & 442. & 443. & 444. & 445. & 446. & 447. & 448. & 449. & 450. & 451. & 452. & 453. & 454. & 455. & 456. & 457. & 458. & 459. & 460. & 461. & 462. & 463. & 464. & 465. & 466. & 467. & 468. & 469. & 470. & 471. & 472. & 473. & 474. & 475. & 476. & 477. & 478. & 479. & 480. & 481. & 482. & 483. & 484. & 485. & 486. & 487. & 488. & 489. & 490. & 491. & 492. & 493. & 494. & 495. & 496. & 497. & 498. & 499. & 500. & 501. & 502. & 503. & 504. & 505. & 506. & 507. & 508. & 509. & 510. & 511. & 512. & 513. & 514. & 515. & 516. & 517. & 518. & 519. & 520. & 521. & 522. & 523. & 524. & 525. & 526. & 527. & 528. & 529. & 530. & 531. & 532. & 533. & 534. & 535. & 536. & 537. & 538. & 539. & 540. & 541. & 542. & 543. & 544. & 545. & 546. & 547. & 548. & 549. & 550. & 551. & 552. & 553. & 554. & 555. & 556. & 557. & 558. & 559. & 560. & 561. & 562. & 563. & 564. & 565. & 566. & 567. & 568. & 569. & 570. & 571. & 572. & 573. & 574. & 575. & 576. & 577. & 578. & 579. & 580. & 581. & 582. & 583. & 584. & 585. & 586. & 587. & 588. & 589. & 590. & 591. & 592. & 593. & 594. & 595. & 596. & 597. & 598. & 599. & 600. & 601. & 602. & 603. & 604. & 605. & 606. & 607. & 608. & 609. & 610. & 611. & 612. & 613. & 614. & 615. & 616. & 617. & 618. & 619. & 620. & 621. & 622. & 623. & 624. & 625. & 626. & 627. & 628. & 629. & 630. & 631. & 632. & 633. & 634. & 635. & 636. & 637. & 638. & 639. & 640. & 641. & 642. & 643. & 644. & 645. & 646. & 647. & 648. & 649. & 650. & 651. & 652. & 653. & 654. & 655. & 656. & 657. & 658. & 659. & 660. & 661. & 662. & 663. & 664. & 665. & 666. & 667. & 668. & 669. & 670. & 671. & 672. & 673. & 674. & 675. & 676. & 677. & 678. & 679. & 680. & 681. & 682. & 683. & 684. & 685. & 686. & 687. & 688. & 689. & 690. & 691. & 692. & 693. & 694. & 695. & 696. & 697. & 698. & 699. & 700. & 701. & 702. & 703. & 704. & 705. & 706. & 707. & 708. & 709. & 710. & 711. & 712. & 713. & 714. & 715. & 716. & 717. & 718. & 719. & 720. & 721. & 722. & 723. & 724. & 725. & 726. & 727. & 728. & 729. & 730. & 731. & 732. & 733. & 734. & 735. & 736. & 737. & 738. & 739. & 740. & 741. & 742. & 743. & 744. & 745. & 746. & 747. & 748. & 749. & 750. & 751. & 752. & 753. & 754. & 755. & 756. & 757. & 758. & 759. & 760. & 761. & 762. & 763. & 764. & 765. & 766. & 767. & 768. & 769. & 770. & 771. & 772. & 773. & 774. & 775. & 776. & 777. & 778. & 779. & 780. & 781. & 782. & 783. & 784. & 785. & 786. & 787. & 788. & 789. & 790. & 791. & 792. & 793. & 794. & 795. & 796. & 797. & 798. & 799. & 800. & 801. & 802. & 803. & 804. & 805. & 806. & 807. & 808. & 809. & 810. & 811. & 812. & 813. & 814. & 815. & 816. & 817. & 818. & 819. & 820. & 821. & 822. & 823. & 824. & 825. & 826. & 827. & 828. & 829. & 830. & 831. & 832. & 833. & 834. & 835. & 836. & 837. & 838. & 839. & 840. & 841. & 842. & 843. & 844. & 845. & 846. & 847. & 848. & 849. & 850. & 851. & 852. & 853. & 854. & 855. & 856. & 857. & 858. & 859. & 860. & 861. & 862. & 863. & 864. & 865. & 866. & 867. & 868. & 869. & 870. & 871. & 872. & 873. & 874. & 875. & 876. & 877. & 878. & 879. & 880. & 881. & 882. & 883. & 884. & 885. & 886. & 887. & 888. & 889. & 890. & 891. & 892. & 893. & 894. & 895. & 896. & 897. & 898. & 899. & 900. & 901. & 902. & 903. & 904. & 905. & 906. & 907. & 908. & 909. & 910. & 911. & 912. & 913. & 914. & 915. & 916. & 917. & 918. & 919. & 920. & 921. & 922. & 923. & 924. & 925. & 926. & 927. & 928. & 929. & 930. & 931. & 932. & 933. & 934. & 935. & 936. & 937. & 938. & 939. & 940. & 941. & 942. & 943. & 944. & 945. & 946. & 947. & 948. & 949. & 950. & 951. & 952. & 953. & 954. & 955. & 956. & 957. & 958. & 959. & 960. & 961. & 962. & 963. & 964. & 965. & 966. & 967. & 968. & 969. & 970. & 971. & 972. & 973. & 974. & 975. & 976. & 977. & 978. & 979. & 980. & 981. & 982. & 983. & 984. & 985. & 986. & 987. & 988. & 989. & 990. & 991. & 992. & 993. & 994. & 995. & 996. & 997. & 998. & 999. & 1000.

tempora distingues, tempus euentumq; crisis pronuntiabis, meliusque auxilia ²² institues.

²³ Curatio.

Vitæ ratio ²⁴ methodo illa vniuersali, quæ ab Hippocrate primo ²⁵ Aphorismorum indicatur, æstimanda est. Nunc etiam consuetudo adiungenda, cum ægri in ediam Hippocratis non ferant, & aliis ciborum, potusq; generibus assueti sint. Initio aqua hordei, ex hordeo pulicula. Principiis, ²⁶ liquidior: post etiam ²⁷ crassior, ac deinceps mixtis amygdalis, tum amygdaloga. Post etiam eadem ex pullorum iusculis dissoluta. Tenellæ pullorū carnes, intrita madida, quæ & infriatas carnes, & synterimata appelles licet, vulgò coliria, & colatitia iuscula. Præter hæc, vulgi expressiones, tortiua iura, atque iis omnibus liquidiora instauratitia distillata, quæ ad ²⁸ ἡδέα καὶ ὠφέλιμα πόματα (sic enim appellat Paul. Aeg. cap. 15. lib. 7.) & reliquas id genus potiones referri possunt. His autem ²⁹ defectis viribus uti mos est. Nam integra virtute nutrities ³⁰ tenuius Synterimata ergo è pulpis galli decrepiti, postquam longa decoctione remolliueris, & exactè infriaueris, conficies. Atque eo iure, in quo gallus coxerit, dissolues. Alioqui id quod conficitur à natura, melius ex assis pulpis, quæ alis copulantur, & sub iis positæ sunt. In capis, perdicibus, & iuuenibus gallinis detrahendū lardum est, priusquam infrientur, atque dum assantur, aquâ violarum, scabiosæ, borraginis, conspergi possunt. Tor-

²² In diata, pharmacia, Et chirurgia.

²³ Actionū, quas labesum, etat pleuritis per causa a-motionem re-stitutio.

²⁴ Ut in eunte morbo, dum siccus manet, si vires valeant sine infirmitatis metu, prius in curam morbi incubamus, quam natura studeamus:

deinde victum loco & iure prescribamus

tenuem, ut exquisitum intelligamus, quibus paucis et semel sit exhibendus.

²⁵ Et lib. 2. de victu rat. in morb. acutis.

²⁶ Ne pleuriticam faciant anhelosum.

²⁷ Cum humescere os cæperit.

²⁸ Paulus Aegineta lib. 7.

²⁹ Ut æquè natura studeas, & pugnes cum morbo.

³⁰ Si brevis sit morbi historia, & cum virium integritate ad statum peruenire queat.

titia iura, id est, expressiones ex eodem modo assis-
capis, perdicibus & cæteris succulentis. Ideoque
priusquam legitimè coctæ sint carnes, etiamdum
succolæ prælo bene mundo supprimantur. Sed &
exossari prius melius est: deinde ita contorqueri,
vt vberem succum reddant, qui interim hyosaccha-
râ, id est, saccharo violato dulcari potest. Instaurationis
hac conuenient formula.

℞. Conseruæ borragi. violarum, capill. ven. ana
℥. i. conseruæ enulæ ℥. ℞. diamargariti frigidi, triasanti-
nali ana ℥. ℞. quatuor 31 semin. frigid. excorticato-
rum, sem. limonum, cardui, bombacis ana ℥. 2. aqua-
rum distillatarum è violis, scabiosa, borragine, bu-
glossa, vngula caball. an. ℥. 4. aquæ decoctionis galli
decrepiti, alterati cum borragine, buglossa, calêdu-
la, & 32 modico hyssopi ℔. 4. cum carnibus vnus
capi iuuenis bene carnosus, & 33 mica panis fiat di-
stillatio in alembico secundum artem.

℞. supradictæ distillationis ℔. ℞. cum sacchari
violati ℥. i. ℞. & 31. cinamomi. Coletur per mani-
cam Hippoc.

Instauratitium pro pauperibus.

Minori sumptu gallus decrepitus ad putrilagi-
nem coquitur cum vitulina: expressio fortis cum
iufculo sorbetur, cuius alimenti vim maiorem ex-
stimant, si cum numis aureis, aliquâdo etiam gem-
mis nodulo inclusis & inditis ventri galli. Præterea
vocata gelatina, concreto succo carniū vires fo-
uendæ sunt. Permulti pleuritici vinum appetunt,
quo tamen 34 interdicensum est, nisi virtute col-
labente animi deliquium metuatur. Tūmq̃ue buc-

31 Cucurbi-
ta, cucumeris,
melonum &
citruli.

32 Propter
amaritudinē.

33 Que ma-
cerata sit in
aqua scabio.

34 Inflam-
mationis me-
ntis.

cella panis in vino tenui, & modico aquæ violarū immergatur. Sæpius naribus admoueat, fugatur interuallis. Acida adstringentia, quæ refrigerant vehementius, aut calfaciunt 35 vitanda sunt.

36 Loco lucido, mediocriter elato, molli culcitra, capite ac thorace subleuato, collocandi sunt. Qui si decidunt 37 in pedes, lignū aliquod, aut aliud corpus pedibus obicitur, vt in ea figura persistant. Hæc vbi ita fuerint 38 prouisa, statim initio de 39 maioribus remediis cogitandum est.

Maiora remedia sunt, purgatio & phlebotomia. Si subsistit aluus, clyster mollis iniici debet. ℞. mal. bis mal. violar. ana M. l. fursur. hordei ana M. β. viol. p. 2. f. decoct. ad ℥b. i. plus, minusue: pueris enim selibra, aliquando vnciæ nouem satis esse possunt. In colatura dissolue calsiæ 3. 6. vel 3. i. sacchari crassioris 3. l. mellis rosacei colati 3. β. olei violac. 3. 3. vel 3. 2. Purgatio interim satis esse potest. Nec perpetuò 40 phlebotomia opus est.

Placuit enim Hippocrati, cum dolor ad hypochondrium inclinaret, vt pharmaco 41 potius, quam phlebotomo vteremur. Pharmaca verò præcipua credidit helleborum nigrum, aut peplion. 42 Gal. verò hieram diaco. quæ helleborum, non scammonium, vt peplion, recipit. Posteritas Medicorum, leuioribus inuentis, veterum pharmaca reliquit. Leuissimum, ac plurimum vsurpatum calsia. Datur hæc ad 3. i. β. 3. 10. 3. i. 3. 6. eaque dissoluenda est aqua hordei, sero lactis, passularum, glycyrrhiæ, eiusmodique pectoralium decocto, vel cum saccharo in bolum cogenda est.

35 Hæc enim expectoratiū prohibent.

36 Vt materia foras euectur, & refrigeretur corpus.

37 Quod si iactatione, vel viri infirmitate.

38 Adhibita scilicet prouisione loci, aeris & decubitus.

39 Quia propter impedimentum partitis cuius officio vita carere nequit, prius est in morbi curam incumbendū, quam naturæ studendum.

40 Vt cum expectoratiū cruentum est, facileque excutitur.

41 Ad amotionem coniuncta causa.

42 Gal. commentario in sent. 11. lib. 2. de ratione vict. in morb. acutis.

- 43 Quod purganda vis ei sit imbecillior. Datur etiam, sed ferè 43 aucto modo, mel aëriū, id est, manna. Vbi verò obstructionis cōiectura est in primis venis, rhabarbari 3.1. vel 3.2. in aqua hordei, endiuix, aut similibum infundūtur, & cum modico cinamomi, fit potus. Neque metuēda eius adstrictio est. Nam & mastiches 3. 3. mouendo ventri-
44 pleuriticorum veteres imperauerunt.
- 44 Mastix enim ex euentu purgat, dum ventriculum adstringit. Alternis diebus, maximè paribus, in quibus ferè quies est, aut lenior morbus, clyster mollis iniici debet, si non descendit alius. Alioqui, quod vtilius est, Cassiæ 3. 8. aut 3.6. in bolum cum saccharo cōgendæ sunt. Dandæque vel manè, vel vesp̄ri, horè dimidio ante cibum.
- 45 Vt si expectatus sit processus vires sunt infirmæ, si difficultas expectorandi in lateris infirmitate cōstat, si pleuritis mitificata fuerit, & ad cōctionem perducta. Consilium vsus pharmaci augebit, si dolor levis est, si naturâ æger non ita eusarcos, aut aliena 45 opinio à phlebotomo. Alioqui si 46 grande malum est, etiam si ad hypochondrium declinet dolor, tutius auxilium phlebotomia est Galeno. Priùs etiam quàm de pharmaco decernas, interroganda ægri natura est. Alij enim 47 difficiliùs purgantur: alijs 48 vel leui pharmaco immodicè turbatur aluus.
- 46 Magnitudine causa & symptomatum vehementia. Hi ergò à phlebotomo habere possunt commodiùs. Quod si incognita ægri natura est, & pharmaco vti decet, medicamentum eliges tum qualitate, tum quantitate medium, ne vel non purges, vel supra modum vacues.
- 47 Vt melâ cholici.
- 48 Vt iis qui sunt λεπτοί καὶ ἀνέμοιοι καὶ ἀνέμοιοι. Tempestiua purgatio turgente 49 materia, prima die, aut non vltra secundam. Et, si pleuritidem eò processisse perspexeris, vt sputa prodire incipiât, purgans medicamentum minimè exhibendum, ne que nullo consistit loco, diuersâque excitat symptomata pro varia parte, in quam influit.
- 49 Effera scilicet, &

sputi motus inhibeat, ex Hippocrate libr. 3. de morbis. Nec omninò agarico, aut etiam hiera diacol. interdicatur, quin vti licet, dolore in ventrem declinante, non ita vehementi affectione, atque vbi à pituita malum est.

Imperabis ergò 50 catholici 3.6. rhab. & agar. infusorum, vti decet, an. 3.2. cum hydromel. quantum sufficit, fiet potus. Eodem modo 51 & catholico 3.4. pul. diacol. misceri possunt. Diaphœnicon quoq; & diaprunum pauperibus imperari possunt.

Phlebotomia remissionis tempore, & eo die quo leuior est paroxysmus, comodior est. Itaque etiam vespere & nocte media, vrgēte malo, & oblata occasione sanguinem detrahes. Nec perpetuò semel is ducēdus est. Nam suspectis viribus, vacationem partiri melius est, vt manè 3.6. vesperi vnciæ sex depleantur. Est præterea, cum de repente noua sit affluxio, vt inde omnia symptōmata recrudescant, sputa quoque vel cruda sint, vel retineantur: tūmq; & sexto die, & octauo, vt 52 Anaxioni, aut etiam tardiùs, sanguinem mittimus. Hòcque remedium secundo ac tertio reuotamus, si quidem non repugnant vires. In quo tamen cautio esse debet. Nam aliquando vbi antea signa omnia salutem prænuntiauerint, crisis tempore, quæ ferè fit ad septimum, aut aliam diem criticam, vehementer pleuritis exacerbatur, symptōmata omnia increscunt, tum nihil mouendū est: sed omnia naturæ 53 cōmittēda sunt.

Desperatis rebus, nihil quoque mouendum est.

In pueris etiam bimis, senibus octogenariis, mulieribus grauidis, 54 remedium hoc temperari debet, non omninò prohiberi.

pressionem 3.
2. rhei electi,
3 1. b. vel
3.4. agarici
in hydromeli
te cocto opti-
mè infusorū
cum 3.1. ci-
namomi, in
qua dissolue
catholici, sy-
rupi viol. an.
3.6. f. potio.
51 Vi. 2℥. ca-
tholici 3.6.
pulueris hier.
diacolocynth.
3.1. vel 3.4.
f. bolus.
52 Hippocr.
sect. 3. lib. 3.
7th in 2nd p.
53 Vt si humo-
ris corruptio-
ne phlegmone
in gangranā
abierit, si vi-
res effecta læ-
gueāt, si expe-
ctorandi dis-
ficultas in la-
teris infirmi-
tate cōsistat,
et ἐν γένος si-
ne sterior ad-
sit. Tunc enī
de salute est
desperādum.
54 Prasertim
si grandis sit
fœtus.

55 *Vt tantū effluat sanguinis, quantum Hirudo suxerit.*

In pueris venæ interim angustiores non apparēt, idque magis in pinguiusculis. Qua in re sanguis uti licet, 55 decurtata harum cauda, ut vacuationis modus certō finiatur.

56 *Quandiu sit palyndrome. Nam si malum iā factum sit, cubiti venā secare est satius.*

Suppressa aliqua per partes inferiores vacuatione, ubi malum inde ortum est, in insigni plenitudine, in materia virulenta, cūque statim initio materia in caput rapitur, ac mentem cōmouet, è 56 venis cruris eiusdem lateris sanguis trahendus est. Alioqui è basilica eiusdem lateris.

57 *In ictu, motu & dilatatione.*

Vacuationis modus è 57 pulsu, 58 sanguinis motu, 59 colore, & corpore præscribendus est. Si initio purus ac rubens effluit, vacuationis modus, cum iam liuidus excernitur. Si aquosus & crudus initio, claudenda vena est, cum iam rubentior & flauior apparebit. Si basilica non apparet, media vulneretur. Atque cum iam vulnerata est, 60 pollex ramo cephalicæ imprimatur.

58 *Si ἀγρός, siue cōfertim fertur sanguis, aut pigro lapsu fluat propter plethoram.*

Animaduertendum pleuriticis iuuari phlebotomia, locis perflatis ab Aquilonibus: lædi verò regionibus, quæ obuertuntur Austris. Hic ergo vel purgatione utendū est, vel tēperanda sanguinis detractio.

59 *Si ruber fluxerit, mox niger, ultimo loco melior: præsertim si pleuritis in superiorib. sit costis.*

In biliosa pleuritide Arabes phlebotomia 61 interdicit. Hippocrates quoque hac sententia prohibuisse visus est. Sanguinem, inquit, nō detrahes, ubi expuitur sanguis, si regio repugnat, si æger pleuriticus est, si natura eius admodum biliosa.

60 *Nequid ex capite defluat, ex quo vacuare non instituimus.*

Galenus sententiam Hippocratis recipit, nisi quod 62 non probat sanguinem non detrahi, spūtib. sanguinem pleuriticis.

61 *Quia sanguis frænum est bilis.*

62 *Imò probat hæc sententiā Gal. commentar. in librum de hum moribus.*

Hippocrates priusquam veniat ad maiora remedia, 63 fomētis vtitur, quæ aliquando satis esse possunt, aliquando morbum indicant.

63 *Liquidū, siccis, mistis, suavis, acerbis, curandi, & explorandi gratia.*

Itaque si sputa biliosa, vesica suis ex aqua calida ad dimidium implenda est, admouendāque lateri. Alioqui gossipium, vel lana mollis infusa in aqua tepida, & expressa subinde apprimatur lateri. In ea aqua, si vis, incoques violas, melilotum, chamæmelum. Fouebis quoque oleo violato & chamæmelino, si crassa & viscida sputa sunt.

℥ milij frixi M.1. furfuris frixi P.2. salis torrefacti 3.1. Interim dum friguntur, vino tenui cōspergi possunt, & si perfrixit latus, aqua vitæ vel hyssopi, aceto etiam, si corpus carnosum est & calidum, neque vehementer vrgeat tussis. Inde fiunt sacculi, qui calidi lateri applicantur. Possunt hi sacculi in vino aut aceto immergi, in quibus vel hyssopum, vel origanum, vel thymum, aut aliquid tale coxerit. Inūges tū ex anethino & rutaceo. Eiusmodi quoque sacculis cumini semen, baccæ lauri, sicc. hyssopus, organū, rosmarinus, & similia immisceri possunt.

64 *Ne sua inaequalitate partem offendant.*

In tenui & cruento sputo sacculus ex milio, furfure, & sale descriptus, sed siccus & calefactus, applicari debet, inūctio ex chamæmelino & amygdalino.

65 *Valet in eunte morbo ad materiae orgasmum, palyndromē, aut fluxionē prohibendā.*

Oportet autem omnia, quæ lateri admouentur, esse 64 læuia, mollia, calida: videndūque, ne quæ calida admota sint, tempore refrigescant, calorque linteis calentibus, aut alia arte fouendus est. Sunt, qui nullis eiusmodi remediis vsi, neque fomentis, neque maioribus illis auxiliis certas antidotos commendant. Quales sunt. 65 Dens apri in scobem cōminuitur, dantur 3.2. ex vino albo tenui. Aliud.

Habet enim dēs apri vim adstringendi maximam.

DE MORB. INTERNIS

Radiciſ lappæ ſiccæ, quæ purpureum floré gerit, aut floriſ 3.2. è mulſa propinantur. Aliud.

66 Cõmendatur mirificè pudèdum bulbum, aut ceruinũ, toſtũ & in tenuiſſimum puluerè redactum: datur ad 3.1. cũ oxymelite, aut vino albo
67 Ad reuelendum Et vacuadum.
68 Simpliciter aut ſcyllitico, ſi materia ſit læta, nec alui imbecillitas, aut melancholia hypochondriaca ab eo uſu euocet.
69 Leniter: nam coctione longiore amareſcit.
70 Ut 3. 4. ad lb.1.

66 Coralli rubri & teſtæ auellandarum rubrarum ana 3.1. datur è mulſa. Ruſtici ius ſerpilli expreſſum cũ aqua cardui benediſti vtiliter uſurpant. Poſſunt hæc quidem tentari, non neglectiſ aliis remediis.

Cucurbitularum in pleuritide 67 plurimus uſus eſt, de quo Galen. in lib. de Cucurb. Vtimur quoq; plurimũ aqua hordei, ſacchari, ſyrupo violato, de iuiubis, 68 oxymelite, hydromelite, decoctione pectorali, ſyrup. capil. ven. & de glycyrrhiza.

Aqua hordei, ſi quidem detergendum eſt, & ſiccandum, ex integro hordeo parari debet.

Si leniendum, ſi extinguenta ſitiſ eſt, idem hordeum fricandum aſperiore linteo, & exteriore tunica ſpoliandum eſt.

Si nutriendum magiſ, proportio hordei ad aquam augenda eſt, magiſque coquendum eſt, dum diſfringatur hordeum. Ferè parant aquam hordei, ut ſit aqua vigeſcupla, id eſt, ut ſint xx. partiſ aquæ, & vna hordei.

Sæpe etiam quartam partem ſyr. viol. commiſcemus, aut modicum ſacchari violati, vel, ut in ptiſana vulgari, glycyrrhizam raſam 69 concoquimus. Aqua ſacchari deterget, coquit, lenit, nutrit.

Sit autem ſacchari 3.1. in viginti partiſ aquæ: coquitur ad ſui dimidium. Poſteſt tamen ſacchari modus augeri, ut etiam aliquando 70 ſub quadruplum ſaccharum ſit, quale hoc eſt.

24. aquæ coctæ, vel aquæ hordei lb.1. ſacchari communis vel violati 3.3. atque aliquando colatur aqua illa cum dicto ſaccharo, & modico cinamo-

mi: cum videlicet nutriendum magis, coquendum, detergendum, repurgandum & roborandum. Iulepi violati vsus est, vt leniamus sitim, & calorē temperemus, leuiter concoquamus, & facilius sputum reddamus. Syr. de iuiubis lenit, maturat, téperatus est: cōuenit quoque, vt violatus, in crassando sputo.

Oxymelitis suspectus vsus in pueris ⁷¹ macilentis, iis quibus genus neruofum infirmum. Quibus asperior tussis, vigiliæ maiores, sputa quoque tam crassa, vt propè sicca sint, similiter & si æger debiliior est. Tempestiuus autem vsus fuerit, si nihil horum repugnat, si fluxio tenuis non est, si sputa mediocriter crassa, hoc est, nō ita resiccata. Hydromelite, vt aqua sacchari vtendum est, nisi quòd calefacit magis & omnino maiore vi præditum est, quàm aqua saccharata. Decoctione pectorali ad sitim, ad coquendū; leuiter detergendū, & incidendū vti licet.

Syrupus capill. ven. incidit, deterget sine manifesto calore. Syrup. de glycyrrhiza ad omnia supra dicta utilis est & pectus roborat. Itaque vt postulabit vsus, modò his, modò illis vtendum est. Veteribus quoque melicrata probata sunt ex aqua, in qua radix violæ purpureæ, stœchas, chamædrys, chamæpitys, horum vnum coxerit. Atque ⁷² initio suppressendæ fluxionis suffitu vtimur.

℥. 73 vernicis 3. i. mastichis, ros. an. 3. 2. fiat pul. pro suffitu cum stupis cannabinis. Item.

℥. diatragacant. frigidi 3. 8. teneat alternatim in ore. Plura in cap. de catarrho.

In coquendo verò quod influxit, vtendum est ⁷⁴ lacte amygdalino, butyro per se. Coquit enim, lenit modice, educit.

71 Tenuibus, qui alio sunt infirmiore, Et mulieribus histericis, Et melancholicis.

72 Cū exclusio sit à capite in fauces.

73 Vel. ℥. vernicis, mastich. nigellæ romanæ ana 3. i. fursuris macri 3. i.

pulueris rosarum rubrarum 3. 2. si. puluis pro suffitu.

Excipitur pīleo nocturno. Hūc etiam spectant s. cūculi & marsupia ex mīlio, sale & fursure capiti admoventi admanē.

74 Si nulla alia sit causa, ac non sit æger diutius.

75 *Hæc in pituitosa pleuritide, affecto & declinante morbo.*

76 *Vt 2℥. sal. sa. parilla 3.*

2. radic. enule campane areos an. 3.1.

salvia & betonica M.1.

fi. decoct. In colatura dis-

solue mellis lib. 1. fi. hy-

dromel, quod maxime hye-

me vsus ha-

beat.

77 *Ad fluxionem sistendam.*

78 *Ad expectoratiū promouendum.*

77 *Vel 2℥. iuiubar, pru-*

na damasc. an. num. 20.

passul. mundat. 3. B.

dactylos, fi-

cus pinguis an. num. 3.

ungul. cabal-

Poteritque modicum sacchari violati commisceri, vt paulò plenius educas, postea verò aliquid mellis. Ita magis repurgabis. Magis etiam, si ad 3.1. butyri, 3.2. diaireos simplicis admisceas, vel amygdalas amaras, persicorum nucleos, aut 75 similia amara torrefacta, & in puluerem redacta.

Butyro quoque quarta pars terebinthinæ lota in aqua malux commisceri potest.

Parabilia quoque remedia sunt 76 melicrata, in quibus radix althææ coquedo, hyssopus, thymum, & similia incidendo & repurgando coxerint. In eadem rem comparat eclegmata, initio quidem cum multo 77 diatragacantho: postea verò cum 78 multo diaireos. Ferèque in remediis pleuriticis lenientia, detergentia, incidentia, repurgantia commiscentur: quale hoc est.

2℥. electarij diatragacant. frigidi 3.6. sacchari candi, penidiarum, pilularum albarum an. 3.3. diaireos simplicis 3.2. syrapi violati & iuiubarum an. quantum sufficit, fiat eclegma.

Vbi verò magis repurgandum & extenuandū, loco penidiarum, mel album: loco syrapi prædicti syrupum cap. ven. & aliquid oxymel. miscebimus.

Iam aucto morbo, ad hos vsus vinum album, tenue & aquosum concedi potest. Inunctiones lateris fiunt ex oleo violarum & aliis, vt supradictum est, oleo de keiry, de lilio, mucaginib. semin. cydoniorum, althææ, lini, scænuagræ. extractis in aqua violarum, vngulæ caball. scabiosæ, hyssopi, butyro, fordibus lanarū, terebinthina, axungia gallinæ, anline M. B. hyssop. P. 1. glycyrrhizæ rasa 3. B. fi. decoctio: in colatura ad lb. 1. dissolue sacchari quart. 3. electarij diaireos simplicis 3.3. fi. syrupus.

feris, anatis, suis, & quæ plurimum laudatur, vrsæ. Adduntur pulueres, ireos, thymi, hyssopi, marrubij, gentianæ, sinapi, cnici, brassicæ, & sarmentorum vitis, non initio quidem, sed iam progresso morbo. Sic enim ferè posteriorum Medicorum vsus. Veteres autem vehementioribus remediis vsi sunt. Latus lana sordida leniente & concoquente integitur: postea etiã in fine morbi lana sulphurata. Formulæ sunt.

℥.ol. violarum, amygdalarum dulcium ana ʒ.ß. misce. Cui adde post initia, mucagin. sem. cydoniorum excorticorum ʒ.6. mucag. sem. lini ʒ.ß. ceræ modicum, fiat linimentum pro latere. Postea.

℥.mucag. sem. althææ & cydoniorum an. ʒ.6. mucaginis sem. lini & fœnugræci ana ʒ.ß. ol. de keiry, adipis vrsi an. ʒ.3. celsypi ʒ.2. ceræ modicum, fiat linimentum.

℥. dialthææ ʒ.2. cum oleo amygdalarum dulcium, fiat vnguentum molle. Atque vbi iam resoluendum est, adde pul. ireos, aut similis ʒ.2. Tùmque bonum fuerit, 78 folium brassicæ ad ignem tabefactum, & butyro illitum superponere lateri, vel ex eiusdem brassicæ caulibus combustis, & in cinerem reductis, mixta adipe, linimentum conficere. Nam id medicamenti affatim discutit.

78 Hæc ex Paulo Aegineta, cap. 33. lib. 3. desumpta, ad plenam ritidem non

Atque vbi ad suppurationem vergit, semen nasturtij & sinapi cerato commisceri possunt. Quo tempore.

℥.rad. althææ & liliorum repurgatarum ana ʒ.1. ficus pingues N. 2. Coquantur omnia in vino albo. Deinde cum axungia & oleo de liliis pinferantur in mortario. Fiat emplastrum molle, cui insper-

tham.

ge semin. nasturtij & sinapi in puluerem redacti
ana 3.1. Tentatis omnibus his remediis, si quidem
desperatio est, & vires tolerare possunt, cauteriū a-
ctuale, aut potentiale (quod vocant) lateri inferen-
dum est.

Scarificatio quoque cum cucurbitula, eo modo,
quo in libello de cucurbitula dictum est.

pleuritis notha.

Est nonnunquam lateris dolor, qui pleuritidem
ementitur, & propterea pleuritis notha solet appel-
lari. Eius causę scholiis nostris proximè describuntur.

Ad curationem verò hæc remedia comparari
poterunt. ℞. farinæ tritic. M. 1. mell. 3. 2. coquantur
in decocto rutæ & nepetæ: deinde addita vitulinæ
axung. lot. in aqua chamæmeli 3. 1. f. f. cataplasma
dolenti parti admouendum. Rustici succo nepetæ
lana excepto, superposita fascia, cōtra pleuritidem,
& internos dolores vtuntur.

℞. maioranæ, rut. ana M. 1. baccar. laur. p. 2. ve-
hementer tere in mortario: adde mell. 3. 4. f. velut
cataplasma, quod impingatur lateri calidum: super-
ponatur lana, & fascia alligetur.

℞. decoction. absynth. tb. f. ficuum pinguiū tri-
tarum 3. 3. f. decoctio ad crassitudinē: f. fortis ex-
pressio. In expressione rursus coque mellis 3. 1. f. ra-
dic. ireos pulueratæ, rad. caul. an. 3. f. iteretur expres-
sio, & cum cerato laurino fiat vt prius.

*Nicol part.
2. lib. 2.*

Achariston à Nicolao descriptum ad nucis my-
risticæ magnitudinem datum omnibus interaneis
doloribus subuenit.

Olea muscellinum, styracinum, ex descriptione
Nicolai compositum, scylliticum, puleginū, è florib.

in oleo infusis, & in vase duplici coctis, & vehementer expressis, hypericinum, mastichinum lateri tepida cum lanis sordidis vtiliter apponentur.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Musa in Aphorismos, ita pleuritidem distinguit, ut notha sit in superiore parte tunice tegente costas, aut inter costas: vera, in mediastino. Quod & rationi, & experientiae repugnat: quibus perspicuum est in succingente costas, aut periostio, aut saltem in musculis intercostalibus veram cum veris propriisque symptomatis excitari: notham in musculis externis. Licet haudquaquam negandum intra thoracem speciem quandam pleuritidis non verae fieri posse. Multis enim ex ratione vitae, quae crassa & viscida gignat, multus humor eiusmodi in corpore cumulat, qui in vacuum spatium thoracis & pulmonis delatus, membranisque haerens, dolorem pleuritico similem affert, sed sine febre, vel certe febricula, aut etiam frigidiore corpore, quam antea, respiratione quasi in collo suffocante, pulsu difficili, tardo, minimo, ubi neque phlebotomia, neque similibus remediis ad pleuritidem accommodatis, sed iis, quae humorem illum incendant, tenuent, & ducant, semper est utendum. Signa autem certissima, quibus in ceteris & pars affecta, & materia affectus internoscuntur, huiusmodi sunt. Si aeger in partem lateri dolenti oppositam decumbere non potest, in membrana costas succingente affectio est, quae suspensa pondere concepto grauatur. Si in partem affectam, digito leuiter premenda pars exterior cutis. Nam si aeger dolorem inde percipit, in musculis externis: sin minus, nisi costa grauius tractetur, vel in periostio, vel in musculis intercostalibus subsistit. Tum notanda erit pulsatio ad distinctionem utriusque. Nam in musculis intercostalibus comprimitur arteria, unde pulsatilis dolor. Omnibus eadem ferè sunt alia symptomata, exceptis febre & sputo. Spuria in musclis externis à materia frigida vel flatulenta, sine febre est. Sputum in inflammatione intercostalium, ob minorem resudationem, pau-

*Anto. Musa
erronea de distinctione
pleuritidis
opinio.*

*Pleuritidis
signa, ex affecta parte
& materia
affectus pendenda.*

DE MORB. INTERNIS

*Morbus tri-
bus indica-
tur modis.*

ἐμπύημα

*Hipp. aphor.
3. lib. 5.*

cum: in perioftio, ferè nullum, tum ob materiæ paucita-
tem, tum quòd sudore sæpe & infensili tranfpiratione
refoluatur. Sanguineam indicât (cæteris fignis non præ-
termiffis) fpurum cruentum: biliofam, ex rubro flauelcēs;
pituirofam tardè apparens, fubalbidum. A melancholia
rariffimè fit, & fi fiat, vix curatur. Cùm autem morbus
iudicetur, vel excretionē, vel coctioē, vel abfceffu, nifi
foluatur celeriter in fanguinea, miffione fanguinis: in
biliofa, vel eodem modò, vel sæpius sudore, aut hæmor-
rhagia è naribus, faltem intra diem feptimum, in peri-
pneumoniâ degenerat: aut poft 14. in ἐμπύημα. Peripneu-
monicus eft æger, fi dolor punctorius imminutus, febris
& fpiritus difficultas aucta, fputum fpumofum, rubentes
genæ, mórſq; eft ferè femper in propinquo. In hac do-
lor fit aliquando, non ratione pulmonis, fed mediæftini
& membranarum. Quòd fi non repurgetur materia, co-
cta in pus vertitur, fitq; empyema, fanie, quæ per fputum
educi debuit, in fpatio thoracis collecta. Terminus au-
tem iudicandæ pleuritidis per expuitiones, decimus quar-
tus. Non, vt Fuchſius, & alij, ab eo die numerando, quo
cœpit æger expuere. Nam id falſum eſſe, & ea quæ sæpius
accidunt, & Anaxionis hiſt. 3. Epid. demonſtrant. Si enim
ita numeres, nō 14. diebus eo modo iudicatus fuiſſet, fed
ferè 24. quia cœpit 11. Rectè igitur Hipp. Quicunque
morbo laterali laborantes, in quatuordecim diebus non
repurgantur, ij ad ſuppurationem verruntur.

Phlebotomia & purgatio.] Ex eodem latere fit, dextro
quidem ob venâ vulgò ἀξίον dictam, quæ è directo eſt:
ſiniſtro verò, tum ob intercoſtalem, quæ oſculis ramo-
rum venæ ἀξίων in ſiniſtrum latus perreprantium co-
pularum: tum ob naturæ conatum, quæ ſeſe ita exonerat.
Verùm de phlebotomæ è directo celebranda nobiliſſi-
ma eſt diſceptatio à recentioribus agitata.

Andræas Veſalius Bruxellensis, inſignis Anatomicus,
& Carol. Q. Imperatoris Medicus, ſemper ſecandâ bra-
chij dextri iecorariam, ſeu fit in dextro latere, ſive in ſini-
ſtro pleuritis, ingenioſè cauſatur. Ab eo ratio assignatur
eiufmodi: quòd vena ἀξίων dicta, hoc eſt ſine pari, à la-
tere dextro venæ cauæ prope cor oriarur, quæ per ſpinâ
délata ex utròque latere octo coſtas alit inferiores, ac
ad dia-

ad diaphragma, & membranam intersepientem distribuitur: unde expeditus multò pleuritidem committens materia retrahatur, si sanguis è brachio dextro extrahatur: quia basilica dextri brachij æfvyꝛ magis respicit, quàm basilica sinistri. Sed id argumentum nullius est momenti apud eum, qui rem Anatomicam paulò oculatiùs perspexerit. Nam vena sine pari, quem recipit à caua vena sanguinem, non ampliùs ad eam remittit: imò suis in osculis venæ cauæ coniunctis ita fabrefracta cernitur, ut ei idem ferè eueniat, quod vesicæ vrinariæ, aut cordis vasorum orificiis. Quòd verò sanguinem semel receptum æfvyꝛ non reuomat, ex dissectionibus certum est.

Nam si venam cauam in parte superiori secueris, & fistula in eam intromissa inferiorem versus partem sufflaueris, tota ipsa caua vena in parte inferiori simul cum vena sine pari inflabitur, & tumida euadet: at si venam æfvyꝛ parte infima secueris, immissaq; cannula ore ventum sursum impuleris, dubio procul vena caua non inflabitur, nec tumida euadet: quia aer in vena sine pari contentus exire nequit. Quòd si aer à vena sine pari ad cauam non deriuetur, quomodo sanguis aëre corpulentior resluet? Quæ questio ut discutiatur, obseruandæ sunt cauæ venæ ascendents propagines ad institutum nostrum facientes. Caua vena ascendens sursum ad cor contendit, rectaque ad iugulum fertur in multas diuisa parres, è quibus duæ illæ sunt memorabiles axillaris & cephalica. Inter quas venas duas prope iugulū ab utroq; latere vena quædam media est ex axillari ferè enascens, quæ inde obrepens in multas finditur venulas, quæ in vniuersum cum ramusculis & venulis sine pari copulantur, quæ, ut dictum est, octo costas alit inferiores. Quum igitur iecoraria vena in pleuritide pertunditur, sanguis non tantum in vena caua còtentus educitur, sed is potissimum, qui in inflammatione continetur, aut est prope inflammationem: præcipue verò si morbus octo costas inferiores occupet: sed multò magis si quatuor superiores, quòd cum his magnam habeat axillaris vena communionem. In quibus secari vena tutò non potest, cucurbitulæ in principio inguinibus affiguntur ad diuersionem. Purgatiã multis de causis reiciuntur. Primum,

quia cū spata prodeunt, eorum prohibent motū: deinceps

*Pleuritidis
catinartica
cur min⁹ cō
ferant.*

*Hippocr. aph.
19. lib. 6. &
Gal. in com-
ment.*

*Hipp. lib. 2.
de vict. rat.
in morb. acu.
sent. 11. &
Gal. ibid.*

*Galen. ad si-
nem comm. 3.
lib. 6. Epid.*

*Peripneumo-
nia an venæ
sectionem de-
sideret.*

de in inflammationibus internis nihil ē parte inflamma-
ta educunt, & partes sanas colliquant: pestemō, quia in
pleuritide & peripneumonia habitis profluuium ven-
tris metuendum. Quæ omnia docet Hip. Sed hæc po-
strema ratio infirmior, Addit enim Gal. in cocto morbo,
& mediocri, non inutiliter aliquando aluum profluere,
licet in maligno malum, & vt causa, & vt signum. Causa
quidem, quia vires exoluit. Signum, quia attracticis
hepatis, & alteratricis, vetriculi imbecillitatem significat.
Quod autem Hip. cum dolor ad hypochondrium exten-
ditur, laxantia præscribit, Galenus concedit, sed tantum
ad materiæ antecedentis educationem, siue ē splene, siue
ē cauis hepatis, non ē thorace, aut latere. Soranus Hip-
pocratem reprehendit, qui non secet venam, vbi ad hy-
pochondrium descendit pleuritis. Idem Galenus tacite
in Hippocrate taxat. Sed enim in exiguo dolore lateris
& sputo cruento, quod est iudicium clementissimæ pleu-
ritidis, non est necessaria phlebotomia: sed aliis auxiliis
profligari debet, maxime in homine biliosissimo, ætate
iuniore, vel seniore, ex libr. de Humoribus. Perperam
igitur faciunt, qui in cruento sputo statim sanguinem
detrahendum esse colligunt. Rarō autem vtendum pur-
gantibus, iisque leuibus, in principio morbo pituitoso
per defluxionem, & si materia fluat ab hepate. Sed tutius
adhuc clysteribus agitur. In peripneumonia etiam de
venæ sectione dubitari potest. Primum, quia ex Anato-
mie non satis perspicuum, qua via materia inflammatio-
nis in venam sectam veniat, cū nullus ramus à ve-
na caua pulmonibus distribuatur, & per venam com-
munem phlebotomia fieri debeat. Deinde quia post
pleuritidem, asthma, aut anginam, venæ sectio ferè
lethalis, quod iam affictas vires occupent. At si sup-
pressis mensibus, hæmorrhoidibus, aut solenni aliqua
euacuatione vteri, & similibus oborta sit, in quibus he-
par in thoracem & pulmonem sanguinē reicit, si spata
rubra, plenitudo, & quæ sanguinem indicant nondum
degenerasse in melancholiā, aut bilem, de venæ sectio-
ne non dubitandum: alioqui abstinendum. In cæteris
curatur peripneumonia ferè vt pleuritis, clysteres, san-

guinis missio, syrupi, decocta, vnguenta, sacculi, eclegmata, condita, frontalia, emplastra, linimenta, cerata, pasta regalis & similia.

Locus perflatus ab Aquilonibus.] Lib. 3. Epid. scribitur in pleuritide Romanos & Athenienses obiectos ventis calidis malè ferre sectionem venæ: Parios & Hellepontios meliùs. Ceterùm non omni pleuritico còuenit necessariò, etsi expuat concocta. Legè. 6. Epid. & historiam pithyonis initio tertij.

ANTO. VALETII EXERCIT. XXVI.

Illabens in membranam costis subtensam sanguis tenuis & biliosus (crassus enim & pituitosus densum membranæ corpusculum vix subit) tumorem & inflammationem, pleuritidem, mutuato ab affecto loco nomine, appellatam, gignit. Talis verò phlegmone ad tria morborum genera referri potest. Quatenus enim tumor, ad morbum in compositione: vt inflammationem sequitur calor & tensio, ad intemperiem reducitur. Et quia tussis ab hoc affectu separari nequit, dum rumpitur abscessus, & effusa in spatium thoracis sanies in asperas pulmonis arterias recipitur, tussiendoque excreatur, soluta quoque vnitas adest. Pathognomonica pleuritidis veræ à spurix notis distincta signa fuisse describuntur ab Hollerio ex Galeno cap. 2. lib. 5. de loc. mal. affect. lib. 12. & 13. Meth. itémq; comm. 1. in lib. de Humorib. secundum Hippocratem.

Affectum hunc quia fluxionis sobolem esse intelligimus, & inhibitione materiæ affluentis, iis maxime in inflammationibus, quæ sunt νόσσην γένεσιν, esse vacuatione priorè ex galeno didicimus, basilica dolentis lateris secatur: quæ tamen præterquam quod reuellit, deriuat etiam còmodè & eua-

Pleuritidis generatio vnde.

Pleuritid ad tria genera morborum reducta.

Pleuritidis curatio.

DE MORB. INTERNIS

*Hippo. sent.
74. lib. 4. de
rat. vict. in
morb. acut.*

cuat. Promptè, vel ante solutam aluum, ducitur sanguis: alioqui dolore, ardore, & partis debilitate perpetuò attrahentibus, magis phlegmone exasperatur. Sanguinis detrahendi modum doloris conditio, corporis habitus, & anni tempus indicabunt. Quanquam verò sanguinem vsque ad coloris mutationem mittendum præcipiunt, nisi vel malignitas inflammationis, vel vires hoc denegent, & ægri facillè propter calidam atque humidam temperiè, qualis est in pueris, & iis, quibus mollior corporis habitus, resoluantur, cauendum tamen diligenter, ne missione sanguinis copiosiore vires multum atterantur, in quarum robore salutis spes in pleuritide consistit. Cathartica valentiora non imperantur, ne agitato corpore fluxionem augeant. Itaque leuior erit purgatio, qualis hæc.

*℞. rh. elect. 3. 2. infundantur in decoct. pectoral. cum
santal. citr. 3. 4. in expressione leui dissol. syr. de hyssopo,
vel capill. ven. & cathol. ana 3. s. f. potio.*

Rhei sic imperati adstrictio tanta non est, quæ sputo expellendo obsit, ut mericulosi medici subuerentur.

Quoniam autem coniunctæ pleuritidis materiæ vacuandæ ratio & via commodior non est, quam per asperam arteriam, eclegmatis, syrupis, vel etiam apozematis promouebitur sputum, non omissis interim, etiam ab initio, topicis anodynis paulò post explicandis. Magis alijs placet syruporum, quam eclegmatum, vsus, quòd internam asperæ arteriæ capacitatem promptius subeant, quòdque longè sint paratiores. Si itaq; sputum admodum tenue incrasandum sit, hæc formula præscribetur.

℞. syr. de glycyrrhiz. & iuiub. ana ʒ. i. Misce. Vtatur eclegmatis loco cum baculo glycyrrh.

Vel syrup. violaceus in hac rem faciet. Syrupis licebit aliquid diacodij immiscere. Aut.

℞. cass. recens mundatæ ʒ. 6. diatragacanth. frigid. ʒ. ʒ. pilular. hypoglottid. ʒ. 2. sacchar. cand. ʒ. i. ʒ. rad. ireos Florent. ʒ. i. syr. capill. vener. & de glycyrrhiz. ana q. s. f. eclegm. Adde, si velis, cōseru. ros. borrag. buglan. ʒ. i.

At si sputum præ lentore & crassitie expelli non possit, ex vsu erunt incidentes syrupi.

℞. syr. acetos. simpl. & capill. ven. ana ʒ. i. vtatur cum bac. glycyrrh. vel. ℞. oxymelit. scyllitic. ʒ. i. syr. de hyssop. & acetos. simpl. ana ʒ. 6. cap. vt. antè.

Quod si fortiore sit opus, ex eclegmatis ad asthma ʒ. ʒ. rad. ari prius in hydromelitè cōcti ʒ. i. syr. de hyssop. & oxymelitis simplic. ana ʒ. 6. fiet lohot. Sæpe accidit, vt vnà sputum promouere, & vires recreare oporteat: atque tum tabellæ, opiatæ, condita instituiuntur.

℞. cōseru. rosar. borrag. bugloss. enul. campan. an. ʒ. 2. diatrag. frig. & diatr. simpl. ana ʒ. i. ʒ. penid. ʒ. 2. electar. de gemmis ʒ. i. rasur. eboris, corn. ceru. ana ʒ. ʒ. cum syr. iuiubino fiat opiat. vel cum sacch. conditum.

Contingit aliquando, vt copiosa sit fluxio, quæ se in pulmones receptat: in qua ad ea quæ sanguinem incrassant, catharrhūq; sistunt, cōfugiendū, etiamsi sputi eductionem remorentur. Nam suffocationis periculum, quod à catarrho impendet, magis vrget.

℞. cōseru. ros. antiq. ʒ. i. ther. veter. ʒ. 3. bol. arm. lotz in aq. ros. ʒ. i. cum syr. ros. sicc. aut papauerino f. opiat. Vtatur horà somni ad magnitudinem nucis auellanz.

Sed de reliquis id genus remedijs plura cap. de catarrh.

DE MORB. INTERNIS

Extrinsecus adhibenda, quæ foras trahunt, linimenta, cataplasmata, denique fomenta, si tamen ab his largioris attractio materiæ non metuitur, vel si pleuritis sit notha, vel à flatu, aut fluxione exigua.

℥. olei keirini 3. i. olei anethini 3. 6. olei lilior. 3. 8. f. litus, superposita lana succida.

Syluius duos aut tres parabat sacculos ex floribus chamæm. melil. aneth. surfur. mil. solis in sartag. frixis: quos iubebat admoueri nunc lateri, nunc ad anteriore thorac. partem prope collum, per quam flueret humor, vt eius fluxionem sisterent.

Efficacissimum est & hoc vnguentum.

℥. olei amygdal. dulc. & irini an. 3. i. axung. gallin. capi. anser. cunicul. butyr. recent. an. 3. 2. croc. gr. 5. cum tantillo ceræ f. vnguentum.

1 Symptomate tum sim plici, tū cum phlegmone coniuncto.

2 Quia crassus, & non arteriosus.

3 Quod in capacitatem confluerit.

4 Quando quidem sit corruptus.

5 Refert enim partem, unde manat, ideam.

6 Crebro pulmonis motu.


7 Pulmones namque sensus sunt expertes.

Periclitatores empyrici in oleo ceræ arte Chymica extracto, cum vino albo aut aqu. cardui, epoto, vel etiam per se lateri illito summam pleuritidis medelam reponunt.

Cataplasmata si admoveantur, videndum ne crebriore eorum usu pus promoueamus, dū solam diaphoresim consilium est moliri. Versa enim in empyema pleuritis funesta.

De I. sputo sanguinis.

CAP. 27.

 Anguis expuitur à thoracis venis 2 niger, 3 grumosus 4 foetidus, cum doloris sensu. A pulmonibus 5 flauus, tenuis, 6 spumosus, sine 7 doloris sensu. Atque hinc rupta, exesa, aut aperta vena. Rupta affatim erupit ex clamore, casu, cōcussione pectoris, perfrictione, plenitudine. Plenitudo ex ratione vitæ, suppressis mensibus, aut

solenni aliqua vacuatione. Exesit, ⁸ sensim & per
interualla ab humore acri, quem vel caput demit-
tit, vel ratio ⁹ vitæ, aliquando etiam inedia ¹⁰ col-
legit. Apertis ex ¹¹ calidiore & humidior ratione
vitæ. Ruptis glutinantia, quæ citra morsum siccant:
exesit ¹² cibi boni succi, & pharmaca sarcotica:
apertis adstringentia conueniunt.

Expuitur sanguis ab arteria aspera, tumque do-
lor sentitur. Omnino paucus sanguis expuitur ex
faucibus & ore, cum scuratione, non tussis. Tussis
enim excitatur, cum ab arteria, pulmone, thoracè,
¹³ sanguis excernitur. Ex gingiuis tantum leui spu-
tatione eicitur. Aliis à capite defluit, non adeo pau-
cus, niger, læuis, linguam & palatum commaculās,
titillans, ad nares grumos relinquens, ex vulnere,
frigore, ebrietate, & capitis plenitudine. Qui si par-
te aliqua in arteriam defluit, tussis irritat leues, faci-
leque gargarismis ¹⁴ adstringentibus supprimitur.
Sanguis quoque aliquando euomitur à ventre, lie-
ne, hepate, proximisq; venis niger, grunfosus, mul-
tus. E stomacho verò aut celophago admodum
¹⁵ exiguus reicitur. Hæc omnia igitur, priusquam
remedia instituas, distinguenda sunt.

Curatio sputi sanguinis è pulmonibus.

Inedia, silentium, leuis respiratio, veneris & vini
abstinentia, quies tum animi, tum corporis impe-
randa sunt. Medicatis alimentis vtendum est, quæ
morbo conueniunt.

Si à capite defluxio, supprimentia ex iis, quæ cap.
de catarrho dicta sunt. Componenda tussis, quæ
vexat grauius. Sanguis, ex interna brachij, angusto
vulnere, modica quantitate, bis aut ter vna die, aut

⁸ Quia di-
stillationes è
capite, qua
tussiculosos
et rancos ho-
mines red-
dūt, per exe-
sionem vasis
tabè afferūt.

⁹ Cuiusmodi
est vsus casei
putris, & le-
poris marini.

¹⁰ Preser-
tim è biliosis.

¹¹ Vt vini
generosioris
vsu.

¹² Ad sisar-
cum facien-
dam.

¹³ Thoracè
enim tussis se
expedire co-
tendit omni
molestia, vt
ventriculus
vomitu, &
cerebrū ster-
nutamento.

¹⁴ Vt ex de-
cocto plātæg.
balanistij, cē-
tinodij, succo
granatorum,
& aqua ro-
sacea.

¹⁵ Quia par-
uas habet vo-
nas.

duabus detrahi debet, sed viribus constantibus. Nam in infirma muliere Romana Galen. libr. 5. Method. sanguinem non detraxit: quam tamen percurauit, cum venisset initio (hoc autem initium 1.2. vel 3. die) pauco sanguine excreto. Si plenitudo in causa est, largiùs. Si suppressis mēsis, vena cruris aperienda est, & aliis artibus mensis irritandus. Iniicienda vincula coxis & brachiis, ad articulos, & in eisdem locis adhibenda frictio. Cucurbitulæ hypochondriis, ilibus, atque inguinibus affigendæ. Sanguisugæ in pectore affigendæ sunt: tum remediis, quæ intro assumuntur, & topicis vtendum est.

Comparentur illa ex adstringentibus, portulaca, plantagine, polygono, omphacio, sumach, galla, cortice glandium, radice rubi, consolidæ, althææ, centaurij maioris, hæmatite, electro, corallo, balauſtiis, rosis. Alius ordo.

Bolo armeno, terra sigillata, sanguine draconis, gummi arabico, tragacantha, thure, mastiche, mirra, melle cocto. Hæc postrema ruptis venis magis conueniunt, vt illa apertis. Oportet autem vitare omninò, quæ nimium adstringunt. Propterea medicamenta hæc ex glutinantibus, adstringentibusque mixtis componuntur: vt si aperta vena est, adstringentia: si rupta, glutinantia superent. Sed quia horum vis non facile penetrat, necesse est aliquid admiscere eorum, quæ tenuium sunt partium: quæ sunt aromata, spica, cinamomum, santali, doricum, & similia ex particularium compositi. Gal. libro 7.

Atque vbi immodicè perturbat tussis, etiam nar-

cotica misceri debent, opium, semen papaueris albi, semen hyoscyami albi, & cicute, cortex radicis mādragorę, philoniū, theriaca vnus anni.

Particularia remedia.

Xenocrates apud Gal. hœdi sanguinem nondum concretum cum pari mensura aceti elixabat, dabátque tribus deinceps diebus. Dosis ʒ. 3.

Frequēs vsus antiquis, maximè initio, atq; vbi grumorum suspitio, oxy crati diluti, id est, aceti ita cōmixti aquæ, vt bibi possit. Acetum quoque in vsu fuit: sed animaduertenda sunt, quæ de oxymelite proximo capite annotauimus.

Coagulum cerui, hœdi, leporis, Græcis & Arabibus hac in re cōmēdatur, quod mirū esse possit, cū natura sit acri, digerente, & exsiccante.

Auerrhoës & Arabū familię parte aliqua refrigerare, adstringere, & reprimere scribunt, aut elemētari qualitate, aut proprietate quadā. Certū est experimēto, quod & Dioscorides scripsit, & in lacte probari potest, dissoluta coagulare, coagulata dissoluere. Deinde modica quātitate exhibetur, & ex iis, quę vim acrimonię refringāt.

Dosis ciceris magnitudo ex oxymelite, vel posca, si grumi dissoluendi sunt. Alioqui ex aqua ferrata, plantaginis, & similibus.

ʒ. coralli rub. torrefacti, & in aceto extincti, terræ sigillatæ, ana ʒ. ʒ. spicæ ʒ. ʒ. cum ʒ. 2. succi portulacæ, aut polygoni, vini granatorum, lactis vstulati, fiat potus. Vel ex eodem corallo, terra Lemnia, bolo Armena, cū syrupo rosarū è siccis, vel myrtillorū, cōcinnabitur potio. Rhabarbarū manditur, datur in substātia cū aqua plātiginis.

DE MORB. INTERNIS

Herbas dat Celsus edendas sanguinalē, plantaginem ex aceto. Sunt qui animalium ossa cum suis cartilaginibus & tēdinibus siccata in puluerē redigāt, quē cum aqua adstringēte potui dēt.

℞. carnium limacum coctarum in vini austeri, & aquæ plantag. ℞. 2. conseruæ consolidæ maioris, & ros. ana ℞. 1. Cum decoctione limacum fiat distillatio in alembico.

℞. suprā dicti distillati ℞. 1. coletur per manicam Hippocratis, cum sacchari rosati dissoluti in aqua plantaginis ℥. 2. fantali, spicæ ana ʒ. ʒ. Symphyto sæpe vsi sunt veteres in sanguinis reiectione, quemadmodum Galen. lib. de theriaca hanc vsurpauit cum symphyti decocto.

Puluis ē limacibus in tegula siccatis, sanguinem comprimit.

Idem præstant trochisci de carabe, de terra sigillata cū decocto hæmatitis cōquassatis: athanasia cum decocto polygoni, vinū saluiatū. Aut.

℞. lapid. hæmatitis, bol. arm. optim. corall. rub. mummiæ, pulmo. vulp. sicci ana ʒ. 1. seminis botryos, cinam. ana ʒ. 1. sacch. ros. ʒ. ʒ. cū mucagine tragacathæ extracta in aqua saluiæ vitæ & myrtillor. f. troch. Vel incorporētur in cōserua ros.

Vbi viribus metuitur, expressionibus vtendum est ē perdicibus, turturibus, quarum ventres adstringente materia farciantur. Aut distillata hoc modo imperanda sunt.

℞. conseruæ ros. cornorū, symphyti an. ʒ. 2. electarij diarho. Abbatis, diamarga. frigidi, triasfantali, aromatici rosati ana ʒ. 2. spicæ, cornu cerui, coralli rubri, pulueratorū ana ʒ. 1. ʒ. trochisco.

de terra sigillata, de carabe, de spodio ana ʒ. 4.
feminis acetosæ, portulacæ, plantaginis ana ʒ. i.
aquarum portulacæ, rosarum, plantaginis, vini
granatorum ana ʒ. 4. decoctionis duarum turtu-
rum, & vnus perdicis lb. 4. cum mica panis al-
bissimi infusi in vino granatorum, & carnibus
vnus capi fiat distill. Coletur per manicâ Hip-
pocratis, vt prius. Licebit etiam parare syrup. è
succo plantag. vngula caball. centaurio, sca-
biofa, bipinella, quo tanquam lohot vtatur.

℥. testarum oui, detracta membrana inte-
riores, ʒ. 2. puluerisentur. Dentur ex aquæ plan-
taginis ʒ. 3. succi saluiæ ʒ. 2. sacchari rosati ʒ. ʒ.
Detur ieiunis.

℥. gummi arabici, tragacanthi assi, boli ar-
menæ ana ʒ. i. coralli torrefacti, cinamomi ana
ʒ. ʒ. Ex lacte cocto eodem modo succi ex su-
pradiçta materia ad ʒ. 2. aut 3. per se exhiberi
possunt. Poterit inspergi ʒ. i. eorum, quæ com-
minui possunt, aut decoquuntur in aqua pluui-
ali, in lacte, in aqua ferrata, aut simili.

Centinodjum & in iusculis coctum, & par-
tibus adhibitum efficacissimum comperi reie-
ctione sanguinis, menstruis &c.

Similiter hordeata, lac amygdalinum, ex e-
iusmodi liquoribus parari debet, iidemque pul-
ueres inspergi possunt. Interim quotidie aqua
hordei cū saccharo rosaceo, syrup. è rosis siccis,
syrupo myrtill. sanguini temperando erit ac-
comoda. Vsu aute adstringentiū aliquando spu-
tū supprimitur, & fit spiradi difficultas: vbi ad
leniētia redeundū, vt paulò post obseruabitur.

DE MORB. INTERNIS

Admouēda thoraci, non quæ adstringunt vehementer (horum enim vis ad pulmonem non penetrat, cogitq; sanguinem in pulmones) sed iam vacuata copiâ, sedato motu, vinum adstringens cū oleo rosato, myrthino, cydoniorum. Commodum erit emplastrum præscribere, pectori, dorso, & lateribus affigendum. Quale hoc est.

℞. ceræ, pic. resinæ pini, bitum. an. ℥. i. mannae thuris ʒ. 6. cerus. ʒ. 4. vitrioli ʒ. 4. opopanax. ʒ. 2. ol. quod. s. aceti ʒ. 20. Confectionis modum petito ex cap. 4. lib. 3. de materia chirurg. Hyeme etiam nardinum cōuenit cum lana sordida in eo madefacta, & appressa pectori. Loco vini, aceti vsus est aestate, benè carnoso corpore, robusto genere neruoso, nec urgente tussi.

E thure, terra sigill. bolo armena, oui albumine incorporatis cataplasmata fiunt adiungenda thoraci, adiungunturque post vsum lanæ sordidæ prædictæ. Quod si malum ex perfrictione ortum est, talsia, sinapi, & quæ ex his conficiuntur medicamenta ex vsu sunt. Oportet autem hæc permittere, dum calor medicamento penetret. In grauiore tussi philonij aliquid imperabis, quod aliter Græcis, aliter Arabibus describitur.

Philonium Græcorum.

℞. pipetis albi ʒ. 20. opij ʒ. 10. croci ʒ. 5. seminis hyoscyami albi ʒ. 20. spicæ nardi, euphorbij, pyrethri ana ʒ. i. excipiantur melle cocto.

Philonium Arabum.

℞. papaueris albi, hyoscyami ana ʒ. 20. opij, terræ sigillatæ ana ʒ. 10. hæmatitis lapidis, croci ana ʒ. 5. castorei, spicæ, euphorbij, pyrethri, margarita-

rum non perforatarum, carabe, zedoariae, doronici, galliae moschatae ana 3. i. caphurae 3. i. cum melle ros. colato incorporentur. Dosis est à 3. ss. ad 3. l. cum succo arnoglossi, aut vino diluto modica aqua rosarum.

Rhazes Philonium sic describit. ℥. piperis, ameos, foliorum rutae, mentastr. castorei, baccar. laur. cummin. an. 3. i. opij, mandrag. feminis hyoscyam. alb. ana 3. i. mellis q. s. quoniam scilicet omnium dosis 3. i. aut 3. 4. Si addas dacrydii 3. i. fiet solutium.

Idipsum, vel philonium Romanum, cum polygonij succo vehementi tussi, vigiliis, fluxionibus medebitur. Vel.

℥. mummiæ puluerat. 3. 2. mastichis 3. 2. cum mucagine tragacanth. extracta in aqua saluiæ fiant hypoglottia.

Trochisci de bolo armena, & similes cum pulueribus conuenientib. & syrup. ros. sicc. in modum lohot sumi poterunt.

Meminisse verò oportet nūquam vtendum esse narcoticis recens paratis, sed semestre spacium esse expectandum, aut eò plus.

Nec statim his vtendum est, sed tentatis prius leuioribus remediis, & vbi natura robusta est. Datur tamen interdum theriaca recens, vt quatuor mensium, crassioris fabæ magnitudine, somni conciliandi gratia, fluxiones siccandi & crassandi. Exhibetur autem vespere. Postridie quoque, perseverante fluxione datur eodem vespertino, tēpore, sed quantitate paulò minore. Quieta verò iā fluxione, mane sumitur, sed ætate vigente, vt annorum 10.

Vel ex syrupi de papauere, de iuiubis, rosarum

DE MORB. INTERNIS

de siccis ana 3.1. parabitur zulapium ad somnum promouendum, & fluxiones præpediendas accommodatissimum. Multa ex quinto methodi colligenda sunt, quæ ad sputum sanguinis pertinent.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Αναφορη, quasi *ἀναφύροντες*, sursum ferentes, & *ἀνατοροι* Græcis dicuntur, qui ex inferioribus partibus per os sanguinem reiciunt. Ex ore quidem & gingiuis, si expuitione prodeat sine tussi, & paucus: è gutture, si cum sereatu: ex aspera arteria, si cum tussi leui: ex pulmone & thorace, si cum tussi vehementi. Sed vehementior adhuc tussis est, cum è thorace reicitur, quia primùm ad pulmonem trahitur, & inde per asperam arteriam deturbatur. Vomitu redditur è ventriculo, siue è cerebro defluxerit, siue ibi concreuerit, aut casu, vel percussione, vel erosione cumulus fuerit. Interpretres tamen Coacorum præfagiorum ita habet. Qui spumosum sanguinem euomunt, dolore infra septum transversum non existente, de pulmone vomunt. Et quibus quidem magna in ipso vena rumpitur, multum vomunt, & in periculo versantur. Quibus verò minor, minus educunt, & securiores sunt. Quanquàm Galenus refert quendam in palatra graui plaga accepta, ferè duas cotylas sanguinis tussiendo expuisse, qui statim secta vena, & adhibitis iustis remediis conualuit, & in posterum superuixit. Ergò ab apertione venæ, aut ruptione in maiore quantitate reicitur, idq; tutius est, licet non sine periculo. Ab erosione verò, in exigua. Hoc deterius, ferèq; primùm tussim siccam excitat & magnam: aliquando copiosior, cum vas insigne exesum cum vlcere pulmonis, & lateris sinistri dolore, vnde sequitur rabes, Distinguendum etiam diligenter an acrior sanguis & vitiosior distillationem excitet, & in pulmonem confluat, vnde fiat erosio: an vitio pulmonis & imbecillitate excrementum ibi colligatur, quod putrescat: an suppressi menses, aut consuetæ aliqua vacuatio. Cum reicitur niger & concretus, & antè fluxit è naribus, indicium est è cerebro in pulmonem proflu-

*Galen. libell.
de vena sect.
contr. E ra-
strataos.*

xisse, aut asperam arteriam. Cognoscitur autem à carne seu propria substantia pulmonis ulcerata exire, duobus signis certissimis: vno, si sit spumofus, vt scribit Gal. commentat. in aphor. 30. lib. 7. modò tamen spuma firma maneat. Nam aliquando venis ruptis, aut thorace ulcerato, licet rarò, & non necessariò, spumofus expuitur sanguis, si agitatio quzdam ac motus accedat, vnde spuma illi inducatur. Sed hæc citò euascescit. In pleuritide etiam rarò spumofus, licet id aliquando contingat. Alterum est, si carunculae & ramenta vasorum similiter excreta, & propriam visceris substantiã referentia simul appareat. Spumofus autè est, quia lenis, tenuis, aëreus & spirituosus sanguis, quo nutritur pulmo, quibus accedit motus, & aëris inspirati commotio. Lege cap. 6. lib. 4. de locis affectis, signa. Meth. 5. Particularia remedia. 7.

Remedia sunt phlebotomia, potus aquæ, silentium, parcissima vita, exigua respiratio, frictio & vincula extremorum, potiones ad reprimendum sanguinem, Cucurbitulae in regione hepatis, epithemata, vnguenta, cõdita, linimenta, syrupi incrassantes, ligaturæ, coctio materiz, purgatio, dissoluentia sanguinem coagulatum, cientia sputum. In erosione, priusquam sanguinem expuant, ad diuersionem angusto foramine vena secanda, purgandum, diuertendus catarrhus, caput & pulmones confirmãdi. In multitudine humorum è thorace expurganda habeatur ratio, ne materia supprimatur, nève sanguis irriteretur. Etenim suppressio sputo lenientia iterum veniunt vsurpada. Oxymel & acetum suspecta, si puer, aut mollis æger, macilentus, neruoso genere imbecillior, asperiore tussi, sputis crassioribus, aut liquidioribus, ægro debili, & senè. Frequenter repetenda phlebotomia, si vlcus non est, si recens malum & non inueteratum, si vires firmæ. E faucibus & tonsillis minùs periculi: ab arteria plus: à pulmone plurimum. Inde enin suppuratio, & tabes.

ANTO. VALETII EXERCIT. XXVII.

Αἱματος πύσεως, seu sanguinis reiectionis nomine Galenus libro quinto Methodi eam

*Gal. lib. 1. de
loc. mal. af-
fect.*

propriè sanguinis exclusionem intelligit, quæ à thorace atque pulmone manat: quanquam sanguis è gula, ventriculo, hepate, splene, nonnunquàm etià ex aliqua oris parte, gingivis, faucibus, gurgulione in os confluat, dum is, qui per nares purgandus erat, ad palatum descendit. Causæ repetendæ ex capite de hæmorrhagia.

*Hæmopty-
scos curatio.*

Ad curationem maximum est in victu inercassante & adstringente, qui & sanguinem ad fluxum reddit ineptiorem, & vlcus ipsum vnit, momētum. Qualis erit ptisanæ cremor, cui inspersa sint malorum punicorum grana: vel hordeatum: quod efficacius fuerit, si hordeum coquatur in decocto lactuc. portul. plantag. centinod. & feminis eorundem, adiecto saccharo rosaceo. Basilica vena confestim pertunditur ad reuulsionem, quia sanguine ad affectam partem semper confluente, frustrà adstringentia, agglutinantia, & alia eius generis, præscriberentur. Mox hæc potio propinetur.

℞. rhei vstulati ℥. i. mummiæ, terræ sigill. an. ℥. i. syr. cydon. ℥. i. cum aq. ros. & plantag. f. potio. Dabitur, manè, vesperi.

In eundè vsum concinnantur zulapia, quæ præcipuè sub horam somni assumuntur.

℞. syr. ros. succ. de papauere, & cydon. ana ℥. i. aqu. plantag. portulac. centinod. an. quart. i. puluer. corn. ceru. vsti, lapid. hæmatitis an. ℥. i. mastich. ℥. i. f. zupium pro dosibus 3.

Vel lupinares trochisci, ineunte præsertim somno ore continendi, imperabuntur.

℞. gummi tragacanth. & arab. in aqu. rosar. dissoluti ana ℥. i. amyli ℥. 2. bol. armen. terræ sigill. an. ℥. 4. mastich. ℥. i. cum syrup. myrtill. aut aq. plantag. vel centinod. f. trochisci. Vtus sit, vt suprà.

Hic pertinebunt opiatæ, condita, pulueres. Noui nostratem quendam Lemouicum hæmoptoicum, qui cum alternis temporibus multum reiectasset sanguinem, nec ullis potuisset remediis sanescere, ad Iulium Cæsarem Scaligerum, Medicorum suæ tēpestatis facile Principem, confugit: ex quo puluere accepit, cuius vsu breui conualuit. Huius formulam quia mihi communicauit, libet hic adscribere.

℥. spodij, ros. rubr. bol. armen. terr. sigill. hæmatitis ana 3.5. corall. rub. carab. margaritar. non perforat. ana 3.2. f. gūmi, tragacanth. an. 3.2. sem. papau. portulac. sem. mal. sem. ros. rub. sem. arnogloss. cornu cerui combusti an. 3.3. acac. succi barbz hircinæ, succ. glycyrrhiz. an. 3.2. amyli torrefacti 3.3. Terantur, misceantur, f. puluis: cuius dosis sint 3.3. Datur cum aqua pluuiali.

Hoc remedium tandem descriptum reperi apud Serapionem cap. 25. Tractat. 2. Dum verò ista fiunt, si restitet aluus, clystere subducetur, vel purgati medicamento adstrictionem aliquam relinquente.

Sic post reuulsionem & deriuationem suppressio sanguinis sputo, & bene purgato corpore, totus thorax oleo cydoniorū, rosaceo, vel myrtillorum, ilinetur, maximè verò æstate. Quod si multa fiat sanguinis eruptio, citra tussim, cœli cōstitutione calida, agro robusto & carnosio, spongia aceto imbuta de consilio Aëtij thoraci apponēda. Verum malum à perfrictione ortum linimenta & cataplasmata calefaciētia postulat. Sed de his plura vide apud Gal. cap. 8. lib. 5. Methodi.

De 1 Phthisi.

CAP. 28.

PHthisis vlcus 2 est pulmonis, quod ferè 3 sputū sanguinis sequitur, aut tussiculam 4 ex actiore nisi temporis progressu cōquiescant, alteram faciunt abū differentiam.

1 Que sit per anastomosis, estq; funesta magnitudine cause, ut destillatione catarrhi è capite, vlcere pulmonum: symptomatū calamitosa vi, ob marcorem totius corporis: difficultate curandi, & vlcus pulmonū curari nequeat propter perpetuū eorum motū: nec sarcosica eò integris viribus perducere possint. 2 Solutio cōtinui cum sordibus & ichore cōiuncta. 3 Rupta in pulmonib. na. 4 Per theorema illud. Quæcumque distillationes à capite tu sicculosos & rancor hauriunt reddunt.

5 Quia aer, defluxione. Aliquando etiam ruptos abscessus tho-
 qui inspiran racis, cum, videlicet, effuso pure in spatium thora-
 ducitur, ta cis, atque ita putrescente, nec in tempore repurga-
 bificā acqui- to, pulmones exulcerantur.

nibus quali- Signa phthisis cum ex aliis, tum ex Hippocr. &
 tatē, & quod Gal. Apho. 60.2. in Prognosticis, & cap. 14. lib. 2.
 vlcus φθίσις Chronion Aureliani.

ma sit, febris- Phthisim sequitur totius corporis 5 languor at-
 que in corde que extenuatio, 6 curuantur vngues, canantur ocu-
 accendatur. li, succedit mortifera 7 illa facies, 8 capilli deflu-
 6 Exhausta lium sequitur, alui profluuium, & mors.

digitorum car- Hoc malum, vt incurabile, maxima pars veterum
 ne. 7 Hippo Medicorum in nulla spe habuerunt.

cratica vul- Itaque initio abstergendum atque 9 resiccandū.
 go dicta, de- Progn.

picta lib. 1. Vbi iam satis deterfum est, atq; iam nihil saniosum
 8 A siccitate repurgatur, glutinare oportet. Sed dum hæc fiunt,

partis exhan- 10 extenuatio corporis instauranda est. Vtemur er-
 sto alimento, go mulla 11 initio ex aquæ potabilis lb. i 3. i. s. mel-

ant cibiviti- lis. Per omnia vbi detergendum, melle crudo vte-
 naturali fa- dum est: vbi glutinandum, melle cocto. 12
 cultate labe- factata.

9 Ichore & Postea verò fœnugræci loti, subinde abiecta prio-
 saniem. re aqua, decoct. vtemur, in qua octaua pars vel fac-

10 Que sit phthiriomate chari, in calidiore conditione: vel alioqui mellis,
 febre et aeris dissoluitur.

infectione. Similiter è 13 fricto lini semine, è ciceribus rubris,
 11 Si mixe- è nuce pinea resinosa, ex iride Illyrica, aristolochia,

χολος. nō sit porrò & similibus descriptis in cap. de asthma-
 12 Ve- Alioqui cum quadruplo melle eclegmata fiēt, tritis

na sectio, si agri vires firant, celebrari potest ad ardoris febrilis extinctionem, & catar-
 rhi auersionem. Interim cibandus est ager hordeato, detergendum vlcus: si
 quidem ager fuerit temperamento frigidiore, & si sit hyems, hydromelite
 simplici, aut cōposito ex bechio, scabiosa: si autē fuerit biliosior, aqua saccha-
 rata, aut hydro. dilutiori. 13 Vel ex electario diaireos, saccharo cādo, penidiu-

atque in puluerem redactis, quæ cōminui possunt. Cicer rubrum in aqua madeat, atque ita tumebit: tum siccat debet, torrefieri in latere calēte, teri subtilissimè. Eius pulueris 3.2. insperguntur mulsæ, aut concorporantur melle.

Marrubij M.1. decoquitur in lb.6. aquæ ad dimidias. Colaturæ addi debet lb.1. mellis, plus minúsue, idque totum decoquitur ad crassitudinem.

E succi marrubij 3.2. succi caulium, scyllæ, hyssopi, & similium, & mellis lb.1. coctis, fiunt eclegmata, quorum vim augeri voluit, si 3.2. pulmonis vulpis ad 3. eclegmatis admisceas. Nuce pinæ, resinosam cum 3.1. glycyrrhizæ decoques in lb.6. aquæ. Col. addes penidiorum 3.4. rursus coques ad crassitudinem. Conuenit, vbi tenuis sputatio est, cum que lenire & coquere oportet.

Similiter è butyro, melle & terebinthina, duobus horum, aut tribus mistis.

Variandaque remedia eiusdem generis, ne fiat farietas.

Diuerſi verò generis, cum mutatur indicationes.

Interea videndum, anne à catarrho in fauces prolabēte phthisis causam habeat. Tum enim pulmo roborandus, cuius imbecillitate excrementa & gignuntur, & promptius admittuntur. Dein emplastrum è labdano, resina, pulueribus conuenientibus comparatum bregmati affigetur.

Atque dum hæc fiunt, hordeatis cum saccharo, aut melle, lacte amygdalino, vino albo, tenui, & subdulci, lacte, aliisque rebus, quæ vires refouent, vtendum est.

Iam purgato vlcere, instauratis viribus, alimen-

14 *Vt vitulina carne, pulli gallinacei.*

14 partim mediæ materiæ, partim refecantibus & glutinantibus vtendum est.

Gestatio mollis conuenit, aër siccus, balneum dulce (vt scilicet, firmis viribus, in linteo, quod à duobus teneatur, immergatur balneo, ex decocto omaforû, maluæ, bismalu. & parietar.) à quo inunctio ex oleo violaceo, butyro recenti, theriaca, mythrifatium, emplastra siccantia adiuncta pectori.

15 *Admouendi capiti, ad exhauriendū fontem catarri.*

Dropacæ, atque etiam 15 Sinapismi conueniunt.

16 *Hæc ad sistendā fluxionem.*

16 Bolus armena, terra sigillata & similia imperanda sunt. Hæc ferè placuerunt veteri Medicinæ. Posteritas Medicorum eadem obseruauit: quædam etiam addidit. Lacte 17 plurimum vsa est asinino, & caprino: in summa seroso, cum detergendum est.

17 *Lactis vsus conceditur, si nulla sit febris excusatio, si non sit hæcæ, pyrexia, id est, si non sint flatu viscera distenta, et si æger vetriculo frigidiore, nec sit cephalalgicus.*

Ouille, vaccino, muliebri, cum refouendum est: vstulato vaccino, aut etiam cū aqua pluuiali cocto, cum glutinandum. Itaq; initio asinino & caprino cum modico mellis, ne cogatur aut acescat in ventriculo, modico quoque salis vtendum est. Refouentur vires lacte muliebri, quod exugat æger è mamma mulieris, quæ sit sana. Atque id quidem melius est suctum, quia cum lacte spiritus & vita exugitur. Si desit muliebres, vaccinum bibat recens emulctum, cum modico sacchari.

Sugendum lac erit matutino tempore. Abhinc tribus horis ouum sorbeant. Vino vtantur albo, tenui, dulci, diluto. Pullaster ad prandium comparetur infarctus succido hordeo, & passul. mundatis. Aqua, quâ vinum diluant, & concoquant cibos, sit aqua hordei. Colatitiis, consumptis è perna vitulina, capone iuvene infarcto hordeo cum herbis commodis, locus erit: de quibus paulò post.

Hordeata quoque, & lac amygdalarum ex lacte, vel pullorum decocto confici debent. Pineola, castaneæ miscetur hordeatis. Condiuntur multo sacchar. ros. infunduntur illa prius in aqua rosacea veteri: dum coquuntur, eadem aqua insperguntur.

Pythocles ex Hippocrate septimo Epid. lacte, multa cum aqua ammixta, renutriebat.

Vtilissimum erit syrupum resumptiuum, à Ioanne Tornamirano cap. de febre hectica descriptum, Vsurpare.

Resouendis viribus lactis cremor cum multo saccharo conuenit. Sanguis humanus destillatus, aqua cancrorum, destillatum restaurans. Vbi glutinandum est.

℥. lactis lib. i. aquæ pluuialis, in qua rosæ maderint ʒ. ʒ. Simul bulliant, subinde ferro candente aut calybe intincto. Alioqui.

℥. lactis à quo butyrum extractum sit, lb. s. reneatur nocte vna sub dio. Fortiter agitetur & despumetur: cui adde sacchari rosati ʒ. s. boli armenæ ʒ. i. sæpe vtatur. Hoc modo igitur vtēris lacte. Saccharum rosatum maximè commendatur initiis recens. Cum glutinandum est, veteri potius vtemur. Similiter confertua rosarum & syrup. ros. Confertua datur per se, aut cū syrupo myrtillorum, aut aqua hordei, in qua cancri fluuiatiles coxerint. Cancrī crudi feruēfacti prius in aqua, & repurgati in quadruplo lacte vaccino, aut conuenienti, concoqui debent ad dimidias. Deinde caudæ desquamati, vel per se comeduntur, vel integrè contunduntur, & inde succus in lac, in quo coxerint, exprimitur.

Bibitur lac hoc, aut inde amygdalogala, vel hordeatum. Comparatur maximè, vbi viribus consulendum est.

Túmque aliquando vitellum oui vnà dissoluimus. Coqui possunt ex aqua hordei. Testæ verò cancerorum in fictili vase cremari debent, & glutinando asseruantur.

Eodem modo limaces & testudines præparant. Verùm oportet diligentius multò repurgari. ℞. carn. limac. benè mundatorum lb. i. vngul. caballinæ benè trite ʒ. 2. lactis pinguis q. s. f. decoctio ad perfectâ coctionem limacû, deinde expressio fortis quæ saccharo edulcetur.

Pulmo vulpis in frustula diuiditur, abluitur ex vino, incoquitur leuiter in aqua rosarum, decocto sumach, aut simili. Rursus lauatur, siccat. Usus tẽpore in puluerem redigitur. ʒ. 2. cum syrupo myrtillorum exhibetur. Vel hoc modo.

℞. pul. pulmonis vulpis. capill. ven. sem. fœnic. an. ʒ. 2. incorporentur cum succi liquiritiæ ʒ. 2. mellis coct. quantum sufficit, cum affusione modici syrupi de myrtillis.

Consolidant hæc. Caseus recens, lac vstulatum, testæ cancerorum, bolus armena, terra sigillata, sanguis draconis, olibanum, mastix, carabe, gummi arab. corallus, rosæ, balauitia, myrrha, & alia eiusmodi. Dantur ex vitellis ouorum, & alia quædam ex lacte vstulato, succo cydoniorum, rosarum, granatorum, syrup. myrtillorum rosato de ficcis.

Vel ℞. caudarum cancerorû fluuiatil. desquamatarum & lotar. ʒ. 3. lactis recent. lb. i. bulliât ad

medias: dein caudæ contundantur fortiter, & cum lacte dissoluantur: cui adde farinæ hord. amyli puriss. ana p. ss. lactis amygdal. dulc. ʒ. 4. misce lento igne. Est quoque hîc Philonij perfici vsus, quod proximè descripsimus. Pata leonis vulgò dicta trita affigitur pectori & gutturi: phthificis & anginosis foras attrahere materiam creditur. Rustici transfixam aurem radice implent, & ita curant. Nutriendum aliquando iure galli decrepiti, alterati cum herbis, & cæteris rebus, quæ conuenient. Ad consolidationem maximè facit panis purissimus cum, decocto mastiches pistus, & vinum subadstringens.

Conueniunt fructus, ficus, vuar. passæ, pistacia, nuclei, pinei, dactyli dulces, pira cocta, & sacch. conspersa.

Videndumque maximè circa initia, ne nimium siccantibus vtamur, quibus cum volumus vt, lenientibus commiscebimus, aut multo liquore diluamus. Febricitantibus phthificis, sitientibus, & calidiorem stomachum habentibus diamelon Alexandri è succo cydonior. Vel è cydoniis in coctis in aqua rosar. aut vtrisque seminibus frigidis, additis ros. santalis alb. rub. succ. glycyrrhiz. recent. vel.

ʒ. aquæ rosar. ʒ. 4. malor. dulcium lb. i. ss. sacch. lb. i. santal. alb. & rub. succ. glycyrrhiz. rosar. an. ʒ. i. ss. quatuor seminum frigidior. ana ʒ. i. syr. rosar. q. s. Mala intus & extra purgatur, cum aqua rosar. lento igne, vel in diplomate coquantur ad tertias, tere in mortario: deinde in aqua rosar. & syrup. de coque, & cum pulueribus & saccharo misce. Dentur ʒ. ʒ. mane & vesper. Distillatum refouendis viribus

conuenit.

℥. conferuæ borrag. violarum, ros. an. 3. i. s. conferuæ ireos, enulæ an. 3. s. elect. de gemmis sine speciebus, diarrho. Abbatis, triasantali sine caphura, diamarg. frigidi an. 3. 2. margaritarum perforatarum, coralli, ambræ citrinæ ana 3. i. passularum, fictium, sebesten, glycyrrhizæ ana 3. 6. nucleorū pini, amygd. ana 3. s. gummi tragacanthi, gummi arabici ana drach. 2. sem. anisi, fœniculi, vrticæ, quatuor sem. frigid. communium, sem. papaueris albi ana 3. i. terræ sigillatæ, boli armenæ, rosarum siccarum ana 3. 3. aquarum bipinellæ, vngulæ caballinæ ana 3. 4. decoctionis limacum, cancrorum, duarum iuuenum gallinarum ana lb. i. cum carnibus vnus capi iuuenis bene pinguis, vnus perdicis, mica panis in vino odorifero infusi, & lib. i. sacchari albiissimi, fiat distillatio. Deploratis instituitur eclegma ex seminis vrticæ 3. s. cinam. 3. i. & mellis quantitate sufficiente: vel decoctum è floribus rosmarini cum aqua pluuiæ. Quod si his remediis nihil proficiatur, vel vruntur, vel relegantur ad mare.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Phthis.

Phthis pro tæbe & atrophia qualibet aliquando sumitur. Significare enim syderationem quandam & marcorem, extenuationem, ἀπὸ τοῦ φθίνειν, ita vt nonnunquam etiam ad oculi affectus traducatur, præsertim pupillæ.

Phthisis quatuor species.

Quatuor tamen præcipuæ species reperiuntur apud Hippocratem & Galenum: renalis, lib. de morbis internis: dorsalis, 2. de morbis: extenuatio sine pulmonis vlcere, ab eius tamen calida & sicca intemperie, aut febre hectica: quarta, quæ omnium maximè propriè φθίσις dicitur, Atheniësis phthoe, ab vlcere pulmonis. Hæc duo per-

Phthisis propriè dicta

petua habet symptomata: febrem lentam, parvam, pu- *duo perpetua*
 trem, quotidianam, noctu magis, quàm interdiu, affligē- *symptomata.*
 tem, quæ oritur à putredine humoris, aut propriæ sub-
 stantiæ pulmonis, vnde calor ob viciniam cordi necessa-
 rio communicatur: deinde extenuationem totius cor-
 poris, colliquatis nimirum, & consumptis carnibus, ac
 solidis partibus supra modum resiccatis, tum ob febrem,
 quæ corpus perpetuò depascitur: tum ob deiectiones
 humidiores, & crebros sudores, qui inde consequuntur.
 Exulcerationis pulmonum causæ multæ esse possunt, sed *Pulmonum*
 duæ præcipuæ, & frequentissimæ, sputum sanguinis re- *exulceratio-*
 pressum nec expurgatū, & defluxus pituitæ salis à cere- *nis duæ cau-*
 bro calefacto. Præcedit tussicula, punctura quædam ad *se præcipua.*
 latus, mammillas, scapulas, titillatio faucium, præter cæ-
 tera signa superiore capite explicata. Familiaris est qui-
 bus oblongū collum, angustus thorax, caput infirmum,
 sublimes scapulæ, tanquam alæ, vnde *φρῶδες* & *πτερυ-*
γώδες, quasi alati, nominantur. Apud Hippo. & Galenum *Aph. 11. 12.*
 tria in hoc affectu reperiuntur mortis certissima signa, *14. lib. 5. &*
 sputum grauiter olens, capilli defluentes, alui profluuiū. *16. 7.*

Quæ tamen tum ad curationem, tum ad prædictionem
 diligenti egent distinctione. Primùm in tabescentibus
 aliquando gingiuæ & os exulcerantur fluxione, & pi-
 tuita grauis defluit à cerebro, vnde sputa grauiter olēt,
 quæ tamen mortem proximam non indicant. Deinde a-
 lui profluuium quibusdam accidit deficiente natura: aliis,
 conuersa distillatione in stomachum, quibus solet tussis
 imminui: cæteris alia occasione, atque id non semper
 lethale. Idem iudicium de capillorum defluuiū, quod
 humorum vitio, & capitis cachexia fieri potest. Ita igitur
 accipiendum. Si sputum è pulmone educatur, & vel
 carbonibus inductum, vt vult Hipp. in Aph. vel, vt Philo-
 lot. in vas vitreum aqua plenum, & inpositum prunis in-
 iectum, vt in calefendo dissolutum vaporem edat, ægro
 & assidentibus manifestam grauitatem & contagiosum
 halitum inspiret, lethale est. Ostendit enim putredinem,
 & *καυγῆσθαι*. Deinde grauis halitus cor vicinum lædit,
 vnde mors celerior, sicque malum est, & vt causa, & vt
 signum. In Coacis prælagiis inde etiam mortis aliud si-
 gnum colligitur: si, videlicet, sputum iniectum æqua

Philothemus
comment. ad
aph. 11. lib. 5.

DE MORB. INTERNIS

*Galen. cōm.
in aph. 12.
libr. 5. &
cōm. in aph.
16. lib. 7.*

marina æneo vasi inclusa, in fundum mergatur. Idem demonstrant capilli defluentes ob siccitatem, vel virium imbecillitatem, & humida deiectio, ob potentia debilitatem, vt ait Galenus. Additur in Præfagiis, si suppresso sputo mens ad nugas & delira verba commoueat. Formula enim mortis in tabidis est, cum sputo retento vel ob copiam, vel virium imbecillitatem, vel adstringentium vsum, obserantur viæ spiritus, vnde ægri strangulantur. Tandiu enim viuunt, quandiu pulmonē per sputa expurgāt. Atque etiam hinc efficitur, vt & autumnus, & Ver humores fundendo, & omnes conuersiones insignes tabidis infestissimæ sint, adeo vt his vulgus ipsum sæpe mortem denuntiet, foliis arborum cadentibus, aut renascentibus.

Coquere oportet, tenuare, diluere, expurgare, detergere, ficcare, glutinare, instaurare corpus, catarrhum auertere, confirmare cerebrum & pulmones, vitare, quæ deorsum purgant (nisi materia fluente) quia sic sputum & pus retinetur, materiæ motu altò reuocato, & corpus magis cōsumitur. Phlebotomia non cōuenit vlcere facto, nisi noua fiat expuitio, aut venæ alicuius recēs apertio metuitur, & vires ferant. Remedia sunt syrapi, potiones, linimenta in pectore, cōseruæ, fumigia pulueres, lohot, hordeum immundatum, lac asininum, balneum, & similia.

ANTO. VALETII EXERCIT XXVIII.

*Phthisicus
primæ differe
rentia ex
Gal. cōm.
ad aph. 10.
lib. 3.*

Primariæ duæ phthisicæ differentiæ Galeno statuuntur: vna quidem ab acri distillatione è cerebro, vt pituitæ salis, aut biliosæ materiæ, sensim ac sensim pulmones excauantis: altera, quæ proprio pulmonis vitio, nulla prægressa fluxione, sit orta, rupto, exeso, aut aperto aliquo vase. Quibus accedit quæ ex fluxione aliarum fit partium. Succedit nonnunquam peripneumoniæ, pleuritidi, empyemati, sanguinis sputo. Interdum morbus est hæreditarius. Est quoque contagiosus. Signis suis satis elucescit.

*Gal. cap. 3.
lib. 1. de diff.
febr.*

Phthisis nisi primis statim diebus curetur, insana-
bilis est: quòd scilicet pulmonis vlcus citra tussim
expurgari nequeat, à qua tamen maximè laceratur:
vnde mutuas velut per operas malum tabidis in
orbem redire consuevit. Deinde medicamenta par-
ti affectæ idonea, integris viribus eò non pertingūt.
His causis duabus additur continuus pulmonum
motus. Et quamuis vlcera pulmonis curaueris, quia
tamen callosas & fistulosas reliquias ferè depo-
nunt, facile denuò exoriuntur. Imprimis igitur, si
vas aliquod in pulmone sanguinem fundat, vulnus
quàm celerrimè glutinandum, antequam phleg-
monem ingeneret, remediis cap. super. explicatis.
Quod si ferina è capite destillatio primum sit hu-
ius morbi suscitabulum, venæ sectio, purgatio, ca-
pitis confirmatio, tussis inhibitió remedio erunt,
vti in catarrho dictum est. Si vlceris tergendí con-
siliu præualeat, hydromel solum, vel cum hyssop-
o, hordeatū, aqua saccharata, syr. de glycyrrh. lac
asinin. imperabuntur. Sed hæc detergentia nò dum
sanguis reiicitur, sed cùm restiterit, exhiberi debent.
Atque tum detergere atq; còsolidare sic oportebit.

℞. lohor. de pulmone vulpis ʒ. i. syr. ros. siccat. vel syr.
de glycyrrh. aut de hyssop. ʒ. ʒ. Misceatur. Eger lamben-
do vtatur eum baculo glycyrrhizæ.

Proderit interim suffitus ex vngula caballina,
& hic quoque puluis longè à cibo vtendus.

℞. bipinell. siccat ʒ. 2. ireos Florent. ʒ. 2. ʒ. sacch. ros.
ʒ. 2. vtatur vt suprà.

Marcorem vero atq; consumptionem, quã cordis
exsiccatio infert, instaurare licebit sequentibus re-
mediis, & parti affectæ, & affectui quoque ipsi cò-
uenientibus.

*Phthisis
curatio.*

DE MORB. INTERNIS

℥. amygd. dulc. mundat. ʒ. 2. pineol. benè præparator.
passul. mund. in aq. rosar. contus. ana ʒ. i. pulpæ carnis ca-
pi, vel coxarum ranar. vel cancro. fluuiatil. vel testudin.
ʒ. i. ʒ. medull. quat. semi. frigi. maior. althææ & bombac.
ana ʒ. 2. anis. ʒ. i. cinam. ʒ. ʒ. amyli parum, sacchar. q. s. fiat
passa panis vel cum vino (si febris non debortetur) vel
iufculo capi, vel aqu. conueniente. Ex qua fiant placent-
ulæ coquendæ in clibano.

Hûc pertinent cõsumpta ex pulpis optimar. car-
nium, pullor. caponum, gallinar. & partium succu-
lentarum vituli, arietis, diu longo igni percoctarû:
expressa ex armo ouillo, perdicib. aflatis, & similib.
itẽmque syrupi resumptiui vulgò appellati. Vt.

℥. passul. mund. pistacior. pineol. & glycyrrh. ras. ana
ʒ. 3. iuiub. sebesten, sic. ping. an. n. 8. hyssõ. agrim. scabios.
bipinell. vngul. caball. hordei decorticati ana M. i.
semin. melon. bombac. vrtic. althææ, scenic. ana ʒ. i. ʒ.
flor. viol. & ros. ana p. 2. cum carn. duar. testud. nemoral.
præparator. & minutim concisar. f. decoct. ad lb. i. In co-
latur. dissol. sacchar. albissimi, & sacchar. ros. ana lb. ʒ.
asperisa ʒ. i. aq. ros. fiat syrup. perfectè coctus, cuius co-
chlearia duo subinde ægrõtanti exhibeantur.

In admotis magna vis non est, quia pulmo pro-
fundiùs latet. Si tamen educi sputû oporteat, quod
ex stertore intelliges, thorax antrorsum & retror-
sum lenientibus illinetur ex cap. de pleuritide repe-
tendis.

De cordis tremore seu palpitatione.

C A P.

29.

1 Palpitatio
cordis, qua
frequentè af-
fert syncopẽ,
est insanabi-
lis, et qua fit
ex cõmissione
pericardij cû
corde.

ΠΑΛΜΟΣ 1 quem formidinem quidam veterû
appellant, motus est præter naturam ab ex-
cretrice incitatus, cum id quod nocet, aut nocere vi-
detur, expellere contendit. Id ipsum verò aliquando
aqua est concepta cordis panniculo præter modû

aucta. Aliquando vapor quidam crassus cordi inclusus: aliàs etiam aliunde importatus, ut è matrice, ventre, & proximis visceribus. Interdum venosus per arterias & venas illatus. Inflammatio quoque & tuberculum palpitationis causæ esse possunt, ut & intemperies. Quæ omnia ex cordis temperamento, totiusque corporis antecedente vita, & aliis signis coniectura artificiali distinguens.

Curatio.

Si sanguinis copia in causa est, si aqua cõcepta panniculis, si inflammatio, aperienda est vena dextra basilica. Avicennas & Arabes dextram, si sanguis causa est, sinistram basilicam, si vapor, aperiunt. Sinistra quoque aperiri potest, si materia non ventriculis cordis, sed corpore concepta est. Quod si malum ab inferioribus partibus inuehitur, aut insignis plenitudo est, venæ crurum secari debent.

Gal. quinto de locis affectis omnes adiutos phlebotomiã scribit, & extenuante victu, quibus cor palpitabat. Id autem, quia verisimile sit vaporem esse crassum, unde cor palpitat. Neque inutilis est purgatio, si cacochymum corpus est: si quidem ex vitiosa materia excitatus vapor palpitationem inuehit. Quod ad reliqua attinet, distinguendum est, sitne causa frigida, an calida, ut inde ratio vitæ instituat, quæ vim medicatam habeat, & malum corrigat.

qui hæmorrhoidibus laborarunt, aut qui vino se & carnibus inuitarunt multis. 6. Quæ pulsu duro & febre dignoscitur. 7. Ut renouetur sanguis vel ieiun. 8. Qui ducitur per os secundum arteriam venosam parte sinistra, aut hypochondrio sinistro per arteriam celiacam.

2. Ut in gallo dissecto obseruasse se tradit Gal. cap. 1. lib. 5. locor. malè affectorum.

3. Cuius signa pete ex Galeni minicronegni.

4. Ut ritè curatione instituas. Nã ut sunt cause, sic & morborum idea: & ut morborum idea, sic varia remedium.

genera instituta sunt.

5. Ut iuuenibus, qui ex ephebis excessere ob hæmorrhag. naturalem superpressam: aut in mulieribus, quibus menses non respondent, aut iis,

DE MORB. INTERNIS

Materia itaque calida, ambra, styrax, calamintha, moschus, lignum aloës, caryophyllum, cinamomũ,

9 *Vi 2℥. corticis citri cõditi, myrobala- lan. cõd. flor. orengiæ cõd. nucis moscha- te cond. con- feruæ anth. viol. bugloss. ana 3.2. spe- cieriũ diamar- gariti calid. aromatici ro- sati, latitia Gal. an. 3.℔. sacchari ro- sati ad pon- dus omnium. fiat trochisci. Dentur bis in die è co- chleari.* cortex citri 9 & citrangulorum, crocus, nux mo- schata, macis, sem. maiora, basilici, vinum aromati- cum, odoriferum (Hippocraticum vulgò appellât) enula, sceniculus, petroselinum, galanga, zedoaria, amomum, cardamomum, cubebæ, rosmarinus, mē- tha, polium, calendula, theriaca, mythridatium, 10 potio moschata, electarium lætificans Galeni, diambra, diamargariton calidum, diarhodon cum speciebus, alipta moschata, gallia moschata, plerès archontica, capus, perdix, & volatilia. Eiusmodi, cõ- fixa lardo, consperso prius cinamomo, assa cum aspersione vini aromatici. Confectio de aromati- bus, vbi suspicio est auræ venenosæ, plurimũ cõ- mendatur. Interim verò si cordis calida intempe- ries suaserit, ad refrigerantia convertere, oportu- num erit, & cum ea pugnare sumptis syrupis è flo- ribus persicorum, è granatis, de ribes, de succo ace- tofæ, &c.

10 *Vel. 2℥. cortic. citri cõditi, conf. borrag. me- lissæ an. 3.℔. cõfekt. alker- mes, mythri- datij veter. ana 3.℔. fiat bolus: detur sub horam somni* Conuenientissimi verò in causa frigida sunt tro- chisci moschati, quorũ hæc est formula. 2℥. mastich. spicæ, xyloaloës, cinam. caryophyl. gall. moschata, cubeb. cardamom. granor. paradisi, cortic. citr. ana 3.℔. 4. moschi 3.℔. cum vino odorifero fiant trochisci pondere 3.℔.

Frigida materia.

Violæ, nenuphar, rosæ, santali, caphura, acetum, omphacium, berberis, cerasa, & pruna acidula, ace- tosa, succus malorum granatorum, pomorum odo- riferorum, acetositas citri, limonũ, citrangulorũ, persica, carabe, coriandrum præparatum, cydonia,

pira, lac acetosum, diarhodon Abbatis sine speciebus, diamarg. frigidum, triasantali. Condita ex his, vt conferuæ & ii syrupi. Sed condita & opiata scioribus, humidioribus arida, ceu trochisci, magis erunt ex vsu. Distillata in balneo mariæ, ius pulli infarcti floribus cardiacis, & similia. Ambigua, aurum, argentû, margaritæ, coralli, os de corde cerui, rasura eboris, cornu cerui, vnicornis, fragmenta hyacynthi, smaragdorum, blattæ bizantiæ, spodiû, doricum, melissa, borrago, buglossum. Sed horum quædam ad frigida, quædam ad calida referri possunt. Ex his trochisci comparantur, fiunt 12 epithemata, poma odorifera, stragulæ & vestes suauitate odore imbuuntur. Portiones conficiuntur, quæ & palpitati cordis, & syncopæ conueniunt. Trochisci quoq; parantur ex materia eiusmodi. ℞. spodij, semin. cucumeris, citrul. endiu. lactuc. portulac. ros. santal, albor. ana ℥. 4. caphur. ℥. 1. cum succo citrul. fiunt trochisci pond. ℥. 4. Sumat quotidie vnum cum liquore conueniente, vt cum aquæ rosarum ℥. 1. in qua ℥. 4. ligni aloës maduerint.

11 Vi. ℥. suc
corum depu-
ratorum bor-
rag. acetose,
endiuie, ci-
tri, pomorum
odorifer. ana
℥. 3. sacchar.
q. s. f. syrupus
vtatur bis in
die cum aqua
decoctionis
acetosellæ.
12 Vi. ℥. a-
quarū scabi.
acetos. buglo-
ros. melis. ana
℥. 3. santalo.
omnium tro-
chisc. de ca-
phura ℥. 2. f.
epithema pro
corde.

Electarium de gemmis, confectio de ligno aloës, cardiacos releuant.

Proderit & vinû diluere aquis cardiacis, in quibus vnicornis maduerit.

Auro & argento sic vtendum est. Calefiant in mediis carbonibus; deinde quadragesies recalfecta extinguantur in vino, aut liquore conuenienti. Liquor postea bibitur. Horum quoque vim relinqui volunt, si conferuantur in ventre volatiliū, dum elixantur aut assantur. Retinentur ore, & saliuā deglutitur. Hoc modo argentû sitim lenit. Alij tenuis-

13 Hoc com-
mentum est.

simis bracteolis, quæ folia vocant, & inde condita, electaria vegetiora reddunt. Rursus alij in pulvisculum tenuissimum comminuunt, & ita cum iusculo gall. decrepiti, cum collatitiis, expressionibus, distillatis exhibent. Sed hæc metalla venena credita sunt antiquis, ob immixtum hydrargyrum. Est & aurum 13 potabile in eundem usum. De colorato cōfectio alkermes cū rasura vnicornis mirificos præstabit sanitatis fructus.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

*Palpitatio
tremulus qui-
dam cordis
motus.*

Omni bus partibus vim quandam naturâ insitam esse, quâ quod offendit, quoad fieri potest, à se propellant, haud dubium est. Omnium tamen non eadem ratio. In epilepsia, sternutatione, vomitu, id contractione efficitur: in tussi, efflatione. In cordis autem palpitatione idē fieri suspicari licet. Concutitur enim cor, & veluti tremulo quodam motu afficitur ob causam noxiam, tanquam ingressum repente hostem formidans, aut superaturum, aut præ imbecillitate languescens sibi cessurum. Neque tamen negamus verâ & propriè dicta palpitacione, de qua Galenus agit, cor affici, id est, dilatari & inflari præter naturam à substantia halituosa & copiosa, cum perspirare non potest: subsidere autem, ubi foras extrusa fuerit, aut ut alij volunt, palpitacionē cordis mediam quandam esse dispositionem, inter pulsum & imbecillitatem. Sed nō ideo dilatatur, quia impletur: aut subsidit, quia vapor foras truditur. Verum cum vaporem aliunde irruentem, vel in se genitum præ imbecillitate dissolvere, aut arcere nequeat, modò dilatatur, modò contrahitur in sese, quia stimulat, & palpitacione excutere nititur quod nocet, donec liberum habeat motum, vel omninò deficiat. Vnde sæpe syncope, aut mors repentina consequitur, præsertim si causam intra se præsentem semper habeat. Inde enim cum & frequentius, & vehementius irriteretur, tandem repente succumbit. Ob id optimè Hippoc. Qui frequenter ac fortiter absque

*Hippo. apb.
41. lib. 2.*

absque causa manifesta deficiunt animo, de repēte moriuntur. Quod ad cordis palpitationem etiam, quæ sæpe syncopem antecedit, iure accommodare videtur Galenus. Excitari autem potest à tuberculo, abscessu, multo sanguine obstructionem faciente, intemperie calida, vermibus non solum orificiū vētriculi, sed & cor ipsum vellicāribus, ut vult Mesuæus, subita vacuatione, imprægnatione, inflammatione, aqua tunica inclusa & humore pūtri ac malè olente plena, lapillis, venenosa qualitate, spirituosō halitu, siue ab externis, siue ab internis, siue in ventriculis cordis, siue in substantia, siue in pericardio, siue in arteriis causa subsistat, siue accidat extrinsecus, ut vtero, liene, hepate, ventriculo. E quibus causis nonnullas in dissectis corporibus hoc morbo peremptis exploratas habuimus: quas non grauabor hic subiicere. Archidiaconi cuiusdam dissecto cadauere, abscessus in substantia cordis iuuentus. In alterius pericardio, aqua. In Britone quodam in collegio Triquetico iacente, inflammatio cordis. In alio, abscessus in vena arteriosa. In multis, pericardium flatu distentum, qui tandem solet in aquam concrefcere, nisi cordis calore dissoluatur. In muliere, quæ quatuor mensium spatio incredibili vrinæ cruciatu laborauerat, duo calculi reperti in corde cum multis abscessibus, integris renibus & vesica. Sed notatu dignissima historia Præsidis primarij Rhotomagensis, nomine Remon. Ab ineunte ætate ad annum quinquagesimum quintum, quo obiit, cordis palpitatione corripī solebat, præsertim à somno meridiano, & ubi arctius tibias constrictas habebat. Sensus quidam tremulus erat ad carotidas, hinc pulsus vel nullus, vel paruus, & sine ordine. Soluebatur paroxysmus edito crepitu, ructu, clystere, dolore in mediis clauiculis excitato, deinde in fronte, vel tussi satis violenta sponte mota. Relictis tibiarum vinculis, & somno melius habebat. Eadem symptōmata in muliere nobili apparuerunt. Vtrisque hepar calidius, ventriculus frigidior. Hinc multa fuliginosa excrementa, spirituosusque vapor & crassus in arteriis interceptus continebatur, qui in cor exhalans, incutiebat tremorem & palpitationem, diuque cōstidonec motu, attritu, aut calore (quod ad id non suffi-

Palpitatio infinitis ferè modis excitari potest.

Io. Mesuæus cap. de tremore cordis.

Archidiaconi palpitatione cordis intereptione historia.

Brito ex inflāmato corde palpitations occidit.

Palpitās ex abscessu in arteriosa vena moritur.

Mulier ex calculis in corvbi inflāpatione concidit.

Præses primarij Rhotomagensis, palpitatione cordis crebro, cōstidatus.

DE MORB. INTERNIS

*Gale. comm.
ad aphor. 41.
lib. 2.*

*Palpitatio-
nis causa nō
semper in cor-
de posita.*

ceret, facultas vitalis) dissolueretur, aut alicunde exitum haberet. Ob eandem causam ictericis, splenicis, melancholicis ferè omnibus, cachexiâ laborantibus, puel-
lis solet contingere, vapore flatuoso educto ex vitioso humore. Eodem modo Galenus refert ex balneo & vi-
tiosis lignis succensis mulierem solitam animo deficere. Alteram ab vteri affectibus idem pati. Cuidam, si vel
per horam laueretur, idem accidere, nisi prius panis aliquid assumpsisset. Hominem, dum exolueretur, & cor
fortiter palpitaret, repentè interiisse. Sed omnibus ne-
que eadem causa, neq; eadem pars affecta. Modò enim in ore stomachi, modò in corde fit principium defectio-
nis animi. Palpitatio quoque non semper causam ha-
bet in corde, sed pars aliqua affecta est, cum qua mu-
tuum habet consensum, vt pericardium, & arteriæ, præ-
sertim maiores & viciniore, inde vterus, & similia.
Causa autem modò per se morbum efficit, vt tubercu-
lum, aqua, inflammatio: modò aliquid commouet,
quod morbum efficiat, vt balneum & ligna succensa in
muliere, cuius meminit Galenus, & hepar ac ventricu-
lus in Præside Rhotomagensi. Quam causam Hippo-
crates manifestam appellat, aphorismo adducto, sicut
priorem non manifestam, a qua periculum mortis re-
pentinæ imminet, non ab altera, licet tandem quoque
interficiat. Ob idque vitam Præses ad 55. annum pro-
duxit, cum cæteri eodem morbo, sed causa dissimili,
breui perierint. Frequenter hoc modo fit. Sympatheia
aliarum partium, præsertim quibus arteria magna infi-
det, decubitu in dorsum & renes, vsu vaporosarum re-
rum, animi vehementi perturbatione, accedente cor-
dis promptitudine per intemperiem calidam, pestilen-
tiali aëre, fetido halitu & venenoso, venenis, tumore
vehementi, & similibus. Pulsus & in morbo, & in vale-
tudine euarians, vt è magno in paruum, veloci in tar-
dum, raro in frequentem, affectum cordis indicat vel
primarium, vel secundarium, ac tantò periculosiorem,
quantò vel frequentius corripit, vel magis continuus,
vt à nobis obseruatum est in clarissima muliere, Dom.
Duchastel. A flatu fieri indicant repentina accessio,
asthma, motus tremulus in genis, aut alia parte, dolor

subirò accedens & desinens, obtenebratio in oculis, sibilus aurium. Ab aliis causis, intemperies corporis, symptomata, & similia.

Remedia sunt victus attenuans, exsiccans, medicamenta alterantia, cardiaca, purgatio, phlebotomia, pilulæ, opiatæ, condita siccioribus naturis: humidioribus trochisci & arida, epithemata, vel potius sacculi, syrapi, clysterum vsus, præsertim in paroxysmo. Celerius enim vapores reuocant Frictio è linteis, quæ cõceperint odorem pulueris violati, fortis inspiratio, vt gementium, contentis in ore cardiacis antidotis, quò magis penetret qualitas, illitus arteriarum, vbi magis pulsant, & affriccio per eadem medicamenta cardiaca, vaporatio. Phlebotomia & victu attenuante curabat Galenus. Quod optimum est in crassiore sanguine & vapore. Omnes tamen scribit ante senectutem mortuos, vel syncope, vel alio genere morbi. Vitentur vincula extra accessionem, adstrictio à vestibus in vêtre, thorace, iugulo, alis, inguinibus, & vbicunque insignia vasa, præsertim arteriæ. Si in febrem acutam incidant, corripuntur syncope, vt in vacationibus imperadis & balneis maxima cautio esse debet. Ob idque ad periculi prædictionem, ne in Medici culpam mors reiiciatur, interrogandus æger in morbis, num per sanitatem aliquando soleat exolui, aut palpitare cor. Sæpe etenim, dum sanguis mittitur, purgantur, & ea fiunt, quæ ex ratione morbi oportet, syncope intercepti moriuntur.

*Gal. sub finē
cap. 1. libr. 5.
de loc. mal.
affect.*

ANTO. VALETII EXERCIT. XXIX.

Palpiratio cordis est dilatatio pæter naturam, morbi solius opus. Vnde impropriè, & solùm secundum analogiam tremor appellatur, siquidem hic fiat à natura & morbo, quum voluntarius motus inchoatus non perficitur. Huius affectus causa est, vel cordis intemperies frigida, vel sanguinis copia, vel vapor aliquis, aut aquea substãtia plus æquo in pericardio contenta, vel eiusdem tuberculum aqueum, carnosum, sanguineum. Primariò cor

*Galen. initio
li. 2. de caus.
sympt.*

*Galen. cap. 1.
lib. 5. de loc.
mal. aff.*

afficitur, vel per consensum corporis totius, vt in febre pestilente, aut maligna, vel viscerum.

Palpitationis curatio.

In palpitationis curatione minimè procrastinandum, quia syncopen, atque etiam mortem repentinam sæpe inuehit. Mittitur sanguis, sed parciore manu, è basilica sinistra, nisi plethora dextram apertendam suaserit: alioqui promptius à sinistra auxilium.

Serosus, aut pituitosus humor, qui sæpiùs morbi huius soboles existit, cathartico accommodato purgabitur.

℞. radic. gram. & petros. ana 3.2. flor. cardiac. ana p.i. femin. card. benedict. anis. & fœnic. ana 3.ß. f. decoct. In colat. pro dosi infunde agar. recens trochis. ʒ.4. thei elect. 3.i. cinam. ʒ.i. In express. dissol. syrup. laxat. ros. pallid. 3.i. f. potio.

A purgatione parabitur humor zulapiis è syrupis de hyssop. capill. ven. de bugloss. aquis melissophyll. beton. card. concinnatis. Proderit ante, aut post zulapium tabellam vnam electarij aromatic. rosau. aut alterius recens parati sumere.

℞. electar. lætif. Gal. dianisi. ana 3.i.ß. rasur. ebor. corn. cerui, ossis de cord. ceru. ana 3.ß. santal. v. triusque ana ʒ. i. sacchar. in aqu. melissophyll. dissol. q. f. fiat electar. per lozeng. pond. 3.2.

Iteranda erit superior purgatio: vel hæc pilul. ante pastum alternis diebus imperandæ.

℞. aloës elect. 3.2. myrrh. agar. troch. & rh. elect. ana ʒ.2. cum syr. de hyssopo f. massa. Ex cuius semidrachma fingentur duæ, aut tres pilul. duab. hor. ante pastum sumendæ.

Intercèa cardiacæ potiones, opiatæ, condita non omittantur. Cordis verò regioni extrinsecus sacculi applicandi.

℞. flor. bugloss. melissophyll. rosmatin. ana 3. i. lign. aloës, mac. ana 3. i. cinam. nuc. moschat. ana 3. ss. santal. vtriusque ana 3. i. f. pulvis. Excipiatur gossipio moschato, fiatque sacculus panno serico interfusus: admoventur regioni cordis.

Eidem epithemata instituuntur ex aqua. melissophyll. calendul. cardam. borrag. vino odorifero, puluerib. agallochi, cinam. caryophyllorum: vel ex iisdem pulueribus oleo irino & moschato exceptis, cera pauca addita, linimenta.

Verum si feruor cordis palpitationis causa sit, contraria vsurpabuntur remedia, cum sumpta, tum admota, scilicet refrigerantia: quorum materiam copiosè descriptam reliquit Hollerius.

De Syncope. CAP. 30.

Syncope est ¹ præceps virium lapsus ex insigni ² spiritus euacuatione, alteratione, ³ interceptione. Euacuatur spiritus, quia subtilior factus est, quia corpus rarius est, in acri vehementique calore. In ⁴ vehementi animi motu, cum iis ⁵ quæ excernuntur immodicè, doloris grauitate, morbi magnitudine, fame, abscessus ⁶ subita eruptione, & maximè in parte principe, aut quæ arteriis plena est: neruo, aut nervosa parte, affectis longo labore, ore ventriculi insigniter affecto, vel ab humorum frigidorum copia, vel ab humorum acrimonia, lentore, crassitie. Aliquando etiam intemperie. In cruditate, quam sequitur alui solutio, intemperie partium principum & consentientium.

nis vomica, aneurismate rupto: hepatis quoque vomica: vacuatione repentina hydropis, aut empiematis.

¹ Ex spirituum et partium solidatione corruptione & alteratione: in quorum comoderata quantitate et qualitate virium robur consistit.

² Tum etiam generationis priuatione, ut ex adæptione.

³ Ut animi perturbatione, respirationis difficultate, insignium vasorum obstructione.

⁴ Vnde repentinus natiui caloris motus intro, aut foras.

⁵ Ut deiectionibus, vomitionibus, cholera morbo, sudoribus magnis.

⁶ Ut pulmonis

DE MORB. INTERNIS

Vteri affectibus, intēperie calida & sicca nimis attenuatis humoribus, vitalis virtutis imbecillitate. Alteratione verò, intēperie totius corporis principiorum, & earum partium quę cōsentiūt, corruptione, vel ab aëre pestilente, vel à venenis externis, ab internis humoribus venenosis, à materia putri retenta in ventre & intestinis. Interceptione, ab humorū copia, à crassitie & lentore eorūdem, qui vias spiritales intercipiūt. Di-
stinctis causis curationē institues, colligēsque; ex primo ad Glauconē, quæ ad hanc rem pertinet. Similiter & ex lib. 12. Methodi medendi.

Curatio.

In euacuatione, refouendæ sunt vires, pauco
7 Ex cōser- alimēto dato interuallis, 7 distillatis, expressio-
uis cardiacis, nibus, gelatina, 8 iusculis, vino, aromaticis.
pulueribus, se-
minibus, flo-
ribus, fructi-
bus. Vt excō-
seruis borrag.
buglos. anth.
nuce moscha-
ta, & id ge-
nus reliquis.

Puluisculus cordialis.

℥. marg. splendorum 3. 2. rasuræ eboris, of-
fis de corde cerui an. 3. 1. vnicornis Gr. 4. sacchari
viol. 3. 2. Vtatur medio cochleari cum syrupo
de acetositate citri. Alius.

℥. corticis citri 3. 1. margarit. splendorum
3. 2. sem. citri conditi, sem. melonum, & ace-
tosæ ana 3. 2. limaturæ auri, fragmentorū sma-
ragdi, hyacinthi, saphiri an. 3. 1. sacchari rosati
3. 3. misce, detur medium cochleare cum vino
albo, tenui, odorifero, & parum vinoso, dilu-
to cum aqua, in qua aurum sæpius extinctum sit.

Exhibetur verò vinum, quod sua substan-
tia spiritus quàm celerrimè reparet. At ad-
uertendum est, ne sit aliqua viscerum inflam-
matio, aut delirium, aut ardor cum cruditate.

8 Dissica-
tur in frusta
capus aut co-
xa arietina,
& coquitur
in phiala bul-
liente in vase
magno aquæ
pleno, datur
eū omphacio
limonum.

Alij syrupum acetositatis citri ad ℥. i. cum aquæ oxalidis ℥. 2. dissolutum propinant.

Trochisci calidi.

℥. mastichis, spicæ, ligni aloës, cinamomi, caryophyllorum, galliæ moschatæ, nucis moschatæ, cubebæ, cardamomi maioris, granorum paradisi, corticis citri ana ℥. 2. moschi Gr. 6. Cum vino odorifero fiant trochisci, pondere ℥. i. aut ℥. 4. Alius puluisculus ad idem.

℥. electarij de gemmis, cōfectionis alkermes, aromatici rosati ana ℥. 2. macis, cinamomi ana ℥. 8. sacchari in aqua borraginis dissoluti & siccati ℥. 3. misce, fiat pulvis.

Epithema frigidum.

℥. aquæ distillationis rosarum, 9 violarum, 9 *Vel acetose* borrag. ana ℥. 3. vini tenuis odoriferi ℥. i. specierum *scabiose, tan-* diamarg. frigidi ℥. i. 8. misce. Pannus purpureus his *tundem.* calidis imbutus cordi admouendus.

Epithema calidum.

℥. vini quartaria tria: melophylli, moschatæ ℥. 3. misce.

Inunctiones.

℥. olei de costo. & iasmino ana ℥. i. ambræ Gr. 4. Alia.

℥. ¹⁰ olei viol. ℥. 2. cum duobus granis caphu- ¹⁰ *Vel olei ro-* ræ misce, fiat inunctio. *sati & cydo-*

Inunctiones, & epithemata sub sinistra mam- ¹⁰ *niorum an. 3.* ma fiunt. *8. his imbutis*

Potiones fiunt in frigida, ex vino tenui odorifero, ex syrupo de corticibus citri, cum aquis mellissophyll. borraginis, calendulæ. ¹⁰ *gossipii car-* ¹⁰ *ptum cordi* ¹⁰ *admouetur.*

In calida, cum syrupo de limonibus, de persicis,

DE MORB. INTERNIS

1 Vel. 2 suc
corā depura-
torum aceto-
sa, agrest. en-
diuia, borra.
limonum, po-
morum, odori-
ferorum ana
3.3. sacchari
rosati q.s. fiat
syrup.

12 Modò id
abradendo et
exasperando
nò sit inesti-
nis molestum.

oxyfacchara simplici, syrupo acetoso, violato, de acetositate citri, & similibus. Maximè commendatur syrupus de pomis, qui ita parari debet.

2. 11 succi pomorum odoriferorum cocti & depurati lb. i. coletur per manicam Hippocratis cū facchari violati 3.3. cinamomi 3.2. Vel, recentiorum more, cum æqua portione, aut paulò minore facchari, fiat syrupus. Eliguntur poma omninò odorifera, partim acidula, partim dulciuscula. Alio-
qui 12 pomatio optimo vtendum est, ex quo vel iulep, vel syrupus parari potest.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

ἐκλυσis.
λειποψυχία.
λειποθυμία.

Vires corpo-
ris in quibus
sunt cōstitute.

Εκλυσis leue animi deliquium: λειποψυχία animæ defectio grauior, nondum tamen ad sudorem vsque: Syncope, grauißima & morti finitima, quasi concisio, quòd spiritus, & vires concidant. Philotheus loco λειποψυχίας, in Aph. λειποθυμίαν, animi defectum dicit. Sunt, qui distinguant. Aëtius lib. 5. ἐκλυσis, & λειποθυμίαν pro eodem sumpsit. Distinctio facilior hac methòdo, cum causarum varietate innotescet. Animi defectionem nihil aliud esse, quàm præcipitem virium lapsum còmuni omnium notione perspicuum. Vires autem sunt in spiritu calori natiuo iuncto, & temperamento solidarum partium, calore insito, & humore primigenio siue radicali constante. Ergò in tam præcipiti virium lapsu, vel spiritus, vel temperamentum, vel utrùnque collābitur. Spiritus autem vitalis cū sit in corde, duplicemque motum habeat, vel intrò, foras, vel foris, intrò, deficit, vel quia non generatur, vel corrumpitur, vel alteratur, vel non mouetur, vel dissipatur. Non generatur vel corrumpitur à proprio receptaculo, propter intemperiem fortem cordis, vt scribit Gal. cap. i. lib. 5. de locis affectis: vel defectu alimenti. Corrumpitur, vel alteratur, à venenata qualitate, siue interna sit ab aliquo mēbro, siue externa, vt ab ambiēte aëre. Non mouetur ad externa, sed intrò cogitur & suf-

focatur, vel ab affectionibus animi vehementioribus, vt ingenti tristitia, anxietate, mœrore, dolore, cura, & similibus, vnde sæpe syncope & interitus, vt Galenus docet de symptōmatum causis: vel à corpore, vt respiratione prohibita, multitudine & crassitie crudorū humorum exiguos meatūs obstruentium, vnde Syncope, aut si nō obstruant neque onerēt, λεωπύχια oritur, vt Galenus docet 12. Methodi. Hūc referri possunt tumor aliquis præter naturam in corde, vel pericardio, vt in dissecto, cuius ex Galeno meminit Philotheus, tunica inclusa in ventriculo cordis plena humore putri malè olente, vermes & similia, de quibus dictum est superiore capite, quæ aliquando obstruunt, aliquādo aura venenosa spiritus inficiunt, & cor vellicant, sicuti & humor è ventriculo, aut vtero, aut hepate, aut cerebro, aut etiam pulmone.

*Philoth. cōm.
in aph. 41.
lib. 2. Aphor.*

Observauī idem cuidam accidisse anno 1549. quod Antipatro Medico. Huic enim mortuo inuentus abscessus in vena arteriosa. Sectioni mecum interfuit Nicolaus Lambert chirurgus. Motu autem è corde affatim & repente aliquando foras dissipatur spiritus, & euanescit eodem modo, quo intrò cogitur, vel ab affectu animi vehementiore, vt in gaudio, voluptate, ira, vigilia, risu: vel causa in corpore contenta, vt insigni euacuatione, purgatione per medicamenta, resolutione spirituum cōcurrentium ad aliquam partem dolore affectā vehementi, aut erosam, vt ad os ventriculi valde sensile, suppuratione, aut ruptione apostematis, vel tuberculi, siue introrsum facta, vt in ventriculum, siue extrorsum, vt in aqua in hydropicis educenda. Simul enim exhauritur spiritus, & vnā cum ruptione euanescit. Quod Hipp. multis locis significat, vt Apho. 27. lib. 6. & 8. lib. 7. In partibus quoque exolutionem fieri, vt vacuatione sanguinis, ita & puris, 2. Epid. Memini vidisse syncope mortuos in huiusmodi ruptione è liene. Dissipatur etiam spiritus, pluribus motibus, tenuitate, raritate corporū ipsos continētium, tenui humore & calido, sudore nimio. Atque hæc sunt ferè causæ, quibus lædūtur spiritus, qui si suam affectionem cōmunicent partibus solidis, ita vt incipiant resolui, quod sudore cognoscitur, erit Syncope valde periculosa, imò verius mors ipsa. Neque enim ferè mori-

*Galenus de
eo Antipatr.
sub finē lib. 4
loc. affect.*

DE MORB. INTERNIS

tur homo, nisi quadam syncopis specie. Sin in spiritibus tantum sit, nec facultas vitalis omnino dissoluta, Lipothymia proprie dicitur, cuius terminus sudor est. Ob id Galenus scribit ad Glauconem Lipothymiam syncopis principium esse. Solidarum autem partium temperamentum multis quoque modis labefactatur, ob defectum alimenti, consumptionem proprii humidi, refrigeratione calidi innati, in longissimis morbis ex atrophia, in febribus acutis à colliquatione, & similibus. Hinc efficitur duo propria & perpetua esse symptomata in Syncope, frigus totius corporis à calore exoluto, & sudorem diaphoreticum, siue syncopticum, à dissolutione solidæ substantiæ. Est enim sudor hic pessimus, & ut causa, & ut signum. Causa, quia solidas partes spoliatur humido, & virium substantiam dissipat. Signum, quia imbecillitatem naturæ non amplius humores continentis indicat. Sed in Lipothymia tantum frigus apparet, sic dicta, quod sit in instrumento animi, id est, spiritu. In utraque tamen sensus & motus priuatio est, & pulsus defectio. Causæ ex propriis signis cognoscendæ: remedia unicuique causæ accommodanda.

Confirmanda facultas vitalis, si ab intemperie: à tuberculo & similibus difficilis curatio. In aspera arteria dyspnoeam efficit: in tenuibus, spirituum alteratione. Iisdem remediis, quibus asthmatici, curantur. Filio Rogier procuratoris Regij febricitanti in pulsu deficiente & intercidere animi deliquit accidit. Asthmaticis remediis euasit. In euacuatione nimia reficiendus æger, vino diluto (diluitur verò aqua frigida, ut frigore fluxum contineat, celeri motu fluxum reuocet) theriaca recenti, irrigatione aquæ frigidæ, ventriculi linimento, frictione partium superiorum, excretio retinenda. In veneno, vomitus, theriaca, mythrid. propria antidotus, pulueres cordiales conueniunt. In alicuius partis sympathia, topica, suffitus,unctiones, cordis roboratio, partis affectæ curatio. In resolutione spirituum, alimenta optimi succi facile & citò nutrientia, humectantia. Diogenes Laërtius scribit Democritum multos annos effluentem spiritum retinuisse medulla panis albi intincta vino optimo, ut Cretico, & cōspersa puluere methæ, appositâq; stomacho, & narib.

ANTO. VALETII EXERCIT. XXX.

Quanquam syncope ex Galeno libr. 12. Meth. virium est omnium lapsus, in eo tamē affectu *Syncope maxime vitālē obsidet facul.* vitalis præcipuè, quæ fundamētum est cæterarū, afficitur. Hinc pulsus ferè nullus, nulla penè respiratio sensus & motus abolitio, in ore pallor, extrema algida & madètia, deniq; ipsissima mortis imago. Causæ sunt summa, ob inemperiem, cordis imbecillitas, *Synopes causa.* semper lèthalis, spirituū à quavis causa exolutio, vel subita eorundē & præfocās ad cor reuocatio, qualis hæmophouis, quib. sanguis adimitur, sæpe evenit, qualitas aliqua maligna, aut halitus teret, tota natura infensus, cōspurcatio ab assumpto veneno, aut à morfu animalis venenati, ab aëre inspirato ex fodina metallica, ex cadaueribus & leguminib. putrib. & à ventriculi, vteri, aut alterius partis, in cuius consensum cor trahi possit, vitio.

Vocatus Medicus ad ægrū syncope prehēsū, omne suum studiū imprimi, ad symptoma referre debet, vt præsentē accessione eū liberet. Proinde agnita causa, remediū ipsi contrariū instituet. Galenus in omni syncope vinum cōmendat, quod alioqui, vrgente febre, inflāmatione, vel mētis alienatione, perniciosum. Eo tamen vti licebit intermissionis tēpore, sed pauco, & decocto buglossi, borrag. aut simili diluto. Odorata, vt lintea aqua rosacea, aceto & pauca caphura imbuta, narib⁹ admota iuuabū: talia enim spiritus promptè recreāt. Aspersio quoque frigida poros occludendo, & vim sopitam antiperistasi exsuscitando, confert.

Recreato à paroxysmo ægro, de synopes causa tollenda cogitatur. Si plenitudo suffocationem mi-

DE MORB. INTERNIS

1. *Est enim immoderata perturbatio vetriculi sursum ac deorsum per vomitum & secessum facta, à causa nomē habēs, vt ait Galen. lib. 2. Meth. Pars affecta est vetriculus, cui consentiunt intestina.*
 2. *Id verò accidit vt plurimū ob vellicationē & erosionem vtriusque officij vetriculi: vnde cōtrarij duomodus sequūtur natura maxime insens.*
 3. *Quare crura & manus cōtrahuntur, animaque deficit.*
 4. *Quibus concurrentibus mirum non est, si subito quis moriatur.*

nitetur, phlebotome haud aliter prodest, quàm si quis exiguo igni, qui præfocatur, lignum subtraxerit, vnde reuiuiscat. Si frigida intemperies, aut calida in causa sit, valebunt cardiaca capite superiore enumerata. Si sumptum sit venenum, vomitus subinde repetetur, fortis iniicietur clyster, alexiteria, quæ tota pugnent substantia, sumentur, & applicabuntur, vt theriaca, mythrid. & id genus alia.

De cholera.

CAP. 31.

Cholera morbus est 1 acutissimus, sine febre ferè, quæ vel vno die, vel altero, vel certè paucis 2 diebus hominem rapit, substantiâ corporis effusa, partim assiduus vomitionibus, partim iisdem deiectionibus.

Hippocrates cholerae siccae neminit Commenario 4. de ratione victus in acutis, cuius naturam & curationem ex eo loco intelliges. In humida verò animaduertendum in primis est, vt si fieri potest, 3 vomitus componatur, & relinquatur motus, qui ad intestinum est, corrupta ferè ac exitiosa materia, quæ excernitur. Itaque initio retinenda non est, sed tum primū, cum vires inde confidere videntur. Itaque initio 4 aquæ tepide, aquæ hordei, aliquando etiam adiecto momento saccari, aut mellis, vbi frigida materia est, imperandus est potus ad 3 6. Quod si æger borborygmis & flatibus sollicitatur, cochleare medium seminis cumini poterit aquæ incoqui. Hac arte fluctuans materia, & ad vomitū incitata, repurgatur, ex quo sistendo vomitui intendendum est.

℥.zulapij ros.℥.3. succi granatorum 3. i. ℔. misce, vtatur breuibus interuallis, duobus aut tribus cochlearibus. Conueniunt & syrapi, s rosatus, myr- 5 *Hi syrapi non sunt in aquis dissoluendi, metus relaxationis ipsius vetriculi ab humi-*
 thinus, de cydoniis, de granatis, & similes in causa ditatenimias.
 calida. Idem quoque in causa frigida, sed cōspersis Eum enim adstringere tum oportet.
 pulueribus spicæ, cinamomi, nucis moschatae, &
 similibus. Alioqui syrupus de mentha, de absyn-
 thio, & similes.

Oportet autem assumi cochleati, breuibus interuallis, & sine aquis, Largior enim potus hîc non conuenit.

Laudatur remedium ab antiquis ex vini granatorum 3. 2. succi menthæ depurati 3. ℔. & vtatur cum cochleati, vt priûs dictum est. In causa frigida, 6 *Si sine febre fuerit affectus, quæ magna ex parte abest.*
 6 vinum optimum, tenue, & odoriferum aliquando satis esse potest. Imperabis quoque, vt granatum Vinum verò generosum vel merum assumatur, pro natura
 integrum, acidum, dulcoratum cum saccharo rosato odoretur. Aeger fugat interim: eiusdem quoque agri, consuetudine, tempore, aère.
 grana commanducet. Conspergenda facies aqua Diluitur autem aqua aurata, argentata, chalybeata: vnde sola vini portione multos prater spem euasisse scribit Alex. Trall.
 frigida, aqua rosarum per se, vel in frigore, adiecto
 vini odoriferi momento, vel moschi modico. Vtendum quoque iis, quæ exterioriùs admouentur stomacho, qualia sunt hæc.

℥. santalorum rubror. ros. ana 3. 2. galliæ moschatae 3. ℔. caphuræ Gr. 6. Mædeât in aquæ ros. 3. 4. aceti 3. 1. ℔. Panniculi in hac miscella merfi & expressi, quantum fieri potest, frigidi toti ventriculo applicentur.

Potest inungi stomachus oleo rosato, de cydoniis, de spica, de absynthio, vt res exigit. Quod si timetur nimia refrigeratio, miscellæ supradictæ succus menthæ, absynthij, aliquid quoque cinamomi

DE MORB. INTERNIS

7 *Vulgò paratur scutū ex mastiche & carne cydoniorū oleo conueniente exceptis.*

Quibus licet aliquid cerati stomachici Galeni immiscere.

aut vini austeri odoriferi commisceri potest: 7 Masticis 3. 2. aut 3. cum oui albumine, cum oleo cydoniorum, aut conuenienti dissoluuntur. Inde fit emplastrum, quod extendi debet in aluta formata ad modum scuti. Cæterum quæ confirmant ventriculi robur sumpta & admota, vt in vomitu & leienteria, veniunt vsurpanda.

Vulgi experientia est, eboris tabella admota ventri vomitus cōpesci. Sed interim dum hæc fiunt, somnus & quies, quantum fieri potest, concilianda sunt. Consulendum viribus, partim odoribus, partim alimentis.

Perdiculas ergò, aut iuuenes pullos columbarum confixos baculis myrthi, rubi, cinamomi, vt res exigit, conspersos interim, dum assantur, aqua ros. vino granatorum, vino austero, odorifero, primum quidem calidos & plenos fumo naribus ægri admovebis. Ex eo tortiuo prælo succum inde exprimes: expressam materiā naribus ægri admovebis: succum sorbendum exhibebis. 8 Dabis gelatinam cum succo granatorum distillatam, qualem in sputo sang. Sunt qui bucellam panis assent, vino granatorum conspergant, edant, dein vinum vtiliter ebibant. Eundem assatum panem vino immersum, & caryophyllorum puluere aspersum, aluum sistere certo constat experimento.

8 *Huc spectant pulueres ex saccharo rosato, & margaritis, manus Christi, conserue rosar. cydonior. oxycantha condita, &c.*

Quòd si nihil continet æger, prius data aqua tepida, cucurbitulam magnam affiges ventri, & interim dum ea cucurbitula fixa est, cibum exhibebis. Breuib. interuallis cucurbitulam figes, & refiges, & ita nutries, ex Galeno sub finem libr. de paratu facilibus.

Consensus est veterum Medicorum, dropacif-
mum impositum ventri singulare esse remedium
assiduè vomentibus. Parabis dropacem ex quatuor
partibus picis & vna olei cydoniorum vnà liqua-
tis, deinde extensis in aluta. Postremo medicamen-
tum calidum ventri applicabis.

Laudantur vincula articularum, frictiones me-
diocres, fots ex oleo multo, magis vbi conuulsio
est, vel imminet. Fouetur spina, muscoli conuulsi,
articuli. Cucurbitulæ quoque & ventri & scapulis
affigi possunt. Quod si refrigerantur extrema, lin-
teis calentibus inuoluenda sunt.

Si spasmus accidit, redeundum ad curationem
spasmi. Si vrget sitis, semina cucumeris in aqua tem-
perari debent, donec intumeant; tum cortex exte-
rior detrahitur: quod est reliquum, aqua incoqui-
tur: aqua refrigerata bibitur. Contra syncopen cum
aliis remediis supradictis, tū buccella imbuta vino
admota naribus, contenta ore vtendum est. Eras-
istratus ex Chrysippo præceptore vinum aqua frigi-
da dilutū cholera morbo affectis, tanquam extre-
mum remedium, commendat, vt vel morti proxi-
mos refoueat. Idem probat Galenus libello de ve-
næ sectione aduersus Erasistrat.

Trochisci Rhazæ.

℞. mastic. boli arm. thuris ana ʒ. 2. β. carabe, car-
damomi ʒ. 2. caphuræ, galliæ moschatæ, caryo-
phyll. ana Gr. ʒ. cum succo granat. fiant trochisci
pondere ʒ. 4. Detur vnus, superbibatur ʒ. 1. succi
granat. iulep. granati, syrup. cydoniorū, aut similis.
Deorsum reptante materia choleram morbum cō-
mittente, optimum erit naturæ opitulari, exhibito

9 Clysteres cathartico conuenienti: vt infuso rheo & vehemētius expreffo, fyrup. laxat. ros. pall. fyr de cich. compos. cum rheo. Atque id quidem tutius implebitur, cum materia naturam ad excretionem sollicitat, nihil tamen effatu dignum vomitu, aut deiectione excludit. Clysterum 9 hīc duplex est vsus. Initio reuocādis vomitionibus, & hi simplices esse debent. Postea verò collabentibus viribus, qui & leuiter reprimant, & adstringant.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

9 Clysteres saepe & saepe iterandi, vt motus omnis deorsum fiat. Initio qui morsum & acrimoniam humoris re-tundant, conueniēt, vt ex lacte, saccharo, oleo viola-to & vitel-lis ouorum. Deinde fortiores paulò & vehementiores.

Cholera morbi dua species.

Cholera arida effectrix causa.

Cholera humida vnde.

Hippocrates quarto de ratione victus in acutis, & Galenus in Comm. & Isagoge, duplicis cholerae meminerunt, aridae & humidae. In vtròque perturbatio est ventriculi immodica infra, supraque. Differūt causa, & symptomata. Arida enim fit ex spiritu flatuoso, acri, qui siue egeratur, siue retineatur, lancinat & mordicat partes ventris nervosas. Venter inflatur, strepitus fit, dolor in lateribus & lumbis, alius nihil deiecit, sed adstringitur. Humida gignitur, vel ab alimentis, vel medicamentis. Alimenta in causa sunt, quae succum crudū, flatuosum, acrem procreant, ægrè coquuntur, tardè permeant, vt intestina suilla infarcta sanguine, capis, pipere, pinguedine, quibus nihil difficilius coquitur, laserpitij succus, ca-seus, suilla caro, bubula, caprina, ventres animalium infarcti. In summa, quaecūque vel flatuosum succum generant, vel acrem, vel facile putrescentem, vel humiditatem acrimoniae iunctam habent. Corruptuntur enim facile, & acrimonia fluxiones irritant ex toto corpore, mordicantes orificia vasorum, quae ad ventrem pertinet, vnde vomitus, & deiectio. Medicamenta sunt, vt helleborus, apud Galen. Comm. in apho. I. lib. 5. Aph. Sed hoc nomine reliqua quoque violenta pharmaca intelligenda, vt Colocynthis, Scammonij. Ex his enim aliquando generatur conuulsio, aut immoderata purgatione, aut neruorum substantia resiccata, aut demorso ore ventriculi, neruis laborantibus per consensum, ab æruginosa bile, vt

bile, vt in adolescente, cuius meminit Galenus, & in negotiatore quodam Rhemenſi, cui vomitu citato deſiit conuulſio. Aliquando verò Cholera ſequitur. Mordentur enim, vt de alimentis dictum eſt, partes neruoſæ vi medicamēti, & acrimonia humoris attracti, à cuius etiā quantitate poteſt ventriculus cōprimi, idque præſertim ſit, cum humores nō ſunt ad purgationem parati. Fit aliquando è toto corpore, aliquando ex quibuſdam partibus, vt hepate. Huic maxime proprium eſt ſymptoma, de quo Galenus agit comm. in eundem aphor. Contractio, videlicet, in muſculis & pulpis tibiarum, quam vulgò, *Gouttes crampes* nominant. Quod accidit viduæ deſuncti Præſidis de Longueil, & Domini Dyuor. Morbus eſt peracutus, vt qui quarto ad ſummū die finiatur. Alia ſymptomata ſunt & ſigna, vomitus, deiectiones bilis frequentiffimæ, deliquia animi, ſudores exigui, ſitis, pulſus vermiculantes, ructus nidoroſi. Quibuſdam accidit certis interuallis, naturā ſeſe exonerante, ſed ob impetum humoris biliōſi erumpentis, ſalubri humore ſimul cum vitioſo foras expulſo. Huiuſmodi homines Græcis *χολερίαι* dicuntur: Plinio, biliōſi.

Curatio perficitur ſublata cauſa, cōuulſione, ſyncope, tremulo motu, ſingultu, ſi adſint. Purgatione, ſi facile ſoluatur aliis, prouocatione vomitus, qui prohibetur iniecto clyſtere calido, vt prouocet, pingui, vt leniat. Hydrex calido partes corporis fouetur. Subducto ventre, & eò conuerſa materia, ſanitas. Dormiat, vt coquat. Vinum ſit tenue, ad penetrationem, vetus, meracum, ad coctionem, modò à cruditate morbus ſit. Pauciſſimo vtatur cibo, lacte aſinino, vt purget & leniat. Neque ſimul deiectionem, & vomitum prouocare licet. Quæ enim in ventre continentur, ſubducenda, & vomitus prohibendus, Hipp. 4. Acu. Ventriculus roborandus ad motus. Conueniunt adſtringētia, emplaſtra, ſacculi, linimēta, vnguenta, cerata, epithemata, ſed celerius agūt for̃. Cucurbitulæ inter vmbilicum & ſtomachū, purgatio, pilulæ, condita.

ANTO. VALETII EXERCIT. XXXI.

CUm pungens dolor atque erodens, tormina & nauſea quenquam inuadunt, hiſque adſunt,

DE MORB. INTERNIS

*Gal. lib. 2.
Meth.*

aut proximè succedunt, vomitus, & ventris per inferiora turbatio, cholerae morbi certa significatio affertur. A causa nomē habet. Accidit enim vt plurimum à bile vellicationem & erosionem vtriūsq; orificij ventriculi committente: vnde contrarij duo motus naturæ molestissimi consequuntur.

*Cholera morbi
curatio.*

Vomitus quia grauissimum naturæ negotium facessit, statim in initio iuuandus, digito, aut penna ori indita, vel hoc vomitorio.

℞. aqu. decoctionis hord. & raphan. 3. 3. olei comm. & hydromel. an. 3. ℞. f. vomitorium, tepidè sumatur.

Vel etiam deiectione materia in ventriculum concepta vacuabitur, iis præsertim, quibus laboriosa vomitio. Purgatio verò sit eiusmodi, vt aluum non lubricet, qualis hæc.

℞. cortic. myrob. citrin. & gran. berber. ana 3. 2. seminis acetos. portul. ana 3. 1. f. decoct. ad dosin. In colatur. infund. rhei elect. 3. 2. cum pauc. cinam. In expressione dissol. eiusdem thei puluerati, vstulati 3. f. zulaipij rofacei 3. 6. f. potio.

Clysteres quoque sæpe iterentur, vt motus omnis deorsum ducatur. Comparabuntur ex iis, quæ humorum aerimoniam retundant, vt ex lacte, oleo viol. sacchar. vitell. ouor.

Robori autem ventriculi sumptis & admotis prospiciendum. Sumptis, si calida sit causa, syr. ros. limon. de acetos. citr. & similibus: qui per se exhibentur, nec in aquis dissoluuntur, metu relaxationis ventriculi à nimia humiditate, quæ adstringere oportet. Admotis, vt oleo cydon. ros. myrr. vel litibus ex iisdem oleis & pulueribus ros. rub. santal. malicorij institutis. Si frigida causa, syr. de mentha, & consimiles valebunt. Alexander Trallianus sola

vinipotione multos præter spem euasisse scribit. Vinum generosum sit, merum, vel dilutum aqua aurata, argentata, vel chalybeata. Plura ad hunc affectum remedia ex capite de leienteria petenda.

De imbecillitate 1 stomachi.

CAP. 32.

Imbecillitas stomachi frequens 2 cõualescentibus: magis etiam 3 ab imperfecta crisi, in quo reuocanda sententia Hippocratis. Si à morbo cibum assumens quis, nõ corroboratur, largiori 4 alimento corpus vti significatur. Quod si non assumenti cibum hoc accidat, scire oportet, 5 quod indiget euacuatione.

In conualescentibus ergo, quibus reddita est appetentia, imbecillitas ventriculi non potest tantum conficere, quantum apperit. Modica itaque quantitate, sed breuibus interuallis, cibis boni succi, & qui facile coquantur, reficiendi sunt. In aliis, quibus appetentia non redditur, reliquæ morbi in causa sunt, quæ optimè vel rhabarbaro, vel hierâ picra ex decocto cicerum, aut absynthij repurgantur.

In sanis verò debilitas est, vel à sola intemperie.

Cuius indicia sunt, calidæ quidem, æstus in medio corpore, sitis assidua, & lingua arida, iactatio corporis, aliquando etiam extrema, vel frigida, vel temperata, nec pro ratione æstus calentia, à cibo nidorosi ructus. Frigidæ verò frigoris sensus in parte infirma, nulla sitis, 7 saluatio aliquando mulra,

diut. 6 Vt æstu viscera incandescent. Nã ubi calor, ibi morbus. 7 Ex humoris in ventriculo fluctuantis copia, per cõiunitatē interioris tunica ad os,

1 Alui sine ventriculi, in coquendo & appetendo, quæ duæ sunt actiones ventriculi, coctio & appetitio.

2 Morbo defunctis, collapsio habitus, alieno temperamento, & mutata ventriculi actione languida.

3 Superstite morbi materia, aut empiemate.

4 Quod scilicet sit infirmus ventriculus, & morbi diuturnitate collapsio habitus, alienatioque temperamento, necessitati

corporis satisfacere nequeat.

5 Ad exclusionem morbi reliquias, quæ suctionis sensum impediunt.

DE MORB. INTERNIS

8 Ea vellocatē habet in aluo generationem, vel aliunde affluit. ructus acidi. Alia ex arte medica Galeni require. Causa quoque nonnunquam materia est, eaque vel 8 quātitate peccat, vel qualitate. Rursus vel corpori stomachi, vel ventriculi imbibita est, vel in capacitate fluitat.

9 Ex lib. 10. Therap. methodi. Intemperies quoque aliquando complicantur,

10 Sumptis quarum omnium signa colliges ex arte medica.

Et admotis: Intemperies contrariis, calida quidem frigidis, ut cofer. viol. ut potu frigida, frictione articulorum, cerato Galeni, cuius hæc est descriptio. 9.

rosar. borrag. inlep. 2. ceræ lotæ in aqua rosarum 3. s. olei rosacei in aqua rosarum similiter loti 3. 2. liquefiant in vase duplici. Quod cum fuerit refrigeratum, diu malaxetur cum aqua frigidissima, vel succo plantaginis.

rosato, syrupo malor. punicorum: admotis ite ventriculo, ut ha pso, semmēto, epithemate Imperanda ratio vitæ, quæ refrigeret. Et 10 contra æstum ac sitim his utimur.

sar. & bu gloss. Hap sus vero cydoniorū oleo imbuatur. 2. sem. cucumeris in aqua macerati, & excorticati 3. s. tragacanth. dissolut. in oui albumine 3. 2. liquefiant in vase duplici cum eodem oui albumine: fiant hypoglottia, id est, pilulæ, quæ teneantur sub lingua.

11 Cuiusmodi est syrup. acetatus. Et tamen oxy. sacchari loco iuncta sit. Quod si syrupis utimur, iis omninò abstinentum est, qui 11 acetum recipiunt, nisi humiditas cōiuncta sit.

prescribi potest, ob succū mali punici. In frigida, volatiliū carnes confixæ cinamomo, aut lardo consperso puluere cinamomi, & ita 12 asfata. Alimenta omninò calida, vinum odoriferum, aut etiam colatum cum saccharo, cinamomo, granis paradisi, modico zinziberis, & similibus. 13.

12 Ut condimentū ex pulueribus caryophyllorū, nucis moschate & cinamomi cum sapa. 13 Aut sunt condita, opiata è nucem moschata, myrobalanis conditis, cortic. citr. cond. flore Aureng. cond.

Forus è 14 sacculo mollissimis plumis anseris ple-
no, & aliis, quæ postea de siccitate in hectica febre
dicentur.

Humiditas, si fluitat, vomitu elicienda est. Vbi
imbibita est, & qualitate peccat, pharmaco repur-
ganda est. Si tantum quantitate peccat, & præter
modum stomachum ac ventriculum remollit, ad-
stringentibus medicamentis, admixta aromatū par-
te ad resiccandum, vtendum erit. Si crassus & visci-
dus humor est, incidendus oxymelite, aut aliis eiuf-
modi, tum pharmaco deiiciendus est. Materia co-
rum, quæ infirmum stomachum è frigore confir-
mant, cinamomum, cortex citri, caryophyllū, ma-
stix, lignum aloës, zinziber, & chebuli conditi, ma-
cis, mētha, absynthium, galanga, scœnuanth. caruū,
ami, flores anthos, vinum aromaticū, nux moscha-
ta, piper, aromaticum rosatum, diagalanga, diacu-
minum, diatrium pipereum, diacydoniū cum aro-
matibus, theriaca, mythridatium, syrupus de men-
tha, de corticibus citri, mel anthosatum, oleum nar-
dinum, de spica, de mentha, in quo aromata calida
coxerint, vt piper, cinamomum.

Frigida. Coralli, santali, ambra citrina, corian-
drum præparatum, ebur, cornu cerui, & vnicornis,
cydonium, pira adstringentia, rose, diarhod. Abbat.
trochisci de spodio cum semine acetosæ, myrrha,
acetosa, diacydonion sine speciebus, scoria ferri, li-
matura chalybis, ceratum santal. vnguentum rosa-
tum, oleum rosarum, & de cydoniis, syrup. rosat. &
de cydoniis, aliæque eiufmodi, quorum pars in cō-
trouersiam temperamenti venire potest. Cæterum
calidam temperiem corrigere possunt. Horū enim

14 *Fiunt sac-
culi ex radi-
ce cyperi, cal-
arom. schœ-
nuantho, ca-
ryophyl. ab-
synthio Ro-
man. menth.
orig. chama-
melo, rosis.
Cōquūtur in
æquis parti-
bus aque &
vini rubri:
decocto ma-
defacta spo-
gia admo-
tur stomacho.
A foru au-
tem illinatur
oleis absynth.
menth. &
nuc. moscha-
ta.*

DE MORB. INTERNIS

omnium vsus, vel quia inde puluisculi & electaria, potiones quoque confici possunt, aut topica, quæ exterius applicentur. Virgente sitis ardore semina portulacæ, cucumeris, cucurbitæ, acetosæ & similia, trita, & excepta mucagine tragacanthæ proderunt. Item glycyrrhiza recens. Per omnia tamen videndum est, ne adstringamus nimium, ex quo siccitas immodica cōtrahitur, ne nimium humedemus. Hinc enim virtus harum partium dissoluitur. Neque nimium refrigerandum, vnde extinguitur calor.

Tepidis vtendum non est, sed vel frigidis, vel calidis, quòd tempore virtus stomachi relaxetur.

Remedia externa anteriore parte ad sterni initium sub pectore aptanda sunt: quanquam & posteriore parte ad duodecimam vertebra[m] probato remedio applicari possunt. Vtræque parte posita magis iuuabunt. Sed oportet ea quæ posterius ponuntur, habere aliquid tenuium partium, quòd per difficiliore[m] viam penetrare possint. Humidiori ventriculo cōuenit. ℞. ambræ citr. mastichis, iridis, an. ʒ. 3. ros. siccarum ʒ. i. ʒ. fiat pul. detur ʒ. cum magno cochleari succi granatorum, vel sero lactis. Quòd si frigiditas adiūcta est, addes cinamomi, scœnuanthi, maceris an. ʒ. i. Quinetiam humidiori ventriculo conuenientissimum istud est remedium. ℞. aquæ vitæ lb. i. aquæ rosar. lb. i. cinamomi ʒ. i. misce omnia. Deinde bis aut ter cola per manicam Hippocr. post infusionem horarum 24. Capiat bis in hebdomade cochleare vnū hyeme, æstate semel. Humiditatem quoque resiccāt ferè omnia in frigidis numerata, & vino in cocta, quòd adstringat.

Ad idem paratur racematum vinum, in quo macerantur caryophylla, absynthium Romanum, &c. Ut si feruente musto, noduli vel sacculi pendeant è charyophyll. zinzibere, menth. absynth.

Sed vbi frigiditas coniuncta est, aromata commiscenda. Ad frigidam dispositionem.

℥. corticis rad. fœniculi ʒ. 2. coquantur in vini optimi ʒ. 4. ad dimidias. Quod si maior refrigeratio est, coletur vinum per manicâ Hippocratis cum ʒ. 1. cinamomi.

Instituuntur quoque trochisci, qui infirmitati stomachi à frigida causa mirificè medentur. ℥. ros. rub. ʒ. 3. ligni aloës, spice, mastich. schœnuanth. mac. cinamomi, absynth. ana ʒ. 1. Ex vino veteri fiant trochisci. Diatriumpipereon, diacydonium Galeni cum aromatibus conueniunt. Exhiberi verò solent electaria, lozengia, syrup. horas duas ante cibum: primum quidē lozengia, deinde syrupi.

Quod si flatus adsunt, galanga, grana paradysi, cuminum, lybisticum, caruum, bacce lauri, iuniperi, & similia vino odorifero incoquenda sunt in pul. redacta, macere & cinamomo adiectis incorporetur melle anthosato. Theriaca & mythridatio hîc vtendum est.

Calorem resouent catuli, cati, caniculæ, pulli, pullæ, manus admota ventri, rasura dibaphi, quæ plurimum conuenit, vbi etiam frigiditas est, gossipium, sacculus è mollissima pluma anseris, pellis leporis. Gossipium in vino odorifero, decoctione menthæ immersum, expressum, siccatum, & ita impositum. Ceratum stomachicum Galeni, vel hoc.

℥. ol. de spica ʒ. 4. ceræ ʒ. 1. mastichis ʒ. ʒ. lique-
fiant in vase duplici. Deinde adde cyperi, macis, ci-
namomi ana ʒ. 1. commisce diligenter, & rasurâ
dibaphi excipe, quantum satis est, calidumque ap-
pone.

Vel. ℥. mastich. cerati stomachici Galeni, æqua-
les partes: cum oleo absynthij, aut de mentha f.
emplastrum ventriculo apponendum.

℥. dialthææ ʒ. 1. mastichis dissol. in oleo de spica
ʒ. ʒ. croci ʒ. ʒ. misce, extendatur in aluta pro stoma-
cho. Hoc & dolorem lenit, & stomachum robo-
rat.

Mastichis grana præmāsa & deglutita, Ceratum
stomachicum Galeni. Concalfacto verò stomacho
vrēdum est cerati santalini ʒ. 2. malaxatis cum oleo
de cydoniis, rosarum, deinde extensis in aluta. Iu-
lepus rosatus, vinum granatorum, syrupus aceto-
sus simplex, & similes syrupi. Quòd si humiditas
calori coniuncta est, aut aliquis humor biliosus, vel
in ventre collectus, vel aliunde inuectus, absynthio,
hiera picra, rhabarbaro, cassia, & similibus hac ra-
tione vrendum est.

Absynthij decoctum biliosa deterget & subdu-
cit, si quidem aliū non fuerint imbibita: & hoc
magis melicratum ex absynthio, aut decoctum ab-
synthij cum octava parte mellis rosati dulcoratum.
Infestissimum verò absynthium, & quæ adstrin-
gunt, quibus pituita ventriculo inhæsit. Tum enim
prius incîdi & tenuari materia postulabit. Hiera
picra, & rhabarbari vsus est, vbi imbibitus humor
est biliosus tunicis ventriculi. Vtriūque ʒ. 1. aut ʒ. 4.
ex decocto absynthij, cicerū rubrorum, sero lactis,

aqua endiuia, satis esse possunt. Alioqui 3. i. cassia, aut catholicum imperandum est. Sed ab his roborandus erit stomachus: nec enim, ut hiera & rhabbarum, confirmare possunt. Ventriculum roborabunt oleum mastichinum & styracinum descriptione Nicolai, in quibus hapsus lanæ purpura intinctæ stomacho apponitur. Similiter olea nardinum & moschatum, costinum, è benzoino, usurpari poterunt.

Vinum absynthites descriptum à Dioscoride deterget, roborat, appetentiam reddit. Quod si deest, molliores absynthij cauliculos recentes leuiter conquassabis, vino odoro, austeriusculo mace-rabis, & leuiter feruefacies, vel siccos eisdem cauliculos vino infriabis.

Id vinum maximè facere ad subuersionem stomachi Arriæ celebris sceminæ historia à Galeno cap. 3. lib. de Theriaca ad Pisonem descripta amplissimè confirmat. Hæc non appetebat, non continebat, ut pote stomachi affecta dissolutione, atque adeò in atrophie periculum incurrebat. At ubi medici, Galeni consilio, vinum ex absynthio confectum propinârunt, illico appetentia est restituta, & ventriculus confirmatus.

In imbecillitate stomachi plurimus olim vsus medicamenti è cotoneis. Syrupus acetosus è cotoneis sic fit. ℞. succi cotoneorum per residentiam depuratorum, sacchari ana lb. i. aceti 3. 3. coque ad spissitudinem. Cōuenit calfacto stomacho, & inde infirmato. Poteris tamen imminuere modum sacchari, ut erit auctus calor: aceti, ut erit sensus stomachi.

DE MORB. INTERNIS

Miua Rhazæ.

℥. succi cydoniorum maturorum per residentiā depurati ℥b. i. sacchari ℥b. β. vini veteris ℥b. β. coquantur, & despumentur. Tum.

℥. zinziberis, spicæ, cinamomi, caryophyl. ana 3. 2. mastichis 3. 4. Omnia puluerisata nodulo includantur, & in prædicta miua calida macerentur: deinde refrigescant, & nodulus exprimatur.

Græcorum.

℥. succi cydoniorum, mellis optimi ana ℥b. i. aceti acris ℥b. β. aut non ita acris 3. 9. zinziberis 3. 5. piperis albi 3. 2. Succus cum aceto & melle modicè coquatur, despumetur, tum inde pulueres, & coque ad crassitudinem.

Moderatis omnibus oris ventriculi affectionibus, præterquam quæ æstu vehementi oriuntur, proxima duo medicamenta conueniunt. Aliud.

℥. carnis cydoniorum, mellis ana ℥b. i. aceti albi ℥b. i. simul bulliant, & agitentur, tum adiace piperis 3. i. zinziberis tantundem, petroselini Macedonici 3. 8. hoc magis adstringit. Ventri calida intemperie affecto, aut bilioso, piper & zinziber subtrahuntur. Ventri temperato tantum dimidium piperis & zinziberis subtrahitur. Aliquādo miuæ aromaticæ 3. i. theriacæ aut mythridatij 3. i. commiscantur. Datúrque hæc miscella ex vino odorifero. Quòd si etiā dolor coniunctus est, in primis phlebotomia ex interna brachij conuenit. Perseuerante malo, ex utrāque basilica, & hoc magis si grauis dolor est, si repentinus, si difficilis ructus, & spiritus: si febris est, si dolor in dorsum & scapulas extenditur, sanguis detrahendus.

Historia est quinto. Epidemion, de muliere quadam, quę in vehementissimo dolore stomachi, nullis aliis adiuta remediis, sanata est ducto ex utrąque manu sanguine.

Postea verò leniendus dolor est, & si quidem venter æstuat, cucumeris semen, & hordei in aqua frigidissima macerati debet, & decorticari: cum adiecta parte glycyrrhyzæ rasæ & recentis coquatur aqua, despumetur. Refrigerata verò, vel niue, vel aliis modis suppradiictis propinetur. Vesica ea aqua, vel alioqui frigida, ex dimidio plena sapiùs admoueatur.

Quòd si materia aliqua concepta ventriculo dolorem facit, ea, vt priùs, commodè repurganda est.

Cucurbitulæ vmbilico, aut ad latera vmbilici affigendæ sunt. Dextrum quidem, si ab hepate: sinistrum, si à liene in ventrem fluxio est. Sùntque omninò tria genera eorum, quæ dolorem leniunt. Primum, quod rescindit causam, vt pharmacum, & medicamentum, quod intemperiem corrigit. Secundum verò eorum, quæ reuera anodyna sunt, qualia sunt chamæmeli, melilotum, anethum, flores rosmarini, ctoci, rosarum, violarum: quibus aliquid menthæ, absynthij, & eorum, quæ stomachum roborant, adiiciendum est. Similiter & furfures, milium, sal, dolorem leniunt: sed frigi debent, & sacculo includi.

℞. furfurum M. i. milij conquassati P. 2. salis 3. l. frigantur in sartagine: deinde includantur: perfumetur sacculus vino diluto aquâ rosacea, & effuso in laterem candentem. Aliud.

℞. florum anthos, rosarū, violarum, chamæmeli,

DE MORB. INTERNIS

anethi, meliloti, ana P.1. summitat. absynthij P. 8. Fiant sacculi: perfumentur, vt prius, & applicentur calidi. Alioqui.

℞. menthæ, absynthij ana P.2. chamæmeli, florum anthos ana P.1. calami aromatici, schœnuanthi, mastichis an. 3.1. Fiat decoctio in vino odorifero. In decoctione gossipium, aut rasura scarlatæ immergatur: exprimantur, & identidem calida applicentur. Materia quoque expressa ventriculo toti applicetur. Sed videndum, ne refrigescat, statimque oleo conuenienti vngere oportebit.

Vbi supradictis remediis non concedit dolor, narcoticis vtendum est. Primùm quidem leuioribus, quales sunt syrupi rosarū, papaueris, myrthi, syrupus violatus, de nenuphare cum 3.1. Philonij.

℞. syrup. ros. & de absynthio ana 3.1. opij Gr.1. bulliant vnà leui ebullitione, deinde cum 3.3. iuris pulli detur in potu.

℞. philonij in causa frigida, in calida verò, requiei descriptione Nicolai, vnus 3.8. in vino tenui odorifero.

℞. pilul. de cynoglossio 3.1. dissol. in syrupi rosati, & de papauere ana 3.8.

Trochisci Stellæ. ℞. spicæ, mastichis, cinamomi, schœnuāthi, castorei, myrrhæ, olibani, piperis, aloës, absynthij, sem. hyoscyami albi, & mandragoræ, opij ana partes æquales, vt 3.8. Fiant trochisci cum vino dulci, pondere 3.2. Detur vnus cum vino odorifero.

Albucasis non reuelandum remedium.

℞. opij 3.1. cum aliorum capitibus duobus. Conquassentur, fiat distillatio in alembico: eius a-

quæ modicum bibatur. Eadem arte poteris opium commiscere rebus stomachicis suprâ enumeratis, & inde aquam elicere. Alia narcotica superiùs descripta remedia quoq; plurima ex 8. libro de compositione medicamentorum χ^i τόπος.

Quod si vlcus affuerit, quod ex signis in scholiis dicendis intelliges, ita moderanda sunt omnia.

Medicata edulia purgantia sint: vt lac amygdalarum dulcium cum saccharo multo, hydromeli, syrup. rosatus, conserua rosarum.

Vbi purgatum fuerit vlcus, acribus omnib⁹, acerbis, acidis, salis, abstinendum: mitigantibus vtendum, quæ & detergeant, & glutinent. Qualia, lac calidum, hordeata saccharo rosato condita. Sed & in gula paulatim deglutienda, & iis lentor quidam insit oportet. Itaque oua sorbilia optimam materiam præstant, qua saccharum, mastiche, farina hordei tosti, fœnugræci, limaces, cochleæ, balauſtia, malicor. mucago tragacanth. gummi Arabicum excipi possunt. Sed de his fusiùs in nostra ad 8. Galeni librum de cõpositione medicamentorum χ^i τὸ 8, perioche diximus.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Affectus ventriculi in œsophago, stomacho, siue orificio, fundo, tunicis, pyloro, infimii propè reperiuntur, *Ventriculi affectus sunt* tantò periculosiores, quantò coctio & distributio cibi *infere immunes* magis necessaria est vniuerso corpori. Quales sunt, intemperies omnis generis, tumores præter naturam, obstructions, defluxiones, excremenra illic collecta, vel nata, vel aliunde immissa, cibus intemptius, nimius, vitiosus, deiecta appetentia, nausea, vomitus, humores in tunicis infarcti, aut in fundo fluitantes inflammatio, inflatio, dolor, exulceratio à causa interna, vt hu-

DE MORB. INTERNIS

more acri, pharmato, cibo, offe acuto, præcedente ab-
 scessu, erosio, fames canina, immoderata sitis, & similes,
 quorum signa, causas, remedia explicare maioris est ope-
 ris. Multa ex Galeno colligi possunt 3. & 6. de morb. &
 sympt. 5. de Locis affectis, 6. de sanitate tuâ 7. Metho-
 di. Signa ex Microtegni: Octavo *ἡ νόσος* ita describit
 stomachicos. contra Andromachum, qui stomachicas
 confectiones sine discrimine scripserat prodesse stoma-
 chicis. Quod & vulgò hodie etiam Empyrici faciunt.

*Stomachici
 qui vulgò
 dicantur.*

Plerique (inquit) vulgò homines eos, qui appetentiam
 perdididerunt, ita vocant, & quibus post acceptum cibum,
 ventris os grauatatur atque opprimitur, & quandam ægrè
 tolerabilem anxietatem habet. Appellant eodem modo
 etiam illos, quibus nausea cōtingit, & maximè si ad vo-
 mitum impellat, & adhuc magis, si cibi corrumpantur,
 quandoque nidorosi facti, quandoque etiam aliam vi-
 tiatam qualitatem adepti. Et præ his omnibus adhuc
 magis illos stomachicos nominant, quibus ructus eius-
 modi cum molestia quadam & anxietate ac subuersio-
 ne contingunt, sæpe cum nondum cibum acceperunt.
 Quinetiam si per plurimum tempus cibi in ore ventris
 morentur grauantur, & vix descēdentes, hos itidem sto-
 machicos appellant. Alios item appetitum caninum ap-
 pellatum habentes, vt & plurima edant, & maximè gra-
 uati paulò post reuomant, similiter vocant. Alios rursus
 qui fortiter exoluuntur, vbi diutius in ediam pertulerint,
 & si non citius cibum accipiant, in ore ventris morsus
 percipiunt, eodem modo stomachicos vocant. Hæte-
 nus Galenus. *Κοιλιακοὶ* autem sunt, qui cibum non con-
 tinent. Ante cibum, ab humore confluyente: post cibum,
 ab imbecillitate: vtròque tempore, ab vtràque causa do-
 lor commouetur. Nonnunquam à cibo cessat, quia ci-
 bus naturam colligit, temperat, calfacit. Vlcus esse con-
 iiciendum ex dolore, ardore, deglutito synapi, & simili-
 bus rebus calidioribus, aut frigidioribus, pure apparente
 in vomitu, vel deiectione. Vlcus ventriculi causa du-
 plex: interna, externa. Externa, vulnus: quod si magnū,
 est incurabile, vt in viuario Aureliano, & id constat ex
 aphorismo 18. lib. 6. Externa quoque causa est veneno-
 sum pharmacum, os acutum acus. At interna, est humo-

*Κοιλιακοὶ
 qui appeller-
 tur.*

ris actis confluxio. Non ciendus vomitus, ne inde vlcus laceretur, & materia aliunde trahatur. Eodem modo neque sternutatio, neque tussis. Ab humore acuto lingua infecta, sapor redit in os, & in vomitu, secessuque, cum ardore, calore, siti, angustia. Si in orificio ventriculi, grauiora symptomata, frigiditas extremorum, syncope, dolor grauior, &c. Ex varietate causarum indicationes curationis sumenda.

*Galen. lib. 5.
Meth.*

Si à morbo cibum.] Conualescentes à morbo aliquando multum appetunt, ob extenuationem membrorum, non solum ab inanitione spiritus & humoris, balneo, profluuiis, sudoribus, insensibili perspiratione, colliuatione, & similibus, sed etiam à ieiunio, inopia alimenti, calore languescente, vt flamma, quæ in ellychnio insita ab oleo & aëre fomitem & pabulum sumit. Aliquando verò appetentiam habent deiectam ob vitiosos humores relictos. Vtrique sæpe, nisi accuratè tractentur, in recidiuam incidunt. Priores quidem, quia cum extenuata membra multum appetant, non tamen sumpta conficere potest imbecillus calor. Cõstat enim historiã multorum, qui à longa inedia sese repleant, inde suffocari. Posteriores verò, quia reliquias morbi tandem natura stimolata aggredi cogitur. Quantò enim plus nutriuntur, tantò magis læduntur, donec accrescente malo morbus repetat. Hi igitur curantur vacuatione, vt docet Galenus libello de sanguinis missione contra Erasist, & Hippocrates, libro 6. Epid. Illis verò remedio sunt, rerum non naturalium commodatio, labor, cibus, potus, somnus, Venus, omnia mediocria: deinde longo tempore substantiæ reparatio per alimenta pauca, bene nutritia, facilia coctu, sæpius exhibita. Nam pauca non sufficiunt: nimia non coquuntur.

ANTO. VALETII EXERCIT. XXXII.

Ventriculi imbecillitas facultatis est concoctricis error, quo vel ἀπεψία, alteratio is priuatio, vel βεαδυπεψία, coctionis imminutio, seu tarditas, vel denique δυνάμει, & deprauiata co-

*Gal. cap. 4.
lib. de diff.
sympt.*

DE MORB. INTERNIS

*Gal. lib. 3. de
caus. sympt.*

ctio infertur. Causæ sunt intemperies, frigida, calida, humida vel sicca, quarum notæ ex Galeno lib. 7. Method. scitè ab Hollerio repetuntur: vel præter naturam tumor, phlegmone, erysipelas, abscessus, aut denique externæ rei alicuius vitium, vt cibi & potus immodica copia, noxia qualitas, intempestiuus vsus, præposterus ordo, excrementorum corruptela, breuitas somni.

*Imbecillitas
v. ventriculi
à caus. frigida
curatio.*

Nuda intemperies raro huic affectui causa est, sed sæpius cõiunctam habet materiam: frigida quidam pituitam, vel ex cibis collectam, vel à capite, vicinisque partibus transmissam, vel crudam humorum colluuiem ab antecedente morbo acuto, aut chronico relictam: calida verò bilem. In frigida itaque purgabitur ex hieræ picræ 3. 3. vel 3. 8. cum vinò albo dissolut. Hieræ vsus si osculorum venarum apertionis metus, vel vteri gestatio, aut hæmorrhoides dehortentur, pilulæ præscribentur.

℞. pilul. de hiera & agar. an. 3. 8. cum syrúp. de mentha, vel absynth. f. pil. mol.

Conferent quoque pilulæ ante cibum ad 3. 2. datæ. Ad iterandam purgationem parabitur humor syrupis conuenientibus: & interea robori ventriculi sumptis & admotis prospicietur. Sumuntur electaria, opiata, vel condita.

℞. zinziberis conditi, ligni aloës an. 3. 1. puluer. electar. aromatic. ros. & diarhod. Abbat. ana 3. 8. cum saccharo in aqua absynth. dissoluto f. electar. per lozeng. pond. 3. 2. Sumat vnam hora 1. ante pastum, à qua licebit vini optimi modicum superbibere. Per se satis sunt interdum, zinziber conditum, cortex citri sic. myrobal. conditæ. Vel. ℞. conferuæ, melissophylli, bugloss. borrag. & ros. ana 3. 2. confer. anth. 3. 1. cortic. citr. cond. 3. 4. confect. alkermes 3. 1. puluer. elect. lactificantis Gal. & de gem-

de gemmis ana 3. ℥. rasuræ ebor. corn. ceru. an 3. i. cum syr. de absynth. f. opiata: cap. manè instar glandis.

Topica erunt, fomenta, linimenta, scuta.

℥. cyper. & calam. aromatic. ana 3. ℥. santalor. omnium ligni aloës ana 3. i. absynth. vtriusque, menth. maioran. ros. rub. an. p. i. f. decoctio addendo quartram partem vini albi, pro fotu regionis ventriculi cum spongia per horam ante cibum.

Post fotum siccatus locus linitur oleis mastichino, menthaceo, moschato, quæ efficaciora erunt, si arte Chymica sint extracta. Superponitur gossipium moschatum. Vel.

℥. maioranæ, absynth. Rom. ros. rub. flor. ros. marini, calam. arom. ana 3. 3. cinam. caryophyll. nuc moschat. mac. galang. ana 3. ℥. ligni aloës, cyper. schœnuanth. an. 3. 4 mastich. 3. i. f. pulvis pro scuto, intersuto ac facto gossipio moschato, & ventriculo applicando.

Faciunt hæc eadem remedia ad fluctuationem, inflationem, & id genus alias vetriculi affectiones. Cum autem calida fuerit vetriculi imbecillitatis causa, purgatio cathartica bilem ducentibus perficietur, ut rhei diluto, electario de succo ros. aut catapotii aureis, de rhab. de aloë. A purgatione dabitur tabella vna electarij refrigerantis, ut diargarit. frig. vel diatragacanth. Temperabitur humor syrup. refrigerantib. acetoso, viol. ros. granator. de limonib. cum aquis eadem præditis facultate. Litus sint ex oleis myrtill. ros. viol. lotis in aceto.

Cæterum symptomata, quæ vetriculi sequuntur imbecillitatem, ut vomitus, singultus, curabuntur supradictis & proximè dicendis remediis. Fluor alui si adsit, pane tosto in vino austero macerato, & ventriculo applicito, vel emplastro ex 3. 2. cydoniati cum oleo myrtill. aut cydon. emollito, &

maſtich. puluerat. 3.i. ſinapiſato cohibendus.

1 Deprava-
tus ventricu-
li motus &
contra natu-

ram, qui con-
uulſionis mo-
do fit, cum ta-
mē conuulſio

non ſit. Con-
uulſio enim
tantum cadit
in partem, qua

mouentur
proceſſus
& omnis co-
uulſio ſym-

ptoma eſt cau-
ſe morbiſica
ſingultus au-
tem & ſter-
nutatio non
item.

2 Galen.lib.
8. de compoſ.
pharmac. lo-
cal.

3 Vti in con-
uulſione ab
inanitione,
ab exauſto
humido pri-
migenio.

4 Hæc diſtil-
lata reſtaura-

tia conſciuntur ex conſernis bugleſſ. viol. borrag. nenupharis aquis ſca-
bioſa, bugleſſ. endiuia. Hæc omnia in alembico reponuntur ſimul cum ſemi-
nibus frigidis, cardiacis, cum decocto capi, carnibus perdicum, mica panis al-
biſſimi. Stillat humor, cui miſceri poteſt ſaccharū & cinamo. tenuiſſimē pul-
ueratum, exhibetur agro.

De ſingultu. CAP. 33.

Singultus i conuulſio quædam eſt, & pra-
uus motus oris ventriculi, vel ipſius etiam
ventriculi i vi retentrice officium negli-
gente, & robuſtiore expultrice.

Singultus cauſæ inanitione & repletio. Qui ab ina-
nitione, ferè lethalis eſt, ſequiturque inſignes eua-
cuationes, vt ſanguinis è vulnere, è locis muliebri-
bus, aut aliunde. Sequitur dyſenterias, diarrhœas,
& cætera eiufmodi. Ardores quoque & graues in-
flammationes viſcerum, de quo priuſquam præſa-
gium inſtituas, vide num ſit à repletionem. Minus e-
nim periculofus eſt, ſæpèque cum multa per ven-
trem euacuantur, ſingultus à repletionem eſt, quia
pars materiæ, quæ à reliquo corpore confluit in vē-
trem, tunicis ventriculi imbibitur.

Singultu excluduntur non ſolū quæ in corpo-
re ventriculi, ſed etiam quæ ſtomachi & œſophagi,
continentur. Sunt qui ad inanitionem adiungant
cauſam ſingultus, perfrictionem oris ventriculi, de
quo 8. de compoſitione medicamentorum parti-
cularium, & Apho. 13. & 39. lib. 6.

In 3 inanitione, etiamſi deſperata res eſt, iu-
uandus tamen æger 4 deſtillariis, collatiuiſ, iuſculis

& expreſſionibus, cibis humectantibus, inunctio-
nibus, & cætera eiufmodi. Sequitur dyſenterias, diarrhœas,
& cætera eiufmodi. Ardores quoque & graues in-
flammationes viſcerum, de quo priuſquam præſa-
gium inſtituas, vide num ſit à repletionem. Minus e-
nim periculofus eſt, ſæpèque cum multa per ven-
trem euacuantur, ſingultus à repletionem eſt, quia
pars materiæ, quæ à reliquo corpore confluit in vē-
trem, tunicis ventriculi imbibitur.

ne dorsi & ventriculi ex oleo violarum, 5 hydre-
læo quoque.

Ex aquæ & olei partibus æqualibus adhibendus
est fons.

Si perfrixit, calfaciendum est per ea, quæ non
tam adstringant, quàm rarefaciant. In perfrictione
enim stomachus, nervosum corpus, condensatus
est, ideoque non transpirat: ex quo repletio fit, à
qua singultus. Vino itaque odorifero cum tantillo
cinamomi & galangæ occurrendum est malò.

Stomachus & spina oleo de castoreo, de piperi-
bus inungenda sunt, aut inde cerata conficienda,
perpetuò seruata ratione, ne adstringamus, donec
aqueuerit singultus.

Vbi flatuum 6 multitudo, iisdem ferè remediis
sedatur. Vino quoque, in quo ruta, rosmarinus, se-
men dauci, cumini, carui, cubebæ, baccæ lauri, aut
iuniperi, galanga, lybisticum, 7 & alia eiusmodi co-
xerint. Aut eadem cum vino odorifero maluatico,
aut similicolasimus per manicam Hippocratis. 8
Aqua vitæ cum tantillo cinamomi, anethum quo-
que quadã proprietate, vt volunt, singultum sedat.
Electaria fiunt ex nardo gallica, zinzibere, feseli, &
proximè enumeratis remediis cum melle. Mel an-
thosatum hîc conuenit, vt 9 confectio de baccis
lauri, 10 theriaca vetus, & mythrîdatium.

Flatuosis à corrupto cibo solennis est hic puluis.
℥. spicæ Celticæ, zinziberis, nepetæ, fesel. rut. dauc.
cumini ana 3. i. sacchari anthosati 3. β. f. puluis. Vel.
℥. castorei 3. i. Detur cum melicrato.

Quòd si materia est aliqua continēs causa singul-
tus, ea vel calida, vel frigida. 11 Calida vacuetur vo-

5 Fiatq; ha-
psus ex gossi-
pio carpto il-
lis imbuto o-
leis, qui per-
petuò vetrica-
lo & dorso
insideat.

6 Quæ ex di-
stentione &
oppressione
alui dignos-
citur.

7 Vinum ara-
maties, aut
absynthites
Carthusiano-
rum, aut etiã

hydromel vul-
gò dictũ mal-
uaticum, aut

vinũ malua-
ticum, horum
omniũ instar
esse poterunt.

8 Aut aqua
inqua maduo-
rit coma ane-
thi Aethiopi-
ci, quod regiũ
appellant.

9 Hac conse-
ctio est a-
rior.

10 Hac miri-
ficè flatus di-
scutunt.

11 Per aph.
17. lib. 4.

22. Si peculia-
ris natura à
vomitu te e-
uocet.

13. Vel. 24.

4. infunde in
aqua endiuia
sero lactis, de
cocto cicer.

rub. in ex-
press. dissolue.

hieræ picræ
3.2. f. potio.

14. Ad compe-
rationem hu-
moris acrioris

15. Hæ pilula
sinus vacua

di & tempe-
randi vi pol-
lent.

16. Hoc re-
medij genus

valet ad in-
flammatorem

hepatis &
ventriculi.

mitu, si fieri potest. 12 Alioqui 3.4. rhab. 13 vel tan-
tundem pul. hieræ picræ in sero lactis, vino grana-
torum acidorum, & maturorum, aqua endiuia, de-
cocto cicerum rubrorum infunde, expressionem
exhibe. Hic obseruandum est, leuiores purgatio-
nes esse debere, quæ ad ventriculi affectus accom-
modantur, nisi à toto corpore humor confluat.
Tum si perseverat singultus, 14 aqua frigida propi-
netur. Subinde hæ pilulæ imperentur.

15 24. spodij, sem. endiuia, portulacæ, ligni aloës
ana 3.1. pulpæ tamarindorum 3.1. rhab. elect. 3.2.

cōfice cum oxycrato, aut vino granatorum. Aliud.
24. syrupi ros. acetosi, oxysaccharæ simplicis an.

3.2. In quibus infunde summatum absynthij 3.8.
fiat in fusio in calidis cineribus, tum duobus aut

tribus cochlearibus refrigerati remedij per inter-
ualla vtatur. Vel zupium parabitur eiusmodi.

24. succi endiu. aut cichorij per residentiam depura-
ti 3.4. cum sacchari violacei 3.2. f. zupium. Op-

portunus erit vsus electarij triāfantalini, quod non
modò ventriculum confirmat & hepar, sed & re-

frigerat.

16 Cerati fantalini 3.4. cum oleo rosato malaxé-
tur: deinde commisce spodij, rosatum ana 3.1. cum

succo semperuiui agita: inde finges duo scuta in a-
luta. Alterum stomacho ad sternum: alterum ad

duodecimam & tertiam decimam vertebrae dor-
si applicabis.

In causa frigida.

Vbi crassa & viscida materia, melicrato hyssopi,
vel oxymelite simplici materiam præparabis. Tum

vt mouebitur, per vomitum aut ventrem repurga-

bis ex hiera picra dissoluta in decocto cicerum rubrorum. Dabis autem hieræ modum à semuncia ad vnciam. Conuenit in hoc singultu acetum scylliticum, oxymel cum cinamomo aromatizatum, 17 Tale melicratum vinosum vulgò dicitur.

℥. vini albi tenuis odoriferi 3.3. in quo leuiter ferueat galangæ 3.1. cinamomi, sem. anethi an. 3.℞. Conuenit & castoreum in vino odore ad 3.2. Sed quia fædo est odore, cinamomo, semine apij temperari potest. Conueniunt & hæc, schænuanthum, asarum, maiorana, aristolochia, enula, zinziber conditum, acorus conditus, diatrium pipereon, diacuminum, diagalanga, theriaca vetus. Exteriùs verò 18 oleum de liliis, de amygdalis dulcibus.

Instituitur etiam cerotum singulare in causa frigida. ℥. olei nardini 3.1. aloës, mastich. an. 3.1. succi absynthij 3.2. cum cera fiat cerotum. 18 Quinetiū fotus ex calis mo aromatisco schænuantho, origano, absynthio, mentha.

Et iam sedato singultu, atque vacuata materia, ea quæ roborant adstringendo. Fit aliquando, vt materia quædam venenosa sit, cui hoc puluere occurrendum sit. 19 Hoc electarium, non modo ventriculi singultui, sed variis aliis affectionibus conferri. Facit ad omne venenam tam aurâ eluendam, Et ad effatam rim exeat, an dam.

Quod ad cucurbitulâ attinet, iam vacuata materia primùm scapulis, tū pectori & vmbilico, postremò ventriculo & 12. dorsi vertebræ affigi debet.

DE MORB. INTERNIS

Quodd si nec his quidem resistit singultus, his locis phœnigmi aptari debet. Alij in malo contumaciori imperant 20 ellebori 3. i. galangæ, cinamomi an. ʒ. i. macerentur per noctem in vini maluatici ʒ3. colatura proximè. Nec omit-
tenda sternutatio, clamor, &c. eiusmodi.

IIIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Δύγξ καὶ
λνγμός.

Singultus mo-
tus vomitu
vehementior.

Δύγξ, λνγμός Hippocrati & Galeno, Latinis singul-
tus. Motus est eiusdem generis cum vomitu, sed fortior
& vehementior. Deinde per vomitum natura tantum
quæ in ventriculi spatio sunt, expellere conatur. In sin-
gultu vero non solum hæc, sed multò magis, quæ in
ipso ventriculi corpore hæret, altiusque & penitius im-
pacta sunt, atque ob id vehementiore motus est opus.
Id experienciâ perspicuum. Si quis enim acre aliquid, vt
piper deglutiat, siue cum melle, siue cum aliquo alio,
postea vinum bibat aqua calida téperatum, calore po-
tus ad interiora piper deducitur, & sua acrimonia ven-
triculum stimulat. Inde vt in tussi thorax, ita hic pun-
ctus aliunde vëtricus primùm dilatat sese, quò valen-
tius excutiat quod nocet: deinde, quasi collectis viri-
bus, sese distringit & compressione edit singultum. So-
nat autem, quod aer aliquis in vacuo ventriculi spatio
comprehensus prematur, & per angustiores vias red-

Vide Galen.
common. I. in
prorrh. sent.
21. & com.
2. in idem
Prorrh. sent.
59. & aliis
fere infinitis
locis.

Philoth. com.
in apho. 3. li. 5

datur. Quia ergò multa concurrunt in singultu, pro eo-
rum varietate ad diuersas facultates locis diuersis refer-
tur à Galeno, motricem videlicet, expultricem, natu-
ram solam, retëtricem, quòd dum dilatatur, cibos com-
plecti nequeat. Philoth. λνγμός πνός facit cõuulsionem.
Singultum verò, σπασμὸν. Musa ineptè vertit frigidum
pro animali. Quanquam non minus corporata passio
videtur in cõuulsione, quàm singultu. Hinc etiam du-
plex difficultas. An sit cõuulsio: & an præter inanitionem
& repletionem, quæ sunt cõuulsionis propriè dictæ
cause, à tertio quodã causarũ genere fieri possit. Qui cõ-
uulsionem esse aiunt, primũ Hip. & Gal. autoritate nituntur.

Sic enim aph. 4. lib. 5. Galenus scribit. Quod autem (inquit) singultus conuulsio sit stomachi secundum Hipp. nos vtrique nouimus. Deinde ratione. Quia nerui satis insignes, sed breues, à sexta cōiugatione in uentriculum perreptantes, ad suum principium contrahuntur, & partem cui inferuntur simul adducūt. Alij negant. Primum *Musa lapsus* quia conuulsio musculi propria est affectio. At neque ventriculus; neque ipsius os musculus est. Deinde dilatatur, antequam contrahatur, postea redit in naturalem situm: quod in conuulsione non fit. Præterea Hipp. in Aph. postquam de conuulsione loquutus est, singultum adiecit, tãquam tertium quid. Sed hæc disputatio nominis tantum videtur esse. Pro inde vtrisque respondemus ex Galeno ap. 39. lib. 6. Singultus verò cōcedatur (inquit) cōuulsio stomachi nominari, quando aliud fuerit sermonis propositum. Quando verò hoc solum studuerimus, ut passionis substantiam cognoscamus, melius fortassis fuerit non conuulsionem nominare, sed quendam motum eiusdem cum vomitibus generis, sed fortio-rem & vehementiorem. Hæc Galenus, cui addimus *ἡ ἀπὸ τῆς ἀφροδισιατικῆς* conuulsionem fieri, ut ait Philoth. Vbi *Musa pueri-* *lis error.* Musa ineptè vertit *ἀφροδισιατικῆς*, propositum, cum signifi- *Conuulsio* cet partem, quæ pro arbitrio mouetur. Est enim conuul- *proprie dicta* sio propriè dicta, inuoluntarius motus, in parte, quæ vo- *quid.* luntate mouetur Singultus autem fit in ventriculo, & sæpius in ipsius orificio. Differt ergo à conuulsione propriè dicta, motus formulæ, & partis affectus naturâ. Latius tamen sumpto nomine, conuulsio rectè dicitur Hippocrati. In altera difficultate argumenta quoque afferuntur in vtrâque partem. Galenus 8. *ἡ τῶν πνευμάτων* se non reperisse scribit in conuulsione tertiam causam supra euacuationem & repletionem. In singultu maximè, acres nimirum humores stomachum mordētes. In quo inconsistentiæ notatur, ut qui toties dixerit conuulsiones sæpe fieri demorso ore ventricoli ab acri humore, ab aura ascendente, humore aut semine putri in vtero, veneno, quæ causæ eedem sunt cum tertia, quam affert Galenus. Hinc efficiunt singultum & conuulsionem esse, & à duobus tantum causis, ut cæteras omnes conuulsiones, fieri, inanitione nempe, id est, summa siccitate, & repletionē

DE MORB. INTERNIS

per humiditatem superfluum, siue replendo nervos contrahat, siue grauet, siue qualitate aliqua vitiosa pungat. Videntur autem rursus homonymiâ decipi. Nam *ἰσχυρὸς*, singultum distinguit à propriè dicta conuulsione. In cæteris locis generalis vocabuli acceptio. Cum enim conuulsio fiat in musculis, & nervoso genere, nervi autè alij potissimum motui, alij insigniori cuidam & exactiori sensui destinati sint, ad voluptuosa retinenda, & noxia reiicienda, vt qui ad orificiũ ventriculi mittuntur, in illis acris humor pungens, aut venenosa quædam qualitas, vel aura, conuulsionem non efficit nisi per accides: vt in arthritide, in qua punguntur nervi, neque tamen conuelluntur: & in aura è crure ascendente, quæ non musculos cruris, sed ventriculos conuellit, & ad contractionem excitat. In posteriore genere contrà fit. Cum enim mordentur partes, quibus nervi illi insignes inseruntur, peculiari quodam motu, vt in tussi, sternutatione, epilepsia, vomitu, & in singultu, expellunt causam noxiam.

Galenus à calumnia liberatus. In quibus certè Gal. tertiam quandã causam agnoscere nobis videtur: in cæteris minimè. Ac proinde cõuenienter rerem naturæ scripsit *ἰσχυρὸς*, se non reperire in cõuulsione tertiam causam, vt in singultu. Quod etiam intellexit de aliis conuulsionibus, quæ eodẽ naturæ conatu sunt, quo singultus, nec sibi hac in re contradicit.

Et reuera qualitas quædam in pipere videtur, aut à sanie, aut corruptela, quæ neque inanitio, neque repletio dici potest, nisi minus propriè sumptis huiusmodi vocabulis. Sic enim, vt capite de conuulsione dictum est, aliquando referuntur omnia ad inanitionem & repletionem.

Fit hic affectus in ventriculo, stomacho, & œsophago, idque vel per *ἰσχυρὸς*, vel sympathiam à meningibus, intestinis, vtero, nervosis partibus, hepato inflammato.

Singultus causa. Causæ sunt inanitio, repletio, qualitas humoris, frigiditas, febris singultuosa, de qua lege Com. Gal. 4. Acui inflammatio meningum, ventriculi, hepatis, mesenterii, humor acris infarctus tunicis, punctio acrium humorũ, pituita tunicis hærens, rigor, vnde nervosa corpora duriora effecta coguntur, & proinde replentur, quia dilatari non possunt, sanguinis eruptio, longa inedia, temere adhibita nervis topica, materia, quæ euomitur, orificiũ vé-

eticuli irritans, vel in eo imbibita, aut abscessum efficiens. In inflammatione hepatis aut alterius partis communicatur affectio per nervos, & feruor stomacho, vel resudat bilis & regurgitat, vel comprimitur ventriculus. In inflammatione cerebri rubor oculorum permanens perspicitur, & qui non euanesceat post vomitum, licet aliquando etiam sequatur stomachi inflammationem, sed rarius. A bile vel corruptis cibis cognoscetur ex precedente vitio ratione, ructu, vomitionis sapore, colore flauo, calore. Ab inanitione ferè fit cum vehementissima siti.

Vt pars & occasio, ita grauius periculum. Nam in febre periculosus est singultus, nisi sit criticus, & signa coctionis manifestò appareant. Sic enim sæpe indicat crissim vomitione futuram. In histericis ab utero nō ita periculosus. Ab inflammatione vteri, deterior. A musculis & ossibus temporū, lethalis. A sanguinis fluxu, malum, vt ait Hip. Sed Galenus rectè addit, vt plurimū. Quod vidisse memini in nobili quodam quinquagenario, vel seniore, è familia D. D. Antragues, cuius ille erat æconomus. Effusa enim incredibili sanguinis copiā, euasit à cōuulsione, deliquis animi, singultu, adhibita cucurbitula, & sanus supervixit. A vomitu quoque malum. Cum enim vomitus, qui remedium esse debet, singultum gignit, ab inflammatione cerebri vel stomachi metuendū.

Erysimachus Medicus in conuiuio Patonis Aristophanem conuiuiam singultientē docet tria remedia singultus: continere spiritum (de quo lege Gal. de difficult. spirandi.) colluere fauces frigidā (contracto ad interiora calore, vel obtuso sensu) & irritare sternutamentum in vehemēti, nec aliis auxiliis cedente. Id (inquit) si bis, aut semel feceris, etiam si frequētissimus sit, tollitur. Respondet Aristoph. non prius cessasse singultū, quā sternutamento represserit. Gal. in Aph. distinguit id prodesse, si singultus sit à conclusis humiditatib. Eos enim, qui ex inanitione fiunt, qui sunt rariores, non sanat sternutatio: alios maximè. Concusso enim capite & ventre, tum reliquo corpore, maximè nervoso, excutitur materia, quæ singultum facit. Sicuti eadem calfacta successione, tenuatque, partim vacuata & discussa, partim translata in partes ignobiles, vt scribitur 4. de rat. vict. in acu. In

*Singultus
per symp-
toma factus
ex hepate in-
flāmato, aut
alio partib.*

*Singultus,
largo san-
guine effuso
sedatus.*

*Singultus
tria ex Ery-
simacho me-
dico remedia.*

pituita tunicis hærente incidendum, detergendum, vacuandum vomitu, pilulis, coquendum, roborandum, fortius ex oleis calfacientibus, vel sicci fortius humidis meliores, conspersa tamen aquâ vitæ, vel simili, cucurbitulæ primum scapulis affixæ, deinde ad 12. vertebra & ventræ. Si sit à biliosis humoribus vomitus, detergentia, in sanie acri, aromatica omnia, discutientia odorata surpanda. Odera enim stomachum colligunt, grauius olentia dissoluunt. In inflammatione ventriculi cauenda, quæ in inflammatione hepatis dicuntur. In omnibuscaussis, clysteres ad humoris deriuationem. Ligaturæ inducendo dolorem, singultum sedant, per fasciam compressio, phœnigmi perseverante malo. In vacuatione, nisi lethalis fuerit, lactis potus, optima iuscula, cucurbitulæ. Ab alimentis acerbis, aut medicamentis, oleum amygd. dul. oliuarum, butyrum, pisanæ cremor, aqua frigida. Sunt quædam vulgaria, vt experimentum, quod probari vidimus, compresso utrinque ad latera medico digito dextro, rei tristici narratio, aut insolite timor, aliò videlicet seducta virtute animali, quæ respiratione facit. Cuiusdam nullis remediis cedebat singultus, nisi vino Hippocrarco albo: cui refrigeratū fuisse ventriculum par est. In herniosis senibus sæpe fiunt singultuosæ febres: in quibus singultus non curatur, nisi reposito intestino. At si reponas vi, paulò post moriuntur. Itaque desperatio. Anno 1647. iuxta ædē. S. Stephani de saxi, Puella assidue singultiebat, nihil deglutiebat, dolore facto in œsophago. Antea pulmonibus bubulis largiter vsa fuerat. Huic grauitas in stomacho, nausea, vomitus. Frustulum tamen pulmonis, quem ederat, in œsophago restiterat. Cucurbitulis & idoneis remediis tandem reiectum frustulum, sicque liberata est.

Experimentum ad singultum.

Puella assidue singultiens.

Gal. comm. adaph. 39. li. 6. & cap. 2. lib. 3. de sym. caus. Et com. in sent. 59. Porrb. 2.

ANTO. VALETII EXERCIT. XXXIII.

Singultus est motus ventriculi violentus, eiusdem cum vomitu generis, sed intensus, atque eo vehementior: quo nititur facultas expultrix, quæ penitus ipsius oris ventriculi corpus infestat, vel quæ

Sunt tunicis obstinatius impacta, eaque mordentes vires habentia excutere, ac foras amandare. Huius affectus causæ sunt repletio, inanitio, acrium, aut se-
 roforum humorum appulsus. Fit autem vel per
 idiopathiam, vel per consensum partium quarun-
 dam, ut iecoris inflammati, vel corporis totius, ut in
 febribus ardentibus. Singultus à plenitudine sana-
 tur per ea, quæ infarcta secant, absterguntque, me-
 dicamenta per vomitiora & catartica. Inanitioni,
 quæ ferè incitabilis existit, debentur polychy-
 ma & euchyma alimenta. Sæpe ciet flatus singul-
 rum: sed hic admota cucurbitula, vel fomento è fla-
 tus discutientibus comparato facilè vanescit.

De Bulimo & Canina appetentia.

CAP. 34.

Bulimos unū famis genus est, 1 phagedæ-
 na alterum. Ingens atq; insatiabilis appe-
 tentia. Vtriusque multæ sunt differentie, &
 causæ euariant. Aliis longum iter per 2 frigora &
 niues, aut alioqui externū frigus inde affecto 3 sto-
 macho bulimi causa est. Sed initio quidem multa
 appetunt: postea verò cōcidit appetentia. Propte-
 rea hoc genus ita definit Galenus. 4 Bulimos castus
 est appetentiæ à frigiditate exteriore, ex indigentia
 totius corporis, & imbecillitate stomachi, qui & re-
 frigeratus nimium, & reficcatus est. Propterea vni-
 uersalis curatio in calefacientibus & humectantibus,
 tum balneis, tum fomentis & eduliis posita est.
 Appetunt ergò hi initio quidem vehementius, sed
 tempore nihil appetunt. Alia quoque species est,

1 Phagedæna
 nomen cata-
 chresticus pro
 canina appe-
 tentia sumit-
 tur. Commēt.

in sent. 37.
 sect. 3. lib. 6.
 τὴν ἐνδον-
 μίαν.

2 Quoniam
 aqua vorax,
 vigilia item
 vorax. lib. 6.
 ἐνδον.

3 Ventriculi
 scilicet orifi-
 cio: unde la-
 besactatur
 vis ciborum
 appetens.

4 Gal. lib. 1
 ad Glau-
 bulimum in-
 ter syncopes
 causas. enu-
 merat.

5 Singulari-
 bus quæ Græ-
 cè τρεῖς ὁμοῦ
 τα appellant.
 Dum enim
 syncopes me-
 tus ingruit,
 vniuersalia
 minimè sunt
 prescribenda.

cap. 19. lib. 5.
de historia
animal.

7 *Præsertim*
theriacâ. Vi-

de Gal. libr.

de theriaca
ad Pisonem.

8 Per apho.
8. lib. 2.

9 Apho. 7.
lib. 2. In qui-

bus nimirum
perfecta ex-

tenuationis,
nec inchoata,

signa appa-

rent, ab ex-

hausto par-

tiâ solidarû,

nec solum, spi-

rituû & hu-

morû, immu-

tatis partib'

nutritiôni di-

catis, in ha-

bitu, tempe-

ramento, &
actione.

10 Cibi li-

quidis, imbe-

cum acris & mordax humor inhæsit tunicis sto-
machi, ut nulla iam sit appetentia, atque ita con-
tabescat corpus. Meminit & alterius generis in lib.
de Theriaca.

Quibusdam nascitur in intestinis latus vermis:
is si diuturnius ieiunium est, lancinat intestinum,
& ventrem. Vbi verò cibus ingestus est, exugit at-
que depascitur, ex quo destitutum corpus alimento
emarcescit. Aliud quoque indicium est illius vermis
proditum ab 6 Aristotele, quod in egestionibus
alui similia seminibus cucurbitulæ, aut cucumeris
apparent. Excludendus is 7 vermis eo modo, quò
dicetur cap. de vermibus. Rursus 8 frequētissimus
est bulimus in iis, qui conualescunt: magis etiam,
si fuerit morbus longior. In his enim non solum
humor & spiritus, sed & solidæ partes detrimen-
tum acceperunt. Qua in re utendum erit præcepto
Hippocratis. 9 Quæ longo tempore extenuantur
corpora, 10 lètè reficere oportet. Quæ verò 11 bre-
ui, breuiter.

In breui enim morbo, humoribus quidem &
spiritibus aliquid detractum est: integræ verò at-
que incolumes solidæ sunt partes.

Quorum instauratio partim 12 odoribus pro-
pter spiritus, partim odoratis alimentis, & iis liqui-
dioribus, propter spiritus & humores, partim etiâ
solidis, si quidem partes elementares attenuatæ
sunt. Ad hæc leges Apho. Facilius est impleri potu,

quòd partes
solide (quarum proprium munus est concoctio) ab exhausto laborent, nec tam
facile partes nutritioni dicatæ à diuturno negotio ad otium se conuertant.

11 Dissipatis scilicet tantum spiritibus atque humoribus, superstite partium
integritate, Et nò labefactata naturali æconomia. 12 Hippoc. lib. de alimēto.

quàm cibus, quartum de sanitate tuenda, 7. methodi, & finem microtechnes.

Summa est, vt alimentis boni succi, qui facillè coquantur, distribuuntur, & nutrant, modica quantitate breuibus interuallis reficias : qui propterea quòd sæpe sitiunt, vino refouendi sunt hoc modo.

13 Lædit vinum vacuo stomacho ante cibum. 13 *Gal. comment. in aph. 21, lib. 2.*
Statim enim differtur in corpus : nervos offendit.
Vnde tremor, conuulsio, delirium.

Ex immodica verò quantitate, aut non conuenienti qualitate ciborum, recidiuæ fiunt. Tempestius est vini potus in medio cibo.

Post cibum interim dum alimentum conficitur, abstinendum vino, tum quia inde fluitat cibus, aut priusquam fuerit cōfectus, in corpus rapitur. Quo tamen tempore, si vehemèter siciant, tantum exhibendum est potus q. s. vt desiderium obtundatur.

Iam confecto cibo, & vt distribuatur, comparato, abundè bibant. Postremum verò genus canina appetentia est. Contumax illa, atque insatiabilis, in qua multos cibos ingurgitant, sed eosdem statim more canum reuomunt, quia, videlicet, natura multitudinem non sustinet. Nascitur ferè à frigido, acidòque humore tunicis stomachi imbibito, quo modo spongia liquorem aliquem exsorbet. Nonnunquam etiam à sola intemperie nasci volunt. Intemperies contrariis corrigenda est.

In vitioso humore conueniunt, quæ incidunt, detergent, calefaciunt. Diuretica quoque, eaque panis, vino, eduliis mixta, aut aliter exhibita, qualia sunt melicrata è thymi, origani, hyssopi, saturciæ, pulegij, alij, potri, & similium decocto, aut qui his

14 *Vt syrupus de mentha, aut de hyssopo, de ab syncho.* respondent 14 syrupi.

Purgandus quoque humor est 3. 2. hieræ pieræ ex conuenienti melicrato. Alioqui conficiendæ pilulæ ex pulu. hieræ & agarici trochiscati ana ʒ. 2. Quod si amarorem aloës ferant, hieræ puluis est melle incorporandus, aut ʒ. 6. electarij de hiera imperanda est.

Alioqui pilulæ fiant, quæ illinantur melle, aut puluis ex ouo sorbili exhibeatur. Potus multus vini, etiamsi non sitierint, conuenit, sed in medio cibo aut pleno ventre verisimilius, quàm vacuo.

Vinum giluum sit, aut vermiculum, nulla prædictum adstrictione, vetus, dulce, vel acriusculum. Hæc & cōtra causam faciunt. Contra verò symptōmata 15 edulia pingua, oleaginosa, quæ relaxant corpus ventriculi, quod acido humore adstrictum est, & vehementius appetit. Omnia frigida, & quæ adstringunt, vitanda sunt.

15 *Ne astituitate edendo frangatur vis vetriculi, & ex canina appetētia fiat bulimus.*

Stomachus oleo fouendus est, in quo thymum, & proximè dicta materia coxerit. Sed quia aliquādo consuetudo fit vomitus, nihil retinetur, atque ideo incalescit corpus, modica quantitas alimenti semel exhibenda est: quā etiamsi non retinet ventriculus, cucurbitula ventri infigenda est eo modo, quo capite de cholera diximus.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

βῆλιμος, καὶ κυνώδης ὀρέξις.

Βῆλιμος, & κυνώδης ὀρέξις nomina sunt ingētem famem & omnino præter naturam significantia. Plutarchus in Symposiacis βῆ scribit idem significare, quod πᾶν, quasi sit πᾶν λιμός, multa fames. Non eadem tamen huius vocis apud omnes acceptio. Aristoteles in Probl. generalius sumpsit pro fame à frigore, intro, compulso calore,

quæ leui cibo acquiescit. Gaza *βούλιμος* vertit caninam *Arist. probl. 2. sect. 8.*
 appetentiam. Aphrodisæus in Problematis confun-
 dit cum pica, quia multa, sed absurda appetuntur. Quam
 etiam fieri scribit à Colico morbo, refluxente vitio in sto-
 machum. Sed Medicis vsu esse solet pro ea duntaxat fa- *Bulimos me-*
 me, quæ contrahitur refrigerato & exsiccato ore ventri- *dicis quid*
 culi à frigore externo, qualis per niues iter facientibus *proprie sit.*
 contingere aliquando solet. Initio multa appetunt, cum
 nondum excessit modus refrigerationis, neque vomitio-
 nibus à cibo sumpto facile corripuntur. At ubi excessit
 frigus, ac robur stomachi resolutum, inappetentia con-
 sequitur & cibi fastidium, etiam si corpus nutritione
 egeat. Hinc imbecillitas ventriculi, animi deliquia, viriū
 exolutio, color fœdus, torsio stomachi, cordis & extre-
 marum partium frigus, pulsus obscuri. Suidas ex Medi-
 corum libris fieri ait hyeme iter agentibus per summum
 frigus, & niues, cum corpore densato intro pulsus calor
 alimentum depascitur. Liquatis niuibus, & calore aëris
 redeunte, exiguum calorem solui, ita ægros hoc morbo
 corripit. Galenus videtur aph. 21. lib. 2. à canina appetē-
 tia hoc solo distinxisse, quod famē non habeat amplius
 adiunctam, licet ab ea inchoauerit, causamque vnicam
 affert, frigus externum. In libro tamen de Theriaca al-
 terius speciei meminit, à latis vermibus & prægrādibus,
 qui chylum depascuntur. Sed hanc Auicennæ, Serapio,
 Trallianus ad caninam appetentiam referunt. Huic si-
 milis est *κυνώδης όρεξις*, id est, canina appetentia, quod *κυνώδης*
 neutra vacuatio corpori ex inopia alimenti, aut calami- *όρεξις.*
 tate frugis populo inuehatur, sed utrâque orijatur ab af-
 fecto ore ventriculi, & puncto à causâ præter naturam.
 Distinguuntur causis & symptomatis. Nam canina fames *Canina ap-*
 causas in vniuersum duas habet, refrigerationem sim- *petentia cau-*
 plicem, & siccitatem oris ventriculi, vt superior, & acidū *sa et sympto-*
 humorem ori ventriculi impactū, & pungentem. Acidus *mata.*
 autem humor duplex, pituita & melancholia. Deinde
 symptomata sunt diuersa. Nam hic à cibo perpetuus vo-
 mitus, & perpetuus cibi appetitus more canum. Cum
 enim causâ, quæ pungendo famem excitat, semper præ-
 sens adsit, & imbecillior virtus cibi copiam non susti-
 neat, necessariò sequitur vomitus. Hinc perseverante

DE MORB. INTERNIS

malo tanta imbecillitas, vt nihil ampliùs ventriculus contineat, alui profluuium, cœliacæ, dysentericæ affectiones, hydrops. Nulla, vt in superiore, animi defectio, nisi diuturnitate mali robur oris ventriculi dissoluatur. Atque hæc est propria essentia caninæ appetentiæ. Galenus tamen vocabuli significationem sæpe traduxit ad alia famis genera, quæ oris ventriculi vitio non fiunt: sed vel ab inanitionibus corporis, vt 4. de sympt. causis: vel imbecillitate retentricis, vt primo eiusdem operis: vel refrigeratis partibus thoracis & respirationis, libro de Vsu resp. Aëtius addit. Causa hæc adici potest, quæ tamen ab Aëtio memorata nō est. Vide cap. 6. Sermon, 1. Tetrabibl. 3. à raritate totius corporis, & occulta perspiratione. Sicque in vniuersum causas in fame canina cōstituere licebit, intemperiem solam frigidam, vbicumque sit, modò ad ventriculum perueniat, vt à niuib. & pota aquæ frigidissimæ: deinde pituitam acidam vel melancholiam: tertio dissolutionem totius corporis, siue exhauriatur insigni aliqua vacuatione, siue alimentis exigui nutrimenti, aut vsu assiduo detergentium, siue nimium transpiret. Quæ species ab aliis faciliè distinguitur, quia alui deiectiones pauciores & sicciore, quàm pro cibi ingesti modo, & qualitate. Cæteræ autem internoscuntur ex relatu ægri, excrementis, ructibus acidis, sapore oris acidò.

Remedia sunt, vomitus, deiectio, pilulæ, clysmata, iteratæ purgationes, opiata, linimēta. In resolutione optimè alentia: in refrigeratione, calfacientia, humectantia, balnea, fots, medicamenta, alimenta. Sed Hippocratis singulare remedium, vini potio. Galenus pingua primum dari iubet, vt obtundatur fames: deinde vinum ex eorum genere, quæ calfaciunt, qualia quæ fulua sunt, rubea, tenuium partium, sine adstrictione, idque in magna copia, licet non sitiant, siue ab intemperie frigida sit, siue ab acido humore. Aëtius quoque vinum exhibet & ieiunis & pransis. Sed in fame naturali admodum noxium ieiunis vinum dare, maximè verò giluum, acre, odorum, non adstringens, quia conuulsionibus & deliriis confestim corripuntur. Quòd si vini potione non remittatur, ob materiam coniunctā, purgato, & vetriculi
os robor-

os roborato. In iis qui per frigora & niues morbum contraxerunt, videndum, ne subita fiat mutatio subito, multum calefaciendo, quia sic calor exiguus & languidus dissoluitur: aut subito nutriendo, quia suffocantur. Si in deliquium animi inciderint, Archigenes reuocari docet odoramentis aceti, pulegij, panis intincti, malis, pyris, aut aliis fructibus, qui ad manum sint. Extremæ partes constringantur, pungantur maxillæ, vellantur capilli & aures. Reuocatis damus panem vino intinctum, deinde carnem suillam, & quæ multum exigua mole nutriunt, oua sorbilia, bulbos, cochleas, aromatica.

Galen. lib. 8. de compos. medicam. 11. 12. 13.

ANTO. VALETII EXERCIT. XXXIII.

Fame assidua dum quis cruciatur, & tamen asumptus cibus ita grauat, molestusque est, ut cum mox vomere, aut per inferiora deicere cogatur, appetentia immoderata, & canina fames vulgo dicta inuadit. Gal. comment. ad aphor. 21. lib. 2. duas eius causas agnoscit, vel frigidiorum ventriculi intemperantiam solam, vel acidos, quos exorbuerit os ventriculi, humores. Hæc quia in cæliacam, aut dysentericam affectionem, hydropem, cachexiam, denique in atrophiam, commutari consuevit, sedulam requirit curationem. Si sola sit intemperies frigida, victus calidus remedio est. Si præterea humor adsit, parabitur syrupo acetoso, oxymelite, syrupo de hyssopo. Vacuabitur verò hiera picra, diaphœnico, dacartharm. agarico & rheo in aqu. fœnicul. beton. vel oxymelite Galeni infusis.

Famis canina causa duæ

Curatio

De iecoris inflammatione. CAP. 35.

Inflammat iecur gibbis & cauis partibus. Vtrunque propriis & indicibus distinguatur, ex cap. 6. lib. 5. de locis affectis.

Humoris morbifici & partis obfessa propriis.

DE MORB. INTERNIS

2 In inflam-
matione he-
patis, si etas
& vires per
ferant sine
infirmittatis
metu, recte ce-
lebratur phle-
botome, cum
ad declina-
tionem causa
antecedentis,
& amotione
coniuncta, tū
ad procura-
tionē pepas-
mi, & mate-
rie exclusio-
nem.

3 Vel. ℥ a-
guar. end. ci-
chor. agrim.
ros. ana 3 3.
aceti 3. 6. san-
tal. rub. ℥
citr. ana 3 1.
caphura ʒ. s.
fi. epithem.
pro iecore, dū
excandescit.

4 Potior est
Græcorū sen-
tētia tum per
se, tū ex cū-
tu. Per se qui-
dē, quod ro-
bur seruē: ex
euentu, quia
scirrhum vi-
tant.

Curatio alia Græcorum, alia Arabum. 2 Con-
uenit tamen de phlebotomia. Statim ergo clyste-
rem mollem iniice ex ℥b. 1. decoct. communis. 3. 3.
olei violati. In quo dissoluantur 3. 6. cassiæ, mellis
rosac. & sacchari rub. ana 3. 6. Reddito clystere eo
tempore, quo æger minùs calere videbitur, declina-
tione accessions, venam basilicam diuidito. Quæ
si non apparet, media, aut etiam cephalica, vulne-
randa est. Probatum quoque antiquis Medicis, vt
venæ extremæ manus aperirentur. Galen. eam ele-
git, quæ ad pollicem vergit, & benè successit. Pau-
lus, quæ ad minimum. Razes, quæ ad medium. Sed
ex his parum sanguinis effluit. Grauis autē inflam-
matio est, & febris, quæ vacationem desiderat &
subitam, & copiosam, etiam ad animi deliquium,
nisi partis nobilitas repugnaret, quæ sine graui de-
trimento subitam plurimamque vacationem non
sustinet: ex quo temperanda est vacuatio. Gale-
nus ad finem septimi Methodi, & lib. 13. multam
vacuationem facit: sed cæteris non consentienti-
bus partitur. Adde quod calidius & siccus hepar
minùs calido & sicco difficilius fert copiosam va-
cuationem, etiam si & inflammatio & febris vtrā-
que magna. Quod attinet ad topica, Arabes refri-
gerantibus vtuntur, quale hoc est.

℥. succi solatri repidi 3 4. cum linteolo, aut stu-
pis cannabinis fiat 3 epithema. Aliud.

℥. aquæ ros 3. 4. aceti 3. 6. santalorum rubro-
rum & citrinorum ana 3. 6. caphuræ ʒ. 1.

4 Græci relaxantibus vtuntur, quibus aliquid
aromatum admixtum sit, quod adstringendo ro-
boret. Vtriusque scopus est, vt refrigeretur hepar:

Græcis præterea, vt vis eius conseruetur. Arabum remedia qualitate propria refrigerant. Græcorum verò per accidens. Nam apertis poris, resoluta in fumos materiâ, calorem hepatis euacuant. Græcorû.

℞. summitatum absynthij, carnis cydoniorum concisorum ana ʒ. ʒ. Decoquantur in aqua & oleo ad consumptionem aquæ: cum stuppis cannabinis, aut linteolis in expresso oleo merlis foueatur regio hepatis. Aut, mala cydonia purgata & contusa in aqua pluuiæ coque, & cum farina hordei & scœnugræci cataplasma confice. Galenus 13. Methodi vino incoquit. Coqui etiam possunt in absynthij decocto. Alioqui.

℞. ol. de absynthio, & cydoniorum ana ʒ. i. ceræ ʒ. ʒ. liquefiant in vase duplici. Refrigerata malaxentur cum succo endiuiz, cichorij, aut simili. Olea conueniunt: rosatum, de cydoniis, de mastiche, absynthio, spica, scœnuantho, in quo santala coxerint, quæ adstringendo roborant. Relaxant verò oleum de amygdalis dulcibus, de chamæmelo, anetho, meliloto, in quo althææ radix coxerit, oleum lini.

5. Hæc olea simul confirmant, & in temperiē sedant.

Sæuiente dolore, tritici farinam in decocto absynthij & anethi coctam, & sacco immissam, utilissimum erit apponere. Sunt qui costum & calammum aromaticum cum liquore conueniente patienti ieiuno ebibendum præcipiunt, vt ægrum in latus postea decumbat. Aliis decoctum absynthij pontici modico conditum cinamomo probatur.

Vbi fluxio maior est, maior quoque infirmitas visceris, plus adstringentium, alioqui plus relaxantium miscendum est. In summa lenientibus, re-

soluentibus, relaxantibus, roborantibus vsi sunt veteres: aliquando etiam remollientibus, vbi iam durities suspecta esset. Mucagines cōueniunt cum semine cydoniorū, althææ, lini, fœnugræci. Quod

6 *Vt iulepus rosatus syr. malor. granatorum.* ad potiones attinet, vitanda sunt quæ 6 refrigerant & adstringunt, nisi 7 aliquid commixtum sit, quod detergeat & aperiat. Propterea aromata antiquis probata sunt. Vti licet schœnuantho, spica nardi, calamo aromatico, cinamomo, folio, asaro, santalino, caphura. Materia verò potionum ex hordeo. Syrupus acetosus, zolapium factum ex aqua vel decocto capill. ven. cichorii, endiuia, fumarie, cuscute, glycyrrhizæ, hepaticæ, quatuor sem. maioribus & minoribus cum octaua parte sacchari, &

8 *Vt. 24. aquæ hordei 3. 8 syr. capill. veneris 3. 1. f. potio.* momento cinamomi, spicæ, & similibus. 8 Syrupi de cichorio, endiuia, capill. ven. de fumarie, sed plurimum diluti non cum dupla, aut tripla aqua, sed potius sextupla, aut octupla. Diluendi verò supradictis aquis.

9 *Vt diarrhoeum Abbasis, diamar-garitis frigi. electarium triasantalinum.* Electaria, 9 quibus confirmatur hepar, proximo capite dicentur.

Probatum est hoc oleum antiquis, etiam inflammato hepate.

24. rutæ P. 2. schœnuanthi 3. 1. sem. lini 3. 2. mediū capitis papaueris. Coquantur omnia in oleo. Ceratum santalinum cum 10 oleo conuenienti malaxatur, capiantur 3. 3. cerati. Malaxentur, extendantur in aluta, fiat scutum ad formam crescentis.

11 *Ad digestionē, sublato inflammationis metu.* Emplastrum 11 de meliloto, de althæa, vbi maturandum est apostema, itēque celsi ceratum descriptione Philagrii, & Galeni, diachylon. Malaxentur cum oleo de liliis, aut in quo radices

althææ coxerint. Emplastrum factum ex contusis foliis brassicæ, & melle, emplastrum ex ficubus pinguibus, althææ radice, coctis in oleo. Si magis resolvere consilium est, emplastro de meliloto adiicimus nonnihil ammoniaci, absynthij, aut similium: ex quibus pustulæ, seu vesiculæ excitantur, quæ oleo rosaceo percurantur. Quod si suspitio est infirmitatis, aliquid olei de absynthio & aromatum commiscendum est.

Reliquiæ clysteribus, & leuibus pharmacis subducendæ sunt, ¹² si quidem malum est in cauis hepatis. Quod si in gibbis, & copiosior materia est, primum quidem iisdem remediis, ¹³ deinde etiam diureticis utendum erit, radice graminis, cichorij, endiuizæ, acetosæ, apij, petroselinij, fœniculusci, asparagi, & aliis, quæ postea plenius dicentur.

Laudata herba eupatorium ab antiquis, & maiorana. Cucurbitulæ ¹⁴ usus tum initiis, tum inueterato morbo. Quidam enim è veteribus, postridie quàm missus fuerat sanguis, cum scarificatione affigebant dextro hypochondrio: relinquebant vulnus in crastinum, atque iterum affigebant. Alij verò iam inclinato morbo, ut reliquias vacuarent, similiter applicabant.

DE IVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Ut Pleuriticos, & Peripneumonicos, qui lateris aut pulmonis inflammatione vexantur, ita *ἡπατιτικούς*, à iecore inflammato veteres appellauerunt. Recentioribus alia huius vocis significatio, de qua dicitur capite sequente. Fiunt autem sæpius in hepate inflammatio, abcessus, scirrhus, imbecillitas, obstructio, vesicæ aqua plenæ in membrana extrema, quæ si rumpatur, hydropisum generat. Cauendum imprimis ne fallamur, si quâdo tumor apparet

¹² Nam causa hepatis per deiectiones, conuexa per vrinas expurgatur.

Galenus ad finem libr. 7. Metho. med.

¹³ Nam quæ natura viâ affectat, eoducere oportet per loca lege naturæ idonea.

¹⁴ Si hepar non sit infirmum, si foras euocanda materia, si non sit fluxio perennis. *ἡπατιτικόν*.

DE MORB. INTERNIS

in medio ventre. Nam quibusdam, vt quotidianis anatomis cernitur, hepar extenditur ad sinistras partes. Deinde diligenter distinguendum, num in musculis sit inflammatio internis, externis, aut in gibba parte, vel caua, & ne pro phlegmone hepatis, pleuritidem iudicemus.

*Iecoris inflā-
mationis com-
munia & ne-
cessaria si-
gna.*

Cōmunia & necessaria signa sunt in inflammatione iecoris tumor, dolor, febris, & ex his spirādi difficultas, actus ficula inanis. Aliquando hepar ob pondus deorsum inclinans tendit diaphragma, vnde membrana succingens costas diuellitur, sicque dolor ascendit ad clauiculas. Febris ardens est, lingua arida, rubēs initio, deinde nigra & aspera, sitis inexhausta, nausea, cibi fastidium, singultus.

*Iecoris gib-
barum inflā-
matarum à
causis distin-
ctio.*

Distinguuntur partes gibbæ à cauis hoc modo. In parte caua dolor grauis, singultus, nausea magis torquēt. Fluxus vētris adest, nisi robustius sit viscus, quod, exuctis humiditatibus, deiectiones faciat. *σπυγγώδης*, & velut in globulos præ siccitate coactas vomitio biliosa, maior sitis, linguæ ariditas & asperitas. In gibba, dolor pūctorius ob ligamentum cum diaphragmate, vrinæ magis rufæ, partes vicinæ, vt septum, magis opprimuntur: vnde difficilior respiratio, tussicula manifestior, dolor ad dorsum acutior ob ligamenta, tumor tactu deprehenditur. Inflammatio inter cutem cognoscitur tactu ob

*Musculorum
abdominis in-
flammatorū
signa.*

tumore, visu, quia calida rubescit: frigida sine febre, vel dura, vel laxa. In medio ventre, retinet figuram musculorum, tumor externus maior, dolor acerbior. Sed ad exactiorem dignotionem lege caput 6. & 7. lib. 5. de locis affectis, vbi Stefiani & Theagenis historiarum. Si in abscessum vertitur, lethale, cum ad carnem vsque hepatis corruptio pertingit, & pus simile apparet faci olei, ex incōcta putredine propriæ illius substantiæ. At si pus intra tunicas contineatur, nihil patiente substantiā hepatis, vacuato pure liberantur omnes. Neque enim necessarium est hepate suppurato hominem interire, nisi magnum sit vitium. Vnde Hippocr. 2. de Morb. Pulmone suppurato, si album & purum pus effluat fibris etiam cruentis intermixtis, ægrum conualescere, si vitello oui simile, & subuiride pus, crassum ac fœtidum mori. Nam pus album alteratricis robur ostendit, & victoriam naturæ.

Remedia sunt, ex eodem latere sanguinis missio, cucurbitulæ in coxis, clyfma, syrupi, olea, vnguenta, cataplasmata. Gal. ad finem libri 7. Meth. in alteratione videndum præcipit, ne dum calorem extinguimus, temperiem naturalem labefactemus: & 13. topica initio nunquam adhibenda esse frigida. Magna ex parte bilis crassior fit in calore hepatis, sed ienuanda, temperanda, & si in cauis, declinante morbo, vel etiam maturata phlegmone, per aluum purgâda: in gibbis per renes sed primo leuioribus vtendum. Neque tamen, si contrâ fiat, tâtus error est, quantum Auicenna scripsit. Nam si venosum genus per medicamêta purgari potest, gibbæ quoque poterunt. Sed eò commodius, quò natura repit. In cauis, clysterib⁹, deiectionis, cnico, polypodio, epithymo, mercuriali in ptisana, & iusculis, primum vtimur, deinde fortioribus, centaurio, colocynthide. In gibbis à diureticis leuioribus ad fortiora paulatim transeundum, ne materia concreascit in scirrhum. Ad id maximè commoda habentur apozemata laxantia, quæ & humores præparant, & vacuant. In duritie videndum præter cæteras partes, vt moderatè molliamus. Vincant incidentia & tenuantia, aromata misceantur. Seruandum enim robur partis.

ANTO. VALETII EXERCIT. XXXV.

IEcori, vti aliis visceribus, morborum genus duplex accidit: à sola intemperie vnum, citra tumorem præter naturam: alteri, vbi vnâ cum intemperie tumor quoque adest, vt inflammatio, erysipelas, scirrhus, inflatio & obstructio à crassis & viscidis humoribus. Inflammatione verò obsidetur hepar, dum sanguis vel exuperantia, vel tenuitate, vel feruore & acrimonia, vel externarum causarum impulsu, percussione, torsione, lapsu, strictione forti & cõtinaua, zonæ, diploidis, è venis immoderatiùs prorupens, in visceris corpus copiosior secedit, & carnosam partis eius substantiâ, in qua cunctando putrescit, imbuir.

Hepatis inflammationis causa.

*Hepatitis
signa.*

Iecur inflammari ex dolore & grauitate dextri hypochondrij cum febre acuta cōiunctis facile quidē intelligimus: sed quia nūc gibbæ, nunc simæ partes phlegmone prehēduntur, totūmq; continuum est hepatis parenchyma, maxima in illis distinguendis difficultas versatur: quæ tamen à Gal. cap. 6. lib. 5. de loc. mal. affect. diligēter excutitur. Inflammationi incipiēti quàm citissimè occurrēdum, enemate blādo ad fæces deturbandas prius iniecto, deinde copiosa sanguinis missione è basilica dextra, si vires ferant: alioqui pauca, sed repetita. Purgās autē medicamentum quanquā phlegmonosa habētib. hypochōdria minūs est cōmodum, licebit tamē benignū aliquod imperare, corpore præsertim cacochymo existēte vt.

*Gal. comm.
ad aph. 24.
lib. I*

℞. syr. de cichor. compos. cū rh. 3. i. cū aq. stillatitia, aut decocto cichorij, vel endiuiz, vel acetosæ, f. potio. Aut. ℞. cathol. dupl. fenn. & rhab. 3. 6. syr. laxatiui ros. pallid. & de cichor. simplic. ana 3. ℞. cum aq. hord. vel decocto pectoral. f. dosis.

Topica interim repellentia & adstringentia, vt in alijs fieri solet inflammationibus, admouebuntur, sed quæ actu frigida nō sint: nam natura partis, quæ & princeps est, & publico officio fungitur, atque etiam situs repugnant.

℞. ol. ros. & cydon. an. 3. i. cum cerato santalino f. linimentum. Vel. ℞. oleorum eorund. vel mastichini & nenuphari. an. 3. 6. mucag. semin. psyl. & cydon. extract. in aq. plantag. & absynthij 3. i. puluer. calam. aromatic. & absynth. ana 3. i. cum cera f. litus.

Cera pauca, vel nulla admiscetur, quia emplastica cū sit, diffilationē prohibendo maiorem inducit calorem. Ad eundē scopum faciēt syrupi sanguinē temperantes, vel apozemata è radicib. acetos. oxy-lapath. cichor. totius, plātag. totius, agrimon. lactuc.

portul. ros. endiu. scariol. capill. ven. seminib. frigid. floribus cardiacis, & similibus. Longius progressa inflammatione, sanies collecta detergeri vult: inflammatis quidē gibbis, magis per vrinas: simis verò, per secessus. Vrinæ ciebit hoc apozema.

℞. radic. gram. acetos. polypod. quer. petros. passul. mund. glycyrrh. ras. an. ʒ. i. cich. end. agrim. omnium capill. bipinell. brion. ana M. i. semin. quat. frigid. maior. an. ʒ. 2. flor. cardiac. an. p. i. f. decoct. ad lb. i. In colatur. dissol. syrup. de althæa, syr. capill. ven. & syr. acetos. simpl. an. ʒ. i. f. apoz. clar. conditum, vt est artis.

Cum fortioribus fuerit opus, addentur valeriana, petros. Macedonicum, & alia id genus diuretica valentiora. Quod attinet ad deiectoria medicamēta, quæ potiora cēsantur cauis hepatis inflammatis, ea mitiora esse debēt: nam vehemētioribus phlegmone augeretur. Quinetiam dum prouecto morbo istis locus est remediis, alia atq; alia particularia deligenda. In incremēto digerētia repellentibus mixta: vt ol. chamæmel. nardin. absynth. capparinum. At in statu sola satis sunt digerētia, nisi inflammatio pergat ad suppuratum. Vbi semper videndum ne emollientium vsu visceris robur dissoluamus. Digeret commodè hoc emplastrum.

℞. massæ emplastri de meliloto, & empl. de mucaginib. ana ʒ. i. cerati santalini ʒ. ʒ. Emolliantur cum oleo de absynth. aut cappar. f. emplastrum.

Id antequā applicetur, fouēda erit regio hepatis ex decocto absynth. flor. chamæ. ros. rubr. calam. arom. femin. anis. lini scenic. Proderit tādē intēperiem à materia in hepate relictā digerere sūptis & admotis. ℞. specier. electarij diarhod. Abbat. & triasantal. an. ʒ. 2. vel ʒ. i. rasur. eboris, corn. ceru. an. ʒ. ʒ. sacchar. in aq. gra. vel agrim. vel capill. ven. dissol. q. s. f. electar. per lozēg. Cap. vnam singul. matutinis.

DE MORB. INTERNIS

1 *Aqua debilitate nominatur hepatici, q̄ ipsa per se cōsistit sine tumore, aut solutione continui.*

2 *Omnis enī debilitatiū in tēperies soboles existit.*

3 *Quā magis Graeci vocāt, cuius est propriū munus hæmatosis.*

4 *Qui aut qualitate, aut copia peccant. 5 Ob intemperiem frigidam.*

6 *Hæc excretio hepatica dysenteria nominatur, seu rubra alui proluit.*

7 *Prorrhæci.*

8 *Ubi inchoatur hæmatosis. Gal. lib.*

9 *4. de vsu par.*

10 *Gal. cap. 7. libr. 5. de loc. malē affec. et*

11 *lib. 8. de cōpos. phar. local.*

Idem præstant cōseruæ ros. violar. cichor. Admo-
uebitur ceratum santal. cum oleo ros. emollitum.
Tandem verò abscessus si sequatur, vt plurimūm fu-
nestus. Vt enim ab eo vita diutiùs protrahatur, sen-
sim tamē tabescēte corpore mors interuenit, quod
videlicet vlcus hepatis ægrè detergeatur, ob perpe-
tuā partis humiditatē: vnde hæmatosis frustratur.
Attamen Claud. Rousseletius primariæ notæ Do-
ctor. Medicus, hepatidem ad suppuratum saluis
ægri rebus perductam obseruauit.

De 1 debilitate hepatis. CAP. 36.

Debilitatis hepatis 2 intemperies causa est, tu-
substantiæ 3 visceris, 4 tum humorum, qui
venis & arteriis continentur. Atque imbe-
cillis est attractrix, retentrix, alteratrix, & excretrix.

5 Attractrice infirma liquida deiciuntur per al-
uum, vt alteratrice vetriculi infirma: sed hîc cruda
& incocta. Infirma attractrice hepatis, non ita cru-
da, sed ad chyli formā accedentia. Hepate verò at-
trahente, sed nō alterante chylum, simile quid lotu-
ræ carniū aut sanguinis, quem aqua diluerit, 6 ex-
cernitur. Postea verò non rudimenta sanguinis, sed
deteriore qualitate excremeta effluunt. Cuius rei
causa hæc est. Frigidiorē hepate alteratrix infirma
est. Itaque rudiorē sanguinem, quem à 7 me-
senterio accepit, non conficit. Vnde per interualla
excernitur, 8 & loturam carniū repræsentat. Vbi
verò resistit, crassescit, tempore angustias hepatis
intercipit. Cum non perspirat, suboritur febricula.
Interceptus humor putrescit, atq; adurit, quo tē-
pore nō iam dilutus sanguis, sed veluti fæx sangui-

nis excernitur. Excretio illa lucet, atq; aliquando in atram bilem conuertitur. In frigida intemperie color faciei pallidus, pulsus tardus, vrina alba, aliàs tenuis, aliàs crassa, non ita frequens, neque copiosa deiectio, neque grauitèr olēs, nisi cum iam corrumpitur. Appetentia aliquando corrumpitur, aliquando intenditur: nulla sitis.

Calidam verò intemperiem sequitur color faciei flauus, celerior pulsus, vrina flauo calore saturata, prostrata appetentia, sitis vehemēs, fastidiū graue, agitatioq; corporis, insignis febris, excrementa alui olida, biliosa admodum, crassa, crocea, mordacia, vomitus quoque virulenti, æruginosi, ex 8. de compositione particularium medicamentorū, 7. cap. lib. 5. de locis affectis.

In calida dispositione fotu atque irrigatione primū vtēdum est, è cham. ros. mastichino oleo, in quo absynthij comæ vel dactyli incoxerint. Laudatum remedium Græcis & Arabibus, frequens v-
sus cichorij, end. Oportet autem hæc vel refic-
ta infriare aqua hordei, vel incoquere aqua purissi-
ma, & adiecta sexta vel octaua parte sacch. potio-
nes conficere. Augebitur autem sacch. modus, vel
minuetur pro ratione. Hæc eadem in frigida con-
ueniunt, sed loco sacch. diluemus mel (aperit enim, sy-
terget, purgat, vrinam ciet) aut vtēmur syrupo de
cichorio simplici cū aqu. absynthij, cuscutæ, & simi.
broche ex oleo cydon. & rosaceo: linimentum ex cerato santalino in oleo cy-
don. dissoluto. Admoneatur etiam ceratum santalinum toti hypochondrio dex-
tro in formam lunæ crescentis. Immisceri poterit puluis coralli rub. aut ros-
rub. 18 Vt conficietur potio quotidie manē ex decocto radic. cichorij, in quo
sub finem decoctionis absynthij Romani coma maduerit. Exhibetur iusta dosi
cum tabella electarij santalini.

9 Nam color
humorū. si nō
sint refluī, si-
milis est more
florū. Galen.
cōm. ad apho.
2. lib. 1.

10 Pigro mo-
tu dilatatur
arteria.

11 Hæc cru-
ditatis index,
ex aepsia &
cruditate in
venis. 12 Ex
perturbatio-
ne à flatu len-
to spiritus.

13 Quale enī
est alimentū,
talis & elu-
cet color.

14 Quam ca-
lor resoluūt.

15 A calore,
& bilis in
ventriculum
affluxu.

16 Ex motu,
putredine hu-
moris, & sy-
natismo, quē
hepar gignit.

17 Fiat em-

DE MORB. INTERNIS

Optimúmque fuerit eas aquas prius condire modico cinamomo, aut adiciere aliquid eorum quæ aperiunt, quale hoc est. Interim roborabit iecur, atque eius incendium temperabit id electarium.

℥. puluer. diarrhod. Abbat. sine moscho, triasantal. diamargarit. frigid. ana ℥. i. rasuræ eboris 3. s. cinam. elect. cornu cerui ana ℥. s. sacchari rosacei quantum satis sit, fiat electarium per lozengias auro cooperiendas, ponderis 3. 3.

℥. endiu. cich. siccāt. & pul. ana ℥. 2. sem. securidacæ ℥. i. cina. ℥. s. fiat puluis, detur è vino albo tenui.

19 *Melicratum
ti & sus in ca-
lida hepatis
intemperie vi-
tandus.*

Laudant veteres 19 melicratum è filicis radice detergendo & liberando, sine calfactione manifesta, aut refrigeratione.

℥. rad. chamæpytheos 3. 2. rad. cichorij 3. i. schœnanthi 3. 2. coquantur in quartariis tribus aquæ purissimæ ad dimidias. Colaturâ percola per manicam Hippocratis cum sacchari albi 3. i. cinamomi ℥. s. sunt qui radices easdem siccāt, tritas cribrant, & melle exceptas ad nucis ponticæ magnitudinem ex aqua conueniente exhibent.

20 *Præter
ea laudatur
electariū san-
talinum sim-
plex ex tri-
plicato rheo.
ut. ℥. specie-
rum triasantal
℥. 2. rhei
elect. 3. 2. sac-
chari in aqua
absynthij dis-
soluti 3. 3. f.
electariū per
tabellas pōd.
3. s. Detur
alternis die-
bus.*

Conferet quoque mirificè hic syrupus. ℥. senecionis, agrimonix, cichor. endiuix ana M. s. glycyrrhizæ 3. i. semin. anis. petros. fœnic. ana 3. 2. cinam. spicæ Celtic. an. 3. i. s. decoctio ad quart. 3. In colatura dissolue mell. 3. 4. s. syrup. mediocriter coctus.

In frigida & imbecilli retentrice atque cōcoctrice.

℥. nardi Celticæ 3. 6. absynthij 3. 2. cinamomi 3. s. cribrata melle excipe. 20 Fiat electarium, aut decoque in aqua, atque inde melicratum compara. Vel eupatorium, absynthium, & alia id genus hepatica vino & aq. incoquantur. Ad fotum eadem concisa

in oleo chamæmelino & vino maluatico coquuntur, dum vinum sit absumptum: oleum seruat ad litum.

Vinum, frigidior & humidior hepate, coquit, roborat, putredinem arcet, intemperiem corrigit. At si febris accesserit, subtrahendus penitus eius usus.

Vbi nullus febris metus, vinum præscribi potest eiusmodi. ℞. rosmarini M. i. rutæ p. i. spicæ Celtic. cinamomi ana 3. i. Hæc in vino macerata leuiter feruefiant: vinum propinetur.

In frigore & inde obstructionibus olea conueniunt, in quibus elenij, iridis, gentianæ, costi radices coxerint. Eademque quoque radices infriantur, & insperguntur melicrato, vel exceptæ melle exhibentur. Cochleæ & lupinum iecur trita, & in puluerem redacta ex vino imperantur. Sic etiam ex pulpa passular. myrobalanorū, hepate lupi, & electariis conuenientibus opiata finguntur.

Electarium de vino Arabum, quod Xiphoides ab Andromacho, & aliis Græcis appellatur.

℞. passul. mundatarum 3. 3. croci 3. i. calami aromati. 3. 2. β. bdellij 3. β. cassiæ 3. 2. β. cinamomi 3. β. spicæ 3. 3. myrrhæ electæ 3. 4. terebinth. 3. 4. schœnuanthi 3. 2. β. siliquarum 3. 2. mellis 3. 2. vini subtilis, quod sufficit. Fiat electarium. Addebant alij in calidior hepate seminis hyoscyami albi, opij an. 3. i.

Materia ferè conuenit, quæ penetrat, aperit, lenit, adstringendo roborat, absterget, incidit, putredinem prohibet, exiccat.

Vtimur ergo ad penetrationem cypero, schœnuantho, croco, iride, aromatibus. Eadem quoque aperiunt. Cui rei etiam pistacia, marrubium, absyn-

21 Vel sic cō-
ficies. ℞. pas-
sul. damasc.
mundatarum
lib. β. Coquā-
tur ad pultis
consistentiam
in vino vete-
ri & generoso.
Trassundantur ceta-
ceo. In cola,
dissol. confer.
anthos, corti.
citr. conditi,
cinam. in 3. i.
spec. aromat.
ros. diamar.
cal. ana 3. β.
vel 3. 2. f. o-
piata, detur
quotidie ma-
ne sub horam
somni ad 3. β.
cum vino ve-
teri.

thium, & alia, quæ capite de obstructione hepatis dicuntur. Leniunt ficus, passule, vinum granatorum dulcium, vinum subdulce & tenue. Absterget mel, aqua mellis, terebinthina, & quæ inde distillantur aquæ, aqua quoque hordei.

Incidit acetum, vinum granatorum maturo-
rum, & acidorum.

Roborat schœnuanthum, absynthium, eupato-
rium, rosæ, spicæ. Præseruant à putredine, & si quid
est virulentum, corrigunt imprimis, cinamomum,
deinde cassia lignea, nardus, iuncus odoratus, schœ-
nuanthum, calamus aromaticus, crocus, myrrha e-
lecta, aspalthum, passulæ, rasura eboris, cornu cerui,
vnicornu, vinum, mel, terebinthina, aromata om-
nia. In exsiccando vtuntur spodio, cuius loco vti
licet saccharo rosato, admixto cinere, facto ex ossi-
bus elephantis.

A proprietate conuenire volunt rhabarbarum,
spicam, passulas, iecur lupinum, carnes cochlearum.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Hæmangi dicuntur, non vt veteribus, qui hepatis in-
flammatione laborant: sed cum citra manifestū aliquem
illius affectum imbecillitas sola acciderit ex intempe-
rie. Cum autem intēperies omnis nata sit, vt ait Galenus,
actionem lædere, nō tamen omnis imbecillitatem hanc
efficit, quam hepaticis tribuit. Cuius proprium est, san-
guinem probè non conficere, sed crudum, semicoctum,
& aquæ modo liquidum generare, siue calida sit intem-
peries, siue frigida. Sed & in calida sæpe aduritur san-
guis, tantū abest, vt semicoctus maneat. Facillioris er-
gō doctrinæ gratiā duplicem intemperiem constituere
licebit: vnā, quæ iam ad iecinoris substātiā peruene-
rit, illiusque vires & harmoniam dissoluerit, ita vt imbe-

*Gal. libr. de
inaquali in-
temperie.*

*Iecoris du-
plex intem-
peries.*

cillitate contracta suum officium non faciat, nisi diminutè. Alteram, citra imbecillitatem, intensa videlicet, aut remissa qualitate aliqua, ut calore & frigore, quæ tamen nondum naturalem constitutionem ita labefactârît, ut facultatis vires sint imminutæ, sed potius corruptæ. In priore perpetua est excretio sanguinis aquosi & semicocti, siue à calore sit, siue à frigore. Distinctio ex effectibus causarum. A calore enim cibi fastidiû, sitis, febris, vitiosorum humorum vomitus. A frigore, contraria. In posteriore, si calida sit, assatur chylus, in bilem vertitur, vrinæ ruffa, alui excrementa crassa, biliosa, fœtida, acrida, ventris adstrictio, ob vehementem attractionem à nimio calore, oris amaritudo, sitis, interna manuum caliditas, pedum pulsus celer. In ambitu corporis pruritus, calidi fumi. Et, si bilis in ventriculum fluat, nausea, biliosa vomitio, & similia. Sanguis autem non crudus, ut in superiore, sed adustus potius cernitur. In frigida contraria omnia apparent, pituita, frigus totius corporis, color faciei albus, habitus corporis tumescens, nisi calor cordis impediat, excrementa pauca, parùm olétia ob cruditatem, ventris profluuium certis temporibus. In sicca, corpus ficius, squalidius, sanguis paucus, crassius, venæ duriores. In humida contrâ fit. Causæ externæ, internæ, quæcunque immodicè refrigerant, calfaciunt, siccant, humectât. Partium item consensus, intestinorum gracilium, venarum mesaraicarum, epiploï, splenis, folliculi fellis, renû, vesicæ, venarum, quæ omnes partes hepatis inseruiunt ad præparauonem alimenti, excrementa recipienda, sanguinis delationem, vel coctionem iuuandam.

Hecoris intemperierum ex causarum effectibus distinctio.

Ab intemperie cum imbecillitate vix curatur. Sed in eo elaborandum ne augeatur, occurrendo causæ, & roborando. In calore remedia sunt aquæ potus, alimenta refrigerantia, syrupi, tabellæ, conseruæ, epithemata, vnguenta, cerata. In frigore, eadem, sed contrariis qualitatibus. In siccitate, humiditatem instaurantia, potus lactis, balnea, proprietatem occultam habetia, & quæ hæcticis conueniunt. In humiditate contrariis occurrendum. Valent hepar piscium, anserum, animalculorû, capreolorum, agnorum, terebinthus, pruna paulula, acetosa. Possunt macerari in sero lactis, aqua hordei, lacte, vi-

Hepatis intemperies cum imbecillitate contrâ vix curabilis.

no, decocto cinamomi, & aliis, vt res postulat, dum turgcant imaces, cochleæ, decocta hepatica. Yua passa tantum astringit, quantum opus habet viscus affectum. Neque enim eget magna astringentione, neque tanta, quanta ventriculus, tota substantia hepati familiaris. In calore vsus mollis casei, cremoris lactis, & similium. Optima sunt, inquit, passim Gal. quæ vnâ cum hoc, quod intemperiem curant, etiam alunt, familiari, scilicet, parti laboranti, vinum, mastiche, confectiones Andromachi, Hepar humidiores habet compagem. Itaque non fert remollientia, nisi moderata, oportetque in indurato hepate calfacientium & attenuantium modum statuere præter morem aliorum viscerum. Bubula, & vini potus nimius Æstate hepati infestissima sunt, & bilem ad hepar multam, collicunt. Hepatica sunt agrimonia, intybi species, senecio chamæpytis, radix filicis, acetosæ, asparagi, plantago, eupatorium, absinthium, sœncus, &c.

*Hepatica
simplica.*

ANTO. VALETII EXERCIT. XXXVI.

Hepatis imbecillitas duplex.

Hepatis imbecillitas, à qua hepatici nominantur, citra manifestum vllum visceris vitium fieri consuevit. Atque hæc vel natiua est, vel adscititia. In vtrâque imbecilla si fuerit hæmatosis, prodeunt alui excrementa loturæ carniū similia. Intemperierum autem, quæ huius affectus causæ accensentur, signa distinguuntur ex Galeno cap. 8. libr. 8. de compos. medicam. *ἔ τὸ πῶς.*

Hepatis imbecillitatis curatio.

Imbecillitas à quauis intemperie per contraria corrigitur, additis modicè adstringentibus, atque etiam aperientibus & detergentibus. Ferè fit enim, vt imbecillo in iecore excrementa colligantur, quæ obstructionem pariunt. Itaque imprimis rhei dilutū ex decocto aperiente præscribitur, vel hic bolus.

℥. terebinth. Venetæ (quæ lenit, terget, vacuat) lotz in aqua endiuizæ aut cichor. 3. 3. rhei electi puluerari 3. i. f. bol.

In calida

In calida causa conferunt remedia hepatis inflammationi dicata. In frigida verò, quæ obstructioni hepatis à pituitoso humore instituuntur.

De 1 morbo regio.

CAP. 37.

1 Abile toto corpore suffusa.

REgius est verò signatus nomine morbus, Molliter hic quoniã celsa curadus in aula. Inquit Serenus. Hoc idẽ Corneli⁹ Celsus.

Debet enim omnibus curis esse vacuus ac solutus ictericorum animus: quin & splendido conclauui, lasciuiis, cantu, iucundis quoque sermonibus laxandus est. Varro quia curatur mulsæ, morbum regiũ dictũ existimat. Vocatur & hic morbus arquatus vel arcuatus. Icterus, quia ictida, id est, viueram, animalculũ, quo cuniculos excludunt (vel *mustellã colore oculorũ aureo*) vel Galbulam auem colore repræsentat: qua ratione & aurigo dicitur.

2 Eaque vesicula fellis.

3 In quo est interdum impressa venenosa quedã qualitas.

4 Imò multã persape.

5 Quæ à venis rarefactis rapiuntur.

6 Naturalẽ, criticam, aut symptomaticam.

Causa ferè 2 obstructio, nonnunquam inflammatio, aut intemperies 3 hepatis. Et obstructio quidem vel hepatis, vel pororum bilis: 4 lapillus aliquando concretus in folliculo fellis, aut adnatum tuberculum. Nonnunquam quia cystis fellis multitudine intercipitur, vel quia vis eius excretrix infirma est. Venena quoq;, aut bibita 5 pharmaca, nec per aluum reddita, huius vitij causæ aliquando extiterunt.

Primũ itaque est, vt 6 causam agnoscas: deinde vt eandem tollas: postremò icterum cures. Interrogabis ægrum, num sentiat grauitatem, tensionem, dolorem in dextro hypochondrio. Manum quoq; admoueabis, vt intelligas, num tumor & durities ali-

DE MORB. INTERNIS

7 Et sit hy-
pochondrium
λαπαρυ, &
omnino a-
quale.
8 Unde nec
vllam subesse
perene icteri
generationē.
9 Ut agri
monia, suma
ria, melilotū,
furfur.
10 Vesicula
felli, & ve-
narum hepa-
tis. Tali e-
nim obstru-
ctione exitu
& aditu pro-
hibetur bilis
in felli vesi-
culam.
11 Vel 3. 10.
ne illud ex-
crementū vi-
aperientium
in venas fe-
ratur, obstru-
ctionemque
pariat.
12 Quod na-
tura clyster
naturalis de-
negetur, ex
eo quod bilis
exitum non
habet in in-
testina.

qua subsistat. Quæ omnia si 7 absunt, & excreme-
ta alui, vrinæ similiter, naturaliter habent, iudicabis
8 incolumē iecur esse: cæterum effusam in corpus
bilem, quæ colorem cutis descēdat, quia crassior
est, exhalare ac resolui non posse. His ergo victum
liquidiorē atque humidiorē imperabis.

Balnea aquæ dulcis, in quibus quæ 9 detergēt,
atque resoluunt, decoxeris. Si verò adsunt, ventē-
que subsistit, albida excrementa sunt, cineritia, &
argillosa, vrinæ verò spissæ, colore croceō saturatæ,
aut etiam nigræ, tum obstructionis certum indicatiū
est. Inflammatio perpetuò cum febre est, de qua
prius. Obstructio ergo prius curetur, deinde dele-
bitur icterus.

Primum itaque aperientibus & detergentibus
insigniter liberanda est 10 obstructio. Verum si su-
spitio aliqua est excrementi in ventre & primis ve-
nis, cassiæ aut catholici 11 3. i. ex sero lactis impera-
bis. Et quia in hoc morbo aluus 12 ferè adstricta est,
vtilissimus est clyster, cuius materia sit ex iis, quæ
stercus durius emolliant, quæ resistantem bilem ir-
ritant, quæ musculos & instrumenta excretionis
incitent. Sic enim placuisse veteribus Aphodiscus
scriptum reliquit.

℥. maluæ, bis maluæ, violariæ an. M. i. furfurum
pinguium M. ℥. fiat decoctio ad ℥b. i. plus minusc.
In qua dissolue mellis communis, sachar. rubr. ana
3. i. salis communis 3. 2. olei communis 3. 3. Hæc est
formula, qua per intervalla vti oportebit, vbi diu-
tius venter restiterit.

Postea si sanguis multus est, basilicam aperies, ac
pro ratione sanguinem educes.

Solitæ quoque hæmorrhoides incitandæ sunt, & menses in mulieribus, venæ sub lingua, non nisi inclinante morbo aperiri debent. Tum enim ea phlebotomia tempestiua est. Tum de ¹³ purgatione agendum est. Meminisse autem oportet nunquam utendum purgationibus, obstructo hepate insigniter, nisi prius feceris viâ aperiētibus & detergētibus.

Que sit huiusmodi, ut materiam morbum facientem radice citius extirpet.

Aperiunt autem oxalis, cichorium, endiuia, apiū, adianthum, calamintha, fœniculum, gentiana, anchusa, aristolochia, melanthium, secutidaca, chamæpythis, rosmarinus, serpillum, hypericum, martubium, asarum, anisum, petroselinum, amara omnia, aromata, terreni vermes, cornu cerui, ebur, cornu vnicornis. Quorum omnium herbas, radices, aqua incoques, aut vino tenui, atque inde cum saccharo aut melle portiones comparabis, aut redacta in puluerem ad 3. 2. mulsæ aut vini albi tenuis & similia 3. 3. aut 4. insperges.

Syrupi in vsu sunt de cichorio, endiuia, capil. ven. de byzantiis, de duabus & quinq; radici. syrup. acetosus, de acetositate citri, oxymel simplex. Aquæ verò endiuix, cichorij, lupulorum, cuscutæ, fumarix, capil. ven. acetosæ, scolopédrij, raphani, apij, fœniculi, lappæ, rubeæ, lybistici, eryngij, rusci, asparagi, & similia. Oportetque initio primùm ut leuioribus, sedque per intervalla. Assiduus enim aperientium vsus vehemēter lædit. Atque vbi his vsus fuerit, purgationes imperabis ex seri lactis 3. 4. in quibus per noctem maduerint 3. 2. carthami conquassati, cinamomi, vel ireos florentinæ 3. 6. Alioqui rhab. 3. 2. infusas in aqua endiuix cum modico cinamomi. Idem pondus ¹⁴ hieræ pictæ, hieræ diaco-

Si pituita obstructio nem faciat, hiera picram commodè usurpabit.

DE MORB. INTERNIS

locynth.conuenire potest. Alioqui.

℞. pul. hieræ diaco. ℥. 4. rab. electi ℥. 1. cornu cerui, rasuræ eboris, cinamomi ana ℥. 8. Dabis hæc ex sero lactis, aut aqua hordei. Tum ad aperientia redeundum est, & iterum purgandum interuallis. Quod si his malum non cedit, medicamentis vtendum erit, quæ fortiùs aperiunt & detergent. Atque iam dacrydio & colocynthide cathartica acuenda, vt proximis Gr. 8. 6. 4. dacrydij admiscenda sunt. Alioqui.

℞. dacrydij ℥. 1. florum anthos, borraginis, & violarum ana P. 8. cinamomi, asari, rad. gentianæ ana Gr. 8. Fiat infusio in sero lactis. In col. 3. 4. dissolue sacchari 3. 8. fiat potus.

Vomitus quoque etiam cum elleboro, de quibus antea, probati sunt. Ita curato viscere, color fœdus delendus est thermis siccis: deinde balneo ex chamemelo, anetho, calamétho, fœniculo, rosmarino, parietaria, & furfuribus. Statimque à balneo, linteis asperis, & materia balnei perfricandum corpus est.

Potiones ex supradictis aperientibus & detergentibus exhibendæ.

Sternutamenta & errhina, qualia priùs descripta, conueniunt.

Oculi & facies aceto albo, aqua hordei, succo granatorum, oxysacchara, succo coriandri, acetosa, acetositate citri. His quidem repidis fouenda sunt & contingenda. Nunquam autem venies ad fœditatem coloris, nisi sublata causa, & curato viscere. Quod si durum est, fouebis ex aceto, in quo althææ & lilij radices, ficus, passulæ, coxerint: tum 3. 3. em-

plastri de meliloto, vel dialthææ malaxat. cum oleo amygdalarum dulcium induces: vel ammoniaci ʒ.2. in aceto dissolutas applicabis. Superioribus remediis vtêris, sed admixtis iis, quæ leniunt & emolliunt.

In materia venenosa initio quidem vomitus, si cò materia vertitur. Si ad intestina, clyster acris. Si in habitum corporis, cucurbitulæ cum multa flamma conueniunt, & ea omnia, quæ foras materiam attrahunt. Ex quo, syrupo acetoso, de limonibus, oxy sacchara, de acetositate citri, cum aquis acetosæ, endiuiz, 15 calendulæ, papaueris rubri, dictamni, tormentillæ, seu succo granatorum, berberorum, li-
 monum, citri, lacte acetoso, in quo flores cordiales
 leuiter bullierint, rasura cornu vnicornis, cornu cer-
 uui, eboris, electario de vino, & paulò ante descriptis
 capite de debilitate hepatis remediis vti oportebit.

15 *Melissæ quoque, morsus diaboli, cardui benedicti, & sim. pentaphylli.*

Theriacæ & mythridatij vsus. Dantur quotidie ʒ.2. aut ʒ.1. cum ʒ.1. acetositatis citri, aut liquore còuenienti.

Virginibus, quas hoc 16 vitium defœdat, purgatio ex hiera. Imperatur ʒ.1. ʒ. ex aqua halicacabi (vulgò Alkekengi) cuscutæ, endiuiz, oxymelite. Alioqui.

16 *De huius curatione fusi in sple-nicu affectibus.*

℞. hieræ picræ ʒ.4. rhab. electi, agarici trochiscati, ana ʒ.ʒ. rasuræ eboris, & cornu cerui ana ʒ.ʒ. cinamomi Gr.8. croci Gr. 4. incorporentur omnia in 17 ʒ.ʒ. catho. Deinde dissolue in sero lactis, aqua cuscutæ, aut liquore simili.

17 *Vel ʒ.6. Exhibitur autè iis præmissis, quæ ad obstructa liberanda præscripta fuer.*

Imperetur quoque hoc electarium. ℞. triasantali, diarhod Abb ana ʒ.ʒ. vtriûsque diamarg.an. ʒ.1. rasuræ eboris, cornu cerui an. ʒ.ʒ. sacchari in aqua cu-

DE MORB. INTERNIS

18 *Diacur-
cuma etiā &
confectio al-
kermes miri-
ficē profunt.*

scuræ & rosomaringi dissoluti quantum sufficit. Fiar elect. per lozengas pondere 3. 1. 18 Dentur manē & vespere per se, vel cum liquore conuenienti ex cochleari. Vel solum triasantalinum electariū cum duplicato aut triplicato rhabarbaro satis esse poterit. Alioqui.

Ammoniacum ad ʒ. 2. ē mulso radicis capparis, vel aromatico vino, exhibitum tanta pollet facultate, vt multos iam ad hydropem properantes liberarit, vacuatis mirabiliter per ventrem visceris obstructionibus. Destillatur inde arte chymica oleum conuenientissimum.

℥. rad. gentianæ in puluer. redactæ ʒ. 4. cornu cerui & rasuræ eboris ana ʒ. 2. cinamomi ʒ. 1. sacchari ʒ. 8. detur sæpe medium cochlear ex vino albo, tenui.

℥. semin. anis. apij, asar. absynth. amygdal. amarar. ana partes æquales: terantur. Ex quibus tritis cum aqua cuscutæ fingantur trochisci.

Vel etiam, ℥. cortic. radicis capparis 3. 9. feminis acetosæ. 3. 6. cortic. radic. fœnic. 3. 3. f. puluis detur ʒ. 1. ex aqua conuenienti media nocte, vel in siti.

Vtatur quoque per interualla decocto cicerum rubrorum, in quo radices petroselini & cichorij coxerint. Epotis id genus medicamentis decumbat æger in latus ægrum.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

*Ictericus
flauus & ni-
ger.*

Icterus iecinoris vitio flauus: lienis, niger: uterque, mixtus & virescens, vt puellis quibusdam. In omnibus

effunditur bilis in vniuersum corporis habitum. Differtia ex causarum varietate & modo sumuntur. Si obstruatur meatus à iecore in folliculū fellis, quia plena adhuc est vesicula, excrementa alui vniūq; colorata erunt: sin alter à follicullo in ecphyim, alba & cineritia, quia bili praelusus est aditus ad intestina. In vtroq; affectu bilis non secernitur: regurgitat in iecur & venas: sanguini permiscetur: effunditur in totū corpus, vnde aureus color præcipue oculorum, ob candorē. Pars per renes expulsa vrinas aureas, crassas, impuras efficit. Si calida sit & sicca intēperies hepatis, multitudo bilis inde procreata icterū generabit. Sed excrementa quoq; alui, vt cæteræ partes, bile perfusa apparebunt. Idem præstat imbecillitas secreticis, quæ genitam bilem non separat à sanguine, vt in obstructione, scirrho, inflammatione, imbecillitate hepatis. Idem quoque facultas expultrix in morbis acutis per crism, vel læsa retentrix, & superata humoris copia, multitudine, malignitate. Sed quò distinctius & exactius causæ omnes discernantur, imprimis videto, an cum morbo acuto sit, an per se: si cum morbo acuto, an die critico factus fuerit apparētibus coctionis signis, iecore non indurato. Sic enim optimæ crisis indicium, superante expultrice facultate. Contrā, malum, præcipue ante diem decretoriū, superata retentrice. Anceps tamen prælagium, vt dicetur. Quòd si sine morbo acuto sit, imprimis excrementa inspicito. Nam si alba, vel parū colorata, obstructio est. Si deiectio alba, vrinæ flauæ, nullus tumor in hypochondriis, neque tensio, & dolor quā parte porus cholagogus decliuis, obstructus est ille meatus. Si colorata deiectio, vel est imbecillitas iecoris, vel intemperies calida, vel morsus venenatorum animalium, vel pharmacorum deleteriorum potus, vel aqua corrupta, vt in expeditione Neapolitana. Duo priora distinguo ex propriis capitibus, in quibus agitur de imbecillitate, inflammatione, scirrho, obstructione hepatis. Nam ab his etiā tribus postremis sunt icteri, auctore Galeno Apho. 62. lib. 4. Verū scirrhus diuturnus morbus existit. Inflammatio & obstructio repente fieri possunt. Adde signum ictero ex imex flatu in intestinis. Nā *πνέματα*, id est, flatuosi sūt, beccillitate de qui ex imbecillitate ictero vexantur. Contrario modo tēti flatuosi.

DE MORB. INTERNIS

afficiuntur, qui ex calida intemperie. Non ignore Hippocratem scripsisse aphor. ultimo libris. regio morbo laborantes non multum ventosos esse. Quod cum experientia repugnet, quâ flatibus ictericos abundate constat, interpretes in varias sententias distraxit. Sed flatu in ventre fieri certum est caloris nativi imbecillitate, vel multitudine & qualitate materie. Ergo cum ferè morbus regius apud nos ex multitudine crudi humoris ortum habeat, qui imbecillitate caloris colligitur & obstruit, nec detergitur influente bile, necessario ita affecti erunt *πνευματώδες*. Quibus verò temperantior victus, multum exercitium, calidior morbus, vel hepar, crassior bilis, intemperies calida, nisi accesserit imbecillitas, flatuosos non esse consentaneum est, quod Hipp. significat. Proinde non ineptè hoc signum adiecimus. Morsum venenatorum, aut pharmaci deleterij potum ex relatu egri, vita antecedente coniuncto.

*Flatuum pro-
uentus unde.*

*Ex ictero a-
cutis superue-
niente præsagium fallax.*

In morbis acutis præsagium quàm sit fallax ex ictero superueniente, historiæ multæ in Epid. demonstrant. Quibus adduntur quædam nostræ observationes. Inter cæteras, anno 1545. quidam sexto factus ictericus, comota aluo biliosa deiecit, urinis nigris & multo felle tinctis. Febris expers iam ambulabat, quasi omnino liberatus. 14. recidiva. 17. obiit. Aliis duobus idem accidit. Quidam admodum robustus ante 7. ictericus factus, ægerrimè & cum recidiva euasit. Anno 1549. mensibus Aprili & Maio (quo ferè tempore Lutetiæ febres tertianæ exoriuntur) multis aureæ urinx, & morbus regius primis diebus. Cuidam nobili ita affecto detractus sanguis ter ad octo ferè vascula iteratis vicibus. Sanguis totus & spumâ, & consistentiâ flauus. Visus est conualuisse. 17. recidiva, alui profluuium, bilis crassa & meracior, singultus levis. 21. obiit. Laborauerat aliquando lue venerea. Multos in Epid. ante septimum ictericos factos euasisse legimus. In Coacis Hipp. ἢ δὲ μὴ σκληρὸν ἄσπαχόνδιον, salutarem esse, 7. 9. 11. 14. Si induretur, ambiguum, ἐνδύασον. Galenus de rat. vict. in morbis acutis, in biliosa febre, ante 7. ictero cum rigore vel horrore morbum solui voluit. Si verò absque rigore, ἐξω τῆ κατάρων, lethale. Vbi criticum ictericum sine tumore, aut inflammatione hepatis, & excretionem consequentem, horroris vel rigoris nomine in-

tellexisse videtur. Sed de his alio loco.

Criticus non curandus. In febrem, inflammationem, scirrhum, obstructionem hepatis intentum esse oportet. In cæteris biliosa purganda, sine attractione vehementi per aluum, renes, vomitum. Suppressa vacuatione, & in plenitudine, venę sectio, à basilica, sub lingua. Hinc balnea, sudorem mouentia, masticatoria, errhina, regia vita, topica, denique omne purgationis genus, quia in totum corpus malum sparsum est, vt scribitur in lib. Quos purgare oporteat. Multos se curasse Romę Galenus testatur antea præparatos incidentibus, aperientibus, deinde medicamentis cholagogis. Lege cap. 7. lib. 5. de locis affectis, & libellum de purgantium medicamentorum facultate. Cõueniunt aperientia, detergentia, cuscuta, erinaceus, ammoniacum in mellito vino, vel aromatico, oleum inde distillatum, vermes terreni triti in melicrato (quibus curatione recepit Dom. Tronson, Senator Regius) aqua raphani Auicennæ (Sic rustici raphani succum ad 3. 4. cum meraci vini 3. 1 sibi exhibent) eupatorium, gentiana, apium, asarum, absynthium, amygdalæ amaræ, radix caparis, triasant. triplicato rhabbarbo, marrubij decoctum. Charadriõ à voragine, vel voracitate, vilis auis, quæ credebatur visa icterum soluere. Propterea venditores occultabant, ne emptores conspecta aue curarentur, priusquam emissent. Inde nomen ei, qui rem vilem quasi magni prætij occultat & dissimulat. Suceus fumiterreæ, cicchorij, inde syrupi cum sero lactis, lac, cremor lactis cum fragis, caseus mollis, iuscula ex hord. acetosa, lactuca, cicchorio, scariola, ius prunorum, ex oleribus conuenientibus acetaria, ius pullastri alteratum cum oleribus conuenientibus, calidam hepatis intemperiem corrigunt. Si sola intemperies, tantum alterandum. In quibusdam oxymel cum decocto guaiaci. Viscum collectum in alba spina, vel etiam in quercu, zona è linteis consutis includitur, cingitur nouem diebus, experimento vulgi.

Gale. lib. de Theriaca.

ANTO. VALETII EXERCIT. XXXVII.

Icterus symptoma facultatis sanguificæ, vel excreticis, biliosi humoris est per summa corporis

DE MORB. INTERNIS

effusio, in adnata primùm oculi tunica apparens. Ab hepate & liene quanquā promiscuè originem habet, quòd ea viscera in humorum procreatione, secretionēque plurimùm occupentur, sæpiùs tamē ab hepatis inflammatione calidam venarum intemperie, bilis plurimæ procreatricē, accerfente, intēperie, scirrho, obstructione, aut à similibus id genus affectibus cystim fellis, cysticōsue meatus obfidētibus accidit. Sæpe fit icterus per crises biliosarū febrium, naturā materiam noxiam ab alto corpore foras protrudente. Qui lienis vitio ingruit, niger est, humoris ideam melancholici referens: vt qui à bile est porracea, aut ab epoto veneno, itēque bestiarum virulentarum demorsu, viridis. Hippocrates

Hippoc. lib. de intern. aff. sect.

albi etiam icteri commemorat.

ICteri signa abinuicē distincta.

In icteri signis distinctione est opus, vt pars verè affecta dignoscatur. Iecoris affectum, hoc est intēperiem, ostendunt deiectiones & vrinæ biliosæ: quæ intemperies si coniunctam habeat inflammationem, grauitas in hypochondrio dextro fatigat. Vesiculæ autem obstructionē, vrinæ solæ bile plurima perfusæ, & deiectiones albicantes. Totius denique corporis habitus vitium inculamus, cum deiectionibus & vrina naturaliter habentibus, color & sudor bilis speciē cum pruritu resipiunt. At verò vbi venenata est causa, ad propria venenorum assumptorum signa recurrendum.

ICteri curatio quam varia.

Vt sunt icteri causæ variæ, ita diuersa remedia. Vbi sola iecoris intemperies subsistit, sola contraria alterantia, vt assumpta zulapia, refrigerantia apozemata, & extrinsecus adhibita cerata, refrigerans Gal. santalinum, atque etiam epithemata, vsurpantur.

Vbi inflammatio adest, remedia antè explicata vsui erunt. Vbi obstructio cum iecoris ipsius, tum vesiculæ fellis, fortiores clysteres, qui ferri solitos ad cum humores irritado retrahant, phlebotome, apozemata aperientia, incidētia, & tenuātia, cholagoga cathartica præscribentur. Clyster erit huiusmodi.

℞. hord. integr. fursur. macr. ana p. ij. quatuor remolliētium, flor. chamæm. melil. ana M. i. s. semin. anis. alth. fœnic. & lini ana 3. 2. f. decoctio ad lb. i. vel tantundē feri lactis accipiro. In colatura disso. cathol. & hierę simplicis (si febris absit) ana 3. s. diaphœnici 3. 2. mell. ros. sacchar. rub. ana 3. i. olei viol. 3. 3. f. clyster.

Post reiectum clystērē pertunditur vena potissimum plethoricis corporibus. Deinde verò tali apozemate humor ad purgationē præparatur, quia hîc sæpe bilis etiam crassior fit, aut per se, aut humoris alterius, vt pituitosi vel melancholici, admixtione.

℞. radi. gram. apij, fœnic. oxylapath. cichor. cum toto an. 3. s. polypod. quern. passul. mund. sem. cartha. tamarind. ping. elect. ana 3. 6. fol. scolopend. chamædryos, chamæpyth. agrim. cuscut. summitat. absynth. lupul. & asparag. ana M. i. glycyrrhiz. ras. 3. i. quatuor sem. frigid. maior. ana 3. s. prun. damasc. n. 8. hord. integr. p. s. flor. cardiac. ana p. i. f. decoct. & colat. ad lb. i. In qua dissol. syrup. de cichor. simpl. syr. capill. ven. & oxymel. simplic. ana 3. i. s. f. apozem. clar. conditū 3. s. cinam. & 3. 2. santa. citrini: sumat bis in die 3. 3. aut 4. horis duabus ante pastū.

Ab his sumat medicamentum sequens.

℞. decoct. pectoral. aperitiu. q. s. fol. sennæ mund. 3. 2. f. decoc. In colat. pro vna dos. infunde per noctē rh. elect. 3. 2. cinamom. 3. 2. In expressione dissol. cathol. & syrup. capill. ven. ana 3. s. diaphœnic. 3. 2. f. potio.

Pauperibus diaprun. solutium, electar. de succo rosar. dissoluuntur in decocto hepatico aperiente, in sero lactis, aut vino albo, aut aqua gram. aut

DE MORB. INTERNIS

Gal. initio lib. 9. de cōpo. med. 27. τὸ πρῶτον. endiuiz. Paulò valentiora purgantia esse debent, quoniā in huiusmodi obstructione, & expultricis facultatis imbecillitate, difficilior purgatio : quæ tamen temperabuntur, si id febris suaserit faciūdum.

1 *Quæ vario rum morborū soboles ut pateres est, agros alimento defraudat, et anadofsimimpedit.* Postquam corpus sufficienter fuerit purgatum, & humorem cuti subiectum discutere oportebit, æger hoc balneum ingreditur, quod quatuor, aut quinque dies continuabit.

2 *Sacculis, emplastr. theriaca, masticis, li- tu &c.* 4. rad. oxylapath. oxalid. radic. alth. lilior. an. 3. 4. enul. camp. 3. 2. viol. fol. malu. bismal. parietar. acetos. cichor. cum toto, bugloss. fumar. fol. vitis, hederæ terrestris an. M. 3. Bulliant simul pro balneo vniuersali. Coniiciatur sacculus plenus fursuris, super quem sedeat.

3 *Hi enim nō facile pepas- mū recipiūt.* A balneo Galenus anethino oleo, aut chamæmelino corpus confricat.

4 *Ab humo- ris acrimonia tunica vellit- cantis.* Et quidem solis ferè balneis cum frictionib⁹, aut litubus relaxantibus & discutientibus est opus, quādo vitium in habitu tantū corporis insidet : vt fit in criticis icteris, qui septi. vñdec. vel decimoquarto die febribus biliosis feliciter superueniunt. Si venenata sit, causa, alexiteriis oppugnabitur. Si niger icterus, valebūt remedia in affectibus lienis præscripta.

6 *A flatu.* *7* *Ob interce- ptam anadof- sim, et prauo- em humo- rum pleonexiam.* *8* *Pravitate succi, et calo- re diffuso cō- tranaturā in prauū excre- menti suffusione.* *9* *Mota, quiete, dilatatione arteria.* *10* *Compressione dia- phragmatis, aut sympathia tunica costas succingentis.* *11* *Non sunt enim de- sectiones figuratæ, sed molles, ex seri copia, & præclusa anadofsi.* De 1 oppilatione hepatis. CAP. 38.



Ppilatur hepar à crassis flatibus, sed facile discutiuntur : non ita facile, si à 3 cras- sis viscidisque humoribus : ferèque senti- tur lancinans 4 dolor aut 5 grauis, aliquādo 6 tē- sio, facies 7 male colorata est, squallor 8 cutis, pul- sus 9 inæqualis, spiratio 10 etiā aliquando difficilis, excremēta 11 à natura euariāt, ferèq; liquidiora sūt.

Curatio magna ex parte ex proximo capite re-
petenda est.

12 Incidendum, 13 aperiendum, 14 detergendū,
à 15 quo purgandum est. Et, si 16 cætera consen-
tiunt, è basilica, aut venis extremæ manus sanguis
educi debet, nisi suppressis mensibus, aut hæmor-
rroidibus 17 malum natum est. Tum enim venæ
cruris potius 18 incidendæ sunt.

Materia incidentium, aperientium, & detergen-
tium proximo cap. descripta est. Peculiariter conue-
niunt syrupus acetosus, oxysacchara, syrup. capill.
ven. de cichorio, de endiuiâ, oxymel simplex, qui-
bus initio, & ubi caloris suspitio, vtendum est. Item
oxymelite scyllitico, syrupo de bizantiis, de duabus
& quinque radicibus, cum aquis cuscutæ, fumarizæ
& aliis suprâ descriptis. Probatû hoc est à 19 multis

℞. 20 aquæ decoctionis hordei ℥.8. aceti ℥.8.
vini granatorum ℥.4. sacchari, mellis albi ana ℥.1.
Fiat zuparium clarificatum & aromatizatum cum
modico cinamomi, vtatur ℥.3. 21 manè & vesperi.

Purgatio ex hieræ 3.2. cum oxymelite, aut quæ in fœdis virginum coloribus scripta est, ex rhabarbaro & agar. addito aliquando acrydij momento, quales hæ erunt pilulæ.

℞. rhabbarbari ʒ. i. agar. ʒ. ii. dacrydij Gr. ʒ. i. cum
oxyelite formentur pilulæ, vel dissoluantur in li-
quore ʒ. conuenienti.

Contra obstructions certissimū remedium esse
volunt frequentem vsum huius pulueris.

24. electarij diarhod. Abbat. triasantali, rosatæ no-
vini granatorum 3. 4. mellis lb. 1. aceti ad gustum f. zupaii. 2
bus ante cibum mane, itémque vespere duabus horis post cibum.
sumaria, agrimonia, cuscuta, vel decocto radicum aperientium.

DE MORB. INTERNIS

uellæ ana 3.2. detur 3.1. ex cochleari cum sex granis mali granati.

℥. succi granati acidi & dulcis ana 3.1. 8. resideant per noctem in salubri loco : postridie addatur oxymelitis 3.1. fiat potus.

℥. succi end. cocti & depurati 3.1. oxysacch. simplicis 3.4. Liberabis obstructionem, calorem temperabis, viscus roborabis, putrida excludes.

Filicis radix & semen securidacæ plurimum probantur antiquis.

Ad hæc præscribenda erit diæta ἀκριβὲς καὶ σκεπὴ, quæ æquè naturæ studeat, & pugnet cum morbo.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Hepatis obstructio quæ fiat. Obstructio fit in venis capillaribus hepatis per caua & gibba disseminatis à vena porta, vel caua, ob earum angustiam, flatus, vel crassi & lenti humoris copiam, ut

pituitæ in frigidiore temperamento. Biliosis etiam temperaturis præua victus ratione utribus sæpe crudus humor in ventriculo & primis venis colligitur, qui calore hepatis attractus obstructiones parit. Vnde aliquando

Hepatis obstructio canse. lenta febris, morbus regius, inflammatio, atrophia, calor præter naturam, sine quo raro fit obstructio in hepate, nisi sit scirrhus. Causæ sunt frequentissimæ, victus ratio ex crassis & viscidis, exercitium à cibo, crassiora alimenta prima mensa assumpta, succedentibus calidis, & tenuium partium. Nam ex his crudus humor intra venas

Hepatis dolor à flatu febre superueniente soluitur. rapitur, sicuti plerumque medicamentorum aperientium usu, ventriculo crudis humoribus referto. Ex dolore, tumore, calore, victu antecedente deprehenditur. Dolor hepatis ab obstructione mediocris cum quodam pòdere. Ab inflammatione magna, flatu, suppuratione, fortis.

Qui fit à flatibus interclusis & crassioribus febre superueniente soluitur, quia tenuat, coquit, resoluit. Inflammationem febris necessario comitatur. Dum pus confi-

cirur, dolor & febris. Certissimum signum obstructionis, tensio vel tumor in hypochondrio dextro. Adde pulsum frequentem, calidius corpus, colorem flauum, vel pallidum.

Remedia ferè eadem cum ictero & lienis obstructione. Optima victus ratio, detergentia, alimenta medicamentosa, iuscula ex decocto aperientium, pilulæ, syrupi, oxymel, purgatio, opiatæ, vnguenta, pulueres, frictio leuis dextri hypochondrij. In scirrho, & à crasis & frigidis humoribus, calfacientia, tenuantia, tergentia, molliètia, quæ illa temperent, sed moderata sint, excellent reliqua. Periculum enim, ne nimium tenuando & siccando aliquid insanabile relinquatur, & nimium mollientibus, fundentibusque materiam, substantia visceris relaxetur. Itaque moderatè mollientibus, præter cæteras partes obnoxias scirrho, in hac excellere debet attenuantium, calfacientiumque mixtio. Fetus ex oleis, mixtis pulueribus aromatum, aceto &c. Emplastra de meliloto, cerata, ammoniacum, decoctum ficuum, passularum recentium, chamæpytheos, alimenta saccharo condita, & aceto diu insolato, quo passulæ, ficus caryoph, &c. maduerint, aliquoties commutata. Laxatur aliquando hepar articulo- rum modo solutum nimia humiditate: cuius signa ex arte medica petenda. Hic vinum plurimum conuenit, aromaticum rosatum, diambra, dianison, digalanga & similia, quæ ventriculo prosunt, nisi quod minus adstringendum in hepate. Adstringendum tamen hic magis, quam in aliis affectibus hepatis, mixtis calidis, si frigiditas cõiuncta est: frigidis, si calida. Fetus ex oleis adstringentibus, emplastrum de meliloto, diachylon commune, ireatum, additis aromatibus & adstringentibus. In calida causa ceratum santalinum cum cydonio, ceratum Galeni refrigerans. Rhabarbarum aiunt hepatis vitam esse. Calidiore tamen & sicciore hepate, mors potius dici debet.

*Rheum hep-
ti calidiori
inimicum.*

ANTO. VALETII EXERCIT. XXXVIII.

OMnium viscerum maximè opportunum ob-
structionibus est iecur, propter tenuium venu-

*Gal. cap. 17.
lib. de consti-
tut. art.*

larum, quæ in eius substantiam sparguntur plurimæ, ramos, cum à caua vena, tum à porta exportectos: per quos quidem omne traduci, exportariq; debet alimentum. Obstructionis causæ, humor crassus, aut lentus, aut multus. Signa, color flauus, ob distributum sanguinem biliosiores, qui præ sui tenuitate exilit, crassiore in viscere restitante, hypochondrij grauitas, dolor, & (si gibba obstruatur) tensio, durities percipitur, spirandi difficultas, à diaphragmatis cōpressione. Obstructa simâ diarrhæa, ob chylum non distributum, contingit. Huic affectui eadem curatio debetur, quæ ictero ab obstructione oborto, de quo antè dictum est.

De I Hydrops. CAP. 39.

1 Symptoma
tis illius, qui
à nimia hu-
moris abun-
dantia nomen
habet.

2 Materia et
loco distincta.

3 Exudate in
spatium epi-
ploi, perito-
nei, & inte-
stinorum, tñ
ab infirmita-
te facultatis

expultricis,
tum ab hepa-
tis contumaci
obstructione,
tñ à laxitate
venarum &
venû infirmi-
tate, aut eo-
rundè obstru-
ctione, atque
tuberculo.

4 Tunc enim
adeft sangui-
ficationis pri-
uatio.

5 Propriè di-
cta: quâuis
hoc nomine
tria hydro-
pis genera cō-

tineantur apud Celsum, qui nominis huius anthor est. 6 Quod albescat
cutis à pituita suffusione. 7 Quod per genus carnosum pituita suffundatur,
sitq; assimilationis priuatio.

HYDROPS 2 tria genera, Ascites ab vtre, quia
Venter aqueo 3 humore & 4 seroso ple-
nus vtrem repræsentat. Commotus his vē-
ter fluctuat, quo modo vesica ex dimidio plena.
Continetur aqua inter epiploon & peritonæon,
quanquam & portio excurrit in spatium epiploï &
intestini, cum à liene, colo, tenuique intestino, vel
iis partibus, vnde epiploon nascitur, malum ortum
est. Alterum genus hydropis, aqua 5 inter cutem,
quæ & 6 leucophlegmatia, & 7 anasarca. Huius
materia iam crassior, est effusa in cutem atque car-
nosum genus totius corporis. Hic si digitum impri-
mas, vestigium fit cauum. Tertium genus tympa-

nites, 8 in quo plurimus flatus humori commixtus *nomen ducēs,*
 est, vnde ventris distentio, qui percussus instar tym- *Et vocatur*
 pani sonitum reddit. *ab Hippocra*

Causa hepar est omninò 9 refrigeratum, vel pri- *te siccius hy-*
 mariò, vel per consensum cum ventriculo, liene, la- *drups, aphor.*
 teribus, tenui intestino, colo, 10 renibus, 11 vtero, *11. lib. 4. aph.*
 12 pulmone. *9 Simplici in*

Nascitur hæc affectio ex 13 immodica vacuatio- *temperie, pri-*
 ne, aut eadem longiùs 14 suppressa. Communis fe- *maria, secun-*
 rè 15 curatio medicamentis 16 hydragogis, quæ a- *daria, vel tu-*
 quas vel pituitam ducant, 17 diureticis, topicis, & *more scirrha-*
 18 externis remediis, quæ humorem siccent ac re- *so. 10 Labe-*
 soluant: quibus si nihil proficitur, 19 ferro & igne *factata vi se-*
 vtendum est. *cretice feri,*
aut etiã vasis

Leucophlegmatix peculiariter conuenit 20 phle- *obstructis.*
 botomia, & ea quæ magis incidunt, vt tympaniti, *11 Per sup-*
 quæ flatus discutiant. Phlebotomia igitur in solo *pressionem mem-*
 hoc genere aquæ inter cutem locum habet. Nec *struorum, eo-*
 hoc quidem perpetuò, sed si otio & antea acta vita, *rùmq; paly-*
 si suppressa aliqua solenni vacuatione id vitium *dromen: aut*
 ortum est. Morbi initio, priusquam 21 in cache- *per frequētes*
 xiam abeat morbus, integris viribus, hoc Hipp. Af- *hystericas af-*
 clepiadi, & Galeno visum est. Oportet autem ne- *fectiones a ve-*
nenata aura

ex seminis
suppressione.
12 Per irans-
lationem ma-
 teria in pulmonibus concepta ad ventrem. 13 Per hemorrhoidas, menstr. dy-
 senteriam. 14 Per scirrhi in hepate generationem, aut visceris ipsius intem-
 periem frigidam. 15 Quæ à symptomatibus correctione auspicanda est, quòd ip-
 sum symptoma sit calamitosius causa ipsa. Et propterea hydropicos statim se-
 candos esse monet Hipp. 16 Vt decocto radicū verbasci famina, succi ireos,
 syrup. ros. pallid. lax. granis ebuli, diacarthamo, non itē antimonio, quod ve-
 neficus empiricis & periculatorib. vsitatisimū. 17 Vt syrupo de radicib. de
 raphano. 18 Vt sudorificis, materiā digerentib. vt emplastro de bacis lauri.
 19 Paracentesis locū habet, si rātum in nimia humoris abundātia cōsistat hy-
 drops sine perenni generatione, cuius perennitas posita sit in hepatis vitio insa-
 nabili. 20 Hipp. lib. 4. de diata in morb. acut. 21. Priusquā materia facta

to coquantur. Ius galli sorbeatur. Aqua extillata è purpureis floribus ireos data 3.6. vel 3.1. quantitate, cum 3.1. electarij triasantali, & Gr. 8. cinamomi, efficacissimè aquam hydropicorum ducit.

Sic vinum scylliticum ex vini lb.6. scyllæ purgatæ lb. 8. coctis ad tertiæ partis consumptionem. Dosis erit ieiunis ab 3.8. ad 3.1. Acetum quoque scylliticum ieiunis datum morbum expedit & terminat per vrinas, tumores omnes deponit. Conditur melle, vel passo. Similiter oxymel scylliticum. Laudantur aquæ alkekengi, medijs corticis sambuci, eiusdem radicis, ebuli, aut ex eorundè floribus, similacis hortensis, iuniperi, raphani, cuscutæ. Cæterum catharticas eiusmodi aquas electariis triasantali, diarrhod. Abbatis, schœnuantho, spica, santalis, meliores reddes.

Cucumer agrestis in frequenti vsu fuit & Græcis & Arabibus, quo sic vtendum.

℥. corticis rad. cucumeris agrestis 3.1. infriatum insperge mulsæ. Sine molestia pituitam ducit, nec stomachum lædit. Ex Aëtio & Actuário.

Secretum 26 non reuelandum.

℥. succi cucumeris asinini & radicis eius, succi laureolæ, succi ireos purpurei, succi absynthij & eupatorii an. 3. 3. resideant : quæ supernatat aqua, abiiciatur. Crassiori verò parti insperge rhabbari, agarici ana 3 8. spicæ nardi, sem. endiuia, scario-
læ, portulacæ, mastiches, lappæ, tagacanthi, salis
gemma ana 27 3.1. mellis col. 3. 8. In vase vitreo
reposita agitentur in sole, vt fiat veluti conserua.
Detur 3.1. per interualla.

26 Huius au-
thor fuisse di-
citur Gordo-
nius, vt sen-
tit Valescus
de Tharāta.

27 Valescus
legit 3.1.
Quæ lectio
magis arti-
det.

DE MORB. INTERNIS

Vel. 24. scyllæ, turpeth. radic. esulæ, radic. teneri-
mor. tithymall. polypod. ireos, chamædryos, mer-
curial. folior. vrtic. an. 3. l. Distemperentur triduo in
aquæ partibus duabus, vini vna: tum coque ad ter-
tias, & cola. Deinde colaturæ insperge zinzibe-
ris, piperis nigri, anis. petros. seminis fœniculi an. 3. l.
cinam. galangæ, spicæ, xylobalsam. asari an. 3. l. leui-
ter bulliant, reponantur. Alternatim dabis patienti
3. l. aut plus, prout primæ doseos effectus suaserit.
Optimum est vti sero lactis caprini, in quo madue-
rit cacumen absynthij, cuscutæ, Gr. x. alkekengi,
fumaria, semina maiora, schœnuâthum, spica. Non
habet par remediū Rhazes. Syrupus acetosus cum
aqua cuscutæ, vbi & sitis extinguenda est.

28 Hæc Cel-
sus pluribus
perstrinxit
cap. 21. lib. 3.

Nec calfaciendum 28 hepar, vbi obstructio libe-
randa, & vrinæ deduci debent. Grauitèr sitiunt hy-
dropici, quibus tamen potio largior danda non est,
quàm quæ vitam sustineat. Vinum album, tenue,
subausterum, in quo diuretica prius admixta fue-
rint.

29 Nulla e-
nim radix hu-
mectandi fa-
cultate gly-
cyrrhizæ am-
superat.

Oxycrati vsus est, cum calor vehemens accessit.
Glycyrrhiza, 29 ἀδύλος appellata, quòd prohibear
siti hydropicos. Probatur aliis Metrodori Epicuri
discipuli factum, qui hydropicus plurimùm qui-
dem bibebat, sed statim reuomebat. In iis igitur,
qui facillè & sine molestia vomunt, probari potest.
Nam & vomitus utilis est hydropicis. Clysteribus
quoque acribus & glandulis materia minuendâ est.
Diuretica conueniunt, berula, lauer, vulgò iuncus
odoratus, spica nardi, asarum, phu, meum, carpo-
balsamum, cassia, radix dulcis, rosa, semen hype-
rici, dauci, smyrnij, petroselini, calamus aromati-

cus, fefeli, cancrorum fluuiatilium 30 ficcatorum puluis, cum æquali parte asari. Ita etiam erinacei ficcati in sole 3.1. mel scylliticum, cantharides integræ, & aliis diureticis commixtæ., sed minima quantitate, vt ad Gr. 5. Hæc autem vel in puluerem redacta, vel concocta dantur ex vino, oxymelite, mulsa, aquis 32 conuenientibus, quales prius enumeratæ sunt capite de oppilatione hepatis.

30 *Ac præsertim lapillorum, qui in capibus cancrorum reperiuntur.*

31 *Ne vesicæ exulcerent.*

32 *Vt ieros, enula cæpæna, sambuci, ebula, raphani.*

Hydræpici ex antecedente frigore, & obstructione iecoris, vel lienis, id imperari potest remedium.

℞. schœnuanthi, cinam. asari, mastich. absynth. anis. fœnicul. ana 3.6. rhabarb. spicæ, aristolochiæ longæ, petros. ana 3.4. caryophyll. croc. calam. aromatici, cardamomi ana 3.2. mellis quod sufficit. Dosis 3.4. cum tepida.

Abominabilis urinæ potus, sed maximè probatus Medicis. Tolerabilior, si ex puero impube distilletur cum melle, & aliis diureticis.

Nec satis est phlebotomo, cathartici, diureticis, vomitu, clysteribus & glandibus vacuare materiã, sed loca tumentia sacculis, vñctionibus, frictionibus duris, balneis, emplastris, aliisque eiusmodi rebus resoluenda sunt.

Sacculi fiant è macribus furfuribus, milio, panico, sale, sulphure, calidis, & ita appositis.

Materia balneorum & vaporationum in thermis siccis: aquæ naturales salæ, sulphurosæ, & eiusmodi reliquæ: quæ si desint, arte comparantur, liquefacto sale subquadruplo, eoque plus minúsve, vel sulphure in aqua dulci. Possunt quoque incoqui anethum, ruta, chamæmelum, calamentum, maio-

DE MORB. INTERNIS

33 *V* folia
lauri, itē ba-
ca laur. iuni-
peri, radices
cucumeris, a-
sinini, bryo-
nia, ireos.

rana, rosmarin. pulegium, fœniculus, satureia, hyssopus, schœnuanthum, stœchas, & 33 similia.

Sunt qui veluti arcanum probant lapidem serpentis. Coluber aquaticus à cauda funiculo constringatur, atque ita suspendatur, vt sit subiectum vas aqua plenum. Euomet coluber lapidem, qui totam illam aquam consumet. Lapis è vinculo aligetur, & apprimatur ventri hydropici, paulatim aquam consumet.

34 *Quinetiâ*
in arena sepe
liendus hy-
dropicus. Vi-
de Gal. lib. 9

Sacculi quoque 34 ex arena & sabulo, vel cineribus calfactis sæpius apprimantur. Laudatur oleum 35 scylliticū, vel in quo decima pars euphorbij, mescerei, vel laureolæ coxerit. Sit autem oleum anethinum, aut simile.

Simplic. cap.
de Pyrite.

35 *Efficacissi-*
mū erit oleū
anethinū, in
quo maluerit
cuminum.

℥. terebinthinæ lb. i. thuris, mastiches, myrrhæ ana ʒ. β. ladani, nucis moschatae, caryophyllorum, galangæ, zedoariæ, cubebæ ana ʒ. β. foliorum laureolæ P. l. succi ebuli, & cucumeris asinini an. ʒ. ʒ.

36 *Hæc vul-*
gò dicitur
balsamum.

Redigantur in puluerem, quæ redigi possunt. Miscuantur. Fiat distillatio 36 in alembico, qua inungantur loca tumentia.

Vel. ℥. florū, foliorum, cortic. radic. ebuli & sabinæ ana M. i. radic. ireos ʒ. i. scyllæ ʒ. 2. coquantur omnia in lb. ʒ. olei laurini, aquæ vitæ lb. i. expressa colatura dissolue saponis vnc. iij. fiat linimentum. Item.

℥. olei ʒ. 10. ceruss. ceræ ana ʒ. 7. vitriol. nitr. aloës, ana vnc. ʒ. aceti acerrimi q. suff. Terenda terantur in mortario cum aceto deinceps affuso ad mellis crassitudinem : seorsim cerusa cum oleo coquatur : quibus mistis cera addatur. Transferantur in mortarium, & cum speciebus manibus

pinfantur, vniantur. Hydropicis, splenicis, & apostematibus præstat mirificos sanitatis fructus, materiam discutiendo, reprimendo.

Cochleis tritis vti licet, & emplastri modo affixis. Mirabile volunt hoc emplastrum.

℞. 37 thuris, mastichis, myrrhæ ana ʒ. i. granorū lauri ʒ. 2. 3^o costi ʒ. β. cyperi ʒ. i. β. stercoris caprini triti ʒ. 4. mellis colati quantum sufficit, ad congregandum emplastrum.

Sinapismi, 39 diaspiratum, prius descripta. Stercora animalium calida conueniunt. 40 Frictiones ex sale in hydrelæo dissoluto, vel ex medicamentis calidis subtiliter comminutis.

Perseuerate malo, phœnigmi ex radice scrophulariæ, ranunculorum, & similibus emplastri modo impositis ad decem horas præscribendi sunt.

Oportetque vesicas configi, vlcera aperta conseruari, superposito folio brassicæ vncto è butyro, vel oleo, grano ciceris, aut ceræ momento. Permittetur aqua fluere ad sexaginta dies. Alioqui cauteria inducenda ventri in ambitu vmbilici, & quibus partibus tumor est. Sacrificationes quoque conueniunt, sed si nihil proficitur his remediis, extremum est 41 paracentesis.

De paracentesi magna olim controuersia, aliis Medicis omnino reprobantibus: aliis approbantibus. Vtriûsq; sectæ argumenta colligit Aurelianus 3. Cronicon capite de hydrope.

Illos enim deterrebat, quod ferè moriuntur omnes, qui puncti fuerint.

Hi verò remedium temperabant, neque in omnibus utebantur, atque ita seruabant aliquos. Gale-

37 Hoc emplastrum valdissimū, & frequentī in vsu.

38 Vel, radicis angelicæ tantundem.

39 De his vide cap. de attrahētibus in materia chirurgica.

40 Fiant quoque mlagmata ex rad. cucumeris asinini, bryoniæ, ireos, costis sub cineribus, deinde mistis cū stercore caprino, baccis lauri, & melle. Prætereā

ex cantharidibus ipsi cū sermone ad motū fiunt vesicula.

41 Compunctio abdominis, & peritonæi sectio.

DE MORB. INTERNIS

nus, Paulus Albucasis, Mesueus in ascite pungūt ad latera vmbilici, qua parte illa vacua & inania sunt, & propemodum excarnes muscoli. Alij quidem dextra parte, si lien: sinistra, si hepar in vitio est.

Alij verò ex eadem parte, qua viscus est, à quo malum primùm ortum est. Si verò intestina in causa sunt, quatuor digitis sub vmbilico, sed paululum reducto phlebotomo in latus. Hippocrates intercutaneos pueros incidit libro de locis in homine. Aurelianus consensu veterum in intercute magis, quàm ascite, paracentesim probauit. In aqua intercute Asclepiades quatuor digitis supra talū tibiam compungit interiori parte eā, profunditate, qua vena inciditur. Qui locus compunctus si parum aque reddit, femora, scrotum, pudenda, si quidem intumuerint, loca etiam supra manum, articulos, incidenda sunt ex Leonide & Hippocrate. Formulam verò punctiōis ex lib. 6. Pauli & aliis collige.

Tempestiua autem est punctio, priusquam in cachexiam morbus abierit, firmis viribus, corpore iuuenili, si atra bilis hydrōpem non contraxit, si validus stomachus, si æger non febrit, aut si febrit, remissionis tempore. Hæc omnia prouidenda sunt priusquam de paracētēsi decernas. Alioqui temeraria est via. Quæ etiam si adsunt, præmonēdi tamen amici ægri quanto cum periculo remedium tententur. Tentarique debet, vbi aliis remediis nihil profectum est.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Υδρωψ.

Ανασφαια.

Υδρωψ tumor est, vel totius corporis ab humore, vel ventris tū ab humore, tum à flatu. In toto corpore & ventris, ανασφαια, υπασφαιδιος, σφαιτικής, λονχφλεγματίας dicitur. In ventre aqua collecta, nō tamen penitus sine flatu;

ἄσκιτις. In eodem, flatus plurimo intercluso cum pauca aqua, τυμπανίαις vel τυμπανίτις, Hippocrati Hydrops sic-
cus nominatur. In omnibus causa antecedens, calor est,
vel frigus. Coniuncta verò, semper est frigus. Refrigeratur enim hepar, sanguificatio deprauatur, siue proprio
ipsius iecoris vitio, vt phlegmone, scirrho, hydatidibus,
intemperie: siue per consensum, vt folliculi fellis, lienis,
ventriculi refrigerati, mensenterij, intestinorū graciliū,
ieiuni, pulmonis, renū, septi transuersi. Ex his enim om-
nibus malū cōmunicatur hepati. Vt si splen ob scirrhū
nō purget sanguinem, renes obstructi, aut imbecilliores
serū non trahant, aut emulgentes, menses suppressi sint,
aut immodicē fluant, aut hæmorrhoides, cor non diffle-
tur. In immodica enim vacuatione, spiritu cum sangui-
ne exhausto calor extinguitur: in suppressione, sanguis
vel excrementa ressuunt in hepar, vnde suffocatur. Ali-
quando contactu chyli frigidioris læditur, vt aquæ frigi-
dæ potu à calore & exercitio. Sic intemperie hepatis à pul-
mone, aut alia parte communicata, Phthisici & Hectici
hydrōpe magna ex parte corripiuntur, nisi ventris fluxu
intereant. Eodem modo asthmatici, aqua in spatio tho-
racis collecta, & in ventrem tandem effusa. Comitatur
febricula, assidua, lenta, cum pulsu paruo, sitis, humore
circum viscera torpescēte, salsedinēq; & putredinem
colligente, spiradi difficultas à cibo etiam pauco, ob ple-
nitudinem, & venarum distentionē, tumor, grauitas, co-
lor vitiosus, cibi fastidium. Ex retentione vrinæ (si verus
hydrōps dici debeat) subito fit, & repenti. Sæpe enim pus
vel crassamentum vrinæ, quod meiebatur, retentū, speciē
quandā hydrōpis adfert, quæ apertis viis, & prioribus v-
rinis crassis euntib; sanatur. In cæteris sēsīm generatur.

Anasarca fit ex humore aquoso partim à iecinore, par-
tim à tota carne corporis, veluti in aquam resoluta, sæ-
pius post morbos diuturnos & febres pituitosas. Sym-
ptomata, tumor non ex æquo in toto corpore, sed parti-
bus inferioribus magis ob humoris grauitatē, & partiu
frigus, corpus laxum, pallidū, emortuo simile. Initio di-
gnoscitur partium extremarum perpetuo frigore, facie
intumescēte post maciem, palpebris & pedibus crassio-
ribus & calidioribus. Si fluxus immoderatus præcesserit,

ἄσκιτις.
τυμπανίαις.

*Hydrōpis
causa antee-
dentes &
coniunctæ.*

*Anasarca.
qui fiat, &
quæ sint eius
symptomata*

DE MORB. INTERNIS

Hydrops à causa calida curatu difficilior cur sit. Ascite generatio, causa, & symptomata.

Ascite signum certissimum.

Tympanite causa.

Tympanite signum pessimum.

aquæ frigidissimæ potio, pedes intumuerint, non à vigiliis, imprægnatione, nocturna statione. Si cauitas remaneat impresso altius digito. A causa calida difficilior curatio, quia calidis ducitur aqua, siccatur, flatu absumuntur. In ascite humor aquosus, vel potius serum inter peritonæum & intestina colligitur tanquam in vtre, vnde morbo nomē. Spiritus aliquid admiscetur. Causa, maius frigus, quàm in Tympanite, succedit cachexiæ, morbis hepatis calidis, obstructionibus, morbis lumborum, renum, vesicæ. Symptomata, tumor ventris, reliqui corporis alimentum non sentientis consumptio, inualecente morbo tumor ad femora, pedes, scrotum, sensim quasi cuniculis factis, maximè post inambulationem humore defluente. Aliquando thoracem occupat. Exudat serum è iecore, intestinis, omēto, & similibus. Initio fieri intelligemus, si multum urinx generetur, & reddatur, paulò post in venis remaneat: sitiunt, corpus contabescit. Signum certissimum, si cum è latere in latus mouētur, percipiatur sonus aquæ defluentis. Vitiò hepatis ortum cognoscimus ex dolore & distentione partis, & si nullus ex morbis superiùs enumeratis præcesserit.

In tympanite abdomen distenditur flatu. Causa, minor caloris mutatio. Succedit cruditatibus, flatibus ventris non discussis, distentioni venarū, dolori circa umbilicū, qui nullis medicamentis cesserit. Initio veluti inflatio. Hinc flatu spissiores effecti in nubem, tandem in aquam, vt pluuiam, concresecunt aucto frigore: vel aqua è venis in spatium ventris, veluti per diapedesum effluit. Cognoscitur, quia venter tympani modo sonat. Facies minus recedit à naturali habitu, maior ventris distentio.

Non admodum formidabilis est aqua intercus, quæ nullo antecedente morbo: deinde quæ longo: omnium periculosissima, quæ ex acuto nascitur. A scirrho confirmato, nō curatur, vix à resiccato nimis hepate: ab hydatidibus maximè. Signum pessimū, vbi vacuata, vel sponte, vel arte, materia, malum redit. Causa enim pertinax. Ergò quod scribitur Aph. 14. libri sexti, Hydrope correpto, si aqua è venis in ventrem defluerit, morbum solui, non est perpetuum. Multis enim sponte vel arte commoto ventre, & aquosis multis inde expurgatis,

non superfuit salus, quo modo sectis mors contingit, siue aqua fuerit in ventre, siue in thorace. Hoc in thorace annotauit Hipp. lib. de morbis, quod & experientia confirmat. Nam etiam si expurgetur aqua naturæ sponte, vel arte, si viscera vel corrupta, vel syderata, celerius moriuntur. Multos obseruauimus, qui ex alui profluuiio melius habuerunt, sed paulò post manente causa morbus rediens interitum attulit. Aliquando etiam in nimia effusione humoris vnà spiritus effunditur, quod Hipp. monet in iis, qui secantur & vruntur. Ob idque oportet integris viribus, & priusquam viscera corrumpantur, remediis vti primùm purgantibus, deinde aliis. Libro de Iud. In hydropse detento, si aqua ad ventrem, aut vesicā fluat, solutio. In leucophlegmatia alui profluuium vehemens, solutio. Sed in Prædictionibus robusta viscera esse vult, si quis liberetur. Ex quo loco videndum, antequam curationem aggrediamur, an sit spes salutis, necne. Addit Oribasius tussim signum esse mortis in hydropicis. Et Aph. 35. libr. 6. Aqua intercute laborantibus tussis superueniens, malum. Sed hoc distinctione quoque eget. Si videlicet id fiat ab aucto morbo, & aquæ ratione, quæ iam pulmonum arterias asperas occupet, vnde tussis. Nam si aliunde, non ita mala. Ex obseruationibus nostris hæ non videntur prætereundæ. Ioanni Blanché negotiatori Parisiensi in Angliam profecto Hyeme tumor cum miraculo quodam subsedit, euauitque morbus, nec rediit. An quòd integro, aut non ita læso viscere aqua partim calore nativo excitato, partim aëre marino resoluta fuerit? Cuidam per sudores sponte excitatos & quasi distillantem aquam, curatio. Alteri mors, cum multo alui profluuiio tumor subsedisset, redeunte morbo. Hospiti leonis argentei in vico D. Iacobi inuenta sunt syderata intestina, & omnino corrupta, quasi sugillata, humor plurimus cruentus, & loturæ carniū saturatæ sanguine similis. Cuidam ad viuum resectis vnguibus pedum, exercitio & frictionibus paulatim humor illuc defluxit, conualuit. Domino Charon Abbati Sancti Petri, cum antea de renibus non cōquereretur, febricula, infirmitas viriū, inclinante ad exitum morbo, venter vtriusque inflatus,

*Hippocrates
aph. 27. li. 6.*

*Tussis hydro-
pi superue-
niens nō sem-
per mala.*

*Ioannes
Blanché mi-
rabiler hy-
dropse libe-
ratus.*

*Hydropico-
rū historia.*

DE MORB. INTERNIS.

dolens, obtingit. Vrina duos ante mortem dies suppressitur. Dissecto cadauere ren sinister totus absumptus repertus est, vomica plenus, quæ cruentam saniem reddidit. Dexter verò ren calculo vtererè obstruente obsessus.

Remedia sunt syrups, opiata, clysteres, admota, pulueres, phœnigmi, vesicatoria, cauteria, punctio, scarificatio cutis ad aponeuroses musculorum, diæta, digeretia, epispastica, cataplasmata, vngueta, pilulæ, diuretica, apoemata, aquæ distillatæ ob tenuitatem vtiliores, decocta herbarum conuenientium, sanguinis missio, suppressis mensibus aut hæmorrhoidibus, victus ratio exsiccans, abstinencia à iusculis, potu, fructibus, exceptis passulis. In leucophlegmatia, resolutis partibus in pituitam, purgantia, vomitus, errhina, masticatoria, & similia. In ascite aquam ducentia. Illigandus liuo venter, & ita quotidie metiri conueniet, vt intelligatur, quid medicamenta profecerint. Cochleari vsus, theriaca, iris siluestris, soldanella, vnguentum arthanitæ (illitum enim aquas per ventrem purgat, & digerit) emplastrum ceroneum auctum sulphure, succi ireos & ebuli crudi potius, quàm cocti, aquæ sulphuratæ, oleum de sulphure, decoctum guaiaci cum aqua terebinthine, rasura pergameni (quæ ratione aluminis & calcis in lixiuio ex rebus discutientibus comparato coquitur, ventri affigitur ad modum cataplasmatismatis, cui & alia permisceri possunt) pilosella (quæ maximè obstructa aperit) aqua distillationis limacum, testudinum, cum alia materia. Sed mirum in modum potus abstinencia, vt & in ventriculo humidior. Celsus laudat potum medium, qui vitam sustineat, & vrinas moueat. Metrodorus Epicuri discipulus coactus siti, bibere solebat, deinde vomere. Notanda historia Celsi. Apud Antigonum regem ex duobus Medicis vnus quædam eo morbo mediocriter implicitum negauit posse sanari. Alter se sanaturum pollicitus est. Prior respondit se respicere ad animum, alterum verò ad morbum ægri. Neque res fecellit. Cum enim posset optima victus ratione seruata curari, ob intemperantiam periit.

Cor. Celsus
cap. 21. lib. 3.

Celsus ibid.

[*Paracentesis*] Erasistratus apud Celsum reprobat sectionem hydropicorum, quia semel effusa aqua, & affecto hepate, postea regeneratur. Si tamen priusquam putreat

materia, & vires concidant, grauiusque affectum hepar, & partes aliæ faciant, adhibeatur, optimè nutrito prius ægro, & cōfirmato, nihil peccatur. Sed extremum remedium est, & non nisi urgente necessitate vsurpandum, & cum magna Medici prudentia. Hippocrates non solum *Paracentesis* paracentesim, seu sectionem, sed vsionem etiam probat, *non nisi urgente necessitate summa* *vsurpanda.* *Hippoc. lib. de inter. part. affectibus.* *υπὲρ τῶν πλύνοντων ἀρτηρίων*, suppuratos, qua parte pus se prodit, in dorso & pectore vrit aut secat, alioqui enutritos prius lacte. In hydropicis verò venas in scroto crassissimas secat: paulò post in eodem scroto, femoribus, ac tibiis frequentia vlcuscula scalpello incutit. Deinde qua parte magis fluctuat aqua, aut tertiam costam ab yltima ad os, ex quo terebra caua *πενήτω περιπληθείω* perforat, donec exeat aliquid aquæ, ex quo linamentum indit è lino crudo, spongiamque mollem alligat, ne excidat linamentum. Quotidie semel aliquid expurgat ad dies duodecim. 13. die reliquum aquæ emittitur, via relinquitur, vt quod supernascitur, effluat, venter cibus resiccatur. Si femur & scrotum intumuerint, vulnusculis audacter configito. Sæpe hepate maximo, & prius lacte nutrito ægro, non metallo, sed alia materia, inurit octo inde crustis factis. Nonnulli id faciendum censent buxeis fuis feruenti oleo tinctis. Libro de locis in homine tenuissimis feramentis circa vmbilicum vrit, ac tantum aquæ quotidie trahit, quantum vires ferant. Hoc semper obseruato, vrendum aut secandum prius, quàm pituita corrumpatur, viscera grauius lædantur, & vires concidant. Deinde vacationem paulatim, id est, 12. diebus, vt prius, faciendam. Galenus paracentesim in hydropice laudat, vsionē in suppuratis, duplicemque affert rationem, cur periculosa sit vniuersa vacuatio in hydropicis. Extinctionem, scilicet, caloris natui, simul cum humore effluente spiritu, & pondus visceris: quod cum non ampliùs sustentatur ab aqua, septum, & reliqua thoracis viscera trahit deorsum. Plura sunt apud Albucasim, Aurelianū, Paulum lib. 6. cap. 44. Recentiores tutiùs progrediuntur. Viā parant cauterio potētiali, deinde actuali. Hinc scalpello

DE MORB. INTERNIS

*Qua diligē-
ter cauenda,
vt legitimè
fiat paracen-
tesis, & va-
cuet.*

perforant, & cannula caua cōmodiore, quàm linum cru-
dum Hippocratis, sensim educunt aquam. Aculeato scal-
pello vtuntur, vt minor fiat perforatio, locumq; eligunt,
vbi aqua deorsum in inium ventrem tendit, relicto hepa-
te & hypochondriis, in medio musculorum obliquorū
epigastrij. Partem materiæ medicamentis purgant, topi-
cis discutiunt, siccante victu absument, vires diligenter
fouent. Minus metuunt à peritonæo perforato, quàm à
membrana succingente costas. Diligenter cauent, ne
pungatur intestina, ne facultas hepatis sit emortua, scir-
rho, aut splenis tumore, aut vlcere pulmonis, aut infir-
mis viribus, aut ætate senili æger laboret. His demptis
minus esse periculi, cum natura sæpe viam aquæ molia-
tur per vmbilicum, & quibus vulneratus est venter, nisi
vulnus ad gracilia intestina penetret, omnes euadant.
Longè tamen tutior scarificatio cutis totius ventris ad
aponeuroides musculorum, paruis scissuris, quibus per
ventrem serum refudet.

ANTO. VALETII EXERCIT. XXXIX.

*Hydrōpum
generationis
modus.*

AD frigidam iecinoris intemperiem hydropes
consequuntur, labefactata scilicet hæmatosi,
& toto corpore refrigerato. Vnde vel pituitosus &
serosus humor inter peritonæum, epiploon & in-
testina, transiens per mesaraicas venas, quæ ad ea-
dem intestina terminantur, colligitur, tumore ab
ingrauescente malo ad femora progrediente, simul-
que in ventre, velut in vtre, fluctuationibus excita-
tis, & hinc ascites: vel eadem ventris loca spiritu
flatuoso replentur, & cum flatu, ait Aëtius, quasi
nebulosus est humor, vnde tympanias: vel fit aquosi
sanguinis plurimi in vniuerso corpore collectio, in
qua corporis habitus spongiæ instar intumescit, &
fit anasarca. Ascites & tympanias à minore sunt fri-
gore, quàm anasarca. Hydrōpum causæ fusissimè

traduntur ab Hollerio ex comment. Gal. in aphor. II. lib. 4. Aphor. comment. 4. de rat. vict. in acut. 2. Pronogst. Signis vix opus est aliis, vt discernantur: sed maximè spectandum, vtrum hydræpisis sit ab hepate per se, an ab aliis partibus per consensum. Quando per se, tussis levis, siccaque molesta est, hepate mole sua pulmonem in angustiam trahente. Deiectiones paucæ & aridæ sunt, quia rapitur aliò aquosus humor, & illæ in intestinis residues torrentur, præcipuè verò si inflammatio accesserit. At cum aliæ primùm laborant partes, suis propriis internoscuntur signis.

Curatio in humorum preparatione, vacuatione, & affectarum partium confirmatione est posita. Humores parabit id apozema.

℥. quinque radic. aper. in vino albo macerat. ana ℥. i. rad. rub. tinctor. valerian. enulæ campan. ireos, corr. rad. fraxin. & thamarisc. similiter macerat. ana ℥. ss. omnium capill. end. agrim. cusc. cichorij, absynth. Rom. an. M. i. semin. anis. melon. cucumeris, card. bened. ana ℥. 2. flor. cardiac. antho. & genist. ana p. i. f. decoct. ad ℥b. i. In colatura dissol. syrup. capill. ven. & de bizantiis ana ℥. 2. fiat apozem. clar. & conditum, vt decet, pro dosib. 3.

Aduerte autem si febris adfuerit, vt plerunque esse solet, aut si hydrops calidam hepatis intemperiem consequatur, admisceri oportere frigidas herbas hepaticas, itémque semina frigida maiora & minora, quæ alia contemperent. Si purgans esse volueris, in huius decocti ℥b. i. colata infundantur fol. sennæ mund ℥. 2. agarici ℥. i. cinam. vel puluer. electar. triasantal. vel zinziberis ℥. i. In expressione dissoluentur succ. ireos ℥. 2. syrup. laxatiui ros. pallid. ℥. 2. sacch. q. s. fiet syr. perfectè coctus: de quo cap.

æger 3. 2. ex cochleari, vel cum aqua cuscutæ, aut absynthij, aut cum decocto cicer. rubro. semel in hebdomade. Vel purgans medicamentum per se post sumptas apozematis superioris doses sic præscribitur.

℞. rad. gram. petros. & fœnic. passul. mund. glycyrrh. raf. ana 3. 2. agr. end. capill. ven. ana M. s. f. femin. fœnic. end. melon ana 3. 1. fol. sennæ mund. 3. 2. f. decoct. & colatura ad dosim. In qua infunde rhei elect 3. 1. agar. troc. 3. 4. cinam. 3. s. In expressione dissol. syr. capill. ven. & ros. pallid. laxatiui an. 3. s. f. potio. Pauperibus diacarthamū, diaphœnicum, folia sennæ imperantur: vel pilul. asfaiçeret, elephāg. de rhab. agar. succis hydragogis excepte, duobus, aut tribus elaterij granis additis, si frigidior & humidior cœli constitutio permittat.

Saluberrimus erit clysterū vsus, qui modò leues erunt, modò aciores ex discutiētibus flatus parati: in quibus dissolu. diaphœnic. benedict. laxat. mel anthos. ol. aneth. Sæpe verò ac sensim dum purgatur, hepar roborari debet, ne factum debilius, aquas denuò generet. Itaque tale electarium præcipiatur, cuius tabella vna dimidia hora ante pastū sumatur.

℞. puluer. electar. triasantal. dupl. rheo 3. 1. spec. diarth. Abb. & lætific. Gal. ana 3. 2. raf. corn. ceru. ebor. ana 3. 1. margarit. electar. 3. s. sem. acetos. plantag. ana 3. 2. cum sacchar. in aq. absynth. aut agrim. dissolut. f. electar. per lozeng. pond. 3. 2. vel adiecta conseru. rosa. capill. ven. f. conditum, cap. vt supra.

Atque superiora hæc remedia omni conueniūt hydrōpi: præter quæ & sua sunt cuique peculiaria. Cum enim tympanites & ascites nunquam sectione venæ profligentur, eâ tamen anasarca incipiēs, integris adhuc viribus, & hepate non vsque adeò perfrigerato, iuuatur, quòd naturam leuet humorum copia grauata, maximè si talis hydrops à suppressis

*Seçt. 4. libr.
de vict. rat.
in acut.*

ſuppreſſis mēſibus, aut hæmorrhoidibus fiat. Quæ diſtinctio maximè obſeruanda. Nam alia ſi ſubſit cauſa, vitanda phlebotome, ſiquidem ſanguinem mittat laudabiliorem: prauum verò, qui in primis venis circa meſenterium & iecur congeritur, in corpus rapiat vniuerſum. Sic etiam in aſcitæ remediis ſubſtitui debent quâtitate maiore, quæ flatus diſcutiunt. His autem artibus poſtquam toti proſpectû eſt corpori, topica, quæ robur hepatis & ventriculo concilient, materiâque reſoluant, qualia ſunt fomenta & litus, uſurpantur.

℥. agrim. maioran. menth. ſicc. ſtœch. abſynt. ana M. i. radic. cyper. calam. arom. ana ℥. 2. flor. chamæm. melilot. roſ. rub. ana p. i. f. decoct. in aq. & vin. rub. pro fotu hepatis cum ſpong. Poſt fotum ſiccata pars illinenda. ℥. olei cappar. & abſynth. ana ℥. i. pulu. calam. arom. & abſynt. ana ℥. i. cum cera f. linimentum.

In tympanite vtilliora ſunt cataplaſmata ex farinis diaphoreticis, orobi, lupinor. fœnugr. lolij, & calid. herbis ac ſeminib. in vino, aut vrina pueri decoctis, adiecta portione emplaſtri de baccis lauri, vel vngu. Agrippæ, vel Martiati. Hûc faciet emplaſtrum de bacc. laur. & de meliloto cum ſucco rutæ, aut ſimili, & pauca aqua vitæ emollitû: vel emplaſt. è ſtercore vaccino, caprino, aut colûbino, ſulphure, baccis lauri, farin. lupinorum, axungia gallinæ & oleo rutaceo additis.

Vel. ℥. origan. calamenth. rut. agrim. ſcœnuanth. ana M. 2. baccar. laur. iuniper. ſemin. caru. anif. fœnic. an. ℥. β. flor. chamæm. aneth. & anth. ana p. 2. Impleantur ſacculi duo: qui bulliant in aq. & vino albo pro fotu. Hunc ſequitur litus. ℥. olei rut. & irini ana ℥. i. puluer. radic. jr. ℥. 2. cum pauco emplaſtro de melilot. f. linim.

Ad aſcitem ſacculi comparantur milio, ſemine

DE MORB. INTERNIS

apij, cumin. caru. bacc. laur. contus. florib. chamæm. melil. torrefactis antè singulis in sartagine, & vino albo irrigati. In anasarca stuphæ siccæ meatus aperiendo, sudores proliciendo, discutiendo, magnum afferunt adiumentum.

Vel humidus vapor decocti conuenientis toto corpore excipitur. Vt.

℞. radic. fœnic. ebulli, ireos, acor. enul. camp. ana ʒ i. cortic. inter. vlmī & cappar. an. ʒ. ʒ. hyssō. rut. salu. agrim. rosm. calamenth. origan. absynth. ana M. i. semin. petrosf. rut. cyper. baccar. laur. & iuniper. ana ʒ. ʒ. flor. chamæm. aneth. anthos, & melil. ana p. i. f. decoct. in aqua & vin. alb. cum pauco aceto in fine addito. Lapides igniti in id decocti iniciantur. Vapor toto corpore, vt dictum est, benè contexto recipiatur.

His præsiidiis si non cesserit hydrops, hydragoga medicamēta repetentur, itémq; topica supradicta. Sitis, quæ in hoc affectu premit maximè, tolerata, nonnullis remedio est. Id nobili constat historia. Rusticus, quem aqua inter cutem malè habebat, Antonij Beniuenij Medici clarissimi opem expostulat. Hic morbū iam inueteratū perspicies, subridens respōdit opus esse, vt non vltà biberet, quàm vt vitam sustineret. Discessit æger, & anno peracto medicum inuisit, & interrogat, an ipsum nosceret. Negauit hominem nosse. At ille, tua ope curatus, inquit, ad te reuertor, scire cupiens an adhuc mihi liceat aliquid bibere, cū hactenus per annum nihil biberim. Admiratus Medicus interrogat, cuius id consilio fecerit. Cui ille, tuo, inquit, & rem omnē ab initio narrat. Iussit tum paulatim vino assuescere, austero, ac tenuissimo. Discessit: & curiosa portione vsus pristinæ sanitati est restitutus.

Curatio lienis.

CAP. 40.

Plenicos ¹ appellant, quibus induruit ² liē, ³ grauitas sinistra parte sentitur. Difficultas ⁴ est ⁵ anhelitus, ⁶ sitis, oris siccitas, ⁷ pedū inflatio, ⁸ color plumbeus, decubitus in ⁹ sinistrū latus grauis, extat durities ¹⁰ oblōga, dolor ad ¹¹ iugulum sinistrū tendit, pediculi scatent, nocte ¹² sudor grauis, foetet ¹³ anima, pudenda ¹⁴ turgent, ¹⁵ erumpit ¹⁶ sanguis, gingiuae ¹⁷ corrumpuntur, venae ad lienem nigricant, & squalescit cutis, vlcera maligna in tibiis nascuntur. Quorum aliqua vel omnia lienosos produnt. Lege quae annotauimus in aphor. 43. lib. 6. & Celsum cap. 7. lib. 2.

• Curatio.

Initio molliendus ¹⁶ venter cassia vel catholico. Quod si inferiori parte visceris scirrhus est, clysteribus vtendum erit. Post hanc phlebotomia conuenit è basilica sinistra, in duos dies diuisa vacuatione, amplo foramine. Quod si vires suspectae sunt, vena quae ad medium digitum, vel minimum venit, incidenda est. Alij venam post aures ¹⁷ diuidunt, &

¹ Qui ex splene laborat, lib. 6. de locis male affectis. Et 9. xxi. τὸ πῶτος.

² A tumore contra naturā, praesertim scirrhus.

³ Dolor grauis, ex materiae copia & partis obtuso sensu.

⁴ Per oppressionem diaphragmatis, cui subiaceat lien.

⁵ Ex corrupti humoris in aluum effluxu, et omnis humoris exhausto.

⁶ Cum hydrops est in propinquo, & liē est κατὰ πῶτος. ⁷ Color enim similis efflorescit humori, cuius dominatu corpus tenetur. Vnde saepe icterus niger, elephantiasis. ⁸ Et in dextrū molestior ob μετὰ τοιοῦτον & suspensionē. ⁹ Quae praese fert idam partis obfessa, Sed tamen existit ἀνὰ πῶτος καὶ κατὰ πῶτος lien, atque tum rotundus est tumor. ¹⁰ Ad clauiculā, diaphragmatis sympatē, quae tunica costas succingenti comunicatur ¹¹ Ex prauorū succorū pleonexia: vnde purgationis necessaria significatio fit. ¹² Humoris in aluo corruptione. ¹³ Ex flatulēto spiritu. ¹⁴ Criticus, aut symptomaticus. ¹⁵ Ex translatione materiae, siue acerbi vaporis, per continuitatē interioris tunicae, quae palato & stomacho communis est. ¹⁶ Expurganda prima regio corporis, vt splenica medicamēta ad lienē aditū habeāt. Vt. 2℥. cass. recens extrac. 3. 6. cū saccharo fingatur bolus. Deinde. 2℥. folior. sennae mūd. 3. 3. vel 3. ℔. maceretur in decocto prun. damas. Et statim dilutus superbibatur. ¹⁷ Et quidē sine ratiōe, nec sine periculo.

18] Tamē se-
cundo iudicio
lien per uri-
nas interdum
vacuatur.

Hipp.lib. de
internis affe-
ctionibus.

19 Nā qua-
le est hepatis
absinthium,
talis est lienis
cortex cappa-
ris: & quale
est hepatis eu-
porium, tale
& lienis sco-
lopendrium. Sic
itaq; fiat me-
licratum. ℞.
cort. rad. cap-
par. ʒ. 6. po-
tyod. querni
rātundem: f.
decoct. suffi-
ciens: in cola-
tura dissolue
mellis ʒ. 3. f.
hydrom. Vta-
tur hōris dua-
bus ante pa-
stam.

20 Preser-
tim ex descri-
ptione Paschij
apud Scribo-
largum.

sanguine, qui effluit, lienē inungunt. Veteres enim naturali quadam ratione atque beneficio constare crediderunt, superfusum sanguinē languenti mem- bro præstare medicinam. Quod & Veterinarij re- tinent. Constat quoque certo experimento venas apertas, quæ ad lienem nigricant, vehementer pro- fuisse, ut inde inueteratum malum & contumax omninò curatū sit. Iisdē venis sanguisugæ & cucur- bitulæ cū scarificatione affigi possunt. Sed hæc loca- lia remedia lienī, vacuato iam corpore, cōueniunt.

Purgandum quoque corpus est, idq; interuallis, pharmaco quidem per os sumpto, si magnus tu- mor est, aut superiori visceris partē collocatus. Diu- retica non ita prosunt, quia à liene ad renes non ita comparata via est. Cæterum iuuare possunt alia ratione, quia videlicet incidunt, & aperiunt.

Potiones & melicrata ex cortice radice 19 cap- paris, scolopendria, capillaribus, rosmarino, radice thamarisci, semine agni casti, endiuia, scariolæ, por- tulacæ, seminibus illis maioribus & minoribus, cor- tice & radice salicis, fraxini, genistæ, & aliis, quæ ca- pite de oppilatione hepatis scripta sunt.

Purgationes ex epithymo, foliis sennæ, puluere hieræ 20 diacolocynthidos, & aliis, quæ cap. de melancholia descripta sunt. Ex sero caprino, aqua fabrorum, aut ea, in qua chalybem candentem sæ- pius extinxeris.

Laudatur aqua depurata, quæ è cotibus defluit, cum acuuntur enses. Lixiuuū, oxymel, acerū scylliti- cum, syrupus acetosus, syrupus capill. ven. de pomis, aquæ, & cætera, quæ patim capite de oppilatione hepatis, partim cap. de hydropse dicta sunt.

Capparum ²¹ vsus ex oleo & aceto plurimùm laudatur. Laudatur vas è ligno fraxini, quo vtantur, dum bibunt. Corallus quoque tritus ex syrupo acetofo. Optimum interim erit his vti trochiscis. *℞* puluer. thamarisci, radic. cappar. ceterach, ana ²¹ Capparum vsus, sene de electu minimè est admittendus. *℥*. i. limaturæ chalybis *℥*. *℞*. spicæ, cinamom. ana *℥*. i. sacchari borraginati vnc. i. cum oxymelite fiant trochisci. *Dum enim ex aceto sumuntur, oxymeliam parant.* Adde quod humor melancholicus ab aceto fermentetur. *Hippoc. lib. 3. de vict. rat. in morb. ac.*

Ad vehementem etiam lienis dolorem, inflammationem, duritiem, puncturam, mirabilis est pulvis diacapparon à veteribus sic concinnatus. *℞*. cortic. radic. cappar. exag. 27. (est autem exagium Actuario sextula, sexta vnciæ pars) semin. acetosæ exag. 18. cortic. radic. thamarisci exag. 9. trita in puluerè dentur cum aqua, vel oxymelite, exagij vnus ponder. Decumbat in sinistrum latus æger, & tres horas ieiunet. Sumendi tempus hora noctis media, vel cum sitis vrget. *Sed tales ex vsu esse poterunt cap-pares. ℞. cap-parum lb. 3. passul. Coryn-thiac. lb. 1. reponantur in lb. 1. sac-char. fusi cū ℥. *℞*. cinamomi in vase, & affundatur aliquid aceti. Ha*

Durities verò, quòd attinet ad topica, mollientibus, incidentibus, resoluentibus curanda est. Adstringentia quoque commiscenda, vt inde roboretur ²² viscus, plus minúsve, pro ratione fluxionis & infirmitatis visceris. Molliet hoc vnguento, incides, ac resolues.

℞. ²³ olei de capparibus *℥*. 6. medullæ vituli, pinguedinis anatis, ammoniaci in aceto dissoluti ana

ventriculo non oberunt. ²² Communi enim officio fungitur. ²³ Vel. *℞*. medulla cerui, aut cruris vituli, butyri recentis, olei de cappar. ana lb. 1. ammon. in aceto dissol *℥*. 2. aque rosar. lb. *℞*. coquantur ad consumptionem predictæ aque in balneo marie, quo linatur lienis regio, leuiter fricanda manu.

DE MORB. INTERNIS

3.2. aceti 3.1. ceræ quantum sufficit, fiat emplastrum molle ad formam linguæ bubulæ.

Remollit butyrû, adipex ex cap. 7. lib. 5. de Simpl. & libro 5. de compositione pharmac. secundum genera.

Radix lilij, maluæ, bismaluæ, brancæ vrsinæ siue achanti. Scylla quoque & radices in oleo & vino austero coquuntur, ad consumptionem vini. Deinde ad formam emplastri imponuntur.

Contra tumores & obstructions lienis præstabilissimum istud est vnguentum. ℞. mucagin. feminis althææ extractæ in vino albo tenui 3.6. olei de capparib. 3.1. adipis anatis 3.3. puluer. ceterach. 3.2. f. vnguētum. Aliud. ℞. olei rutacei, ol. de capparib. 3.6. puluer. radic. cappar. 3.1. ceræ & aceti scyllitici parum, fiat vngētum. Vel. ℞. olibani, ammoniac. ana 3.1. dissoluantur cum aceto ad crassitudinem: deinde cum succo brassicæ diu pinsantur, & apponantur ad duritiem splenis.

Ficus pingues similiter præparatæ, ammoniacum in aceto dissolutum, & ex oleo rosaceo, oleo in quo scolopendrium coxerit, oleo amygd. dulcium, de liliis, de cucumere asinino, de hyperico, de ben, de capparibus. Conuenit & emplastrum de meliloto, dialthæas, cerotum œsypi, diachylon sine gummi, cum mucaginibus radicis althææ, lini, scœnugræci. Vbi iam remollita durities est, lapis molaris, pyrites, aut 24 lapis alioqui durissimus aceto acerrimo candens extinguatur: linteis inuoluitur, & sæpe apponitur. Alioqui fumus excipitur. Sed his vtendû est solum, cum iam aliqua ex

24 Aut etiâ
lateres candentes aceto
extincti parti admonen-
tur ad discutiendum.

parte remollitus tumor est. A quorum usu ad remollientia redeundum est, oportetque per intervalla alternatim uti his remediis. Postea verò fortioribus utendum erit, ac primum quidem ammoniaco opopanax miscendus est. ℞. ammoniaci ʒ.i. β. opopanax ʒ.i. Dissoluantur gummi in aceto: deinde malaxentur cum oleo de cucumere asinino. Iam quoque miscebitur emplastrum Agrippæ: & ut minuetur tumor, veniemus ad emplastrum de fermento, ad dropaces, ad sinapismos, ad cauteria tum potentialia (ut vocant) tum actualia.

At si humorum inhibitioni sit eadem opera incumbendum, emplastrum eiusmodi convenientissimum erit.

℞. resinæ fixæ ʒ.12. ceræ, ammoniaci ana ʒ.6. auripigmenti, aluminis scissil. olei veter. ana ʒ.1. s. aceti acrioris q. sufficit ammoniaco soluendo. Sacculis quoque uti oportebit resiccantibus ac resolventibus, nunquam tamen neglecto remollientium usu. Sacculi.

℞. milij parum conquassati P.2. salis P.β. torrefiant in tegula calida. Fiant duo sacculi longitudine dimidij palmi, interpuncti in linteo trito & raro, & perfumigati cum aceto acerrimo, in quo lapis durissimus & igne candens extinctus sit.

Contra rugitus & fluctuantem ²⁶ aquam è regione lienis probatum est hoc veterum remedium.

℞. piperis, cumini, rut. ana exag.10. nitr. exag.9. melle optimo excipe. Dentur manè & vesperti exag.2. Vcl.

℞. nigellæ Romanæ, seminis anis. apij, petros. cumini ana exag. 2. misceatur libr.1. farinæ,

²⁶ Frequens
clysterum ex
decocto capi-
tis veruecini
usus mirifice
confert ad ru-
gitus & flu-
ctuantem a-
quã è lienis
regione.

pistoria arte, fiat panis. Possunt & species è vino dari. Melior panis, si ex aqua decoctionis fraxini pinsatur.

Frequens hoc malum est ortum à frigore, quod post plenilunia frigidiori cœlo, post vsum aquæ & frigidorum magis apparet. In quo purgandum corpus est per intervalla ex hiera aliquando simplici, aliquando diacolocynth. Vel.

℞. aloës succorinæ 3.3. rhab. electi, agar. tro. ana 3.℔. ceterach, scolopendrij, sem. agni casti, & endiuizæ ana ʒ. ℔. cinamomi, asari, spicæ, rasuræ cornu cerui, rasuræ eboris, coralli ana Gra.8. cum aceto scyllitico formentur pilulæ. Vtatur drach. i. singulis hebdomadibus. Exsiccanda quoque aqua sacculis.

℞. cumini P.2. sem. agni casti, sem. rutæ ana 3. i. crassiusculè cōquassata, & in tegula siccata, duobus sacculis (vt prius) includantur, & calidi sacculi alternatim apponantur.

Vaporatio quoque conuenit ex durissimo lapide candente extincto in aceto, in quo ebulus, folia salicis & scolopendrium coxerint.

Vnctiones, quæ in ascite. Radix acori in acri aceto cocta, tum addita octaua parte sem. nasturtij, emplastri modo imponitur.

Lepidium quoque per se tritum, & calido aceto mersum. Videndum tamen ne refrigescant.

Conueniunt spleni à proprietate splen asini domestici, & syluestris, pulli equini, vespertilionis decolati corpus. Crementur hæc in vase testaceo: 3. i. pulueris, vel eo plus, ex oxymelite imperatur.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Σπληνώδεις Hipp. dicuntur, quibus diu obdurit lien. Sed & multi alij sunt lienis tumores, quorum sua signa sunt. De externis & internis lienosi describuntur, si vitiosi malè colorātur, halitus foetet, aluus adstringitur, tumet lien, semper æqualiter emaciantur, vlcera mala contrahunt. Pituitosi minùs hæc patiuntur. Tumor modò decrefcit. Obdurefcit autem ab humore melancholico, vel phlegmone, nec concocta, nec digesta. Sequiturque sæpe humoris melancholici per intestina profusio. Lienem enim *κατὰ ῥέωσιν* vocat Hipp. 6. Epid. quia vel tumore durus deorsum vergit: vel eò sua excrementa abiiicit. Purgatur enim per intestina & hæmorrhoidas, à quibus etiam lienem durum sanari scripsit in eundem librum Gal. com. 5. Vnde Medicus naturalem curationem sequutus, viam & rationem purgandi lienis instituere debet. Neque tamen negamus industria naturæ aliquādo humorem melancholicum per renes & vesicam expurgari, & *πρὸ πυλῶν* id docetur. Sed capite de doloribus capitis annotauimus nullam esse viam communem, ex Galeno in Methodo medēdi, & anatomia, nisi multiplici anfractu in venam cauam regurgitans humor eò perueniat. Hic affectus longus est & periculofus, præsertim superueniente intestinorum difficultate, tum quia intestina læduntur humoris transitu, & vires labefactantur: tum quia hepar simul cum omni venoso genere comparitur, vnde vel refrigerato calore natiuo sequitur hydrops, vel interitus. Nam quod Hipp. 48. Aph. lib 6. scribit, Lienosis superuenire dysenteriam, bonum, intelligendum ratione vacuationis, quæ modum non excedit. In rugitu splenis aliquando impletur colum flatu: aliquando vas, quod à medio ascendit. Sed distinguitur, quia in splene dolor grauis, in vna parte fixus, & sinistra. In colo verò acutus, mobilis, & vagus.

Σπληνώδεις.

Lien κατὰ ῥέωσιν cur fit.

Lienis morbus cur periculosus.

Eadem, quæ in hepate, remedia, sed valentiora conueniunt, incidentia, status discutientia, mollientia, aperientia, thamariscus, ebuli radix vel ireos, puluis scolopēdriæ ceterach, brionia, cortex hedere, radix capparis, diacapparō, olibanū, ammoniacū, oxymel de radicibus, torchilici de eupatorio, cerata, oleū laurinū, emplastra de meliloto

Lieni valentiora quàm hepatis remedia.

DE MORB. INTERNIS

diachylon, lien bubulus, onagri, vespertilio siccatuſ, capite detracto, limatura chalybis, & ſimilia. Democrituſ thamarifci carboneſ igniuſ in vino extinguebat. Aegri cum ſumunt medicamenta, in latus ſiniſtruſ decumbant.

ANTO. VALETII EXERCIT. XL.

Iſdem fermè vitiis tentatur lien, quibuſ hepar, ſed ſæpiuſ obſtructione & ſcirtho, propter ali-
mèti, quod attrahit, ſpeciem. Craſſior enim ſanguis in illiuſ viſceris nutritionem faceſſit. At talis qui-
dem ſuccuſ nunc melancholicuſ, nũc pituitoſuſ in liene imbecillo coaceruatur, neque commodè re-
purgatur: aut etiam miniſtratur ab hepate, propter
eiuſ naturæ alimentorũ uſum, vel ob ſolèniſ cuiuſ-
dam vacuationiſ, vt menſium, hæmorrhoidũ, ſup-
preſſionem. Tumore ſiniſtri hypochondrij cum du-
ritie coniuncto, graui dolore, difficultate ſpiradi, co-
lore corporiſ ſubnigro & plũbeo ſatiſ hic affectuſ
manifeſtuſ euadit. Hũc reuocãtur remedia obſtru-
ctioni hepatiſ adhibita, ſed quæ ſint vehemètiora.
Imprimiſ igitur vacuata prima corporiſ regione
mittitur ſanguis ex interna cubiti ſiniſtri: cuiuſ de-
trahendi quantitatem & vires, & ipſiuſ ſanguiniſ
color indicabunt. Mox materia craſſa & viſcida
parabitur hiſ zulaſiſ.

*Gal. lib. 13.
Methodi, &
li. 2. ad Glau.*

℞. ſyr. capill. ven. oxymeliſ ſimpl. & ſyr. de fumaría
ana ʒ. i. aquar. gram. lupul. & borrag. an ʒ. 2. vel ʒ. 3. f. zu-
lap. pro doſib. 3. Sumat biſ in die duab. hor. antè paſtum.
Vel. ℞. ſyr. de ſcolopendr. de bizantiſ & de epithymo
ana ʒ. i. cum aquis prædictiſ vel cum decocto ſplenico f.
zulaſ. quod cõdiatur pauc. cina. ſantal. citr. vel puluer.
elect. triaſantalini.

Sed uſitatiora ſunt apozemata, cum ſimplicia ſup-
petunt accommodata. Vt.

℥. cortic. radic. cappar. thamarisc. oxylapath. ana ʒ. i. cichorij totius, fol. scolopéd. cetherach, adianth. polytr. fumar. borrag. & buglossi. ana M. j. summit. lupul. thym. epith. cuscut. ana P. i. glycyrrhizæ rasæ ʒ. 2. passul. mund. ʒ. i. quat. sem. frigid. maior. an. ʒ. i. sem. cuscut. anis. fœnic. fumar. ana ʒ. i. ʒ. flor. genist. recent. & triū flor. cardiac. ana P. i. f. decoct. ad quart. ʒ. ℥. prædict. decoct. quart. ʒ. In colatura dissol. oxymel. simpl. vel scyllitic. ʒ. ʒ. f. apozem. clar. & condit. f. art. cap. ut antè, bis in die.

In reliquo decocto infunduntur fol. sen. mund. ʒ. ʒ. agar. troch. ʒ. x. & addita sacchari quātitate sufficēte fit syrup. perfe. coct. cuius ʒ. 2. ʒ. cū decoct. passul. glycyrr. & anisi dissolutæ in hebdomade sumantur. Quæ si parū mouerint, iteratę eiusdē syrupi dosi addetur aliquid electar. diacarth. cōfectionis hamech, aut diaphœnici. Vel in dosi conuenientis decocti, quale est apozematis superioris, infunde foliculor. fennæ mundator. ʒ. 2. agar. troch. ʒ. 4. cinam. ʒ. 2. In expressione dissol. syr. de lupul. & cathol. ana ʒ. ʒ. f. potio. Et quoniā purgationes hīc sæpe ac sæpe repetuntur, & verendum est, ne natura vni aut alteri assuescat remedio, sequēs institui poterit pilu. massa.

℥. massæ interioris pil. sine quib. pil. de fumo terræ ana ʒ. i. ʒ. rhei elect. ʒ. 4. aloës hepatic. agar. recēs troch. ana ʒ. i. sal. gemm. zinziberis, cinam. ana ʒ. i. cum syr. de cichor. simpl. singatur massa. Postea duplici alura contegatur: reponatur in pyxide terrea. Sumat mensibus singulis circa plenilunium, maximè tempore humido & pluuio, pilulas ʒ. pro drach. cum vino albo emollitas, manè hora quart. &, si possit, illis superdormiat.

Topica erunt fomenta, linimenta, emplastra.

℥. flor. chamæm. melil. summit. aneth. prass. scolopend. absynth. parietar. hyssop. thym. bismal. totius, violariæ, mercurialis, fumar. an. M. i. sem. lini, fœnugr. alth. ana ʒ. i. f. decoct. in aqua & vino albo pro fetu lienis cū spongia vel filtro bis in die longè à cibo.

DE MORB. INTERNIS

Deinde linimentum sit huiusmodi.

℥.olei cappar. 3.2. gummi ammoniac.in aceto scyllitico dissoluti 3.℥.assæ odoratæ 3.3. cum modica cera. flitrus pro liene manè & vesperi.

Honorato Castellano Regio Medico, quem mira ac penè inimitabili dexteritate Medicinam facitantes nobis inuiderunt fata, & morte præmatura sustulerunt, familiaris erat litus ex struthiocameli adipe, quo nullum efficacius remedium expertum se mihi de liene conquerenti amicè dixit.

Si inueterarit affectus, atque inceperit scirrhus, quod ex renitentia partis, duritie, pedum inflatione, & aliis eius generis signis dignosces, huic tempestiue occurrendum, metu cachexiæ, hydropis, scirrhi. Itaque incidentia magis, tenuantia, emollientia atque discutientia particularia aptari debent.

℥.radic.cucumer.agrest. alth. & lilior. ana 3.1. coric.rad.cappar. & thamarif. ana 3.℥. mal. bism. rut. scolop. ceth. absynth. ana M.1. sem. fœnic. lini & fœnugr. an. 3.℥. flor. cham. melil. & genist. ana P.℥. decoct. in vino albo & aqua cum aceto pro fœtu lienis cum spong.

Post fœtum hoc cataplasma imponetur.

℥.far. sem. lini & fœnugræci ana 3.1. far. lupinor. 3.℥. puluer. radic. ireos & thamarif. ana 3.2. adip. vitulini, & axung. cunicul. ana 3.1. olei cappar. q.℥. cum magmate superioris decocti f. cataplasma.

Quibus cataplasma displicebit, imperabitur linimētum ex mucag. sem. fœnug. in aq. scolop. extr. olei cappa. & liliac. an. 3.1. ammoniac. in aceto forti & aq. vitæ dissoluti 3.℥. puluer. radic. bryon. & ireos ana 3.2. cum pauc. cera. Vel emplastr. aut ceratum ex eiusdem ammoniaci emolliti in vino albo 3.℥. styrac. cal. 3.2. puluer. rad. ireos Flor. cyper. & aristoloch. rotund. ana 3.℥. axung. anser. & ol. a-

mygdal.dulc.quantitate fuffic.compingetur: & fuper alutam in formam linguæ bubulæ extendetur. Sed & quoniam huius visceris robur femper conſeruandum,talis concinnabitur opiata.

℞.conſeru.roſ.3.2.cōſeru.anth.capill.ven.& bugloſ. ana 3.1.electarij lætificant. Gal.confectionis alker. arom.mat.roſ.ana 3.2.Mythridatij veteris 3.4.cum ſyrupo de ſcolopendria, f.opiata: de qua capiat magnitudinem fabæ hora ſomni,& in exitu lecti.

His ita adminiſtratis ſi perſeueret affectus, crebri iniiciuntur clyſtères, maximè ſi inferna parte lien magis intumeat. Fortioribus quoque purgationibus id visceris laceſſemus,quod (ait Gal.lib.13. Method.) hac duntaxat via lienis ſuperflua vacuentur. Quod controuerſia non caret. Nam & annotauit Hollerius ex Hippocrate libr. de intern. affect. ſecundo iudicio lienem per vrinas expurgari: & ſcripſit Gal. cap.2. libr.2. de arte cur.ad Glauc. lienem cum renibus per vrinarios meatus vacuari. Noui ego religioſum virum, quo cum quotidie familiariter verſor, cui ter, aut quater in anno,maximè Vere & Autumno ineuntibus, intumefcit lien: ac dum prominulus tumor inſtat, dolore hypochondrij infeſtatur,ſubliuidus toto fit corpore, ſenſimq; deterius habet. Sed tandem nigricantibus vrinis atramento ſimillimis,erumpentibus per 5. aut 7.dies, priſtinam reſumit incolumitatem, tumore & grauitate hypochondrij vanefcentibus. Iam à 12. aut 15. annis repetito iſtiusmodi per interualla vinarũ profluuium detinetur, cùm antè turgidas, ſed minùs apertas habuiſſet hæmorrhoidas. Sed hæc parerga.

1 Qui ab intestino colo-
nem habet,
estque dolor
omniū sanis-
simus. Cuius
doloris mul-
tiplex causa
est: materia
crassa & lē-
ta, flatu, hu-
morum acri-
monia, & in-
flammatiō.

2 Qui à pi-
tuita vitrea
intestino af-
fixa ortum
ducit.

3 Ut largio-
re potu, &
fructuū usu.

4 Desidera-
to naturali
clystere, qua
bilis est, quo
pituita va-
cuatur.

5 Galenus
lib. 2. & 6.
de locis malè
affect.

6 Vnde simi-
litudine sym-
ptomatum in
incerto est;
vtra pars af-
ficiatur.

7 Ab obstru-
ctione.

Huius multiplex causa est. Ac primum de 2
phlegmatica dicendum. Itaque colligitur
pituita crassa & frigida, atque aliquando
vitrea, otio, intemperante 3 vita, obstructis viis, 4
per quas bilis in intestinum defluit. Hinc dolor ex-
citatur 5 quasi infixi pali, certoque loco insistit: sed
ut plurimum ad inguem sinistrum, & vtrumque; re-
nem, sursumque aliquando reuoluitur, & locum
mutat, ut sunt fluxus coli intestini, quod relicto in-
testino recto in sinistrum inguen diuertit. Ad sini-
strum renem ascendit, vbi angustius est. Quæ angu-
stia efficiunt aliquando, ut hac parte dolor 6 colic-
us grauis intendatur. Hinc ad splenem & ventri-
culum iam laxius extenditur, subitque hepar, hæ-
retque aliquando cysti fellis. Postremò in dextrum
ilium descendit, vbi definit in cæcum, quod ad re-
nem dextrum possum est. Dolor hic fixus, ut in an-
gustis, quæ ad sinistrum renem sunt, nephriticum
dolorem repræsentat, ut etiam peritos Medicos fal-
lat. Sed in nephritide urinæ 7 tenues, albæ, postea
etiam cum aspero atque sabuloso sedimento. Do-
lor ad coxas 8 extenditur. Fomentis & cataplasma-
tis mitigatur: inde laxatis viis non commutat locum:
aut si commutat, perinæum, & viæ vterum affli-
guntur. In colico hoc dolore urinæ tinctæ & igni-
tæ, quæque biliosum falso repræsentant. Impostu-
ra fit, quia bilis, quæ ad intestinum defluebat, inter-
ceptis viis ad renes diuertit. Præclusæ viæ sunt, ut
neque ructus, neque strepitus ventris exire possit.

8 Obliquo enim ductu secundum ilia ad pubem fertur.

Stercora sine succo, plena flatibus, similia bubulis, quæ iniecta aquæ consistant, neque in fundum demergantur.

Curatio.

Causa mali humor ille frigidus affixus 9 intestino. Symptoma verò dolor, qui si vrget vehementius, prius quidem 10 leniendus est, quàm affectui consulas.

At quæ doloris gratiâ imperantur, ea prodesse solent, vel quia intemperiem 11 corrigunt, vel causam auferunt, vel leniunt atque contemperant, aut stupefaciunt.

Narcoticorum vsus in hoc genere colici doloris omninò suspectus 12 Græcis, permissus Arabibus. Optimum genus est, quod simul & causam 13 tollit, & dolorem attemperat. Secundum, quod solum temperat.

Remedia verò multiplicia. 14 Phlebotomia, purgatio, balnea, exteriùs 15 admota medicamenta, cucurbitulæ, potiones, amuleta, quæq; proprietate 16 quadam colicos curant.

Phlebotomia 17 omnibus ferè relicta est. Octavius approbat. Et nostra 18 memoria efficaci admodum remedio interim vsurpatur: multò magis, si dolor grauiùs vrit: si benè carnosum corpus est: si vires, ætas, & cætera permittunt. Remissionis tempore è basilica dextra, auersionis gratiâ, angusto fo-

9 Qui aut illis generationē habuit localem, aut aliunde affluxit, aut cōtinuēter affluit.

10 Nihil enim æquē facit infirmum

corpus, ac dolor. Hipp. li. 3. de fractur.

11 Partem, & humorem ad equalitatem adducendo.

12 Hi tamē Philonium prescribunt.

13 Purgando, digerēdo, temperamentum partis & habitum restituendo.

14 Si causa cōiuncta vis excitet antecedentem, si phlegmone adsit, si humores doloris vi estu incan-

duerint. 15 Quæ dolorem leniant, flatus discutiant, materiam coquant.

16 Ut intestinum lupinum. 17 Quòd nihil conferre posse videatur, néque ad affectum, néque ad symptomatis correctionem, præsertim cum materia sit vitrea pituita. 18 Cum doloris acerbitas causa magnitudinem superat, succeditque cause coniuncta antecedentis perennis affluxio ex vitio aliquo.

ramine, & modica vacuatione, nisi febris adfit. Tū enim multò liberius, atque etiam copiosius, sanguis depleri potest.

Quòd ad purgationem attinet, quia materia cōtumax est, incidentibus primū, concoquentibus
 19 *Quæ sit* atque detergentibus vtendum est: tum 19 ratione
eruditatis vitæ, tum iis quæ clysteribus iniiciūtur, atque etiam
expers, nimiaque hu- exteriùs admoventur. Conueniūt ergò origanum,
moris abund- mētha, pulegium, marrubium, hyssopus, thymum,
dantiæ, qua- maiorana, ammi, beta, rosmarinus, enula, radix pœ-
que tenuis sit onix, scordion, fefeli, ruta, lybistichum, anetū, cha-
et exquisita. mæmelum, asparagus, anisum, carui, & dauci semi-
 na, vinum teuue, odoriferum, zedoaria, galanga, ca-
 storeum, gallia, aromaticum rosatum, puluis ducis,
 mythridatium, theriaca, confectio de baccis lauri,
 mel anthosatum. Secunda classis. Centaurea ma-
 ior, vrticæ semen, asarum, betæ succus, mercurialis,
 sal, sulphur, ius galli antiqui, ficus siccæ, carthamus.
 Sed hæc classis posterior simplicium deterget ma-
 gis. Iisdem quoque scopis hieram, polypodium, &
 serapinum commiscemus.

20 *Oleum*
etiam nuctū.
 21 *Vulgò di-*
citur oleum
Philosopho-
rum.

Olea conueniunt anethinum, rutaceum, 20 &
 in quibus superiora coxerint. Fortius est 21 p^{er}ro-
 leum, oleum de castoreo, euphorbio, piperibus, sæ-
 pèque gummi in oleo dissoluimus, vt galbanum,
 serapinum, quale hoc est.

℥. galbani ʒ. ss. dissolue in olei rutacei. ʒ. 3. aut
 circiter. Aliquādo etiam & moschum, & algaliā,
 & ciuetam, sed minori modo, in oleo dissoluimus,
 Quale hoc est.

℥. ciuetæ Gr. 4. aut 6. dissolue in oleo rutaceo.
 Inunge. Vel fit illitus è pipere longo & vitello oui.

Sunt

Sunt qui addant oleum anethinum. Diuitibus moschū & algalia eodem modo dissoluantur. Eiusmodi olea vel cum ²² clysteribus iniiciuntur, aliquando quidem per se, aliquando cum decoctione conuenienti: iisdem ea pars, in qua ²³ dolor est, inungitur.

Cæterum oportet hoc in primis animaduertere, ut & incidamus, & concoquamus citra calorem vehementem, & iis quæ minimè inflant. Calidiora verò conuenient iam purgata materiâ, ut inde relicta intemperies corrigatur. Melicrata ex supradicta materia comparari possunt. Et hæ potiones plurimum laudantur.

℥. summitatum absynthij vulg. ꝑ. i. sem. cumini. 3. 2. feruefiant in vino tenui odorifero: expressio bibatur. Aliud.

℥. quarum ²⁴ cordialium 3. 2. aquæ nepetæ 3. i. In quibus dissolue theriacę aut mythridatij ʒ. 2. Vel.

℥. menthæ viridis M. s. efferuescat in vino albo tenui, aut vino mulso. Per tres dies bibitum omnino liberat. Item & marrubij decoctum. Aliud:

℥. vini maluatici. 3. 2. calami aromatici. 3. s. croci Gr. 4. ferueant leuiter in calidis cineribus: colatura bibatur. Similiter ex galangæ & cumini ana 3 i. feruefacti cum vino albo tenui. Vinum absynthis ab Aëtio plurimum commédatur: aluum enim roborat, bilem repurgat, eius generationem prohibet, deterget, ventos propellit, discutit, auertit, spiritus defæcat. Alij, & rectè quidem, adiiciūt cumini momentum, ut 3. l. quæ feruefiat in eo vino.

Probatum quoque & istud est certissimo experimento remedium. Cortex aurengiorum in vi-

²² Ex decocto rerum incidētium, ex tenuantium, detergentium.
²³ Præsertim circum vmbilicum, & vtrumque renem.

²⁴ Vt cardui bened. morsus diaboli, scabiosa, & simil.

no albo coquitur ad tertias. Vinum quotidie ieiuno bibitur. Valet & ad præcautionem, & ad curationem. Sumunt alij, succi herbe veronicæ & vini alb. ana 3. 2. potui dant, & mirificè iuuant. Item illud.

℥. succ. maioranæ ʒ. 4. castor. ʒ. 2. cum vino Hippocratico bibantur.

25 *Ad restituedum intestini habitū, & dolorem leniendum.*

Sed tamē cucurbitula nō nisi ceteris

administra- tis adhībēda.

26 *Sed multo magis clysteribus.*

27 *Vt. ℥. oleor. rutæ, nucum, anethi,*

vinū malua- tici an. quar- ta. 1. cōfectio- nis de baccis

lauri ʒ. ʒ. hieræ picræ

tantundem, fiat clyster.

28 *Vel sine auro, cū pul- uere glycyrrhizæ. Au- riū enim ven- tricula negotium facessit.*

Cucurbitula ampla, & cum multo igne medio vmbilico affigi debet. Coquit enim. Sed vtilior vsus eius futurus est, si prius impleatur vino calido, in quo aliquid ex supra dicta materia coxerit, & ita calida affigatur. Vtile quoq; fuerit aliorum succo, aut re simili inungere parte interiori.

Vbi materia iam attenuata, & ex parte cocta, partim clysteribus, partim ²⁶ cathartici subducen- da est. In clysteribus ex supradicta materia ²⁷ com- paratis mellis anthosati ʒ. 1. olei conuenientis, vt anethini, vel rutacei. ʒ. 3. dissolui debent. Aliquid quoque salis, vt ʒ. 2., potius quàm nitrum, quod ventrem subuertit, dissoluere oportet.

Procedente etiam malo. 3. 2. 3. aut 4. pul. hieræ picræ, aut ʒ. 1. vel ʒ. 6. hieræ, diaphœnici quoq; ʒ. ʒ. aut tantundem terebinthinæ adiici potest. Veteres clysteres imperabant crassiore substantia, ex solo interim oleo, modūque faciebant ad heminas duas, id est, ad duas libras, aut nostro more ad quartaria sex. Purgatio per os leuis esse debet, quales sunt hæ pilulæ frequentatæ.

℥. hieræ picræ. 3. ʒ. cum vino albo tenui formetur tres pilulæ coopertæ ²⁸ foliis auri. Paulò fortiores, si tantum addas rhabarbari, oportetque à leuioribus ad fortiores progredi.

Terebinthina quoque plurimū laudatur. Da-

tur ab 3. 8. ad 3. 1. inuoluta nebulis, ut fiant, quod a-
iunt, morfelli.

Nonnunquam terebinthinæ 29 dimidium 3. 29 *℞. terebinth. 3. 8. hieræ picre*
hieræ, aut rhabbari incorporatur, ut sint terebin-
thinæ. 3. 2. vel 3. *℞. 2. Miste, & fi. bolus cum nebulis exhibendus.*

Fortioribus purgationibus utendum non est, nisi ubi contumacius malum est. Tūque uti lice-
bit 3. 1 pulueris hieræ diacolo. coacta in pilulas. Ali-
quando etiam adici possunt dacrydij Gr. 3. plus mi-
nūscue.

Laudantur purgationes, quæ præterquam quod
purgant, etiam dolorem stupefaciūt. Quibus uten-
dum erit nimium sæuiente malo, quales sunt.

℞. pul. hieræ picræ. 3. 4. opij, croci ana Gr. 1. vel
2. pro viribus ægri. Cogantur pilulæ cum vino. Si-
militer supradictis catharticiis 3. 1. philonij commi-
scebis.

Post purgationes clysteribus, fomentis, balneis
utendum est, usque maximè, quæ dolorem leniant,
qualia sunt chamæmelum, melilotum, anethum,
althæa, semen lini, scœnogræci.

Tuncque utendum erit amuletis, quæ à tota
substantia conueniunt. Intestinum lupi siccatū, tri-
tum datum 3. 1. pondere aut. 3. 4. cum vino albo
tenui, in quo chamæmeli flos, vel anethi efferbue-
rit. Utuntur variè pelle lupi. Alij cubiliū stragulas
contra hoc malum inde comparant. Alij cingulum
gestant, aut partem pellis ventri admovent. Non-
nulli stercus lupinum album tritum ex vino albo
tenui propinant. Meliora putant, si ossa in stercore
inuenta, vnà conterantur. Idem stercus nucula in-
cludunt perforata, suspendūt è collo, ut ad ventrem

*Ex Galeno
lib. 10. Sim-
plic.*

perueniat. Atque in id vtuntur ligula è corio ceruino, aut filo lanæ ouillæ, quæ à lupo interfecta sit, vel, vt alij volunt, quæ à lupo euaserit.

Laudant & anguillæ sanguinem. Alaudæ genus cristatum (quod Galerita dicitur) vstum aut elixum cum iure galli. Stercus gallinæ, quæ exercetur & nutritur sicciore pabulo ex oxycrato. In capite limacum, qui colore sunt cineritio, pellucidus lapis inuenitur: qui tritus, & ex vino, vel aquis cōuenientibus propinatus mirabile contra colicum dolorem remedium præstat. Tunicæ interiores ventriculi erinacei, masculi quidem, in viris: fœminæ, in mulieribus, adiecta tertia parte eorum, quæ incidunt, detergent, & alioqui colicæ conueniunt. Hæc probantur Græcis & Arabibus. Placādis doloribus internis, post omnia tentata remedia, vtimur decocto chamæmeli, aut aqua destillationis eius arte chymica facta, & in potu data. Acerbius verò vexante malo, neque cedente aliis remediis, narcotica permittunt Arabes mixta pharmacis, vt prius, vel aliter. Ac primùm quidem in clysteribus ex leniente materia capita papaueris concoquimus, quibus si nihil efficitur, vtimur flocculis, qualis hic est.

30 Vel potius 3. s. vel gran. 5.

31 Ne longa morâ intestinum labefactet opii, atque adeo stuporis loco venerationis inducat. Philonij

descriptio alia est in cap. de sputo sanguinis.

℥. olei anethini. 3. 2. castorei. 3. s. opij. 30 3. i. misce, & in eo madefac flocculum lanæ, quem è filo suspendes: suspensum impelles in sedem, ac simul atque aquieuerit dolor, 31 retrahes: vel clystere vteturis, cuiusmodi est veterum.

℥. ol. rutacei ʒ. i. opij, castorei an. 3. i. Sed posteritas Medicorū oleo admiscet castorei 3. s. opij. Gr. 5. Per os verò conuenit philonium Rhazæ, cuius hæc descriptio.

℥. piperis, ameos, foliorum rutæ siccorum, menthaſtri, caſtorei, baccarum lauri, cumini ana 3. l. opii, mandragoræ, ſeminis albi hyoſcyami ana 3. ℥. mellis. 3. l. in quo cætera incorporentur: datur. 3. l. Quod ſi catharticum voles efficere, adicies dacrydij ʒ. i. Secretum Albucæſis ex aliis diſtillatis cum opio.

℥. capita alliorum n. 6. opij 3. 3. fiat diſtillatio in alembico, detur modicum eius aquæ.

Aliud Andromachi admirabile, lib. 9. de comp. med. *χρὶ τὸ πονος.*

℥. piperis albi 3. l. opii 3. ℥. croci Gr. 18. ſeminis hyoſcyami albi Gr. 15. ſpicæ nardi, pyrethri, caſtorei, euphorbii ana ʒ. i. vel 3. ℥. excipe melle cocto. Doſis eſt ʒ. i. aut dimidium ʒ. cum aqua frigida. Ad eundem ſcopum facit maximè Caſſii medicamen, Celſo cap. 14. libr. 4. *καλὸν* dictum, quod & potui datum prodeſt, & impoſitum quoque extrinſecus, digerendo ſpiritum, dolorem leuat. ℥. coſti. aniſ. caſtorei an. 3. l. petroſ. 3. l. piper. longi, rotundi, myrrhæ, nardi ana ʒ. i. excipiantur melle.

Curatio colicæ flatuoſæ.

Eadem ferè curatiō doloris colici nati è flatibus. Nam non alia re differt, quàm quod in primo genere, plus eſt materiæ, ventorum minùs. Hic verò inteſtina plurimis flatibus conturbantur, & vel 32 nulla, vel exigua materia eſt.

Propterea minor grauitas, diſtention maior, vt aliquando parte aliqua venter in gibbum extuberet. Singulare remediū hīc eſt, Cucurbitula ampla imbuta, vt priùs dictum eſt, 33 medicamentis, quæ

32 Nulla nō
potest eſſe co-
lici doloris
materia, quæ
doquidē fla-
tus ſuas in-
humoribus
baſe habent
conſtituas.

33 Vi gene-
roſo vino, ma-
luatico, deco-
cto foliorum
baccharū
lauri. Vel al-
io poterit il-
lini.

34 *Vi 2℥. a
quæ decoctio
nis summita-
tum anethi
quartar. 3.
olei commu-
nis vel viola-
ti quartar. 1.
ex hydrelao
fi. clyster.*

flatus discutiant, cum multa flamma medio um-
bilico affixa. Clysteribus primùm vtendum est,
34 qui stercus emolliant. Qualis ex hydrelao,
melle & sale modico. Sed melius fuerit in ea a-
qua, vnde hydrelæum paratur, priùs fuisse in-
cocta, quæ flatus discutiant. Sunt autem cami-
num, ammi, amomû, fœseli, daucus, anisum, fœ-
niculus, petroselinum, caruum, nigella, baccæ
iuniperi, lauri, vrticæ semen, ruta, calamêthum,
pulegium, zinziber, caryophylla, calamus aro-
maticus, cinamomum, piper, galanga. Hæc aro-
mata vino tenui incocta, vel cum vino percola-
ta plurimùm cōueniunt. His autem colicis vina
optima, quæque tenui sunt substantia & odorif-
era, non solum ægris, sed sanis etiã conueniunt.

35 *Tum enim
vitanda ni-
mia humoris
abundantia,
& calor na-
tius excitā-
dus, qui effor-
tus languet.*

Abstineāt aqua, diluto vino, 35 fructibus hu-
midis, & oleribus: quæ ratio vitæ imperatur &
viris & mulieribus frigidioribus, quibus plu-
rimi flatus toto ventre colligi solent. Hic etiam
aristolochia, castoreo, euphorbio, quæ fortio-
ra sunt, vti licet. Ex his omnibus & melicrata
componi possunt vina quoque reddi efficaciora
condiuntur cibi. Olea vngendo sunt, sacculi,
& fometa. Probatissimû mihi est istud linimen-
tû. 2℥. olei rutacei & nardini an. 3. 6. galbani cū
aqua vitæ dissoluti 3. 3. Liquefiant simul. Deinde
cū ciuete ʒ. 4. croc. gr. 6. f. litus. Vel oleû anethi-
num cū vitello oui subigatur, piper tritû adda-
tur, & umbilico adhibeatur. Sed hic, vt & in reli-
quis generibus colici doloris, ratio habenda est
mulierû grauidarû, ne quid iniiciamus, aut etiã
applicemus, vel aliter imperemus, quod abortû
faciat. Quale est castoreû, euphorbiû, amara omnia.

Videndum rursus ne nimium aperientibus utamur. Sic enim fit, ut apertis orificiis uteri sanguis effluat, & sequatur abortus.

Præterea neq; remolliendum, neq; relaxandum nimis. Hinc enim dissolutis uteri vinculis abortio fit.

Curatio colica biliosa.

Inedia ³⁶ colicos iuuat à frigida, lædit ³⁷ verò à calida. A materia acri vehementissimè cruciantur, vomitus biliosi, æruginosi, motus ³⁸ conuulsionis, & animi ³⁹ deliquia, sudores ⁴⁰ interim frigidi, & febris, quibus phlebotomia exiguò ⁴¹ detractò sanguine còuenire potest. Multò magis, si febris adest, aut inflammatio orta in intestino. Sed aliquando hîc & in aliis generibus vrina ita supprimitur, ut inde ⁴² periculum immineat. Qua in re è malleolo vena ⁴³ secanda est. Læduntur hi omnibus acribus & calidis, egéntq; temperatis, deinde etiam frigidis.

Purgatio ⁴⁴ conuenit non molesta, nec aceruatim facta, sed interuallis ex 3. ß. pul. hieræ picræ, 3. 2. ad summum, 3. i. rhabarbari.

Cassia, catholicon ad 3. 10. exhibentur: ⁴⁵ manna ad 3. 2. eaque dissoluere oportet in aqua hordei, prusiana vulgari, sero lactis, decocto passularum, prunorum, sebesten, violarum.

& extinguendâ inediam. ⁴² A suppressione vrine, & eius ad nobiles partes palyndrome. ⁴³ Ad amotionem causæ coniunctæ, & materie, quæ in vitio est, vacatione, tum verò ad vrinæ καταρροήν. ⁴⁴ Ad collectionem biliosi humoris, quam coli intestini distentio sequitur, distentionem dolor. Vt. ʒ. tamariind. ping. passul. num. 1. ana 3. i. prun. damasc. num. 12. sol. end. scariol. borrag. flor. viol. recent. summit. lupuli ana p. i. seminũ end. melon. anisi fensc. glycyrr. ras. ana 3. i. ß. si. decoct. in qua dissolue syrup. violac. multarum expressionum. 3. i. f. potio. ⁴⁵ Manna tutò exhiberi nequit, quòd huiusmodi colici ferè sint πικροχολοι καὶ μεγάλωσπαστικοι.

³⁶ Quòd inedia cruditas tollatur, cuius dolor colicus soboles existit.

³⁷ Quoniam acrior fit bilis, quæ procreata est.

Vnde symptomaticis augetur ægritudo verò inedia perennem affert generationem in biliosis naturis.

³⁸ Vt doloris, ex punctis membranis.

³⁹ Syncopæ stomachicæ per cardium.

⁴⁰ Rapto seroso humore in venas.

⁴¹ Ad prohibendam bilis generationem.

46 *Vt. 2.* Clysteres 46 ex radice & foliis althææ, maluæ,
radi. althææ violariæ, mucagine feminis lini, althææ, psilij, cy-
3.1. fol. viol. doniorum, adiecto interim capite papaueris cum
mal. alth. pa- vitello oui, oleo violato, butyro recēti, adipe anseris,
riet. lactuc. gallinæ, anatis, saccharo violato, aut melle violato.
ana M. 5. se- Virgente interim dolore, vtile erit hoc cataplas-
minis psilij, ma admouere. 2. farinæ lini & hord. ana M 2. co-
cydoniorū, al quantur in oleo chamæmel. si. cataplasma. calidum
thææ an. 3. 2. apponatur. Vel ceratum sequens. 2. ceræ 3. 5. vitell.
furfur. macr. ouor. 2. farinæ fabar. 3. 5. olei chamæm, & ros. ana
hord. integr. 3. 2. Vitellos ouorum cum muccagine feminis lini
an. p. 1. prun. coniunge, & cerato misce.
10. si. decoct. Plerosque curauī lenticulâ, (vasis genere lentis fi-
In colatura guram referente) decocto conuenienti plena, &
ad lb. 1. dis- plantis pedum admota, prouocato inde sudore.
solve cathol. Admouetur quoque conuexa parte caua, è ferro
3. 1. vel 3. 6. albo, vel stanno.
mell. violat. Atque interim si suspitio est exulcerationis, tum
sacchar. rub. plantago, rosæ, sumach, & similia decocto clyste-
an. 3. 1. 5. olei rum miscenda sunt.
viol. 3. 3. vel Plurimum laudantur clysteres ex liquidiore hor-
olei violati deato, aut lacte amygdalarum dulcium ad quarta-
& nenupha- ria quinque: in quibus dissolue butyri recentis 3. 3.
rini ana 3. 1. sacchari violati 3. 1. Qui clysteres, quia leues sunt, si
5. si. clyster. diutiùs retinentur, mel violatum loco sacchari, aut
47 *Primum* Plurimum laudantur clysteres ex liquidiore hor-
temperamēto deato, aut lacte amygdalarum dulcium ad quarta-
frigida: vt ria quinque: in quibus dissolue butyri recentis 3. 3.
iufculæ ex de- sacchari violati 3. 1. Qui clysteres, quia leues sunt, si
cocto pullorū, diutiùs retinentur, mel violatum loco sacchari, aut
cum lactuca, etiam commune miscendum erit.
portu. oxaly- Eadem 47 quoque alimenta sint. Panis, ex 48 au-
de: ptisana stero vino aquæ frigidæ potus, inunctio ex oleo
sen hordea- violato, butyro recenti, oleo chamæmelino atque
tum, prunorū etiam anethino. Sacculi & fomenta ex proximè di-
damascenorū cta materia, chamæmelo, anetho, &c.
vsus, vini Ter die comedat. Nam inedia talibus inimica. 48 *Vt vetriculus cōfirmetur.*
abstinentia,
syr. violace.

Balnea 49 aquæ dulcis. Narcotica in genere fe-
rè necessaria. Verùm Arabes corrigunt non casto-
reo, pipere & similibus, sed croco & 50 stercore
lupi. Quæ si medicamentis miscenda sunt, misce-
buntur, vt priùs, hieræ, rhabarbaro, catholico, cæ-
tera quoque & eadem ratione.

Sunt & alia genera colici doloris, vt ab aposte-
mate, vermibus, intestini descensu, indurata fæce,
de quibus alio loco.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Primùm cum de dolore vètris æger cõqueritur, an sit
sublimis, nècne, considerato. Galenus Aph. 7. lib. 6. su-
blimè & non sublimem distinguit peritonæo, ita vt su-
blimis sit in membrana, & musculis abdominis. Hic aut
dolores leuiores sint, & minùs periculosi, facilièque ex
propriate doloris, & differentiis causa discernitur, ad-
dito partium consensu. Quare cum membrana & mu-
sculi viliores sint partes, & faciliùs remediõrum vim sen-
tiant, de salute & remediõrum inuentione minùs dubi-
tandum. Sin intra peritonæum, maius periculum. Primò-
que num ab vtero, an renibus, distinguit. Solent enim
mulieres à partu, aut quo tempore fluxuri sunt menses,
dolore colico simili torqueri. Sed vtero affecto, dolor
magis est in ligamenti, ad inguina descendit, coxendi-
cus videtur. Quibus adde partum antecedentem. Si ob
difficultatem mensium fluentium, dolor magis circum
renes, quàm in penitioribus partibus, qua partæ venæ &
vasa spermatica ad vterum tendant. In his enim disten-
tio est ob plenitudinem, vnde dolor: qui magis torquet,
cum menstruum tempus appetit. Si à renibus ibi dolor
incipit, fixus est, diuturnus, in vesicam porrigitur, vrina
aquosa, tenuis in principio, vel turbida, aut suppressa, &
similia. Sic de calculo, aut pituita in renibus suspitio est;
de inflammatione verò, si febris iuncta, & magna renum
caliditas sentitur. Alioqui in intestinis affectio est. Mor-
duntur, distendantur flatu, abscessum patiuntur, supra
umbilicum periculosius, infra minùs. Morsus ab intem-

49 Ex deco-
cto viol. agri-
mon. pariet. a.
fol. visis
50 Vel con-
dito borrag.
citrin. myro-
balani.

Colici, dolo-
ris sublimis,
inferio-
Colicus do-
lor ab vtero
ab eo, qui est
a renibus, di-
stinctus.

DE MORB. INTERNIS

Colic. dolor à calida causa.

Colicus à flatu.

Colica symptomata.

perie, inflammatione, pituita vitrea, materia calida. In inflammatione febris & calor. In intemperie cum pituita vitrea, dolor fixus in vna parte, intestinum perforari videtur. A materia calida, dolor acris mordicans, post morbum biliosum, retentam bilem, vt in ictero, calidis irritatur, signa bilis adsunt. A flatu, aut alterius pituitæ multitudine, dolor non ita fixus in vna parte. Iliacus magis fixus, magisque in circuitu vmbilici. Colicus in lateribus potius iuxta fundum ventriculi, siue crassus aut viscosus humor sit, siue flatuosus spiritus interclusus, nec habens exitum. Symptomata sunt, nausea, vomitus pituitosi atque corrupti humoris, multò grauiores, quàm per nephriticos affectus, ob recursum flatuum & materiæ sursum ab intestinis, qui aliquando biliosi sunt, tamen si materia pituitosa, excrementorum retentio, vt ne flatus quidem aut ructus exeat. Sæpe vagus est dolor, modòque hanc, modò illam partem grauius torquet. Circa vmbilicum aliquando sunt grauissima tormina, propter anfractus tenuis intestini sensus vegetioris, in quibus interclusus spiritus dolores facit. circa lumbos propter cæcum & colum, quod illuc sæpe angustius. Deinde quia illuc vincula neruacea sunt, quibus colum & renes inter se alligantur, & renes lumbis. Hoc malum si diuturnum sit, & perseveret, nec remediis cedat, vt fomentis, clysteribus, sacculis, vnguentis & similibus, confirmata est intemperies, & veluti hæctica, quæ difficillimè remoueri potest, vnde imminet periculum hydropis sicci. Si à vacuatione critica, aut sola refrigeratione nondum confirmata, adhibitis remediis facile sedatur. Si hæc non adsunt, non flatus, sed cancer, aut abscessus aliquis dolorificus, metuendus, periculumque imminet, ne marcor hominem è medio tollat. Quod obseruatum est à nobis in D. Zolin Medico perceptum, dico, & Aduocato Gilot, cui colum, qua parte vicinum est reni sinistro, collecta veluti cartilagine dura in scirrhum obduruerat, interiore cavitare eo tumore intercepta, vt nihil transcurreret. Itaque neque clysteribus, neque medicamentis iuuabatur, etià fortibus. Parte dextra colum ad instar Gilot colico magnæ vesicæ dilatatum & extensum, medicamentis datis morbo sublatum. & potionibus plenum. Superiecti, viciniq; musculi abdominis, & peritoneum, saniosa. Post longa, & multorum annorum tormina, è quibus tamè non decumbebat, sexto,

D. Zolin Medico perceptum, collecta à collo cartilagine dura. Aduocatus Gilot colico morbo sublatum.

à quo decubuit, die mortuus est sine febre, nisi quodie obiit, nimirum 5. Martij, 1555. Magister Hieronymus Germanus interna inflammatione, & putrilagine, colico morbo præ-
 tum simile passus est: 4. die obiit, extremis antè frigescē-
 tibus, languescēte pulsu, & sanguineis spectris ob oculos obuersantibus. Quod autè à veteribus scriptum est, co-
 licū dolorē trāsire in Paralyfim, id rarū apud nos: familia-
 re quibusdā populis, vt Britonib⁹. Sacerdoti cuidā anno-
 rū 40. ex assiduo propè dolore colico Paralyfis nata, do-
 lorē soluit, sed māsit Paralyfis annis aliquot. Vires ex pul-
 su nō colligēde, quia in dolore graui pulsus ferè paucus.

*Hieronymus Germanus morbo præ-
 hensus colico simili occum-
 bit.*

In vitrea pituita, vomitus, clysmata initio fortiora, pi-
 lulæ, ynguenta, syrupi. A viscido humore, & flatu, eadē
 remedia cōueniunt, sed imbecilliora, clyster emolliens,
 discutiens, relaxās. A bile aut influxu acris humoris, pur-
 gatio ex hiera, clysteres detergētes, fœtus, aliquando bal-
 neum, pulueres à pastu. In phlegmōne meruēda cathar-
 tica, quæ humores trahunt ad partē affectā. In flatu cu-
 curbitula repētē dolorē aliquādo tollit. Rhabar. myrob.
 ob adstrictiōē: senna, cassia, pruna, māna, dulcia, ob flat⁹
 minūs cōueniunt: balneū quoq;, quibus ad cōuulsiōē,
 paralyfim, arthritidē, natura propensior. A nimium vio-
 lētis inflammationis periculum imminet. Senibus, pueris,
 mulieribus grauidis, imbecillo calore & vitibus, narco-
 tica non exhibēda. In crassis & viscidis humoribus, ini-
 micissima: in acris & calidis, apta: in crassis spiritibus
 cōceduntur. Phlebotomia si febris, & sine hac, vbi acutis-
 simus dolor, & omnia cōsentiūt, sed angusto foramine,
 pauca vacuatione. Veronica trita è vino albo & bibita,
 alanda cristata in cinerē redacta, & esca, cortex mali gra-
 nati, capita veruecis, sursures frixi, cingula è corio lupi,
 alia distillata, tunica interior vētriculi erinacei, anguil-
 læ sanguis, ossa & stercus lupi cum aqua tepida apot, ca-
 storeum, auicula (vulgò Mesange) coralli incisi, triti, &
 ieiuno dati ad cochlearia ij. per tridū, cornu cerni vsti,
 vmbilicus incisus recens nati infantis, vt si modicū de co-
 aurea, vel argentea armilla includatur, & circumferatur,
 cortex mali aurei. Sunt qui membranā inuolutā capiti
 pueri recens nati maximā vim habere contra colicū do-
 lorē affirmant. Propterea si quādo id accidat (nam non
 omnib⁹ accidit) obstetrices seruāt, & experimēto cōstare

*Sacerdos ex
 assiduo colico
 dolore in pa-
 ralyfim inci-
 dit.*

*Que à pro-
 prietate coli-
 cis medetur.*

DE MORB. INTERNIS

asseuerant. Vnde dicuntur (*nais coëffez*) quod felicitatis prælagium dicunt. Natus est mihi filius Iacobus cum ea membrana, quare, quia insignis erat, statim subtraxit, subduxitque anus obstetrix.

Physica quadam ratione mirum in modum profunt, si suo modo & tempore præparentur.

ANTO. VALETII EXERCIT. XLI.

*Doloris colici
ei causa ex
cap. 7. lib. 12.
Meth.*

FActa per distentionem in colo intestino contri-
nui solutione dolorprehendit ingens, qui ab
affecta sede colicus nuncupatur. Huius causæ sunt,
crassus & pituitosus humor intra coli membranas
collectus, qui ventrem excruciat, & tormina facit,
vnde aluius suppressa est, & nausea ac vomitus mo-
lestant: flatuosus spiritus, à quo tensio atque rugi-
tus: inflammatio, cum qua febris adest, dolor in vē-
tre pulsans, vrinæ retentio, bilis vomitiones, quæ
alioqui nihil leuant, atque internus feruor: mor-
dadium humorum collectio, à qua similia prope-
modum, sed paulò mitiora quàm in phlegmone,
symptomata sequuntur. Fit interdum à fæcibus in-
duratis: nonnunquam à lumbricis. Nephriticum
dolorem colicus sæpe ementitur, quia colon rēni-
bus incumbit. Sed vtriúsque distinctio ex peculia-
ribus signis petenda habetur apud Gal. cap. 2. lib. 6.
de loc. mal. affect.

*Colici doloris
curatio.*

Vocatus ad ægrum Medicus hoc vnum impri-
mis studeat, antequam ad affectus causam tollen-
dam aggrediatur, vt doloris vehementiam, quæ sæ-
pius syncopem calamitosam inducit, summoveat.
Sedatur dolor anodynis, clysteribus, potionibus, fri-
ctionibus abdominis, fomētis, litubus, cataplasma-
tis, incessibus, affixis dolenti loco cucurbitulis. Pri-

morum clysterum quantitas minor esse debet, vt diutius retineantur. Maior enim grauando vim irritaret expultricem. Sed & in dolore mitiore licebit eadem opera causam ipsam demoliri. Vt si crassus ac frigidus humor intestinum afficiat, hic imperatur clyster.

℥. mal. bism. violar. pariet. ana M 1. chamæm. summitat. aneth. origan. calamenth. abrot. ana M. ℥. semin. anis. caru. cumin. ameos, fesel. ana 3. ℥. bacchar. laur. semin. rut. ana 3. i. f. decoct. ad ℥b. i. In colatura dissol. cathol. & diaphœn. ana 3. ℥. sacchar. rubr. mell. anthos. ana 3. ℥. olei anethi & chamæm. ana 3. i. f. f. clyster.

Ast vbi flatus præualebunt, ita præscribetur.

℥. decoct. remollientis & carminatiuæ ℥b. i. in qua dissol. cath. 3. i. confect. de baccis lauri. 3. 3. mell. anthos. sacchar. rub. ana 3. i. olei aneth. 3. 3. f. clyster.

Itē si perseveret dolor, denuò clyster alter iniiciatur.

℥. olei lini, olei nuc. ana 3. 3. olei aneth. 3. 4. terebinth. vnc. i. f. clyster.

Terebinthina tum maximè adiicitur, atque etiam oleum de scorpionibus, cum renum malè affectorum suspitio incidit. Quod si biliosa sit causa, comparabuntur clysteres non è solis calfacientibus, sed mistis refrigerantibus: vt si cum remolliitiuis vulgò dictis cichor. endiu. violaria; semin. frigida decoquantur: cassia cum diaphœn. sacchar. mel. viol. oleum viol. & aneth. dissoluantur. Neque verò omitterentur potiones ex phlegmagogis, aut cholagogis, vt erit materia, instituendæ: nec quæ assumpta aut admota profant, qualia ab Hollerio describuntur multa. Colicum dolorem quàm citissimè sedare, quæ ad amplissimum Ducem Aumallium misit Comes Rupefortius remedia, communi notum est experientia. Ea quamuis vulgaria, non grauabor

DE MORB. INTERNIS

subiicere: ℥.malu. bismal. mercurial. ana M.℞. parietar. M.℞.℞. semin.rut. ʒ.℞. Bulliant in æquis vini & aquæ partibus, parca tamen quantitate adhibitis, vt liquoris plurimum per setaceum traiciendi superfit. Herbis & seminib.coctis adde buryr.recent.& olei chamæm.quantum satis sit ad cataplasma. Excipiatur stuppis, dolenti parti applicandum.

Sed antequam cataplasma adhibeatur, spongia decocto imbuta superiori, cui tantillum aceti, aut vini albi immistum sit, fouetur locus. Perseuerante dolore, panis recens cocti in clibano, & adhuc calentis mica imbuitur ol.scorpion. ʒ.℞. ol.ane.h. & rut. ana ʒ.2. quæ puluere tenuissimo è seminib. cumini, anis. & fœniculi parato sinapifata, vt loquuntur, calidè affectæ sedi apponitur. Cæterum si dolor sit à phlegmone, longè operosior incunda curatio, metu ilei, in quem facile degenerat. Valentibus ægri viribus mittitur sanguis. Mollientibus clysteribus sæpe sollicitatur aluus. Admouentur initio repellentia: deinde, vt in reliquis inflammationibus, sensim ad resoluentia venit.

1 Intemperie,
vitiata con-
formatione,
solutione con-
tinui.

2 Criticè, vel
symptomati-
cè.

3 Per Apho.
30. lib.7.

4 Suppressa
quoque cere-
bri vacuatio-
ne solita per
nares.

De alui fluxionibus. CAP. 42.

Fluxiones alui partim vitio 1 ventriculi & intestinorum, partim vitio materiæ excitarī solent. Ea verò materia vel in ventre est cōcepta, vel aliunde 2 translata, vt à cerebro, in fluxu 3 cerebriali. Eiusmodi fluxus solet euenire otiosis, intemperatis, iis qui somno nimium indulgent, quique 4 humidiores sunt cerebro, modò iuncta frigiditate, aliquando etiam caliditate. Humida aëris constitutione, Austrina, & maxime cum sequū-

tur Aquilones, qui per Austros & cælum pluuium collectam materiam exprimunt in ventrem. Com-mouetur fluxio expergefactis, & periodica est. Ex ratione materiæ curatio instituenda est. Nam ali-quando pituita dulcis est, aut expers qualitatís : ali-quando falsa, acris & mordax, quæ distinguenda sunt & curanda, ex iis, quæ cap. de catarrho descri-pta sunt. Nam sistendus est catarrhus, roborandum caput & vētriculus. Roborabitur ventriculus ea ratione, quæ præscripta est cap. de debilitate stoma-chi. Influit aliquando ab hepate, liene, atque etiam yniverso corpore, de quibus postea.

Quæ verò lænteria appellatur, multas causas ha-bet : infirmitatem contentricis non solum ventri-culi, sed etiam primorum intestinorum, è quibus fit alimenti distributio. Infirmitas ex intemperie nascitur : intemperies alias simplex & sine materia : aliquando verò cum materia. Quæ, vt plurimum accidit, falsa s; pituita est.

Fit lænteria & ab acri, 6 humore, aut re alia eiusmodi vim expultricem irritante, vt abiiciat cibū, priusquam confectus sit.

Res autem eiusmodi vlcera sunt saniosa, quæ ab alimento vellicantur, quibus aliquando occasio est pharmaci poruincula retenta in rugis & asperitati-bus vētriculi. Quod ab agarico, colocynthide, me-tallicis, & rebus quibusdam venenatis, vel non satis comminutis, vel maligna qualitate, inferri solet. Duo hæc genera causarum Gal. annotauit 12. Aph. libr. 4. 22. libr. 3. & aliis quoque locis. Magna pars Græcorum, quique Arabes sequuntur, ventriculum putant viscida interim pituita illini, atque ita lubri-

s Vel etiam
acida, eaque
lænteria co-
mitem habet
oxyregmiā.

6 Facit a-
crior ille hu-
mor quasdam
veluti aph-
thas, vnde ex
pultrix facul-
tas irritatur.
Quo modo in
vesica stran-
guria, in ano
tenesmus ex-
citatur.

cari, ut inde districta asperitate & rugis ventriculi læuor quidam sit, & via lubrica, unde celeriter cibus defluat, nec possit contineri, ex qua ratione læ-enteriæ nomen factum est, quod non ita approbat Galenus comm. in Aph. I. lib. 6.

Est & alia læ-enteriæ causa. Post dysenterias & vlcera intestinorum, cicatrices fiunt, quæ si obducantur osculis vasorum, per quæ à tenui intestino ad portas hepatis inuehitur chylus, defluit alimentum aliqua quidem ex parte, sed non omnino confectum.

Est autem in genere læ-enteria coctionis priuatio, cum celeriter alimenta excernuntur, neque consistencia, neque colore, neque odore, neque alia qualitate immutata, sed subalbida, maximè aquosa & liquida, nulla commixta bile, aut sanguine.

Alimenti nomine non solum cibus, sed & potus audiendus est. In ea, quæ ab acri humore, doloris sensus est: qui si perseverat, dysenteria fit. In imbecillitate nullus doloris sensus, & melius eunte morbo, acidi ructus commouentur.

Curatio læ-enteriæ.

Curatio tota in duobus est. Materia 7 vitiosa (quam maximè arguit oris graueolentia, propter corruptum in stomacho humorem, aut cibum) primum est vacuanda. Deinde roborandus ventriculus. Itaque si materia acris est, infarcta tunicis ventriculi & intestini, purgatione ex hiera, rhab. utendum est. Dissoluantur itaque 8 3.2. aut 3. hieræ, aut 3.1. eius pulueris in sero caprino, decocto cicerum rub. vel absynthij. Et quia puluis amarior est, adiicitur purgationi ex eo puluere 3.1. oxyfaccharæ simplicis,

7 Antecedens
& cōiuncta,
pituita acida,
quæ resolui-
tur facultas
retētrix: aut
serum acre &
pituita salsa,
quæ aluum fa-
cit aphthosā.
8 Vt. 2. Pra-
dic. cichor. 3.
1. absynth. in
sine decoctio-
nis positi p. 8
f. decoct. in
qua infunde
rhei electi 3.
2. In expres-
sione dissolue
syrup. de ab-
sint. 3.6. aut
de mentha tā
tundem, f. po-
rio.

simplicis, aut 3.6. syrupi de absynthio. Rhabbarbari 3.1. aut 3.4. infusi in aqua absynthij, aut liquoribus supradictis. Veteres dissolunt in mulla, cui & vis est detergendi, & leniendæ amaritudinis pharmacorum.

In crassiore bile & contumaciùs hærente veteres addebant 3.1. scammonij. Nunc verò satis fuerit, si Gr.4. dacrydij misceantur.

10 Vacuata cacochymia, adstringentibus vtendú, sed modicè, multo etiã min⁹, siqua febris suspitio est.

Probatum remedium antiquis ex tribus partibus succi granatorum acidorum, & vna succi menthæ simul coctis: deinde adiecto melle, vt fieret eclegma. Nostro more vteremur 3.1. oxysaccharæ simpl.

3.3. syrup. de mentha, vt per interualla 2. aut 3. cochlearibus vteretur, aut vt esset liquidius medicamentum, 3.1. iulepi ros. admisceretur.

Laudatum & aliud remedium è cydoniis & malis granatis, vt esset vtriùsque æqualis modus, tum coquerentur ad putrilaginem, atque expresso succo tantum mellis misceretur, quantum satis esset ad eclegma. Nostro more licebit vti syrup. de cydoniis,

& oxysacchara simplici, 11 vtróq; ad 3.6. cum 3.1. iulep. ros. Maximi est momenti diacodion cum sapia factum, quod & somnum conciliet, & ventrem sistat. Simile huic est diaoporon Asclepiadis. 2℥. pipor immaturor. malor. cydon. mal. granat. acidor. dactylor. immaturorum ana 3.1. Coquantur cum mellis rosac. 15.1. donec inspissentur: subductis ab igne adde mac. acaciæ charyophyll. an. 3.6. cinamomi, balaustior. an. 3.2. Seruatur in vso, & datur cum aqua a cisternæ.

10 Nam adstringētibus vena obstruuntur, & huiusmodi tenaciùs adherant.

11 Vt. 2℥. oxysacchara simplicis 3.1. syrup. de mentha 3.6. vtatur ex cochleari, si febris absit.

DE MORB. INTERNIS

Exteriùs cataplasmata, quæ in debilitate stomachi à calore dicta sunt. His remediis celeriter curari scripsit Galen. in Meth.

12 *Galenus*
lib. 8. metho.
Et 9. de comp.
med. local.

In pituita eadem in genere conueniunt: quæ si crassa est, oxymelite & similibus primùm incidenda: tum ex hiera repurganda. Si verò tantùm con-
spersa tunicis ventriculi, solis siccantibus & calfa-
cientibus opus est, vt confectionibus è succo cydo-
niorum cum aromatibus, quas priùs ex Græcis &
Arabibus descripsimus, vino forti antiquo, styptico,
sed modica quantitate. Modus enim potus est, ne
fluitet in ventriculo. Quòd si consuetudo est, dilua-
tur vinum aquâ ferrata, in qua vel cinamomum,
vel mastiche, aut utrùnque coxerit.

Proderit inirificè hic puluisculus. ℞ coriandr.
præp. ʒ. 4. corall. rub. rosar. rubr. rasuræ ebor. cor-
nu cerui, ossis de corde cerui ana ʒ. i. cinamomi ʒ. 2.
sacchari rosati ʒ. 2. fiat puluis subtilis, vtatur in pa-
ne tosto.

13 *Vt forus,*
linimenta, ha-
psi, empla-
stra.

Mastichis Gr. 2. vel 3. in puluerem redacta, & ouo
sorbili excepta, per interualla deuorantur, Chepula
conditæ, nux quoque moschata cõdita, caro cydo-
niorum, gelatina ex iisdem confecta, diacytonium,
zinziber conditum, & alia in debilitatè stomachi à
frigore enumerata. Similiter & quæ exteriùs 13 ap-
plicantur, ceratũ stomachicum Gal. car. cydonior.
emplastr. de gallia.

In calido autem fluxu potest tale emplastrum im-
perari. Mica panis in oleo rosaceo subigitur: dein-
de cum succo semperuiui & lactucæ malaxatur, &
imponitur.

Laudatur vomitus à cœna: & quia cibos non cõ-

tinent, fixa ingenti cucurbitula, eo modo, quo cap. de cholera diximus, ventri affixa, vt contineatur cibus, procurandum est.

Rusticus quidam percuratus est quotidiano vsu coaguli vitulini fabæ parvæ magnitudine cum vino epoti. Sunt qui pulverem ex pudendo ceruino & taurino exsiccatis parant, pani tosto oxyacanthæ succo, vel granatorum, prius imbuto inspergunt, & vtiliter assument. Fiunt etiam è farina fabæ fressæ siccata in clibano, dein pista cum aqua rosacea veteri, & saccharo rosato; nebulæ. Eidem farinæ pasta Regia misceri potest. Quod si nihil iis remediis proficimus, dropace atque sinapismo vtendum.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Laenteria, Coeliaca affectio, diarrhæa, dysenteria, immoderatas alui fluxiones significant, sed vt nominibus, ita natura & causis distinctas. *λαῖον* Græcis læue significat, seu continuum, & nulla ex parte diuulsum, sed sibi vndique cohærens, æquabili superficie. Vnde *λαῖον περιαι*, quasi *λεῖότης τῶν ἐντέρων*, læuitas intestinorum. *ὅτι δὲ ταχῆα διεξοδος τῆς τροφῆς μόνον σίτων ἀμεταβλήτων ἐκχεῖται*, cum cibus & potus, qualia sumpta sunt, celeriter & ante coctionem vllam, aut exiguam, elabuntur è ventriculo & intestinis. Huic igitur duo propria sunt, quibus faciliè discernitur ab aliis: nempe alimenta celeriter, postquam sumpta sunt, per aluum reddi, & mutationem ferè nullam coctione adeptam esse. Id necesse est fieri, vel ob imbecillitatem retentricis ab intemperie, vel irritationem excreticis. Intemperies siue sit in ventriculo, siue in intestinis, quæ anadosi inferuiunt, siue in virisque, aliquando hæctica est, & in habitu, quæ scilicet in ipso corporum habitu firmata est, sic vt calore suppresso coctionem prohibeat, & cibum diluat humiditate: aliquando propter acidam pituitam diutius in-

λαῖον περιαι.

Gale. comm. ad aphor. I. lib. 6.

Laenteria à cæteris alui fluxionibus distincta.

hærentem, vel, vt vult Oribasius, frigidam, crassam & lentam, quæ replet rugosas & sinuosas partes, vnde inducta læuitate cibus effluit. Nonnunquam quoque à medicamento lubricante, aut alimentis pinguibus. Irritatur autem facultas expultrix multitudine materiæ & acrimonia. Multitudine quidem, vt alimentorum multorum, aut propter venarum melsaraicatum obstructionem non distributorum, aut humiditate aliunde confluente dilutorum. Acrimonia verò humoris tenuis, aut alimenti corrupti, aut exulceratione aliqua. Partes enim exulceratæ ex permeante cibo dolorem percipientes, eum à se propellunt.

Sequitur sæpe alios fluxus, diarrhæam, dysenteriam, aut longum morbum, tuncque ferè lethalis est. Quòd si excrementa non egerantur cruda, & impurefacta; sed semicocta, foetida, neq; statim post cibi assumptionem, Cœliaca affectio dicitur, sitque ab iisdem causis, sed præcipuè à cibi corruptione ac cacoachymia, & intemperie ventriculi, siue frigida, siue calida. Vnde Paulus scripsit Cœliacam confundi cum Lænteria, quæ sit ab imbecillitate ventriculi. Merito ergò Gal. reprehendit veteres, qui in his affectibus cibos effluere ob læuitatem intestinorum existimarent. Et si enim hæc quoque causa est, non tamen præcipua, & propria, sed imbecillitas potius, ob quam ventriculus & intestina grauata à cibis assumptis, ipsos confestim excernunt. In medicina faciendâ, tria imprimis cognito morbo spectanda sunt, An sit obstructio in venis melsaraicis, an humor acris, aut pituitosus, & an à capite fluat. Obstructionem indicabunt præter cætera grauitas in hypochondriis, excrementa chylosa, vrinæ tenues. In acrimonia & exulceratione seu abrasa superficie partium, cuiusdam morsus inerit sensus. In imbecillitate, deiectio nullû dolorem efficit. Humorem autem è capite defluere Hippocrates colligi vult ex spumosis excrementis. Quibus (inquit Aph. 30. lib. 7.) in alui profluuiis excrementa spumosa sunt, iis ex capite pituita defluit. Sed hoc non est necessarium, vt Galenus monet. Nam cum causæ continentes spumæ sint spiritus humori mixtus, & motus inæqualitas, vnde frangitur humor in multas partes, siue ob multitudinem calo-

Cœliaca affectio que.

Paulus Aeg. cap. 40. lib. 3.

Gal. ibidem.

Alui fluxus curatur quoque consideranda.

ris, ut in iis, quæ elixantur, siue agitationem, ut in mari: potest à venis proximis, aut ventriculo, aucto feruore, aut agitatione humor cum spiritu mixtus excrementa reddere spumosa. Et in dysenteriiis materia commota, & calore æstuante agitata videmus spumosas deiectiones fieri. Alia igitur signa adiicienda sunt ex his, quæ circa caput apparent, ut grauitas, multitudo sputi, quod mane & noctu vehementius fluat, ægri somnolenti sint, pituita defluente ad ventriculum molestiam quãdam sentiant, & similia. Solent autem, quasi periodis quibusdã, à somno nocturno spumosa excrementa deicere, quibus facillè cerebrum repletur, & ventriculus humidior est. Est enim, ut Hipp. scribit 4. de morbis, cerebrum pituitæ veluti fons quidam: quia velut cucurbitula incumbens corpori, ex vniuerso corpore attrahat, ex quo fluxiones fiunt. Acidi ructus in principio demonstrant pituitam in ventriculo, aut frigidam intemperiem, nec dum prostratas esse vires, sed aliquo tempore cibos retineri, & veluti initium quoddam coctionis fieri. Sed aucta passione cessant, quod malum est. Bonum verò, cum post longum tempus superveniunt, ob eandem causam. Hæc igitur propria natura est, & essentia læenteria & cœliacæ fluxionis. A quibus diarrhæa distinguitur, quia non alimenta, sed humores pravi, multa liquida excrementa, pituita, vel bilis altera, syncera vel mixta, vacuantur, siue ex toto corpore, siue ex aliqua parte.

Cerebrum pituita fons Hippocrati.

Diarrhæa à læenteria & cœliacæ distincta.

Natura enim sese exonerante, si orificium, supremæq; partes valentiores sint, pylorus autem languidior, excrementa deorsum abiiciuntur. Sin contrà, sursum repunt, & pro diarrhæa vomitiones excitant. Modus autem propulsionis eodem modo fit, quo in superiore, irritata excettrice, aut retentrice imbecilla. Symptoma est multorum morborum. Fit enim sæpe in declinatione alicuius morbi acuti, vel post morbos diuturnos, cum varij & diuersi humores purgantur, vel à cute astricta, à medicamentis constringentibus, aëre, si post medicamentū purgans æger aëri se exponat, vel medicamentum sit violentius, aut si singulis annis bis aut ter ita soleat expurgari. Ab inrempie certe frigidiorē vētriculi multitudinem cibi nō coquēte, læenteria creari potius quàm diarrhæa,

DE MORB. INTERNIS

consentaneum est. De dysenteria dicitur sequenti capite. Fiunt & multæ aliæ fluxiones, vitio alicuius visceris, vt inflammatione hepatis, tumore lienis, & similibus, quæ ad alia capita referri debent. Memini me fluxum quendam diuturnum in multis obseruasse, in quo varia, opima, nigra, cœrulea, viridia, satis corpulenta excernebantur. Ex quo alios euasisse, vt Aduocatum De la Vergne Anglum Pœdagogū filij legati Angliæ, & alios, vidimus alios interiisse, vt Malicornium Ducem celebrem pedicatus in exercitu, Haultemanum fabrum argentarium, & similes. Omnibus ferè vitium in visceribus, & vlcus in postremo intestino. Dominus Datchy in vico Templi post sextum annum, quo eo morbo laborauerat, interiit obfesso hepate multis vomitis, syderata parte mesenterij. Gortæus eo morbo in secundum annum functus cōualuit. His, qui conualuerunt, interuallis idem morbus rediit, vel dysenterica excrementa. Anno 1558. Autumno dysenterix salutes iisdem excrementis. In fine purulenta egerebant, de quibus sequente capite. In omnibus certè Aphorismus Hipp. notandus. Si qualia purgari, &c. Et cum duobus modis vacuatio moueatur in nobis, primum beneficio naturæ, vt in acutis morbis, diebus criticis: in longis autem & hominibus sanis, statis temporibus & periodis: deinde à qualitate quadam morbosa, & vi morbi, inordinate & sine periodis: Medicus his fluxionibus obsistere debet: illas sequi, & tardiores iuuare, materiâque naturæ comparare, & comparatam, si natura cessit, vacuare: si vacuatione nimia offendatur, compescere, vt & si sit periculum vel ex transitu humoris, vel læsione alicuius partis, vt in Phthisicis, pulmonum inflammatione & costarum, longa difficultate intestinorum ex scirrho lienis, & similibus.

In diarrhæa, leuiora initio, ne quid in gracilioribus intestinis retineatur, lac, topica, sacculi, vnguenta, forus, cataplasmata, purgatio, clysteres, opiatæ, cucurbitulæ, fumigia, pulueres. In pœenteria, purgatiua, cōfectiones, emplastra, vnguenta, pilulæ, insuersiones, in aluo iusto humidior, parcius potus, isque ad vesicam diuertendus. Vbi alius ficiot, largior potus, isque ab anadysi prohibendus. Vinum tenue & calidū, medicamenta diuretica, mo-

*Zoienterico-
rum historia.*

*Vacuatio duobus
modis in
nobis mouetur.*

eius criticus, multas vrinas faciunt, vnde parua deiectione, quia materiæ pars, quæ per aluum fluere, ad vrinas diuertitur. Sicuti multa eunte deiectione vrina pauca, aquosa, humore ad intestina conuerso. Sudor minuit & deiectionem & vrinam.

ANTO. VALETII EXERCIT. XLII.

Alui fluor, qui communi nomine diarrhæa appellatur, tres causas potissimas, præter intestinalium & ventriculi in temperiæ, agnoscit: humoris nimirum molesti copiam, qualitatem, vel vtramque. Fit autem vel ventriculo & intestinalis primario affectis, vel per cōsensum cerebri, hepatis, corporis totius. A cerebro quidem fluor est spumofus: ab hepate chylosus: à liene niger: à toto corpore pinguis & graecolens. Si à cerebro fiat, vt pote catarrho in aluum ruente, fons, mali primū catharticis humoris accommodatis ex capite de catarrho repetendis exhauritur, nisi fortè naturæ satis per se excernenti totum negotium committatur. Deinde verò excipiente parte confirmata sæpe viribus exolutis cōsulitur. Quod idem in fluxione alui à reliquis causis procurandum. Quæ ventriculum roborēt sumpta & admota, ex capite de ventriculi imbecillitate petantur.

Diarrhæa nomine omnis alui fluor significatur.

Fluor alui summa curatio.

1 *Qua tempestate humor, qui in peculiari cuiusque natura redundare consuevit, exitum non habet.*

2 *Quæ tempestatas pituita salsa est procreatrix, & procreate corruptrix.*
3 *Vt viris et mulieribus præhumidis, quibus non est perspirabile corpus.*

De Dysenteria.

CAP. 43.

Hæc Yeme 1 aquilonia, Vere 2 australi & pluuiofo, calida Æstate, Æstatis fine & Autumno dysenteria fiunt otiosæ, intemperatis, & quibusdam 3 naturis peculiariter, vt lenti- ginosis.

Nam antecedentibus anni partibus pituita cras-

4 Cū pituita viscida ad sphincterem adhærescit, & rectū intestinū exulcerat.

5 A tenuibus quidem, sanguis facit omni ex parte permixtus: à crassis, nullo modo, aut inæqualiter.

6 Vnde deiectiones optimæ, pauca & alba.

7 Propriè dicta, cum vlcus serpiter per omnes intestini anfractus.

8 Lenientibus, detergentibus, adstringentibus, & cicatricè inducentibus.

9 Vt hamorrhoidum, aut menstruorū.

10 Vnde infirmitatis, & synopes metus adferuntur.

sa & viscida in intestinis colligitur. Quod si bilis non pro ratione è cysti fellis in intestinum defluit, nec eam pituitam pro cōsuetudine deterget, multo copiosior pituita in intestino, & bilis toto corpore aceruatur, acceditque cruditas. Hæc omnia æstio calore putrescunt. Primūque illa pituita acris euadit: intestinum vellicat: fit deiiciendi 4 appetentia, inanis aliquando, at interim pauca, vel cum maximo conatu mucosa, & similia albuminibus ouorum egeruntur.

Fit etiam aliquando, vt acrimonia eius humoris clausulæ venarum intestini referentur, & ita aliquid sanguinis vnà cum mucosis illis excrementis 5 deiicitur. Hoc malum non dysenteriam, sed tenesimum appellari volūt. Tum dysenteria est, cum bilis illa putris magno imperu in intestinum confluit, & grauius exulcerat. Radit primū 6 pinguiā, quæ intestino adnata sunt: deinde ramenta: postreimò etiam sanies effluit. Excrementa illa ferè spumosa sunt, quia in dysenteria & febris, & inflammatio est. Itaque motu & calore spuma excitatur.

Omnis 7 dysenteria exulcerario est intestini, aliquando totius quidem, aliquando huius vel illius: quod ad curationem distingui oportet, ex cap. 43. lib. 9. Aëtii.

Curatio est in phlebotomia, purgatione, clysteribus, 8 potionibus, & externis remediis.

Corpore benè carnosio, graui febre atque inflammatione, suppressa aliqua solenni 9 vacuatione, sanguine multo 10 cum excrementis abeunte, consentiente ætate & viribus, vena secari potest, etiam si

Gal. in Comment. ad Glauco. & lib. 4. de ratione victus in acutis repugnare ¹¹ videatur. Verum quia assidua egestione, perpetua ¹² vigilia, febre atq; inflammatione vires maximè laborant, temperandū vacuandi consilium est. Itaque alii humeralem, alii venas extremæ manus aperiri volunt, quia hinc minus viriū cum sanguine effunditur. Potest & basilica aperiri, sed angusto foramine, & paulatim reuulsa atq; etiam vacuata materia. In suppressis purgationibus inferioribus ¹³ venas malleoli aperiri iubent. Quod si fit, eò magis temperanda vacuatio, quòd hinc ductus sanguis ¹⁴ plus virium, quàm è manu exhaurit.

Eadem quoque controuersia de purgatione. Sed iam indubitatum est, vbi & morbi magnitudo, & ¹⁵ cætera non repugnāt. Nullum autem præstantius pharmacum ¹⁶ rhabarbaro, à quo purgatio non solum semel conuenit, sed si res exigit, & vires permittunt, sæpius ¹⁷ repetenda est.

In purgatione consilium esse debet, vt obstructions liberentur, & via facta, redundans materia vacuetur.

Nec ¹⁸ de adstrictione initio cogitandum est. Itaque 9. 4. plus aut minus rhabarbari imperentur. Infundantur in aqua endiuixæ, aut simili, quæ vim habeat liberandæ obstructionis. Aliquando 3. 6. syrup. ros. de siccis nō tam adstrigēdo, quàm roborando commiscuntur. Nonnūquam aromata, cornu cerui, vnicornis, admiscenda putant. Multò ma-

¹¹ Imò non repugnat

Galen. dum vne sectionem in diarrhæa prohibet, non item in dysenteria.

¹² Ob frequentem deiiciendi cupiditatem, & anathymias eos somnifera inopiam.

¹³ Vt fiat humor κατάρροος, qui erat ἀνάρροος, viamque ad loca commoda affeceret.

¹⁴ Tū quòd partes superiores plus habeāt sanguinis, quàm inferiores.

¹⁵ Vt neque vires, neque atas, neque anni cōditio.

¹⁶ Aequè enim natura studet & pu-

gnat cum morbo. ¹⁷ Ob perennem humoris morbifici generationem.

¹⁸ Metu inflammationis febris, & translationis symptomaticæ humoris morbifici ad nobiles partes, vnde pleuritis, peripneumonia, epilepsia.

19 Initio hac poterit prescribi potio, cum vacuandi consilium adierit. 24. rhei electi. 3. 2. macerentur in liquore stillatio endivia & cichorii, floris expressio: cui misce. 3. 1. syrupi violac. f. potio. 20 Praestabit dilutum exhibere cum forti expressione. Sic etiam partes quasque subbibit rhabbarum, cum aliquo torrefactum primas tantum venas permeet. Adde quod rheum torrefactum acrimoniam acquirit, proptereaque intestinis inimicum. Itaque cum adstringendum erit, sic imperabis. 24. rhei electi in tenuiss. puluerem redacti 3. 2. macerentur in liquore conuenienti: f. forte expressio: adde syrupi ros. de siccis 3. 1. f. potio.

hibita regurgitat in partes superiores.

Hinc grauior febris incenditur, epilepsiæ fiunt & conuulsiones, aliâque eiusmodi mala enascuntur. Adde quòd adstringentiâ intestinorum vlcera exasperant.

Sed adstringentium tempestiuus vsus est iam vacuata in totum, vel magna ex parte, vitiosa materia, quòque tempore iam excernitur cum vitioso frugi succus, & inde virium casus metuitur.

In adstringentibus, quæ lenius id præstant, meliora sunt, deinde ad fortiora progredi licet. Videntumque est, vt adstringentibus partim lenientia misceamus, partim etiam, si per os sumuntur, ea quæ vrinas ducant. Sic enim fit, vt nullo periculo materia prohibita ad vrinas diuertat, nec refluat in partes nobiles & superiores. Quo tempore confirmandum hepar est, ne tam facile humores è corpore reliquo recipiat. Quod efficiunt cerati santalini 3. 3. malaxatæ cum oleo rosaceo, extensæ in aluta, vt fiat scutum ad modum crescentis pro hepate. Cætera quoque, quæ capite de debilitate hepatis à calida causa dicta sunt. Eadem ratio stomachi & ventriculi habenda est ex iis, quæ propriis capitibus descripta sunt.

Clysteres primùm leniant: deinde detergeant & abulât: postea etiam carnem regenerent, & consolident. In quibus si oleum dissoluatur, dulce sit, non falsum: aut si falsum est, priùs abluatur, vt falsuginem deponat, & omnem alienam qualitatem.

Clysteribus lenientibus optimum est admisceri

21 Vide histor. 2. vniuersal. lib. 1. *ῥῶϊσιν* vbi de stranguosis agit Hipp. derivatione ab aluo ad renes facta.

22 Nam initio potior esse debet materia cura, quam vlcis in choati.

23 Vt oleum comune, violac. amygdal. dulce.

DE MORB. INTERNIS

24. *Vel rosa-* quod intestinum roboret. In detergentibus & re-
rū p. ij. viol. liquiis intestinorum sensus, & nuditas prius cogno-
M. l. Vel le- scenda est. Alia enim intestina vegetiore sensu sunt,
nientem cly- nec ita inducta pituitâ, non ita carnosa, quibus cle-
sterē sic præ- mentiores clysteres conueniunt.
scribes. 24.

Clysteres lenientes

violariæ, al- 24. 24. *ros. M. l.* Fiat decoctio in lacte recens mul-
th. lactuc. pa- cto ad lb̄ i. lb̄. Colatura fundatur tepida, diu retinea-
riet. summi- tur. Dolorem mitigabis, temperabis ardorem, vlce-
tatum anethi ra ablues & detergebis, illines intestinum, solidabis,
an. M. l. pru- roborabis, vim acrium humorum obtundes. Gale-
nor. n. i. 4. fur nus, Oribasius, Aëtius, solo lacte recens multo vfi
furis macri. sunt. Aliud.
hord. integr.
ros. ana p. l.

feminis alth. 24. 25. *ol. ros. ad lb̄. i.* leuiter calidum pluribus ho-
psil. & cydo. ris retentum dolorem & inflammationem mitiga-
ana 3. 2. rad. bit. Poteris addere semissi libræ olei rosarum, deco-
althææ 3. 1. ctionem maluæ & scœnugræci, feminis lini, althææ
f. decoctio: in & cydoniorum, aut horum mucagines pari men-
qua dissolue sura commiscere.
(si potior sit
ratio mate-

ria, quàm vl- Alij lb̄. i. olei amygdalarum dulcium, mucaginis
ceris) vel bu- sem. cydoniorum extractæ in lacte 3. 4. adiiciunt.
tyr. recentis,

vel ol. amyg. Conuenit amygdaloga, vel orizogala, hordea-
dulc. 3. 2. mel tum, auenatum, liquidiora ad lb̄. i. infusa cum buty-
lis rosati & ri recentis 3. 3. aut pari pondere adipis anatis, anse-
sacchari rub. ris, gallinæ, pinguedinis hirci, caprarū. His enim tu-
an. 3. 1. lb̄. vi- tius vtemur, si qua olei qualitas suspecta est. Amyg-
tellos onorum daloga & orizogala leniunt magis, & contempe-
duos f. clyster. rant. Hordeatum etiam refrigerat. Auenatum sic-
Quod si ro- cat. Conuenitque magis in tenuibus fluxionibus.
borandi con- Ad easdem valet syrupus rosa. de siccis, diacodyon
silium est, ad-
de mucaginis
tragacanthæ extractæ in aqua plantag. 3. lb̄. aut 3. 6. 25. *Hæc ad mate-*
riam, non ad vlcus, præscribuntur.

sine speciebus: horâ somni datur.

Rhazes non habere parem scribit in dolore ab acrimonia, olei rosati lb. i. ß. muscillaginis sem. p silij 3. 4. Laudatur & hic clyster.

Rhazes lib. 9. ad Alex. mans. cap. de dysenter.

℥. sem. lini, althææ, p silij, conquassatorum ana 3. ß. sem. cydoniorum, orizæ & tritici in tegula tostorum ana P. l. fiat decoctio in lacte ad lb. i. ß. In colatura fortiter expressa dissolue sæui hirci, aut pinguedinis rasæ ex abdomine arietis 3. 2. butyri recentis 3. 1. sacchari violati 3. 1. ß. ouorum vitella 2. Vitella miscemus leniendo, & vt diutius inhæreat intestino, quod infusum est. Similiter & sepum, & quicquid pingue est, saccharum & mel detergendo. Vtimur albißimo saccharo, vt lenißimo: gressu verò appellato, vt magis detergente.

Hoc etiam magis melle-rosato & & communi. Celsus hoc clystere dolorem mitigat, apertentiam excitat.

℥. decocti foliorum rosatum quartaria v. vitella ouorum 2. In Dysenteria ferè 26 tormina sunt & flatus. Qua in re summitatû anethi & chamæmeli, florum anthos. & meliloti aliquid miscendum est. Contrà verò sanguinis excretiones taxo barbaro, plâtagine, bursa pastoris, cétinodia, fragaria vtimur.

Clysteres 27 detergentes.

Aqua hordei, serum 28 lactis cum melle, aut saccharo ros. Similiter hydromel. decoctum cicerum rub. parietariæ, fursurum, vinum rubrum, decoctû betæ, 29 centaureæ, radicis cucumeris agrestis, ficuum pinguium, absynthij, lupinorum. Horum vnus quartaria quinque aut libra. In quibus dissolue mell. rosati, sacchati. rub. ana 3. 1. ß. Aliquâdo

26 Ab humoris acrimonia, flatu, aut affectiõe quadam intestini cancerosa. 27 Quibus pugnatur clystere Et acrimonia materie.

28 Aut etiã lac asinum, quod multum habet feri, in quo vis est detergendi. 29 Minoris, si inflâmato nulla sit.

DE MORB. INTERNIS

30 In aqua semuncia terebinthinæ 30 liquidæ cum 3. 2. salis
plantag. aut
rosarū lota. 31 communis. Aut vt detergeas & lenias, detergē-
tia coquuntur in lacte.

31 Ad pitui-
tam contu-
macem. Vel. ʒ. aqu. hord. tb. l. succ. plantag. 3. 4. vitella
ouor. 3. f. clyster.

Fuerit quoque vtile rosas, plantaginem & similia
adstringentia admiscere, vt robores. Vt materia cō-
tumax est, quæ inhæret intestino, plus minúsve de-
tergebis.

Fortiores sunt clysteres ex vrina, lixiuio, muria,
salſugine, aqua ſalsarum oliuarum. Fortioribus viē-
ris, vbi leuioribus nihil effectum est. Detergentibus
dolor interim exasperatur. Itaque reddito clystere
detergente, lac recens multum iniicies, aut clyste-
rem qui leniat.

In carnosus intestinis regeneranda caro: in mem-
branosis consolidandum est. Carnem regenerabis
clystēre, qui primū abluit, deinde impleat carne.
Ablues ē sero lactis & saccharo, ex vino calido, au-
steriusculo, mulsā, & similibus.

32 Sunt hi
pulueres sar-
cotici. Deinde commiscebis 3. 2. pul. 32 gentianæ, thu-
ris, enulæ: tetrapharmaci 3. l. vel eo plus: aut liquori
commiscebis mellis, terebinthinæ & butyri ana 3. 6.

33 Ad leniē-
dū, cōfirman-
dum. & de-
tergendum. Optimūque fuerit hos clysteres 33 diutius reti-
neri, crassiores fieri additis ouorum vitellis.

Consolidant & cicatricem ducunt decoctiones
adstringentiū, in quibus terræ sigillatæ, boli armen.
sanguinis draconis, thuris aut similia 3. 2. vel eo
plus misceantur.

Sunt autem adstringentia alia calida, alia frigi-
da. Calida, nardi spica, absynthium, cinamomum,
caryophyllum, calamus aromaticus, lignum alcē,

galla, thus, mastiche, manna, aloë, myrrha, viscum, iris, gentiana, aristolochia, enula, styrax, 34 *Hæc ta-*
 lis, salvia, arthemisia, thymum, origanum, rosmari- *men ex Ga-*
 nus, pæonia, anisum, ammi, cuminum, nasturtium, *leno vim ha-*
 coagulū hædi & leporis, caseus inueteratus in aqua *bet astrahē-*
 coctus, siccatus, & in puluerem redactus.

Frigida, hyoscyamus, portulaca, lenticula palu-
 stris, pilium, semperuium, cichorium, polygonū,
 lactuca, umbilic⁹ veneris, oxalis, violaria, cucurbita,
 atriplex, solanum. Sed hæc non ita adstringunt,
 35 quia humidiora sunt: quæ sequuntur magis.

Vitis capreoli, amoglossum, rubus, myrthus, ba- *35 Omnia*
 laustia, malicorium, rosa sicca, corna, forba, pruna *enim quæ ad-*
 sylvestria & ptra, mespila, galla, thus, berberis, aca- *stringūt, cras*
 cia, hypocystis, terra sigillata, hæmatites, bolus ar- *fiora sunt.*
 na, sang. draconis, salix, coriandrum in aceto mace-
 ratum, carabe, caphura, corallus, margaritæ, cornu
 cerui, santali, spongia ex aceto expressa, imbuta pi-
 ce, deinde cremata. Interior tunica ventriculi galli-
 narum, erinaceorū, papauer, hyoscyamus, opium.

Aliud est genus clysterum in putridis ac serpen-
 tibus vlceribus intestinorum, in quibus caustica dis-
 soluuntur. Fiunt pastilli caustici ex arrhenico, calce
 viua, auripigmento rubro, mixta acaciâ, & iis quæ
 adstringunt. Coguntur ex succo plantaginis, ex vi-
 no cocto, fiuntque pondere 3. l. 2. aut 3. Dissoluun-
 tur autem in tb. i. vini diluti, in lacte & aliis decoctis
 lenientibus.

Sunt 36 qui addant singulis 3. eorum pastillo-
 rum singula Grana opij, antequam infundantur. 3. 2. opij. ḡ.
 Buccella panis ex aqua frigida, lacte, aut diluto vino
 exhibenda est. *36 Vt. 24.*
pastillorum
descriptorum
3. 2. opij. ḡ.
1. Dissoluan-
tur in libr. i.
lact. fenema.

37 Quod per
sympatheia
intestini la-
befactetur.
38 Ut masti-
chino, mētha,
cydoniorum,
absynthij.

Stomachus 37 myrthino oleo, aut 38 simili ro-
borandus est. Præterea muniendum caput, ne ar-
dore clysteris offendatur. Quod si infuso stoma-
chus exurit, detur frigida ad 3. 4. & lectucæ cau-
liculi ex aceto. Retineri oportet. quod infusum est
ad horam, quod minimùm sit, vel duas, quod plu-
rimùm. Si verò non retinent, sed statim eiciunt
clysteres, muria prius, aqua marina, lixiuium, vrina
cum sale iniicienda.

Anus ex decocto adstringentium fouetur, vel
sacculo è milio & sale expresso in vino nigro ad-
stringente. Post hos clysteres lac recens emulctum
iniiciendum est.

39 Ad ex-
purgationem
materia, par-
tis robur, &
meatum li-
bertatem.
40 Ut primò
lenientibus,
mox detergē-
tibus, postre-
mò adstrin-
gentibus.

Clysterum vsus, vbi exulceratio in inferioribus
intestinis. Si verò in superioribus, potiones conue-
niunt magis. Quanquam perpetuò 39 vtrisque re-
mediis vti licet. Et potionibus 40 quidem eo ordi-
ne, qui in clysteribus præscriptus est, exceptis cau-
sticis.

Ad adstringendum cōueniunt potiones ompha-
comeli veterum. Nunc syrupus de agresta, de myr-
thillis, de ribes, succus cornorum, mēspilorum, co-
toncorum, sorborum, prunorum syluestrium. Co-
quantur succi, & aliquid sacchari rosati admiscea-
tur. Aqua decoctionis sumach, mastiches, & rerum
adstringētium. Alumen tritum 3. l. pondere ex ovo.
Similiter symphyti radix, pūmex tenuissimè tritus
cum vino austero, saluix decoctum, lac vstulatum
cum 3. l. stercoris canini, aut in quo radices quin-
quefolij, consolidæ maioris, & similia coxerint, vel
in quo calculi, vel fluuiatiles, vel marini igniti prius
extincti sint.

Coagulum

Coagulum leporis vel hædi 3. i. pondere è vino veteri abluitur. Datur cum aqua decoctionis sumach, mastiche, succo plantaginis depurato. Puluis factus è turture cum bolo armena, sanguis draconis, & mummia contusa vase testaceo bene lutato, & ita cremata. Dantur 3. 2. ex lacte ouillo cocto.

Conueniunt cydoniatum, conserua rosarum, cornorum, symphyti; & similes. In aquæ rosar. lb. i. bulliant mastiches, sumach, caryophyllana 3. i. lb. fiat decoctio ad 3. 8. pro tribus dosibus. Ouum 41 ex aceto frigitur: deinde conspergitur pulu. adstringente.

41 Acid vetriculo nocet.

Ossa femoris bouilli trita, alumen in succo plantaginis dissoluitur. In eo linteolum immergitur, sicatur, vritur, fit puluis conueniens. Succus expressus ex stercore asinino. Est aliquando, cum multum sanguinem fundunt. Frigida cibaria iis conueniunt, vt aliis dysentericis tepida ac calida. Clysteres itaque, vt prius. Hæc verò potio, macis, balaustiorum ana 3. i. Dato 3. i. aut 3. 4. ex vino adstringente, aliisque remediis vttere, quæ sanguinem sistunt capite de sputo sanguis.

Experimentum cuiusdam est, vt herba Verrucaria, quam Sancti Fiacrij vocat, cum bursæ pastoriæ æquis partibus, aceto & sale additis, tundatur & plantis ægri admoueatur. Atque vbi exsiccantur, innouantur. Alij centinodio ita vtuntur.

Sudor excitatus plurimum prodest viribus valentibus, balneo aut suffumigio ex rebus sudorem mouentibus.

Later calfactus, & vino albo conspersus, inuolutus pannis adhibetur 42 plantis pedum.

42 Aut etiã vasculũ aqua fermento plenum, nisi resolutionis hepaticæ metus aliquis immineat.

DE MORB. INTERNIS

Narcotica conueniunt nondum deiectis viribus. Syrupus de papauere, aqua ros. tepida, in qua coxerint semina papaueris albi.

Suppositoria, vt priùs. In clysteribus dissolue 3. l. trochiscorum de carabe, aut philonij perfici. Quibus si nihil proficimus, dabimus ʒ. i. aut 3. ʒ. ex decoctione mastiches. Philonium capite de colico dolore proximè descriptum, & alia iam multis locis descripta.

Inungendus est venter primùm quidem iis, quæ leniunt: deinde quæ adstringunt, vt oleo de cydoniis, de spica: aut cydoniorum carnes in aceto coquendæ sunt, detractis interioribus, deinde malaxatis. Adde trochiscorum de carabe 3. l. mastiches 3. l. ʒ. Fiat emplastrum, quod fumigetur cum ligno aloës.

Consulendum viribus ex iis, quæ dicta sunt de sputo sanguinis. Ratio vitæ instituenda pro rei necessitate. Leniendum enim, detergendum & adstringendum.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Dysenteria differentia quatuor ex Hippoc. & Galen. Apud Hipp. & Galenum dysenteria differentia quatuor reperiuntur, scd tres priores improprie dictæ. Vna, à copia sanguinis toto corpore redundantis, qui è venarum orificiis apertis in intestina effunditur, vt in hæmorrhoidibus, è venis ani. Vbi vi morbi & vitio corporis, non providentia naturæ excernitur, malum: itaque etiam quoties demittitur sanguis per vias alienas. Sed quedam est naturalis vacuatio sanguinis, vt per vterum mulieribus: quibusdam per nares: aliis in crisi: nonnullis per hæmorrhoidas, naturâ expurgante vitium grauioris mali. His vacationibus suppressis, aut intermissa exercitatione, aut truncato membro, certis intervallis solet huiusmodi dysenteria contingere, quam

cruentam vocant, Græci *αἷμα κρῖον*. In hac sæpe etiam sanguis niger pici liquidæ similis excernitur. Nam cum hepar sanguinem conficit, eius crassio rem partem lien attrahit, & alimêto tenuiori inde sumpto reliquias deiecit deorsum. Si verò hepar multum limosi sanguinis colligat, lien non expurget, neque attrahat, aut attrahat quidem, sed præ copia, aut debilitate non conficiat, aut excrementa sua non expurget, utrôq; viscere copia oppresso & debili factò, fiunt deiectiones nigrae: aut cum antè solita essent expurgari per hæmorrhoidas, vterum, aut hæmorrhagiam, si supprimatur solennis purgatio, acceruat ur humor, & per intestina vacuatur. Sed cum triplex sit materia atrae bilis, sanguis crassior, vt vinum crassum deposita face, limus & fax sanguinis crassioris: & bilis flaua, de his deiectionibus intelligimus, quæ nigrae sunt, neq; grumescunt, nec quicquam acre, corrosens, vel acidum habent, nec effusa in terram feruent, aut fermentant terram, sed sunt veluti sanguis niger, aut limus sanguinis, qui salubriter è corpore sæpe expellitur, & si retineatur diutius, in atram bilem exquisitam transit, & extra vasa nigrescit ac corrumpitur, vnde multis interitus contingit. Ob idque optimè de similibus vacuationibus Hippoc. Sanguinem quidem supra ferri, qualiscunque sit, malum: infra autem, bonum: cum niger deiecitur. Nā partes inferiores superioribus minùs principes. Deinde leuatur natura excremento melancholico, vnde & morbi graues solui possunt, & declinari. Sed reuera multis distinctionibus est opus: num vi symptomatica, naturā, arte excat, quid inde fructus, quidque sequatur incommodi: num signum, an causa, an utrūque. Altera dysenteriae species à Paulò sub priore comprehensa, à Galeno 3. de Sympt. causis distincta, fit non propter sanguinis copiam, sed acrimoniam, bile flaua vel atra permixta, vnde stimolata venarum orificia aperiuntur. Potest initium esse à causa frigida, quando crassa & viscida materia, interceptis angustiis hepatis, putredinem quandam contrahit, vnde cruentæ ac saniosæ deiectiones prodeunt aucto feruore. Hæc priore periculosior, aliquando tamen salutaris. Morbo inclinate, à pharmaco expellente nihil periculi. Si verò prin-

*Hippoc. aph.
25. lib. 5.*

*Paul. Aegin.
meta cap. 42.
lib. 3.*

DE MORB. INTERNIS

cipio & incremento febris, periculum denuntiat. Melius autem quando parcius, quàm cum copiosius effunditur. Multos ipse observavi stantes & sæpius deicientes, nigra etiam fæci aut pici liquidæ similia salutatiter, & in febre, sed natura superante, & non in principio. Natura enim initio coquit, non vacuat, in coctis separat vtilia ab inutilibus. Hæc victrix excernit. Ea enim est naturæ œconomia. Acrimoniâ autem irritante, excrementisque magnam viscerum adustionem & putredinem indicantibus, visceribus nobilibus grauter laborantibus, superaffato crassiore sanguine vel bile, putredine quadam contracta, lethale, quia superior morbus. Bonum verò, cum natura vi medicamenti adiuta ruffi aliquid, vt à Rhabarbaro: nigri, à cassia & Cathol. aliisque id genus excernit, vitio euicto. Cauendum etiam hoc loco, ne frequentius permeante acri humore, vlcus in intestinis contrahatur, semperque à bile deiectiones synceræ metuendæ, & vt causæ, & vt signa grauiorum affectionum. Tertia species est hepatica dysenteria, cum aquosus sanguis deiecitur, loturæ carniū persimilis ab imbecillitate retentricis & alteratricis in hepate, de qua superius dictum est capite de morbis hepatis. Quarta maximè propriè dicta facta in intestinis ab vlcere cum torminibus ventris & dolore, præsertim cum fluunt, vel redduntur excrementa alui. Aliæque à tenesmo, aliæ à diarrheâ incipiunt. Et in aliis, acris materia, in aliis mucosa egeritur. *Quærit Galen. s. de vsu partium. Quomodo illic fieri possit vlcus.* Nam cum sentiant intestina, & vel naturalem bilem, aut leuiter atram statim expellant, qui fit vt descendente materia acri, & celerius expulsa, fiat vlcus? Respondet transitu per anfractus & circumuolutiones id fieri, bile acriore vtrâque, pituitâ verò sæpe inhærente intestino. Putrescit enim, & sanguinem contrahit, sicque exulcerat. Vnde etiam sequitur à quolibet humore dysenteriam veram fieri posse, sanguine acriore (qui aliquando in intestinis concretus refert etiam bilem) pituita, bile vtrâque. Periculum intelligitur ex natura vlceris & humoris vitiosi. In vlcere enim primò videndum quousque progressum sit ex recrements abrasis ab intestino, vt intelligatur

*Dysenteria
hepatica.*

*Dysenteria
maximè propriè
dicta.*

an adhuc sit, an factum sit. Interior tunica intestino-
rum carnosior : exterior magis membranosa : tertia è
peritoneo . Constant fibris circularibus & transuersis,
additis rectis, vt non sine ratione quibusdam visum est,
ad attrahendum, & ad firmamentum aliarum, præci-
puè in recto: quod, quia magis laborat in egerendo
stercore duro, pluribus fibris præditum est. Canibus
eadem ratione plures fibræ in intestinis, quia non nisi
magno conatu excernunt. Sua ergò intestinis carnosa
substantia, quæ semel exesa & erasa eò grauius pericu-
lum denunciat, quò profundius abraditur. Primum pin-
guedo quædam & mucus apparet. Deinde effloratio
quædam & ramenta ex superficie, vt in epidermide cu-
tis. Postremò substantia corpulenta intestini. Est au-
tem veluti caro, non vt musculorum, sed peculiaris in-
testino. Cum qua cruenta deiectio sequitur, interdum
vulcerum crustulæ, & puris magna quantitas. Abradun-
tur enim primò intestina: deinde exeduntur: postre-
mò vlcerantur. Magna ergò parte exempta huius sub-
stantiæ membranosæ, ea neque renasci potest, neque
cicatrice tegi. Vnde desperatio. Galenus quidem scri-
bit multos fuisse seruatos putrefacta interiore tunica,
integra exteriore. Sed hoc in eorum numerum refera-
tur, quæ accidunt aliquando. In iudicando tamen mul-
ti decipiuntur, quòd sæpe pingue aliquid similitudine
fallat, vt albida caruncula videatur. Sed pingue inie-
ctum carbonibus liquatur, & nidorem pinguedinis ef-
fundit. Caro nigrescit & siccatur. Cruor & ramenta
cum extremitatis mixta, nec statim à dolore reiecta,
in tenuioribus: supernatantia, & statim post dolorem
reiecta, in inferioribus intestinis & crassis esse osten-
dunt. Quod attinet ad humorem, qui deiecitur, Hipp. *Gal. commēt.*
sinceras omnes deiectiones periculosas esse vult. Ta- *ad sphor. 23.*
les sunt, impermixtæ aquosæ humiditati, quando so- *lib. 7.*
lus humor, qui vacuatur, deiecitur, siue sit biliosus,
siue melancholicus, siue porri colorem præ se ferat, siue
bilis æruginosæ. Sed id in febre intelligo. Nam deie-
ctiones huiusmodi exustam esse omnem natiuam hu-
miditatem à febre demonstrant. Quæ ab atra bile fit,
Galenus insanabilem dixit, quia non differt à cancro.

DE MORB. INTERNIS

Gal. com. in Aphor. 24. lib. 4. **Qui** in superficie non curatur: quātò minùs in intestinis, vbi nec medicamenta adhærent, & semper superfluitate alimenti irridente tangitur vlcus? In libro quoque de atra bile, omnem exulcerationem ab atra bile insanabilem facit, nisi quis circunciso loco omnē vim eius abscindat, sublata etiam vicinia cum vlcerata parte. Aëtius tamē, si per crism excreta atra bilis dysenteriam mouit, non esse desperandum ait. Si sponte, & non criticè, id est, nulla Naturæ, aut Medici prouidentia, desperatio. Sed caue, ne sanguinem concretum in intestinis referas ad atram bilem. Vidimus qui simile quid crassiori pici nullo periculo & sine febre deiecerent. Alios cum febre & periculo. Monachus quidam apud D. Genouesam dysenteria laborans, cum vi morbi frigerent extrema, nigra, liquidæ pici similia, deieceret, spiraret difficulter, & iam de funere disputaretur, conualuit. Anno 1557. Autumno, tempore benè constituto, pestilentissimæ febres extiterunt, & quæ plurimos sustulerunt: dysenteriarum salutare. Nemo enim, in multis, quos vidi, interijt. Curabantur clysteribus lenibus & rheo. Erant enim ab acri fluxione. Sæpe quidem, sed pauca, egebant. Parum febricitabant, ac rheo dato conquiescebat dolor. Sicque breui liberabantur. Anno sequente, Autumno quoque dysenteriarum multarum, in quibus viridia, cœrulea, nigra, biliosa, cruenta, deiciebantur, & qualia scribuntur lethalia. Tamen omnes propè euaserunt, curâ etiam parum sedulo adhibita. Annus fuerat benè constitutus. Hyeme Aquilonia, Vere australi & pluuioso, Æstate calida, Autumno dysenteriarum. Aliæ ex victus ratione. Vergitinosæ & ruffis magis periculosa. Luteriarum humidiorè anno periculosiores, quàm æstuoso & sicco. In sicco statu anni, materia sapius bilis vtrâque. In pluuioso, pituita putris. Cum cibi fastidium accedit, quibus prius non erat, malum est, & vt signum, quia vtrium intestini ad orificum ventriculi peruenisse significat: & vt causa, quia non instauratur, quare maximè egent. Sæpe etiam latius peruagatur affectio, quàm ad intestina. Adolescens anno 12. natus bilioso profluuiio cum febre correptus deiciebat frequenter similia dysentericis, nigrum sanguinem.

*Aëtius Te-
trab. 3. Serm.
1. cap. 43.*

*Monachus
dysentericus.*

*Dysenteria
humidiorè
anno Luteria
periculosiores*

*Cibifastidium
dysenteria su
perueniens
malum.*

Sitis, manus frigidæ, vigilia, vini magna appetentia. Nihil adiutus remediis obiit die 9. Apertus œsophago inferiore ad vetriculi os superius & ad medium thoracem, nigro, corrupto, epiploo similiter corrupto, pulmonibus alteratis, recto intestino exulcerato. Dolor fuerat in sinistro latere, imo ventre & stomacho. Alteri febris, vomitio, ventris dolor, deiectiones pici & nigro sanguini similes: 20. die mors. Secto corpore inuentum vlcus vstulatum, in ambitu excisis tunicis omnibus ventriculi, qua parte decliuus, est in pylorum. Huic procidit anus ferè toto morbo.

*Dysenterico
rū historia.*

In huius morbi curatione duobus sæpius modis peccatur vulgò: celerius suppressa aluo, & adstringentium vsu impacto pure in inuolucris intestinorum. Suppressa intempestiuè dysenteria vidi insanum factum. Mulierem quoq; , cui in perpetuam vitam ita constricta aluus, vt septimo quoque die tantum excerneret, & inde ore & naribus grauiter oleret. Galenus de venæ sectione contra Erasist. non paucos vidisse scribit, qui dysenteria, varicibus, hæmorrhoidibus suppressis in insaniam, apoplexiam, atram bilem, nephritidem, pleuritidem, hydropisim, sanguinis vomitionem & hæmoptoicam passionem inciderint. Nobilis quidā pictor in scabiem fœdam. Corpore enim pleno materia feruida sursum fertur. Alioqui ita resiccatur intestinum, vt maneat perpetua alui adstrictio. Si sursum & deorsum obseratur, in inuolucris intestinorum aceruat magna puris quantitas, quæ tandem interficit. Quod nos cuiusdā corpore dissecto obseruauimus. Fluxus acris & malignus moderādus hordeatis, clysteribus è lacte, lacte poto & similibus. Interea fouendæ vires, vt impetū natura sustineat. Aliis materia acris, aliis mucosa egeritur, quibus non eadem remedia conueniunt. Quæ à diarrhæa incipit, purgatione, confirmatione partiū, diuersione: quæ à tenesmo, expulsionem stercoreis, detergētibus, lenientibusq; clysterib. opus habet. Conueniunt cholagoga, quæ adstrictionē aliquā relinquāt. Clysteres, abluētes, detergētes, astringētes, cicatrice obducētes, linimēta, forus, potiones ad somnū cōcilandum, syrapi, iulepi, cōdita. Quātitas clysterum augenda ad lb. i. ss. aut i. quia inanita intestina sunt, & melius

*In dysenteria curatione
duplex vitium
cōmittitur.*

Pictor nobilis ex suppressa dysenteria in scabiem fœdā lapsus.

DE MORB. INTERNIS

tergentur. In pulueribus periculum, ne remaneant in parte affecta, & pungant. Sanguinis quoque missio vitanda, quia vires deicis, neque bilem trahit, neque curat vlcus. In cruenta laudatur.

ANTO. VALETII EXERCIT. XLIII.

Dysenteria, seu intestinorum ab vlcere difficultas, inuadit, cū paulatim & breuibus interual-
lis, non affatim & repētē, deiectio fit: quo nomine ab improprie dicta hepatica dysenteria seiungatur. Illius verò deiectionis hi gradus obseruantur, qui magnitudinē vlceris designant. Adiposa primū cum sanguine, dein rametosa quædam, deniq; penitiū grassante vlcere, carunculæ excernūtur. Excitatur hic affectus à bilis, aut pituitæ falsæ prouentu, isque vel in supernis & tenuibus, vel in infernis & crassis intestinis. Itaque vtriusq; dignotio maximū habet ad curationē momentum. Si intestinis à superioribus vniuersus sanguis excernatur, reliquis excrementis erit perfectē permixtus. Si à crassioribus, nō tam benè permiscebitur, sed supernabit. Deinde vbi ramenta sola eiciuntur, si pingue quippiam habeāt, à crassis: si tale nihil, à tenuioribus secedūt intestinīs. Spectandū quoq; an infra, an supra vmbilicum sit dolor. Qui enim infra, crassiora indicat affici intestina: qui supra, tenuiora, quanquam non necessariō. Quærendum item ab ægro, an statim à dolore, an longo pōst tempore excernat.

Curatio in recta victus ratione magna ex parte consistit. Confert hordeatū ex hordeo torrefacto, & in aq. chalybeata cocto, adiectis mali punici acidi granis, semine papaueris albi, & id genus reliquis feminib⁹ frigidis ad tēperacionem bilis opportunis.

*Vlcerum te-
nuiorum &
crassiorū inte-
stinorum di-
stinctio.*

*De his pluri-
bus Gal. cap.
2. lib. 6. de
loc. mal. aff.*

*Dysenteria
curatio.*

Carnes in virium deiectione conceduntur: & elixæ quidem cum portulac. lactuc. plantag. end. Assæ verò aqua rosacea irrorantur, myrthi germinibus cōfiguntur, adstringentibus farciuntur. Vtui sunt fructus, passulæ integr. mespila, sorba, cydonia, & reliqui austeri fructus. Ex aqua chalybeata, saccharo rosaceo, & paucis granatorū acidorum succo paratur potus. Hora sitis Zulapium rosatum per se cum aqua chalybeata, deinde cum syrupo cydoniorum exhibetur. Mox autem humor intestina vellicans atque exulcerans vacuandus, aut aliō deriuandus: potione quidem, si tenuia infestet intestina: clystere magis, si crassa.

Gal. ibid. & lib. 4. Meth.

℥. rh. elect. 3 2. cinam. ʒ. i. infunde in aqu. endiuix *Hac ad dy-*
quantitate suffic. In expressione dissolue rh. puluerati *senteriam te-*
ʒ. i. syrup. de cich. & cydon. ana ʒ. ʒ. f. potus. Vel. ℥. a- *nuum inte-*
grim. centinod. plantag. ana M. ʒ. granor. berber. 3 2. se- *stinor.*
min. plantag. & cydon. ana ʒ. i. cortic. myrob. Cepul.
3 2. f. decoctio & colatura ad dosim. In qua infunde rhei
elect. 3 2. cum paucis santal. citr. In colatura dissolues
syr. myrtill. vel syr. ros. siccat. vel zulapij rosacei ʒ ʒ. cū
3 ʒ. rh. puluerati.

Additur aliquādo ʒ. i. rasuræ cornu cerui, aliquādo gr. 3. aut 4. vnicornis. Sunt qui rheū assant, siue vstulant, vt catharticā vim minuant, & adstringentem augeāt. Quod multi non probant: sed vel fortissimā eius adstrictionem præferūt, aut ipsum rheū totum in substantia præscribunt. Pauperibus catholici 3 6. cum rhabarbari, vt prius, in decocto adstringente infusi ʒ. 2. dissoluētur. Inter purgandū cauendum perpetuò ab omnib. acrioribus & scāmioniatis medicamentis. Post purgationem, venæ sectio reuellendo, sanguinis etiā decurrētis acrimoniā retundēdo, mirificè prodest. Sed cōsulendæ antè sunt

vires: quæ si deiectæ ac infirmæ, vt sæpe sunt, propter copiosam vacuationem, & vehementiam doloris, phlebotome abstinendum. Iuuabunt etiam apozemata refrigerantia in biliosa cephalalgia præscripta: quæ etiam salubriora sunt futura, si per vrinas materiam morbificam deriuent. Cui scopo inservient, vini albi vsus, syrupus cydon, semina frigida maiora. Sed laborantibus crassioribus intestinis plus est auxilij in clysteribus. Qui primi iniiciuntur, detergent ac repurgant intestina iis sordibus, quæ residues & affixæ sua acrimoniâ frequenter desident cupiditatem inducunt. Vt.

℞. ros. rubr. tapf. barbat. plantag. fursur. hord. ana p. 2. f. decoct. in lacte pro duab. iniectionibus. ℞. prædictæ decoct. lb. i. vel quart. 5. In colatura dissol. mell. ros. colati, sacchari albi ana 3. i. ʒ. syr. ros. siccat. 3. i. f. enema, additis ouorum duorum vitellis. ℞. decoctionis eiusdē quart. 3. in q. dissol. sacch. ros. 3. ʒ. syr. cydon. & ros. siccat. ana 3. i. succi plantag. 3. i. vitellum oui vnius, f. clyst.

Maior clysterū quantitas assumitur, cum eluenda & detergenda sunt intestina, quia tum impleri debent: minor, cum adstringendi, glutinandi & consolidandi consilium præponderat: si quidem, id vt præstent, longiore opus habeant retentione. Olea, ac pingua omnia, quæ sordidiora reddunt vlcera, non immiscetur, nisi ineunte dysenteria sedandus sit dolor. Tum enim ol. rosaceum addi poterit. Cum tergendum simul & adstringendum fuerit, talis imperabitur clyster.

℞. fursur. macr. palæ hord. tapf. barb. flor. chamæm. & summat. aneth. ana M. i. f. decoct. vel ex aq. pluuiæ, vel chalybeata, vel hydromelite, vel lacte vstulato ad lb. i. ʒ. In colatura dissol. syrup. ros. siccat. & syr. myrill. ana 3. 2. vitell. ouor. 3. butyr. recent. 3. 3. pul. malti. & sang. drac. ana

3.3. fiant duæ iniectiones, vna manè, altera vesperi.
 Parabitur quoque adstringens & consolidans clyster ex farinæ amyli 3.2. in lacte vstulato (quod cōsumpto sero terget minùs, & adstringit magis) coctis: additis butyri recent. 3.2. adip. hirc. cum butyro liquati 3.1. bol. arme 3.2. vitell. ouor. 2. In eum finè fumuntur oua dura cum aceto cocta, zulap. rosaceum, syrup. cydoniorum. Vt.

℥. syrup. cydon. 3.3. vtatur cum tripl. aqu. chalybeata longè à pastu.

Imminutæ autem vires roborabūtur cōditis, opiatis, instauratitiis destillatis. Hæc opiata omniū huius generis remediorum instar esse poterit.

℥. conseru. symph. conseru. antiq. ros. & cōser. borraginis ana 3.6. electar. diarhod. Abbatis, & diamargar. frigid. ana 3.1. 6. cortic. citr. conditi 3.2. cum syrup. ros. siccar. aut cydon. f. opiata.

Confirmabitur etiam vētricus admotis: vt litu ex oleis cydon. & mastichino: emplastro è carne cydo. mastich. & cerato stomachico Galeni cū oleo myrtillor. emollitis cōfecto, & aliis similibus. Quod si, vt ferè fit, humorū acrimonia spinctērem musculum exerceat, hoc vnguento commodè retundetur.

℥. mucag. sem. cydon. & psilij extractæ in aq. plantag. vng. popul. ana 3.1. vitell. oui vnius, ceræ q. s. f. vng. quod è gossipio in modum glandis efformatum, & filo appesum, in anum immittatur.

Eidem ano præ imbecillitate à frequēti deiectione orta, hianti, ac velut procidenti, vtile erit hoc fomentum instituere. ℥. tapf. barb. ros. rub. centinod. & plantag. ana M. i. f. decoct. in aq. fabr. & vini rub. æquis partib. pro foru ani cū spongiis. Alij imperāt puluerem ex thur. ros. rub. mastich. qui igni impositus fumum reddit ægro per annum excipiendum.

1 Ab vicere
superstite à
dysenteria,
vel ab omni
materia que
dysenteriam
facit.

2 Reseratis
vasorū oscu-
lis ab acri
materia, aut
superstite vl-
cere.

3 Tempesta-
re præsertim
austrina, qua
pituita falsa
parens est.

4 Generatio-
ne multa, aut
excretrice vi
imbecilla, aut
desiderato na-
turali clyste-
re ob folliculi
fellis obstru-
ctionem.

Tenesmus irritatio 1 est ultimæ partis in-
testini, id est, recti, in quo sæpius libet sine
causa defurgere. Excernuntur omninò pau-
ca, mucosa, idque maximo conatu, insidentque
stercori guttæ 2 sanguinis. Hic si præter mucosa
stercora excernuntur, ea cocta ferè sunt. Nascitur
hec affectio magna ex parte in 3 pituitosis. 4 Acer-
uatur enim pituita recto intestino crassa & viscida:
putrescit, tempore acrimoniam contrahit, irritat in-
testinum: hinc deiiciendi libido. Sed quia contu-
maciùs inhæret pituita, non nisi magno conatu ex-
cerni potest. Hoc tenesmi genus dysenteriam ferè
præcedit.

Aliud verò genus hanc sequitur. A dysenteria
relinquuntur vlcera, in quibus acris sanies intesti-
num vellicat, ex quo fit tenesmus, inanis desidendi
cupiditas.

Post phar. si quid intestino hæsit, vt malè infria-
ta coloc. aga. aut similibus, eadem affectio nascetur.
Vlceribus quoque in ea parte sponte natis idem ac-
cidit. Abscessus in recto intestino natus eandem ap-
petentiam inuehit nonnunquam.

Curatio.

Initio causa cognoscenda est. Quod si præcessit
frigus, & pituita crassa in causa est, rutam, hyssopū,
origanum, calamentum, rosmarinū, maioranam,
lauri folia, stœchades, anethum, melilotum, cha-
memelum, vino incoques: hinc fovebis sedem: ma-
teriam calidam emplastri modo toti perinæo in-
duces.

Iuuant fotus 5 ex oleo rutaceo, chamæmelino, anethino, ſeſamino. In vehementi 6 frigore oleo, in quo decima pars caſtorei aut bituminis diſſoluta ſit. In dolore anetino & irino vtendum erit. Eiuſmodi oleis fouere & vngere oportet perinæum & imum ventrem, iſque calidis. Deinde contegendæ partes duplici aut triplici linteo calfacto.

Laterem veterem denigratum fumo cōfringes, & comminues: aceto feruēti immerges: inuolues linteo, & calidum ſedi totique perinæo applicabis. Molle filtrum, aut cottonem, vel ſpongiā molliorem ſæpius immerges vino calido, in quo ruta, fœniculus & quædam ex ſupradicta materia coxerint. Deinde expreſſa, ſed calida, ſedi ac perinæo applicabis. Poſt forum linteis calentibus muniendę partes, omninoque videndum eſt, ne refrigerſcant. Laudantur hac in re ſuffumigia ex reſina pini iniecta carbonibus, nuce pinea, bene reſinoſa, aliquando addito ſemine rutæ, cumini, aniſi, fœniculi, vel hoc modo.

℥. 7 picis ſiccæ ʒ. i. bituminis ʒ. ſ. liquentur in aceto: liquatis inſperge ſulphuris in puluerem reducti ʒ. ſ.

Clyſteres ad quartaria 2. vel 3. ex iis comparantur, quæ calefaciunt, incidunt, detergent, leniunt, quales proximo capite deſcripti ſunt in dyſſenteria.

Similiter ſuppoſitoria ex labdano, ſtyrace, oleo rutaceo, adiectis ſeminibus fœniculi, rutæ, aniſi, cumini, & ſimilibus.

Si dolor vrget 8 vehementius, narcoticis 9 vtendum erit, vt prius.

Sacculi fouendæ ſedi & perinæo ex milio, fur-

5 Hi im-
buetur hap-
ſus ex goſſi-
pio carpto, &
perinæo ad-
mouebitur.

6 Vt iſ ac-
cidit, qui ſine
ſubligaculis
per niues de
ambulāuant,
aut lapidi
inſederunt.

7 Ex hiſ
ſunt, trochi-
ſci, quorum
halitus ſeu
fumus ſede
excipiendus.

8 Vt ſi cau-
ſa magnitu-
dinem vincat
doloris vehē-
mentia, inſta-
mationiſque
meth' aſſerat.

9 Vt Philo-
nio in lacte
diſſoluto, aut
ſapa. Aut
coquetur fur-
fur cum ſa-
pa ad pulvis
conſiſtentiam
hinc diſſolu-
tur opꝝ ʒ. 3.
aut 4. Inſi-
ciatur.

DE MORB. INTERNIS

furibus, sale, rutâ, & descripta materia frixis in sarta-
gine, deinde sacculo inclusis. Quod si inflammatio
est, & cætera consentiunt, vena brachij interna se-
canda est.

10 *Ob im-* Probatur quoque Arabibus purgatio levis è cas-
pensum calo- sia, manna 10 suspecta Græcis. Vrina & sudor pro-
rē, quem fa- uocari possunt ad diuersionem, victus refrigerans.
cile contra- Clysteres lenientes è lacte, hordeato, oleo rosaceo
hit. tepidis, & aliis, vt prius.

Infessiones in decocto maluæ, bismaluæ, sem-
nis lini, violariæ, adiecta portunculâ florum cha-
mæmeli & meliloti.

Olea conuenient, rosaceum, violatum & nenu-
pharinum, in quo folia salicis coxeris. Deinde e-
tiam axungia, butyrû recens, ex quibus & vnguen-
ta fiunt: quale hoc est.

11 *Vt. 2℥. de-* 2℥. olei rosati 3. i. olei salicis & violarum ana 3.
coct. hordei, 3. ℞. mucaginis quatuor seminum frigidorum in aqua
aut aque cydoniorum extractæ 3. 6. ceræ modicum, fiat vn-
mulse (si non guentum.
sit ardor) 3.

6. mell. ros. Molli gossipio in aceto albo feruente partes fo-
colati 3. i. his uendæ sunt, id est, imus venter & perinaeon.
cômistis fiat

enema. 11 *Vel 2℥. a-* Vlcera si qua sunt, abluenda 11 primùm sero la-
*axungia suil- ctis, vino austero, mulsâ, etiam lixiuio, si sanies con-
la 3. i. cerus- tumaciore est, aut vino austeriusculo tepido, & sexta
sa, pompholy- parte mellis rosati, quibus postea adiiciatur aliquid
gis lota ana rosarum, thuris, mastichis, gummi arabici, tragacan-
3. i. cum a- thi, & similibus. Aut fiant hæc vnguenta.*

qua plantag. 12 *f. vnguentū.* 2℥. cerussæ plumbi 3. i. mucagi. gummi arabi-
ci extractæ in aqua rosarum 3. ℞. corticis thuris 3. i.
olei rosacei quantum sufficit ad impinguandum.
Aliud.

℥. mucaginis gummi tragacanthi & arabici, mucaginis seminis psilij ana ʒ. ʒ. aloës lotæ ʒ. 2. olei rosarum, quod sufficit. Cum modico ceræ fiat unguentum. Hæc inunguntur ulceribus, si quidem apparent. Alioqui commiscantur clysteribus iis, qui ad consolidandum descripti sunt, cap. de dysenteria. Potus lactis caprini primum quidem ad ℥. i. quæ paulatim bibitur, non accruatim. Postridie verò ad ℥. ʒ. remedio est tenesmo. Oportet primo die recens mulctum bibere. Postridie decoctum ad dimidias, & despumatum.

Decoctum betonicæ in vino albo tenui, laudatur ab antiquis.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Tenesmus; affectus est præter naturam in recto intestino, in quo assidua & implacabili desidendi cupiditate æger tenetur: vel, ut alij, irritatio ultimæ partis intestini, in qua sæpius lubet sine causa desidere. Initio excernuntur pauca, mucosa, magno conatu, aliquando conspersa sanguine, sitque velut procemium dysentericæ. Hic necesse est naturam stimulari in intestino ab aliqua causa præter naturam, quam excernere nititur, quasi illic esset excrementum. Ea est vel sine materia, vel cum materia: & si cum materia, vel in cavitatem intestini continetur, vel extrinsecus comprimit meatum. Sine materia intelligimus, ut cum frigus partem illam constringit & mordicat, ut si æger in folio frigido, aut lapide sederit, aëre, vento frigidior. Aliquando reduplicatur intestinum, vel musculus, ut nec clysteres, nec alia auxilia excipiat pars implicata, sæpèq; efficiat, ut lateat vlcus. Materiam vero dicimus, quicquid interiorem illam cavitatem irritare potest, vel vlcus (nisi tum dysenteriam esse velis) vel abscessus, vel hæmorrhoides interiores, aut vermes, aut humor acris, aut sterces induratum & coactum. Quæ omnia tum ex relatu ægri, tum excrementis & doloris pro-

*Tenesmus.**Tenesmi causa vel cum materia, vel sine materia.*

DE MORB. INTERNIS

prietate artificiosa coniectura discernere licebit. In ulcere excernitur sanies aut sanguis, dolor acutus, humor acris relictus post dysenteriam, & si nihil perspicui potest, profundam esse suspicamur, fitq; aliquando cacoëthes. Vidimus vermium globulos assidue reiici, ac subinde renasci. Ante dysenteriam ferè fit à pituita putri: in dysenteria, ab acrimonia, vel medicamento malè infriato, vel glande immissa. Aliquando iecur plus iusto calefactum acriorem materiam perpetuò generat, quæ ad partem affectam defluit. Reiicitur, sentitur morsus, quandoque sequitur febris quasi hectica, & paulatim atrophia. Stercus induratum coniicimus, si diu æger nihil reddiderit, aut non nisicrementa dura, sicca, sine mucositate, Extrinsecus comprimitur & pungitur vel à magno & inæquali vesicæ calculo, quia vesica recto intestino incumbit, vel inflammatione parastatum. Hic adest penis distentio, ardor urinx. Illic calculi signa adiicienda, urina retenta, turbulenta, sanguinolenta, & similia. In gravidis minatur abortum, ut scripsit Hipp. Vterus enim inter vesicam & rectum intestinum situs est, foetusque concepto amplior, & vesicam (vnde assidue meiendi cupiditas) & intestinum premit. Quo fit ut etiam in laboribus partus, & alio quoque tempore tenesmi cuiusdam imago illis eveniat, & si hoc morbo vehementius corripiatur, in vehementi illo conatu necesse est laborare uterum, foetum quoque deprimi assiduo decessu, & vires lædi. Vnde abortus. Interdum tam vehemens affectus est, ut dysenterix similis videatur.

*Tenesmus
gravidis ab-
ortum mina-
tur.*

Curatur sublata causâ & affectu, vnde nascitur. clysteres ex hydromelite probè cocto cum rebus coquantibus, carminantibus, detergentibus. Omnes in minima quantitate ad ℥. j. aut ℔. j. quia intestinum ferè strictum, & ultima tantum pars abluenda. Infusus in decoctione pingui, inunctio, in ulcere unguentum Ægyptiacum, foras ex vino, in quo ruta, vel quæ coquant, incendant, confirment, coxerint. Later vetus fumo denigratus aceto feruenti, ut excipiatur fumus, linteo conuolutus, admotus, & similia.

ANTO.

ANTO. VALETII EXERCIT XLIII.

Tενεσμός, seu Τενεσμός affectus est à sympto-
mate nomen habens, videlicet à tensione, quæ
recti intestini extremitatibus incumbit. Causis, &
symptomatis cum dysenteria cōuenit: & propterea
scripsit Galenus tenesmum quandam constituere *Gal. lib. 3. de*
dysenteria differentiam. A bile igitur, aut pituita *sympt. causis.*
falsa si ortum habeat, hūc reuocantur remedia ad
dysenteriam imperata, cathartica, enemata, tum e-
tiam ea, quæ refrigerando humores contemperat,
quæque per vrinas materiam deriuant, apozema-
ta & zulapia. Quod si frigori aut flatibus accepta
referatur causa, fomenta calida satis esse poterunt.

De curatione hepatici¹ fluxus.

CAP. 45.

¹ Hunc he-
paticam dy-
senteriam vo-
cant.

Hepate calidiore excremēa durissima & si-
mililia pilulis caprarum, vnde *αυτεγατόδι*
à Græcis, nisi iuncta sit imbecillitas. Hic e-
nim biliosa, liquidiora, & vt ² augetur calor, insi-
gniter flaua, crassiora, grauiter olentia, æruginosa, ² *Humoris*
nigricantia, assatis humoribus, & postremo colli- ^{suppressione}
quata hepatis substantia. Hic sitis, ardor, deiecta ap- ^{& astu.}
petentia, assidua corporis iactatio, difficilis ³ cura-
tio. In infirmitate attractricis hepatis, chylosa. In in- ³ *Vehemen-*
firmitate alteratricis primū quidem loturæ car- ^{tia sympto-}
nium similia, & sanguini diluto aqua: deinde varia ^{matum, hu-}
qualitate & consistentia, interim quasi limus san- ^{moris contu-}
guinis & grumus. Integra ferè appetentia, sitis nul- ^{macia, reso-}
la, frigoris sensus, foetor exiguus. Hepatici fluxus ^{luta hepatis}
nocte excitantur magis, longioribus ^{vi ac substā-}
⁴ interuallis. ^{tia.}

⁴ *Gale. cap.*
2. lib. 6. de lo-
cis malè af-
fect.

6 *℞. 2℥. ce-
rati santali-
ni 3. i. pulue.*

Horum curatio ex capite de debilitate hepatis pe-
tenda est,

*subtilissimi
corall. rub.*

In summa vtendum est refrigerantibus, si infir-
mitas à calido est: calefaciētibus, si à frigido. In vtrif-
que vitanda sunt, quæ obstruunt. In calida.

*℞. 4. mala-
xentur cum*

2℥. electarij triasant. 3. 2. coriandri præparati 3. i.

*oleo cydonio-
rū, f. empla-*

semin. acetosæ & portulacæ ana 3. i. coralli rubri

strum in for-

3. 6. sacchari rosati 3. 6. misce, vtatur in iusculis, in

mā lunæ cre-

hordeatis, in potu.

*scientis, &
dextro hypo-*

Syrupi conueniunt, rosatus, de ribes, myrrhinus,

chondrio ad

cydoniorum, vel iulepus cum multa aqua ferrata.

7 Materia

Spodium, semē portulacæ, acetosæ, corall. rubr. flos

scilicet cōue-

rosarum, & semen arilli, lappa, cichorium, endiuia,

nit, quæ pe-

sonchus, coriandrum præparatum, acetositas citri,

netrat, vt cy-

ptisana, & similia conueniunt. Ceratum 6 santali-

perus, schæ-

num subactum è rosaceo, ceratū ex oleo rosarum,

nuanth. quæ

deinde subactum cum succo cichorij, endiuia, son-

aperit, vt ab-

chi, plātaginis, & tantillo succi absynthij, vel eupa-

apert. cicho-

torij. Ceratis inspergi possunt pulueres ex proximē

rium: lenit,

dicta materia.

vt passula,

In 7 frigida, vnde lotura carniū, electarium

vinum gra-

de vino prius descriptum, mel passulatum hoc mo-

do præparatum.

2℥. passularum benè pinguium M. 2. fiat deco-

ctio ad ℥b. i. 6. vini optimi austeriusculi. Coquantur

dum crassescat vinum. Deinde passulæ in supradi-

ctum vinum fortiter exprimantur per setaceum, id-

que satis rarum. Expressio cum vino rursus coqua-

tur ad crassitudinem. Cui adde aromatici rosati 3. i.

sem. nasturtij & securidacæ assati & infriati, cina-

moni electi ana 3. 6. misce, vtatur sæpe. Hinc eun-

Arabum his omnibus pollet commemoratis dotibus.

dem puluerem seorsum aceruabis, insperges 3.1. lactis vstulati 3.4. cum vitello oui, fiet pulcicula.

Poterit inspergi & lacti amygdalarum benè cocto. In hoc fluxu lac ouillum coctum & vstulatum conuenit, sed inspergere oportet aliquid supradicti pulueris, vel hunc.

℥. corticis thuris ʒ. 2. caryophyllorum, cinamomi an. ʒ. ʒ. Orizogala, pulli gallinarū & columborum, perdices, auiculæ assatæ, vinum tenue, odoriferum, subadstringens. Inungatur hepar cum oleo mastichino, de spica, de absynthio, & aliis dictis prius. Deinde superaspargatur pul. mastichis ʒ. 1. styracis calamit. Gr. 16. thuris albi & nigri an. Gr. 6.

Fotus è spongia expressa in vino decoctionis mastichis, thuris, styracis calamithæ, rosarum, absynthij, florum cupressi, eupatorij, asari.

Si superueniat febricula (quod sæpe fit) proximè dicta remedia calfacientia téperanda sunt prius dictis refrigerantibus.

HIJSDEM HOLLERII SCHOLIA.

De hac affectu lege Galenum cap. 2. lib. 6. & cap. 7. lib. 5. de Locis affectis: capite 8. & 6. li. de Morbis & symptomatis. Maior sanguinis quantitas reiecta ab hepate necessariò oritur. Sanguis vel rubet: vel aquosus est: vel ater & niger. Is duplex, vel sanguis crassior, ut in bobus: vel limus & sæx sanguinis. Hic rursus duplex siue adustus sit, siue naturalis: crassus nimirum, à quo viscera profunda fiunt, & eiusdem veluti serum seu pars tenuior. Rubens *αἷματις* dysenteriam efficit: niger, tenuis & splendescens, lotiū fluxū, quem vulgò vocant, & quem prima dysenterix differentiā complexi sumus: crassus tam hanc, tum etiam secundam. Sed tenuior magis è venis mesaraicis & ramis venæ portæ, quæ incoctum san-

DE MORB. INTERNIS

guinem & serosum continent: crassior ab hepate, vel lie-
ne. Si cum torminibus, dysenteria est. Si in fine febrium
quartanarum, morbis à melancholia, & aliquādo in pe-
ste, non malum, Si sanguis aquosus, tertia est dysenterię
impropriè dictę species. Nonnullis etiam lotius fluxus
dicitur. Læso hepate, rupta aut aperta venâ, sanguis ni-
ger, velut crassum atramentum, deinde rubens aliquan-
do excernitur, & moriūtur. Quales duos ipse vidi. Vtē-
que vix sentiens periculū, animi deliquio paulatim ex-
tinctus est. Sunt & alię multę differentię deiectionum
alui ex variis causis apud Hipp. vt *ἔνσματα*, interpreti
strigmēta, veluti linamenta, *πικιδναί*, liuidę, *δυσώδεις*, fœ-
tidę ex corruptione partium, vnde exeunt: *χολώδεις*, *χο-
λὴν ἀκράτον*, bilem synceram significantes, non multam,
vt vult Musa, & similes. In quibus hæc duo generalia
præcepta tenenda sunt: omnem synceram excretionem
metuendam in morbis, quia cruditas significat: omnem
quoque corruptam, si die non critico, crudo adhuc mor-
bo, cum labore ægri, non leuat, aut tantum ad tempus.
Ab initio quidē (inquit Galenus de omnibus) nunquam
ad bonū fiunt huiusmodi deiectiones, vt pote magnam
visceris læsionem ostendentes: ad morbos quidem con-
sistentes sequuntur sæpius, naturā superfluitates expur-
gante. Et paulō post. Multi deiectionum colores præter
naturam, spōte quidam euacuati, multarum atque ma-
larum in corpore dispositionum sunt signa. A medica-
mento autem ducti vim habente plures humorum spe-
cies euacuādi, nihil absurdum significāt. Sed de his mul-
ta superiore capite. Varia autē illa excremēta, quę dei-
ciuntur, cruditatibus ventriculi respondent, quę reten-
ta corruptelam quandam & vitium contrahunt.

Pro varietate causarum multiplex curatio. Quibus
sanguis excernitur, rupta, aut exesa venâ, si vires firmę,
sanguis modicus è basilica detrahendus, rhab. in substā-
tia, cum syr. ros. aqua arnoglossi, tabulę ex iis, quę san-
guinem supprimunt, syrupus ex succo arnoglossi, centi-
nodia, bursa pastoris, millefolio, verrica Græca, vino gra-
natorum, cum sacch. ros. embroche ex oxycrato parato
ex aqua plantaginis, &c. Vitanda in cæteris quę obstru-
unt: vtendum roborantibus, redeundū ad caput de debi-

litate hepatis, aperiendum reborando, aqua decoctionis passularum, Gallina cum cydoniis & conseruis adstringentibus cocta in balneo maris, donec ius concreascit in causa conueniente, gelatina ex rebus corroborantibus, cinamomo & aliis, aqua distillationis mastichis, coralli, feminis cydoniorum, vnde diluatut vinum.

ANTO. VALETII EXERCIT. XLV.

Hepatici fluxus pauci meminerunt Practici, quod affectio istiusmodi vel ad hepatis intemperiem aliquam, calidam, frigidam, à qua attractrix, vel retentrix facultas imbecilla, aut ob visceris eiusdem obstructionem, fiat: vnde & communem habet illis cum affectibus curationem. Auicennas in obstructorum resecratione, & hepatis confirmatione summa medendi præsidia collocavit. Vide cap. 10. lib. 3. Fen. 16. Tract. 2.

De fluxu 1 Pestilentiali. CAP. 46.

Eleno olida insigniter, fulua & crassa excernuntur, aliis subalbida, Autumno ferè: liuescit facies, grauiatur corpus, pulsus 2 cecidit 4. 7. vel 9. moriuntur, aut ægrè conualescunt. Alij tota cute 3 commutantur. Aliis decidit 4 vngues. Fluxus hic periculose adstringitur. Præter remedia supradicta in dysenteria, vtatur atro in decoctis pullorum, perdicum & similibus, syrupo de ribes, de cydoniis, de myrtillis, de limonibus, acetositate citri, vino granatorum, syrupo acetoso simplici cum iulepo rosato. Atque aliquando in auro-ra 3. s. bonæ theriacæ in vino granato, acetositate citri, aut re simili dissolues. Iuscula alterentur cum

1 Quod est
luis pestifera
symptoma.

2 Hippocr.
sect. 3. lib. 3.
τὸ ἐκδιῆναι.

3 Diffusa pe-
stilentia pu-
tre dine per-
habitum cor-
poris.

4 Ex atro-
phia partium,
& venenata
humorum qua-
litate.

DE MORB. INTERNIS

multa acetosa, & nodulo de berberis. Colatitiis inspergatur pulvis hic.

℥. limaturæ auri 3. i. diamargariti recens facti 3. s. nūcis moschata 3. s. margaritarum, smaragdorū, saphyrorum ana ℥. s. panis sacchari 3. s. fiat pulvis. Interim quoque vtatur puluere vnicornis & cornu cerui, vino tenui, odorifero, diluto aqua, in qua aurum extinctum sit. 5 Vtatur interim hoc electario.

5 Interim etiam
vti poterit
pilulis
Rufi ex aloë,
myrrha &
croco.

℥. conseruæ ros. 3. i. s. conseruæ corticum citri conditi cum saccharo 3. i. corticum citri 3. i. s. margaritarum electarum 3. i. hyacinthorum, smaragdorū ana ℥. s. serici crudi ℥. i. seminis citri mundati ℥. 2. s. acetosæ 3. s. boli armenæ, terræ sigillatæ ana 3. 2. limaturæ auri 3. i. cornu cerui & vnicornis, rasuræ eboris ana ℥. i. sacchari albiss. 3. 19. folia auri numero decem. Fiat conditum ad formam sacchari rosati cum aqua rosata moschata.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Pestilentis huius constitutionis Galenus meminit pluribus locis, vt Aph. 21. lib. 4. & in lib. de atra bile. Excernebant nigra ferè 7. 9. 11. Quibus deiectio talis non fuit, pustulæ nigræ toto corpore excitatæ. Nullus autem seruatus, qui atram bilem exactam deiecerit. Primis diebus deiectiones erāt ruffæ & colliquationis indices, vel vt alio loco *ἡ τῶν*, vitellinæ, crassæ, acres, foetidæ, spumosæ. Postea verò, vt scribitur in eundem Aphorismū, nigræ, vel superassato sanguine, vel putredine quadam contracta & corruptela. Sed an fuerit pestis peculiariter appellata, an Epidemius morbus, qui multos interfecerit, dubitari potest. Nam pustulæ illæ nigræ rarò in peste apparent, quin sequatur mors. Et multos ipse obseruauit pestilenti febre laborantes, quibus eruperunt infanti propè carbunculi, aut furunculi similes carbuncu-

lis, quorum nullus enasit. Cutim & vngues decidere nō-
nulli à veneno putant.

Non temere suppressendus fluxus, sed bezoardicis
vtendum, syrupis, cordialibus conferuis, opiatis, rasura
vnicornis, & similibus.

ANTO. VALETII EXERCIT. XLVI.

Symptomaticus huiusmodi fluxus pestilentialis
appellatus, biliosus est, ratione feruoris hepatis,
vt plurimùm, proueniens. Ita grauis esse solet, vt vi-
res quàm celerrimè prosterнат. Si non vsque adeò
sit efferus, soluenti medicamento, vt rheo, curatur.

℥. polypod. quern. contus. cum pauco semine scenic.
3. ℔. herb. scariol. cicho. & oxalid. totius ana M. i. thama-
rind. ping. 3. s. prun. acid. num. s. passul. mundatar. 3. 3.
fem. scariol. & anis. ana 3. ℔. flor. cardiac. p. r. f. decoct. ad
dos. Infunde rh. elect. 3. 2. cinam. 3. ℔. Factæ post sex ho-
ras forti expressioni adde zulapij ros. aut syr. cydon. 3. 6.
fiat potio.

Aliàs optimum erit bolum armenam, aut terram
sigillatam, vt in peste dicetur, exhibere. Empirici in
hunc scopum imperāt puluerem, aut succum scor-
dij, felici nonnunquam successu: quia fortasse sim-
plicis id medicaminis feruida viscera, maximè que
iecur, alterat, atque immutat.

De difficultate meiendi.

CAP. 47.

Vesica interiorē membranā habet con-
textam omni genere fibratam, quas dum
intendit, vrinā continet. Si solūm transuer-
sis agit, exprimit. Eius actio in totum naturalis.

Eiusdem collo musculus est obliquus. Agit hic
transuersis fibris arbitrario quidem motu, ne vrina
intempestiuè effluat. Itaque cum plena est vesica,
& quantitate vel qualitate irritatur, trāsuerſas fibras

intendit: musculus cessat ab officio, atque ita vrina emingitur. Nervi à lumbis & osse sacro ad vesicam perueniunt. Resolutis nervis aliquando torpescit sensus vesicæ: aliquando musculus sphincter, qui collo vesicæ adnatus est, resolvitur, atque ita vrina intempestivè effluit. Galen. cap. 4. lib. 6. de loc. malè affect.

Aut si sensum perdidit vesica, retinetur. Aliis nascitur inflàmatio læsis vertebra, unde nervi oriuntur: quod & dolore, & calore loci intelligitur. Aliis rupta vena sanguis emingitur. Grumus fit, qui meatum intercipit, quo vrina expurgatur. Idè meatus & lapillis, & tuberculis, & inflammationibus, crasso pure, vel humore aliquando præcluditur, atque hinc vrina exprimitur.

Vitiatæ verò mictionis tria sunt genera: dysuria, id est, difficultas vrinæ: stranguria, stillicidium, aut substillum malum: ischuria, cum omninò vrina supprimitur. Dysuria libidinem meiendi facit, sed ægrè & vi quadam: aliquando etiam cum dolore vrina excernitur.

In stranguria assidua meiendi cupiditas, sed vrina guttatim effluit. Ischuria improprie quidem fit perdita renum actione attrahente. Si enim serum sanguinis non attrahitur, vrina non fit. Proprie verò meatu vrinario præcluso, aut infirma excretrice vesicæ, quæ transuersis fibris exprimere non possit. Idque propter intemperiem, vt siccitatem, in ardentissimis febribus: aliquando resolutis vesicæ nervis, & musculo incolumi. Nam si musculus vna resolutus est, vrina præter voluntatem effluit. Dysuriam & stranguriam facit retentricis imbecillitas,

quæ ferè fit à frigido. Frigidum enim vesicæ corpus, & frigido facîle euincitur. Altera causa est vrinæ acrimonia. Adiunge cætera, vt inflammacionem, grumos, vlcera, calculos, & cætera.

Curatio dysuriæ & stranguriæ.

Si à frigore infirmitas, calorificis vtendum est, vnctione perinæi & pectinis, fomentis, balneis, clysteribus, potionibus, alijsque remedijs. Vnguendo olea ² conueniunt rutaceum, anethinum, chamæmelinum, balsaminum, de scorpionibus, de keiri, de lilio, de cucumere asinino, in quo decima pars castorei, sexta galbani vel opopanacis coxeris. Ex eiusmodi oleis fiunt cerata. Ceratis consperguntur ³ aromata, quæ calefaciant, & partium tenuitate facîle penetrent.

Fomenta fiunt ex decocto maioranæ, rosmarini, arthemisiæ, origani, calamenthi, thymi, hyslopi, parietariæ, lysimbrij, berulæ & cressonum, ex quibus & balnea comparari debet. Alioqui has ⁴ herbas friget in sartagine ex oleo vel butyro, & emplastri modo femori superiori, pectini & perinæo calida admouebis. Omentum arietinum calidum, iisdem locis admotum iuuat, vel recens detracta pellis cuniculi. Cuius axungia in eundem vsum plurimum commendatur.

Clysteribus & glandibus ex supradictis herbis, oleis & materia, adiecto sale & melle, ad irritandum, confici debent.

Decoctum radice eringij, cyperi, radice lappæ, ameos, cinamomi, nepithæ, myrrhæ, opopanacis, cretæ marinæ, carthami, extremitatum caulium, & alia, quæ postea dicentur cap. de lapide.

1 *Expultrici* scilicet facultatis vesicæ, quæ dysuriâ facit, aut retentricis, quæ stranguriam.

2 *Cõmendatur* præter cætera oleum de scorpionibus cū anethino. Vt. ℥. olei anethini, olei de scorpionibus, an. 3. 10.

castorei 3. 2. galban. 3. 3. Coquatur in balneo mariæ, solummetum.

3 *Vt* caryophylli, macis, cyperus, angelica.

4 *Vt* ℥. raphani cõtusi, parietariæ, cressonis an. M. Ex his cū suillo adipe frixis, vel

axungia fæniculi, f. cataplasma admo uendum publi & perinæo.

DE MORB. INTERNIS

Aquæ conueniunt tribulorum, raphani, cretæ marinae, pentaphylli, alliorum, acori, florum malug, cyperi, erythodani, fabinae, fabaceorum, scolopendrij, alkekengi. Grana alkekengi trita & expressa succum reddunt, vtilem cum vino albo tenui, terebinthina, parietaria, acetosa, acetum album.

Conueniunt à proprietate viuerræ genitale, ciss Naturalis nis scorpionum crematorum, testa oui repurgata, æconomia vitio; excremēti suppressione, quod in peculiari curiſque natura redundare consuevit, aut improba vitii ratione. siccati, aut eorundē testiculor. puluis, vesica tauri & capræ.

Conuenit & theriacæ potus, vocatum lithontribon, electarium Ducis, aurea Alexandrina, cucurbitulæ natibus affixæ. Pediculus inditus foramini virgæ, aut cimex, vel loco horum fila croci, granulum salis, cathæter, algalia, syringua, aut candela cerea oleo prius illita.

Vbi verò vrina 5 acrior est, si quidem corpus benè carnosum est, si inflammationis suspitio, vena basilica 6 secanda est.

Purgandum cum 3. 10. cassiæ dissolutæ in sero caprino, vel liquore 7 conuenienti. Vomitus, si quidem consuetudo est, plurimum prodest. Clysteres è lacte, 8 sudoris pronocatio.

Galenus 9 ex Hippocrate, phlebotomiam è crure magis probasse visus est, quàm è brachio. Arabes prius è brachio, quàm è crure, quod & aliquot locis Galeni non repugnat.

Hic olea conueniunt, violatum, nenupharinum, 9 Libro 6. de papauere, ex quibus cerata fiunt, admixta modica quantitate caphuræ, gran. 3. aut 4. ad singulas 3. cerati.. Aphori. aph. 36. & sent. 5. sect. 1. lib. 6. 7 ἐν ἀνθρώποις.

Balnea & fots in decocto sem. lini, scenugræci, althææ, psilij. Nec peccaueris, si quid chamæmeli adieceris.

Aqua distillata ex acetosa, plantagine, lanreola, pentaphyllo, syrupus de iuiubis, de papauere, decoctum glycyrrhizæ, portu. lactucæ, quatuor seminum communium, lac asinæ, vel capræ, serum lactis, lac amygdalarum, hordeatum cum sem. lini, melonum, cucumeris, 4. sem. communibus frigidis, quale hoc.

℞. seminum psilij, melonum, cucumeris ana 3. 2. seminum althææ, cydoniorum ana 3. 1. seminum lactucæ, hyoscyami albi, papaueris albi ana 3. 8. gummi tragacanthi 3. 2. fiat decoctio: cum qua dissolue amygdala dulcia. Fiat lac amygdalarum cum saccharo violato. Quod si suspitio est vlceris, iam bolus armena, terra sigillata, sanguis draconis, pul. equiseti cum lacte vstulato, syrupo myrtillorum, iulepo rosato conueniunt. Similiter saccharum rosatum, triasantalum, tragacanthum frigidum, cydoniatum sine speciebus factum cum saccharo. Iniicitur in virgam lac recens emulctum, maximè muliebre, cui si calor maior est & dolor, addatur mucago seminis papaueris, cucumeris, psilij, & similium cum modico caphuræ. Vbi verò consolidandum.

℞. lactis mulieris, vel bubuli vstulati 3. 3. farcollæ nutritæ, amyli, cerussæ ana 3. 1. fiat injectio ter aut quater in die. Laudatur hic puluis, quo manè & vesperi vtatur.

℞. sem. melonum excorticorum 3. 2. semin. citruli, cucurbitæ, portulacæ, papaueris albi ana 3. 8.

DE MORB. INTERNIS

sem. hyoscyami albi ʒ.ʒ. & Gr.6. panis sacchari ʒ.3.
fiat pul. detur ad ʒ.2. cum iulepo violato, aut liquo-
re conuenienti. Drachma vna trochiscorum alko-
kengi cum liquore conuenienti plurimum com-
mendatur.

Grumi decocto stœchados, sarmentorum vitis,
mummiâ, oxymelite, rebûsque eiusmodi inciden-
tibus dissolui debent: Hinc graue periculum est.
Sequitur enim animi defectio, coloris fœditas, pul-
sus paruus, frequens, obscurus, anxietas, & vt plu-
rimum mors.

Sanies & pituita si crassior est, incidēda. Inflam-
mationes & vlcera suo modo curanda sunt. Ita &
calculus. Plenior vesica manibus comprimēda est,
& qua parte tumor eminet.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

*Vrina suppri-
mitur vacua,
aut plena ve-
sica.* Urina vel supprimitur: vel parum & frequenter min-
gitur: vel seruat naturalem excretionis modum, sed ve-
fica cum difficultate aliqua aut dolore operatur. Suppri-
mitur autem vel vacua, vel plena vesica. Si vacua, argu-
mentum est vrinam non transire ad vesicâ. Vitium igitur
erit vel in vtereribus, vel renibus, aut resolutis, aut in-
terceptis. Philoth. in Aphor. obstructionem addit in cras-
sioribus intestinis à crassa & viscida pituita, quæ prohi-
bet ad hepar, & consequutione quadam succo-
rum generationem, & vrinæ secretionem. Si verò vesica
plena sit, in ea affectionem morbosam esse necesse est.

*Philoth. eodm.
ad aphor. 46.
libr. 7.*

ioxovgia.

*σπασγία.
δυσγία.*

Suppressio vrinæ siue renum vitio, siue vesicæ fiat, qui-
busdâ dicitur *ioxovgia*. Propriè tamen hoc nomen usur-
pari debet in ea tantum affectione, in qua vrina suppri-
mitur, læsione in vesica existente. Cum autem parum &
frequenter, siue guttatim & maturius, quàm pro natu-
rali excretionem emittitur, *σπασγία*: quando tēpore con-
uenienti, sed cum difficili motu, aut dolore, *δυσγία* no-

minatur. Hæc est vera distinctio inter has affectiones breuissimè ex multis Galeni locis cõprehensa. In quem *Euchsius notatur.* acerbius tanquam tenebras offundentem, nobis inuehi videntur, qui nuper Commentarios in Aphor. scripserunt. Aiunt enim in dysuria semper dolorẽ fieri, vt in dysenteria: nunquam in stranguria. Sicque hæc sola differentia dysuriam differre à stranguria, siue guttatim emittatur, siue contrà. In quo & sibi & experientiæ repugnant, vt qui alio loco scribāt stranguriam fieri eo modo, quo dysenteriam ab acri humore confertim ad vesicam irruente, & alibi ardorem vrinæ adiungant, imò producāt aphor. 55. lib. 5. Vbi Hippocr. ait stranguriam fieri à magna inflammatione vteri, aut intestini, aut renibus purulentis. Quo pacto hîc dolor ad stranguriam nihil pertinebit? Neque ad mixtionem duarum affectionum recurrendum, nisi maiorem multò confusionem in omnibus & Hippocratis, & Galeni scriptis, de industria mutatis pro arbitrio vocabulorum significationibus, inducere velimus. Vnicuique enim libenter concesserim rem quamlibet, vt velit, nominare, modò aut à seipso, aut ab aliis intelligatur. At in veterum scriptis interpretandis non idem licet. Illi enim perspicuitatẽ sequuti propriis, & suo tempore vsitatis dictionibus conceptiones animi expresserunt, parùm admodum solliciti, quo quisque idiomate deinceps loqueretur, aut in quam significationem vocabula traduceret, modò sententiam non peruerteret. Ac certè nescio an vlla vnquam maior in grauioribus scientiis exorta sit cõfusio ex præstigiis quibusdam & captionibus tum verborum, tum dialecticarum ratiocinationum, quàm quæ imminere videtur, neglecta vera illa antiquorum methodo, solo nomine plerisque, etiam doctioribus nota. Cùm igitur perspicuum sit, non solùm in dysuria, sed & in straguria, & ischuria dolorem sæpe fieri, actionem tamen vesicæ diuerso modo lædi, num satius fuerit à rei natura, & læsionis in excretionem varietate harum affectionum distinctionem sumere, quàm ex dolore, qui omnibus communis esse potest? Vt igitur aluus in lænteria, ita vesica in stranguria, siue vrinæ stillicidio non expectat, vt vrina tota colligatur, sed statim, tãquam granantem (vt ait Galenus) aut mor-

DE MORB. INTERNIS

dentem expellit. In dysuria siue difficultate vrinx ex-
stat quidem, atque aliquando diutius, quàm oporteat:
sed cum excernenda est, percipit æger dolorem, aut tan-
tam difficultatem, vt sæpe, nisi locum vesicæ comprimatur
manu, aut diu & magno conatu enitatur, liberè nō pro-
fluat. Et si in totum supprimatur, iam erit *ischuria*. His
positis causæ faciliè inuestigari possunt. In stranguria
primùm vesicam stimulari ad excretionem ante tempus
perspicuum est. Id igitur vel vrinx mordentis acrimo-
nia fieri necesse est, vel imbecillitate retentricis, quæ mi-
nimo etiam onere grauat, vel ab ulcere, erysipelate,
abscessu, inflammatione. Acrior vrina redditur vel ad-
mixtione acris alicuius humoris, vt pituitæ salis, aut bi-
lis, puris per vesicam euacuat, vt à renibus suppuratis,
vel quia talis ex venis effluit ex praua victus ratione,
aut intemperiem calidam, & humidam, vel humidam ac-
quisiuit. Idque aliquando per consensum vicinitatis ra-
tione. Participat enim intemperie & inflammatione par-
tium proximarum, à quarū etiam tumoribus premitur,
vt intestini & vteri. Retentrix imbecilla redditur ab in-
temperie qualibet, sed præsertim frigida. Musculus vesi-
cam claudens quandoque resoluitur, vt in senibus. Sed
proprie non est stranguria. Hæ sunt in vniuersum cau-
sæ huius præcipitis excretionis, propriis signis distinguen-
dæ, & ex relatu ægri, quas diuersis locis Hipp. exposuit.
Vt cum scribit in siccitatibus vrinx stillicidia fieri: alio
loco, Recto intestino, aut vtero inflammationem patien-
te, & renibus purulentis, curari quoque vini potione, &
sectis venis interioribus. *Δυσουρία*, si dolorem pro sym-
ptomate habeat, causa erit inflammatio, vel abscessus, vel
ulceratio, vt ab usu medicamentorum acrium, vel spiri-
tus flatuosus, vel inæqualis intemperies. Si verò diffi-
lem aliquem motum, imbecillitas potentie excrettricis,
vt ob frigus vesicæ, aut colli: vel tumor præter naturam,
vel obstructio à crassis & viscidis humoribus infarctis, aut
adhærentibus ceruici vesicæ, aut vrinx permixtis. *Ισχυρία*
nascitur obstructione meatus vrinarij, imbecillitate
excrettricis, intemperie. Obstructio, vel cum collum vesi-
cæ tumescit & induratur extra naturam, adeò vt via vri-
næ claudatur: vel cum ibi aliquid præter naturam ge-

*Stranguria
causa.*

*Apher. 16.
lib. 3. 58. 5.
48. 7.*

Ischuria causa.

neratur, vt tophus, carunculæ, tuberculum: vel aliunde confluxit aliquid in illam cavitatem, vt grumus, lapis. Imbecillitas ab intemperie, morbo organico, solutione cōtinui, sæpe neglecta meiendi occasione, velut euerfa expultrice ob copiam vrinæ immodicam, vnde etiam obturatur meatus. Sic nec vesica sese contrahere potest ad expellendum: nec si id fecerit, præcluso aditu vrina exire. Intemperies à multa siccitate idem efficit, vt in febribus ardentissimis & siccissimis. Si lapis exitum prohibeat, siq; insignis magnitudinis, cognoscitur, quoniam ægro supino, si concutiat, vrina prodit: si paruus extiterit, cathetere immisso sentitur in collo vesicæ. Si arena, dignoscitur exitu, quanquam rarò obstruat, nisi lentus humor adsit. Si sanguis cōcretus, liquidus solet antè effluere: si pituita, apparet dum excernitur. Si imbecillitas, præcessit aut diuturna retentio, aut frigus vehemens, aut alia intemperies. Si abscessus, dolores, & febres præcesserunt. Tophus, callus, tubercula solent sequi ardorem vrinæ, fluxum feminis, morbum gallicum, vlcerationem à cathetere. In cathetere cauendum ne fallamur, quòd aliquàdo purè aut crassitie pituitæ orificium intercipiatur, & os catheteris angustius, aut quia nihil lotij in vesica, interceptis superioribus. Constat experientia vrinam supprimi à calculo in ventriculo renum sine dolore. Sed vbi incidit in vteras, acerbissimus dolor excitatur. Pleurisque suppurantur renes calculosi, & colliquantur, vt tantum maneat pellicula, sicuti D. de Mancy, cui ren dexter colliquatus, sinister calculum habebat, vter & partes reliquæ siccatae. Subita resolutione vesicæ cuidam cum subitus dolor motus esset in osse sacro & coccyge, vrinæ suppressio sequuta est, quam tamè reddebat rufiens, & sese comprimens, manu admota pubi. Sensus amissus in recto intestino, vt neque clysterem injectum sentiret, neque cum redderetur. Admotis fomētis, & emplastris ossi sacro contra Paralyfim, rediit sensus & conualuit. Viro nobili in pueritia secto aderāt signa omnia calculi, nisi quòd cathetere non inueniebatur. Mortuo à male curata cicatrice abscessus & gangræna in vesica & vicinia inuenta est. Inflammatio vesicæ dignoscitur tumore supra pectinem, febre, vrinæ retetione & excre-

*Domino de
Mancy ren
dexter colli-
quatus, sini-
stro calculo
obfesso.*

*Inflammati-
onis vesicae no-
ta.*

DE MORB. INTERNIS

mentorū alui. Sequitur ferè vlcus, calculum, vsum medicamentorum acrium, dolorem vehementem.

Varia curandi ratio. Pro causarum diuersitate conueniunt clysteres ex materia conuenienti, quia collum vesicæ insidet recto intestino, forus, infusus, veronicae succus, cuniculorum esus, qui iuniperum oleant, candela cerea, iniectiones per virgam, cassia cum tanrillo rhab. terebinthina, iniectio ex oleo nardino & succo ocimi, aqua theriacalis, gallus cum parietaria, radicibus, herbis, seminibus conuenientibus coctus, aqua ligustri, herniaria, sacculi, vinum dilutum aqua parietariæ, intinctus ciborum in oxymelite, vel succo limonū, sectio venarum interiorum iuxta Hipp. A materia frigida vini portio, forus ex decocto apij, illitus ex vnguento Agrippæ, Martiato & similibus, vinum enulatū, sterco grandioris muris.

ANTO. VALETII EXERCIT. XLVII.

VRina guttatim & sæpè reddita stranguriam facit: excreta magno cum dolore & nisu, aut etiam manu firmiter appressa, dysuriam: suppressa seu cohibita ischuriam. Stranguria duas cum habeat causas, acrimoniam vrinæ, ab humorum corporis totius mordacitate, aut aliquo renum vitio, vt vlcere & abscessu, itémque facultatis vesicæ retentricis imbecillitatem, à morbo, vt intemperie, aut humore præter naturam, si quidem ab illa fiat, dolorifica est, ab hac minimè. Dysuria verò atque ischuria maioris tātū & minoris ratione distinctæ affectiones iisdem innituntur causis. Aut enim fiūt ex partium aliarum consensu, vt resolutorum renū, serum non attrahentium, vterum interceptorum, crassorum intestinorum inflammatorum: aut per protopatheiam vesicæ, vel plus æquo frigidæ, vnde expultrix facultas imbecilla, vel obsessæ phlegmone, tumore aut obstructione, sanguinis grumo, pure,

Dysuria et ischuria non multū inter se distincta.

re, caruncula, topho, lapide, copia vrinæ, aut deniq;
 re quanis alia vrinam exitu prohibēte. Horum cau-
 sæ & signa affectuum à Galeno describuntur lib. 5. *Non omnis*
 de sympt. caus. & lib. 6. de loc. mal. affectis. Quin- *vrina sup-*
 etiam plerunque in morbis acutis instante crisi vri- *pressio est is-*
 næ suppressio interuenit ad crīsim apparens, per su- *churia.*
 dores, aut alui profluium futuram. Aliquando iis-
 dem in morbis per resolutionem caloris insiti vesi- *Hipp. sent.*
 cæ vrina intercipitur ad mortem. Sed hæ suppress- *16. sect. 2.*
 siones ischuriæ nō sunt, quia vesica plena nō fiunt. *Prophet. I.*
 Vt causæ sunt variæ ita curadi ratio diuersa. At prius-
 quam de remediis decernas, affectam partem ex-
 plorabis, & si tensio, tumorque nullus sensu perci-
 piatur, fistulam vrinariam, catheterem vocat, in pe-
 nem immittes. Vbi constiterit vrinæ acrimoniam,
 aut vlcus & abscessum renum, stranguriam excita-
 re, opportunum fuerit ad ea præsidia, quæ cap. de
 ardore vrinæ & de inflammatione renum traduntur,
 recurrere. Quod si ab intemperie frigida vesicæ id
 mali acciderit, calorificis remediis, præsertim admo-
 tis, sanatur. Cum autem meiendi difficultas, vel e-
 tiam ischuria vitio renum serum non attrahentium
 fiunt, quia fusione & secretionē est opus, compa-
 randa sunt ex simplicibus calidioribus & acriori-
 bus apozemata, quæ sanguinem fundant, & se-
 rum segregent, sed præmissa tamen purgatione
 blanda.

℥. cassiæ recēns ē canna extractæ drach. 6. pulpæ se-
 besten drach. i. rhe. elect. puluerati ꝯ. 4. vel 3. i. cum pul-
 uere glycyrrhiæ, f. bolus. Vel.

℥. terebinth. Venet. claræ, in aqua rosac. & alkecheng.
 lot. drach. 3. rhe. elect. pulu. ꝯ. 2. cum diatragacanth.
 frigido, f. bolus. Hic vtilior est, cum detergendi confi-

lium suscipitur.

Clysteres subinde repetiti, materiam aliò deriuando, nec in affectam partem adducendo, magis conferunt. Apozema verò vrinæ ciēs erit huiusmodi.

℞. radic. quinque aper. rad. valerian. rub. tinct. maioris, eringij ana ʒ. i. herbar. capill. cich. chamædr. chamæpyth. scariol. agrim. eupator. absynth. hyssop. ana M. i. semin. apij, petros. azar. sesel. halicacab. ana ʒ. 2. passul. integr. ʒ. i. f. flor. genist. sambuc. ana p. 2. cicer. rub. vnc. 2. herniaræ vnc. ʒ. f. decoctio ab ʒb. i. In colatura dissolue syr. capill. ven. & de bizantiis ana ʒ. 2. ʒ. f.

Apozema conditum, vt decet. Vbi sanguinis grumus, caruncula, & tophus seu callus in vesica affuerint, vsurpanda erunt mollientia, digerentia, exedentia. Molliet hic litus.

℞. ol. amygdal. dulc. & de scorpionib. in aq. parietar. lotor. mucag. sem. alth. lini, & fœnugr. in aq. saxifrag. extract. & axung. cuniculi ana ʒ. ʒ. cum pauca cera in aq. bipinellæ emollita f. linimentum.


Fomentum ex oxymelite cum spongia ad incidendum accommodatissimum. Vel eius generis incidentia, vt hydromel, oxymel, in quibus quæ calida sunt, incocta sint, intromittuntur per cathæterem. Exedentia postulat caruncula, callus, sed quæ minimum habeant erosionis. De his consule Alphonsum Ferrium Neapolitanum Medicum longè doctissimum, qui pulcherrimum de caruncula tractatum edidit. Si lapis in vesica suppressionis vrinæ causa sit, quærenda remedia ex capite de calculo vesicæ.

De calculo.

CAP. 48.

1 De lithiasi, siue lapide renum.

2 Si tenuis sit humor, aut acer, vnaque expultrix renum facultas languidior, & meatus angustiores.

 Alculum gignunt calor renum 2 immodicus, aliquando etiam tepidus, & humor crassior, qui calore lapidescit. Generatur ali-

quando in renum stomacho : aliquando in substā-
tia. In vesica 3 quoque generari verisimile est, &
maximè pueris.

Signa, dolor 4 fixus, in renibus grauitas, vrinæ
initio tenues. Primùm quidem cum arenis & exi-
gua asperitate: deinde cum multo sabulo & cras-
siores excernuntur. * Primùm igitur clystere mol-
liendus venter est. Renes enim oppressi stercore
grauius dolent: liberati leuius, & ex eo calculus mi-
nori negotio excluditur.

In dolore vehementi sanguis detrahi potest è po-
plite vel malleolo. Alius quoque leni medicamen-
to ducenda est, vt cassia ad 3. i. cum saccharo viola-
to, vel glycyrr. decocto. Optimum quoque fuerit
interim, dum Medicus laborat excludendo calcu-
lo, alternis diebus 6 Cassiæ 3. 6. aut 3. 3. cum saccha-
ro violato imperare horæ dimidio ante cibum. Po-
steaquam verò 7 stercus depulsum est, secta vena
est, & lenita aluus, vnctionibus, fomētis, balneis &
remediis lenientibus atque laxantibus vtendum est.
Conueniet itaque oleum viol. amygd. dulc. butyrū
recens, oleum in quo radices althææ cōxeris. Vn-
guentum dialthææ, cēsypos, hyeme etiam oleum li-
liorum, & cham. fotus & balnea ex malua, bismal-
ua, violaria, cham. meliloto, lini semine & fœnugr.
aliisque eiusmodi.

Iuscula 8 quædam ex malua, bismalua, adiectis
ciceribus rubris cum multo butyro & modico sale.
Postea verò remediis 9 vtendum est, quæ calcu-
lum excludunt. Primùm quidem leuionibus, dein-

3 Prima ge-
neratiōe, aut
secundaria.

4 Non va-
gus, vt in co-
lico dolore.

5 Ab obstru-
ctiōe vasis
vrinarij. Aut
etiā vrinarij
suppressio cū
dolore renum
repentè ober-
to. Ex Hipp.

in Coacis anō
maduerf.

* Pituita vo-
mitio, deinde
etiam bilis
æru ginosa, se-
moris quod è
directo est,
stupor.

6 Vt nephri-
tica remedia
inoffenso cur-
su ad renes
perueniant.

7 Stercoris
enim copia ne
phritici dam-
ni augentur,
compressis à
colo facibus
distento reni-
bus.

8 Vt. 2. sum

mitatā bismalua M. i. si. iusculum cum multo butyro & cochleari vno mellis
Narbonensis. 9 Si subsistat calculus, & ad vesicam viam affectet.

DE MORB. INTERNIS

10 *Hæc ex* de fortioribus. Conuenit initio oxymel simplex
Actio. Obser cum decocto liquiritiæ. Beronica, lupulus, capparis,
uabis vero scolopendrium, capillares herbæ, radix graminis,
sanguine illu chamæbati, & similia. Fortiora sunt scylla, iris, enula,
efficaciorum aristolochia, & similia. Oporteret autem interuallis
futuru, si po- repetere hæc remedia leniendo, laxando, excludendo.
stremis dieb Sanguis 10 hircinus è iugulato hirco iuuenis, quo
hircus diure- tempore uix maturescunt: medius quidem excipi-
tici: altus tur, relicto eo, qui primus fuit, & postremus fictili
fuerit. vase excipitur. Infolatur, 11 exsiccat, reseruatur-
 11 *Obducto* que fideliter. Cum usus fuerit, accipies pul. 3. l. s.
lunco, ne so- cum vino tenui.
lus ardore vis
euaneſcat.
 12 *Gal lib. 9* Aurelianus à balneo, aut iam laxatis viis, renes, pu-
Simplex. vnu bem, interfoemineum, calido hirci sanguine inun-
lapis Iudai git. Lapis Iudaicus tritus & potui datus 3. l. pōdere.
ci genus tan- Solinus, Dioscorides & alij Medici tum renū, tum
tum statuit. vesicæ lapides frangere hunc scribunt. Galenus nō
Vnde colligas vesicæ, sed renum. Author libelli de calculo duplex
libell. de cal- 12 genus facit, scribitque marem è renibus, foemi-
culo falso Ga- nam è vesica calculum educere.
leno tribui.
 13 *Huius no-* Datur cum oxymelite tritus in cote, vel cum 3. 3.
di oleum se- aquæ conuenientis. Oleum 13 chamæmelinum fi-
uadi & in- ctili vase concluditur, mistis floribus genistæ. Vas
cidendi in fideliter clausum stercorario fimo sepelitur, illicq;
duo do vim vt efferuescat, aliquot dies relinquitur. Eo oleo re-
habet. nes, pubes, perinæum inunguntur.
 14 *Hæc pro-* Bestiolæ in lapidariis, fodinis, quasi verrucæ lapi-
prietate inex- dibus obhærescunt, quæ si quinque numero ex a-
plicabili di- quæ 3. 3. sumantur, mirabiliter iuant. Pellis 14 lepo-
cuntur esse ne- 14 lepo-
phritica. Pul- dic. petro. rad. saxifrag. & lapillis qui in astacorum capitibus reperiuntur.
uisculum au- Conferet mirifice ad lapidem cōfringendum cum vino albo aqua fœnicul. sco-
tem apte con- lopend. aut petroselinum diluto exhibitus.
ficies ex ra-

ris cremata, lepus decolatus, alioqui integer cum croco & carnibus vase fictili crematur. Eiusdem renes ficcati & inueterati pondere 3.4. ex vino tenui propinantur. Cinis vngulæ equi, plumarum paluborum, testæ cochlearum, cæcorum, vermium terrenorum, asellorum, passeruli, quam caudam tremulam vocant, sterco murium in aceto tritum. Calculus, quem quis primùm excluserit. Lotium capræ môtanæ, cicadæ, & alia eiusmodi à proprietate calculum excludunt.

Corticis raphani acerrimi 3.6. horis 12. in vini albi tenuis 3.8. maceant. Colatura duabus dosibus sumitur.

Terebinthina 16 ad cautionem calculi potius, quàm ad exclusionem, imperanda est, eaque multis modis vtimur.

℥. terebinthinæ 3.4. inuratur in lamina ferrea candente, vt possit infriari. Dabis 3.2. eius pulueris cum 3.2. aquæ saxifragiæ, chamæmeli, vel genistæ, & 3.1. oxymelitis. Hoc medicamentum 17 excludendo calculo satis esse potest, vbi priùs lenieris, & relaxaueris. Vt.

℥. terebinthinæ 3.8. lithontribi 3.2. misce, fiat bolus. Aliud.

℥. terebinthinæ lotæ decies in aqua saxifragiæ 3.8. cum saccharo fiat bolus. Hoc verò datur tempore paroxysmi.

℥. terebinthinæ lotæ in aqua violarum 3.8. benedictæ 3.2. Aliud.

℥. 19 terebinthinæ lotæ in aqua haliacabi 3.2. pul. tragacanthi & gycyrrhizæ ana 3.1. 8. incorporantur in 3.8. cassiæ, cum saccharo fiat bolus. Aqua

15 Vini albi vsus in calculi genesi non probatus, & ad renes humores deducat excrementitios.

16 Imò potius ad curationem, quàm ad prouisionem, terebinthina præscribenda.

17 Idem facit terebinthina aqua stillatitia.

18 Ex Rheæ descriptio, quæ turbiti nō recipit. Attamen

buius loco re et substitues hiera pic. 3.2

19 Hoc medicamentū parī facultate leniendi & tenuandi pollet, proptereaq; ad paroxysmū dūgōd & imperari potest.

distillata è terebinthina.

Iustinianum excludendo calculo ad 3.3. dissolvitur in glycyrrhizæ decocto, vel cum saccharo violato in bolum cogitur. Lithontribon per se 3.3. pondere, vel cum 3. Iustiniani ex decocto glycyrr. aqua violarum, chamæmeli, aut simili. Aliud.

℥. cornu cerui vsti & puluerisati, gummi tragacanthi similiter pul. ana 3.1. terebinthinæ in lamina terrea, vt priùs, crematæ 3.℔. lapidis Iudaici, pul. vermium terrenorū ana 3.1. incorporentur omnia in Iustiniani 3.1.℔. Deinde in decocto glycyrrhizæ dissoluantur, & fiat potus.

20 Guaiacum decoctū diureticū est, vnaque cum urinis sudores ciet maxime: sed potius in prouisione cōfert, quam excludione.

21 Quod renes habeant angustas.

Sunt qui singulare præsidium putant frangendo lapidi lignum 20 guaiacum: iusta quidem ratione, virtute videlicet incidente, adstringente & leniente. Talia enim esse oportet, quæ calculosis imperantur. Vitanda tamen sunt, quæ nimium siccāt, quæ crassiorum pattium.

Ratio quoque habitus corporis ineunda est. Obesum corpus magis 21 tenuantia, gracile verò minus perferre potest. Sic loci, temporis, anni, ætatum & similibus meminisse oportet. Laudatur & hæc distillatio.

22 Vt pulueris polygoni minoris, betonica, lapillorum asfacinorum, pulueris corticis cassia.

℥. mellis ros. terebinthinæ ana ℔. Liuiubarum, febelsten, nucleorum pini ana 3.4. Granorum alkekengi, seminis cucumeris, nigellæ, apij ana 3.2. succi raphani per residentiam depurati ℔. 2. Semina, & reliqua materia solida, conquassentur: cum cæteris in alembico ponantur, fiat distillatio. In distillationis vnc. 3. dissolue 3.1. aut 3.4. 22 eorum, quæ à proprietate calculum excludunt. Qualia sunt antea descripta, cinis scorpionum, scarabeorum, hepatis

asini, testæ ouorum, ex qua exclusus recenter pul-
lus est, hirundinum, testarum auellana.

Limonum succus à multis commendatur. Item
& cinis vitri combusti. In vehementi siti & calore,
si quidem prius vacuatum corpus est, si debilitas vi-
sceris, aut consuetudo non prohibet, aquæ frigidæ
potus largiter exhibitus aliquando calculum exclu-
dit. Aliud remedium.

℥. rad. asparagi, rad. rubi humilis ana M. 2. folio-
rum betonica, polij montani ana M. 2. cicerum ni-
grorum M. 1. fiat decoctio in aqua pluuiali secun-
dum artem. In fine decoctionis adde aceti scyllitici
℥. 1. fiat colatura. Dosis ℥. 4. cum ℥. 1. lapidis Iudaici,
aut similiū.

Frangendo calculo non est remedium inuenire
forſan isto accommodatius. ℥. succi limon. ℔. 2. succ.
raphan. ℔. 3. succ. bipinell. beton. saxifrag. parietar.
alkekeng. alth. creſſionum ana ℔. 8. Miſceantur ſi-
mul. Quibus adde tribulor. cortic. bruge ſpinæ,
radic. ſœnic. petroſ. acor. enulæ, veronica, gentian.
ireos Florent. an. ℥. 2. ſeminis melon. ocymi, bardan.
milij ſolis, ſeminis petroſel. Macedonici ana ℥. 1. ſe-
min. cucumeris, portulac. citrul. ana ℥. 8. fol. & flor.
beton. ſcolopend. aſpleni, flor. viol. alth. bugloſſ.
taſſ. barb. ana M. 2. f. infuſio, deinde fortis expreſ-
ſio. In qua diſſolue mell. optimi deſpumati ℔. 2. te-
rebintihina ℔. 1. aceti alb. quart. 1. ſpecier. electar.
Duc. aureæ Alexandrinæ, lithontr. ana ℥. 1. f. diſtilla-
tio in alembico ex arte. ℥. ſupradictæ diſtillatio-
nis ℥. 3. ſacch. violacei ℥. 1. cinam. 3. 8. Detur bis indie
horis 4. à cibo, neque comedat poſt horas quatuor.
Sunt qui agripalmæ manipulos duos contun-

dant, sensim affundendo vini alb. 3. 4. salis subtilis-
sime triti 3. 1. & factam expressionem potui dent.
Alij aquam argentinæ commendant, aquam cha-
mæmeli, itémque lappæ radic. decoctum.

Remedium Porphyry & Octauj.

℥. brassicæ siccae & in puluerem redactæ 3. 2. pi-
peris 3. 6. misce. Dato 3. 1. ex aqua, aut aqua alkeken-
gi, aut simili.

Gallus lassatus flagris cum polytrico, trichoma-
ne, lupulo, asparagis, aliisque eiusmodi ad putrila-
ginem coquitur: ius sorbetur. Conueniunt præte-
rea scolopendrium, portulacæ succus, cucurbitæ ci-
nis, valeriana, semen personatæ, cardui & damoso-
nij radix, lini, cumeris, maluæ, fœnugræci, api, fese-
leos, hederæ semina, cyperi radix, asari, rusci, cyno-
sbati fructus detracta interiori lanugine, & spon-
giolæ in cynosbato natæ, gummi, nuclei cerasorum,
persicorum, cortex medius corilli, sarmenta vitis
combusta, & extincta in vino tenui, aut liquore cõ-
uenienti, vt bibatur colatura.

Electri, lapidis spongiæ, pul. saxifragiæ ana 3. 6.
ex aqua genistæ, aut simili.

Cucurbitula, lenito prius dolore, remollitis ac
relaxatis partibus, iam non vrgente inflammatio-
ne, renibus primùm, deinde perinæo & inguinibus
affigi debet.

In summa clystere mollienda aluus, leniendus
venter è cassia. Detrahendus sanguis è crure, nisi
plenitudo sit totius corporis: sic enim è cubito
prius. Lenientibus atque laxantibus, deinde etiam
leuiter incidentibus calculus ad exclusionem præ-
parandus est, paulatimque faciendus gradus ad ea,

quæ detergent, attenuant, expellunt, atque etiam
 urinas mouent: multò maximè cum iam remittitur
 dolor, & calculus commutat locum. Quòd si iis,
 quæ bibuntur, nihil efficitur, cucubitus vtendum
 est. Si verò neque hoc remedio exit calculus, ad
 relaxantia, lenientia, & initium curationis redeun-
 dum est. Relaxabunt & leniunt fomenta, cataplas-
 mata vt. ℥. fol. malu. bisfal. parietariæ ana M. i.
 summitat. aneth. flor. chamæm. & melilot. ana p. i.
 semin. alth. lini, scœnogr. anis. ana ʒ. β. bulliant in a-
 qua & vino albo pro fotu. Ex huius decocti mag-
 mate fingetur cataplasma, additis ol. scorpion. &
 cuniculi axungia. Auena, berula, gallitricum, meli-
 lotum & similia è vino albo, aut butyro friguntur,
 & inde fiunt sacculi & emplastra minori appa-
 ratu. Si verò translatus est calculus in vesicam, nec
 aliter extrahi potest, ad incisionem cōfugere oportet.
 Cuius rationem repetes ex 6. Pauli, Chirurgia
 Albucasi & aliis Chirurgis.

23 Vt ad ca-
 taplasmata ex
 raphano, na-
 sturtio aqua-
 tico, parietaria
 in adipe
 cuniculi fri-
 xis confecta.

In hoc morbo dolor intolerabilis facit, vt aliquā-
 do vtendum sit narcoticis. De quibus multa antea.

Descriptio 24 olei de scorpionibus.

℥. aristolochiæ rotundæ, gentianæ, cyperi, cor-
 ticum radices capparis ana ʒ. i. Bulliant omnia in
 lb. i. olei amygdalarum amararum.

24 Quod ad
 comminuen-
 dum calculū
 in renibus
 valere puta-
 tur.

Sunt qui addant succi raphani lb. β. vt fiat de-
 coctio ad succi consumptionem. Alij aquam. Per
 hebdomadem insolentur.

Singulis libris colaturæ adiace duos scorpiones,
 & rursus insolentur dies 15. Gutta eius olei virgæ in-
 funditur: eodem oleo pecten & perinæum inun-
 guntur.

DE MORB. INTERNIS

Probatum quoque multis balneum sulphureum, ex aquis naturalibus, vel subquadruplo sulphure liquato in quadrupla aqua. Alij in eiusmodi aquam calidam lintea immergunt, & calida perinæo ac pectini apponunt.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Calculi in capite concreti.

Multis in partibus corporis humani calculi generari possunt. Obseruauimus concretos in capite & utero mulieris, cui dissectandæ in Scholis publicè præfuimus. Multis in folliculo fellis leues, nigri, flauī, innatantes aquæ, qui quandoque excluduntur deorsum. In nobilissima muliere 53. repertos, secto folliculo, videre licuit in Auernia.

Lapides ex ano redditi.

Puero cuiusdam sutoris in mesenterio inuenti: duabus mulieribus in pulmonibus: multis in articulis, iecore, liene, ventriculo. Adhærent sæpe vesicæ, cranio, utero. Galenus de humoribus meminit calculi in utero. Musa mulierem refert ex ano quinque lapides reddidisse, Quod verisimile est. Nam pituita sæpe lentissima intestino hæret, quæ potest concrelescere, dum satis non detergitur. Galenus 5. de locis affectis meminit cuiusdam, qui è thorace velut grandines expuebat. Alberto Sauonarolæ mortuo

Mirum de Alb. Sauonarolæ calculoso.

decem calculi inuenti in vesica magnitudine oui columbæ & figurâ, singuli pendentes plus quàm 3. v. omnes simul 3. vi. vt scripsit Musa. Pituita putris & pus crassum aliquando repræsentant calculi signa, vt in Præfide quodam multa mucosa, viscida, longo tempore quotidie expurgante. Sed de materia, causa efficiēte, & generationis modo in vesica & renibus non eadem omniū sententia.

De calculi causis variæ sunt authorū sententiæ.

Alij aiunt multam materiam crassam ac terream primum cogi in vnum in vesica, cuius pars intima concrescit, tandemque, si non eiiciatur, calore & frigore parte tenui consumpta in lapillum coalescere. Hinc voluitur ab vrina, & semper sibi adiungit atque sic augetur. Causam autem efficientem esse tum calorem, tum frigus, vnde in senibus & pueris generantur, non in iuuenibus. Alij ex Hipp. materiam faciunt vrinam adustam à feruore & ardore. Quorum enim alius fluida est ac

sana, & vesica, aut vesicæ os, non ardet, his faciliè urinam effluere, & in vesica nihil congregari. Quorum verò alius ardens & feruida fuerit, in his etiam necesse esse vesicam idem perpeti. Cum enim magis, quàm pro natura, fuerit calefacta, stomachus eius inflammatur. Vbi verò hæc perpetitur, urinam non demittit, sed in seipsa concoquit & adurit: & quod quidem tenuissimum in ipsa est, excernitur: quod purissimum transit ac emingitur. Indicio esse urinam splendidissimam excerni instar feri. Brasauolus tertium modum affert ex eodem Hipp. 4. de morbis. Fieri enim ex arenis, sedimento, velut glutine, copulante. Hoc quibusdam non placet, quia natura ut statim arenam senserit, protinus eicit. Et cum renum calculus nudus sit, adeo vesicam vexat, ut diu non possit retineri, quare nec augeri. Contrà nonnulli nullum in vesica lapidè generari aiunt, quin in renibus acceperit principium & rudimentum. Indicia esse nephriticos dolores, qui in omnibus præcedunt, & in omnibus calculis medium quasi nucleum reperiri, verum rudimentum à renibus exturbatum. Philot. contrà, sæpius in vesica propter capacitatem calculos generari. Respondent capacitatem iustum argumentum non esse, & experientia doceri contrarium. Tantam controuersiam neque nostrum est conciliare, neque breuibz scholiis id potest præstari. Si tamen licet ex iis, quæ apparent, quicquam efficere, cum lapides renum & vesicæ, neque eodem colore, neque eadem figura, neque eadè substantia, nec in eodem sexu aut ætate similiter cōcrescere sensus doceat, omnibus eandè causam, aut generationis modum tribuere, aut locum, non minùs absurdum videtur, quàm si in metallis & lapidibz terrenis idè fieret. Vesicæ enim calculi ferè maiores, rarò alio colore, quàm albo, aut cinereo, in pueris frequètiùs ob edacitatè, ut ait Galenus, unde crudi humores generantur, qui calore cōcrescunt. Sed fusam crassitiem, exceptà ob robur natui caloris & virtutis naturalis in vesicam renes excernunt. Adde si vis mollia & humida corpora puerorum & fluxilia, quod plurimum facit ad excretionem materæ crassæ. Quæ quia in senibus & adultis non adsunt, in illis frequètiùs generantur in renibus. In mulieribus rariùs propter

Hæc Fernely est opinio cap. 43. lib. 6. Pathologici.

Philoth. comment. in aph. 80. lib. 4.

Calculi in renibus cur mulieribus rariùs generantur.

DE MORB. INTERNIS

menstrua, & laxitatem mollietatemque viarum. Aceruantur lactis, casei, vinorum crassiorum usu, ut Ferrariæ: aquarum limosarum, ut Lutetiæ: alimentorum crassi succi, ubicunque sit. Urinæ aliquando arenosæ ex vesica: aliquando contrâ. Ex his omnibus in vesica & ab arenulis, & à materia terrea atque adusta, sed multò frequentius ex crudo succo, limoso ac viscido, quo etiam coguntur arenulæ, calculos oriri consentaneum est, aliquandòque arenulas ex renibus in vesicâ labi, sed & ex ipsius urinæ sæce resolutio humore posse fieri, à calore stomachi ipsius, ut ait Hippocrates, quales in matulæ fundo apparent. Crassities materiæ intelligitur ex corticibus veluti cæparum, quibus lapides vesicæ integuntur, & ex compacta substantia ac duritie. A viscido humore frigus, à superueniente calore induratio, coctio & quasi assatio, ut in lateribus ex luto: unde neque calore liquantur, neque frigore. In renibus verò ferè tinguntur rubro, ut rubrum intelligas, & flauum, & rufum iusta ratione, quod & in arenis videre licet. Nam à sanguine, calore loci, & partis colore tingi solent. Minus duri, asperi, & magis friabiles, quàm in vesica. Ergò magis ex arenulis coalescunt. Cur igitur multi arenas, mingunt, neque calculosi sunt? Causa in promptu est. Non enim coguntur, nisi viscido aliquo, & crudo humore, tanquam glutine. Opus est tempore. Vbi igitur obstructio à crassis & viscidis humoribus, & acrior urina ac magis sæculenta, angustiores meatus, calore superueniente à quacunque parte, ut hepate, corde, renibus, quod diu impactum fuit in meatu, induratur & lapidescit, figuramque accipit à sinu, in quo est. Neque impedimento est, quod nonnulli respondent, ex calculo arenulas fieri, non contrâ. Cur enim qui generatur in vesica, in arenulas rarò dissoluuntur? Neque etiam ob id necesse est in calculo renum semper arenulas excerni cum urina. Nam in multis dissectis probatum contrarium, qui calculosi sunt inuenti, cum neque arenas meierent, neque laborarent urinæ difficultate, in fossio calculo in substantia renum. Archigenes & Philagrius arenas reddi volunt, cum iam calculus è rene in vesicam descendit. Rudimentum quoque in renibus quandòque accipi, accretionem verò in vesica

*Cur multi
arenulas fun-
dunt, cum cal-
culosi non sint.*

non est negandum. Cuiusmodi calculi in medio sunt friabiles, in superficie duriores & magis compacti, doloresque nephritici præcedunt.

Quæ omnia plurimum conferre videntur ad curationem & prædictionem, ut in quibusdam potius ad arenularum generationem respicere, in aliis ad crudorum humorum copiam oporteat, certumque sit in renibus, & ex arenulis facilius posse comminui. Calculus renum exactè describitur his signis. Dolor renum acutus adest. Sexto tamen Epid. gravis in renem dolor, cum cibo replentur. Quod ita distinguendū censemus. Cum enim in ventriculo renum figitur, vel sine dolore est, vel cum graui. Vbi incidit in vteras, vel etiā intra renem, pungit pelliculam in exortu vterum dolor acerbissimus. Cum etiam mouentur vehemētius, aut spinam flectunt, dolorem acutum percipiunt, & stuporem circa lumbos & crura ob compressionem nerui à lumbis, vel, ut alij volunt, venæ cauæ. Proinde additur ab Hippoc. & in lumbos, & in testem secundum renem situm. Videtur enim quibusdam testis sursum trahi: Dolor ille fixus est, nec locum mutat, ut in colico. Frequentè mingunt. Sed paulatim adstringitur & supprimitur vrina. Vrinā enim frequenter fluere non est sufficiens argumentum liberum esse calculis vteras, cum vno clauso per alterum reddi queat. Suppressa vrina regurgitat, vnde alui tumor, singultus, animi deliquia, coma, dyspnœa, Cataphora, &c. Non semper arenulæ rubræ prodeunt, sed sæpius, præsertim vbi è renibus emotus est lapis. Vomunt pituitam inualefcēte dolore, & æruginosa, fastidium cibi, alui excretio difficilis. Ex lib. 6. τὸν ἐν τῷ νεφρῷ. Sæpe sanguis excernitur ob violentiam calculi.

*Renū calculi
facilius at-
tendantur, quàm
vesica.*

*Vrina quan-
tumvis flui-
dens liberis
calculis vte-
ras non ar-
ruit.*

Clyster lenis, fomentum, vnguentum, bolus, phlebotomia. Molliuntur viæ cassiā cum rhab. cessante dolore & vomitu. Deinde terebinthina: postea oleo amygd. dulc. cum alphenico, vel diatrag. hinc cataplasma molliens. Postremò quæ comminuunt. Inueteratus calculus paulatim atterendus. Alioqui frustrā contendimus excindere. Vbi iam durior & maior substantiæ reni impactus, & quasi actis digitis & radicibus inhæsit, frustrā oppugnatur. Recens natis mollior. Ille tamen atterendus

DE MORB. INTERNIS

paulatim, & confringendus. Alia enim remedia excludunt, alia atterunt & frangunt. Regurgitante vrina ad ventriculum vomitus ciendus, alius subducenda. Alio-
qui vis medicamentorum hebetatur, licet ab hepate & renibus eorum quoque vis infringatur. Vehemens impulsio, commotio, affriccio, qua parte vretes explantatur, è renibus urinam & calculum promouent. In excludendo calculo renum videtur quædam periodus. Multis quieto dolore, nec opinantibus, excidit. Infinita propè sunt remedia in veterum libris, sed cum iudicio & delectu eligenda. Quidam nobilis Lutetiæ lapidem habuit mollem, laxum, efformatū ad instar mortarij, per quem transcolata aqua & epota mirū in modum iuuabat calculosos, & urinam suppressam. Cauendum à nimia refrigeratione renum, quia inde angustiora vasa redduntur, & aliquando gignendi impotentia consequitur.

ANTO. VALETTI EXERCIT. XLVIII.

CAlculi, lapides, arenulæ, sæpe præternaturam in renibus coguntur, humore scilicet aqueo ac terreo, tenaci præsertim & glutinoso, eò confluente, cuius portio tenuior caloris accessione exhalet, crassior exusta, exsiccatâque spatio temporis in substantiâ topheo similem & lapidosam conuertatur. Vide Galen. comment. ad sent. 6. sect. 1. lib. 6. Epidem. Vnde deprompta reperias, quæ de calculi causis & signis fusiùs ab Hollerio memorantur.

*Calculi renū
curatio.*

De calculo atterendo cum cogitat medicus, præpurgata prima corporis regione blando cathartico, aut iniecto clystère, toti prospicit corpori sectione venæ, si plenitudo adsit, si fluxionis metus & inflammationis in propinquo sit, si dolor intolerabilis, atque adeò grauis febris vrgeant, viribus alioqui constantibus. Pertunditur vena axillaris interna cubiti è directo: quanquam Galen. in nephritico dolore

*Gal. cap. 17.
lib. de curad.
rat. per sang.
missionem.*

venam poplitis, aut malleoli secatur. Quod non fit, nisi inflammatio, fluxio, aut copia sanguinis aliud suadeat. Mox conueniet purgare, vias lenire, ac laxare. Purgatio ergo sit eiusmodi.

\mathcal{R} . cassi. fist. recens è canna extr. 3.6. rh. elect. puluer. 3.1. diaphœnic. 3.ß. cum puluere glycyrrh. & tragacanth. f. bol. parui, obeliis inuoluti. Vel \mathcal{R} . rh. elect. 3.1. ß. agar. troch. 3.1. infundatur seorsim in aqua parietar. vel vino albo, vel cicer. rub. decoct. cum tantillo cinamom. Factis express. adde syru. de alth. vel de scolop. aut glycyrrh. & cathol. ana 3.ß. f. potio.

Pauperibus in oxymelite Galeni, aqua parietariæ, aut decocto radic. aperientium dissoluitur 3.1. cathol. cum 3.2. diaphœnic. Syluius putabat clysteres maiorem habere vim, quàm quæ per os sumuntur, quia integris viribus ad renes perueniunt, ipsos onere magno leuant, ac velut fomento quodam dolorem mitigant. Sic autem parantur.

\mathcal{R} . malu. bismal. parietar. berul. ana M.1. flor. chamæ. melil. ana p.2. semin. anis. fœnic. ana 3.2. f. decoct. & colatura ad lb.1. In qua dissol. benedict. laxatiu. & hieræ ana 3.6. terebinth. Venetæ 3.3. mell. ros. colati, sacchar. rub. ana 3.1. olei rutac. & aneth. ana 3.1. ß. f. clyster. Vel \mathcal{R} . decoct. remol. addita 3.ß. seminis fœnic. vel hydromelitis bene coct. lb.1. In qua dissolue quæ supra.

Quod si leniendus tantum sit dolor, ex ol. amygd. dulc. lini, & chamæm. ana quart.1. f. clyster. Reiecto clystere hæc imperentur.

\mathcal{R} . ol. amygdal. dulc. 3.2. vini maluatic. 3.4. Cap. post clysterem. \mathcal{R} . parietar. M.3. frigrantur cum oleo de scorp. & amygd. dulc. f. cataplasma pro renibus.

Si calidiores fuerint renes, illinetur eorum regio oleis ros. & violaceo lotis in aqu. plantaginis, aceto tantulo addito. Ab his præscribetur apozema ad calculum conterendū, quale hoc est, quod Hollerio

& Syluio fuit familiarissimum.

℞. radic. althææ, gram. acetos. petros. ana ʒ. i. bruce spinæ & ramusculor. eiusdem, ferraturæ ligni guaiaci ana ʒ. i. cortic. rad. cappat. thamarisc. & fœnic. an. ʒ. ʒ. semin. anis. fœnic. milij sol. hyper. semin. cucum. cuscut. citr. ana ʒ. 2. fol. bismal. M. 4. beton. viol. maluæ ana M. i. end. scariol. agrim. ana M. ʒ. fol. pariet. capill. vener. ceterach, scolopendr. cuscut. ana M. i. passul. mundat. iuiub. ana num. 12. fruct. alkekeng. num. 30. flor. beton. hyperic. bismal. malu. tapf. barb. viol. borrag. ana p. 2. aquar. stil. latit. haliac. parietar. end. portul. acetos. chamæm. succ. limon. ana ʒ. 2. aqu. fontanæ puriss. q. sem. fi. decoct. ad ʒb. 2. In colatura dissolue syrup. de althæa & de limonibus ana ʒ. 4. f. apozema conditum exarte. Vel in colatura dissoluta ʒb. i. sacch. & syrupor. prædictor. ana ʒ. 2. fi. syrupus perfectè coctus, vtendus per se, vel cum vino albo. Vel ℞. rad. petro. fœn. apij, temperatar in aceto fortissi. per noctem, cordibus abiectis, ana ʒ. ʒ. rub. maioris ʒ. i. capill. ven. ceterach. adianth. bardan. ana M. i. semin. anis. alth. milij sol. ameos ana ʒ. ʒ. sem. melon. ʒ. i. vuar. passar. ʒ. ʒ. glycyrrh. ras. ʒ. 2. cicer. rub. trium. flor. cardiac. ana p. i. aqu. font. q. suffi. vini alb. ʒb. ʒ. f. decoct. ad ʒb. i. In colatura dissol. syrupi capill. ven. & oxymelitis simplicis ana ʒ. 2. f. apoz. in treis dos.

Vulgò probatur decoctum cicer. rubrorû. Ioannes Vassæus Medicus celeberrimus improbabat, quod renes vlcerare contenderet ex Dioscoride. Eius loco aiebat saluberrimû esse remedium decoctum summitatum althææ, brassic. rub. cum melle optimo, & butyro recenti. Huius decocti vsus esse debet per dimidiam horam ante pastum.

Alij iuscula instituunt ex malu. bismal. bipinell. saxifrag. berul. herniaria, violaria, radic. lappæ maioris, asparag. quinq. foliis cupressi, ciceribus rub. radic. petros. fœnic. in aq. fontana ad mediæ partis consumptione, quorum vsus sit ante pastû. Obesis corporibus,

corporibus, iisque prius benè purgatis, guaiaci decoctum conferet. Honoratus Castellanus maximè probabat decoctum vrticæ nouellæ, sed præsertim veris initio vsque ad Maium. Efficacius fuerit, si sumpta electarij sequētis tabella vna superbibatur.

℥. nucl. persic. 3.2. lapil. lync. Iudaic. ana ʒ. i. milij sol. gran. alkekeng. gram. ana 3.ʒ. polypod. 3. i. genist. asparag. semin. basilic. ana ʒ. 2. nucl. mespilor. ana 3. i. ʒ. semin. apij, saxifrag. scœnogr. ana 3. i. semin. bismal. dauc. ana ʒ. i. electarij lithontr. 3. ʒ. Puluerata singula excipiātur saccharo anthosato in aqua parietariæ, siue saxifrag. dissoluto, fiāntque tabellæ ponder 3 3.

In præscribendis eius generis remediis habeatur ratio naturæ ægni, & aëris. Vbi enim frigus dominatur, semin. apij, petros. Macedon. saxifrag. aspar. addi possunt: vbi verò calor, semen acetos. end. pepon. melon. pulu. diatragacanth. frigid. Ad comminuendum & deturbādum calculum sunt qui gallinæ ventrem exenteratum malo citrio vno minutissimas in partes dissecto, sem. bardan. melon. alth. ana 3. ʒ. & cicer. rub. p. 2. infarciunt, elixant, iusculum sorbendum exhibent, idque continuant per aliquot dies, post terebinthinæ vsum.

Alij has pilulas maximè commendant.

℥. lapid. Iudaici, lync. ana 3. i. nucleor. mespilor. 3. ʒ. tragacanth. gumm. cerafor. & persic. ana ʒ. i. teruntur omnia, & incorporantur in 3. i. terebinth. pro dosib 3.

Hoc quoque vulgi experimentum minimè contemnendum.

℥. radic. enul. 3. ʒ. granor. alkekeng. 3. 2. baccar. iuniperi 3. i. glycyrrhiz. 3. 6. omnia tusa in vino albo bulliāt: colatura detur.

Lignei ramusculi, vel cortices radicum brugespinae siccantur in clibano, vt teri possint in mortario.


Pulvis transfunditur per setaceum, vt sit tenuissimus. Exhibentur eius pulueris ℥.4. cum ꝑ.4. vini alb. bis in mense, alijs opportunis calculo, arenulis, semel. Infinita alia reperiuntur remedia, in quibus præscribendis eam cautionem seruare nos oportet, vt nimium acria & calida diuretica (quæ alioqui vrinæ cohibitio huic affectui familiaris exposcit) declinemus. Hæc enim calculum cogerent magis, & indurarent. Si ex deciduo calculo renibus vlcus impingatur, proderit terebinth. emulsio amygdal. ex aqua hordei, vel mulla, vel plantag. decocto, addito syrupo de althæa. Si calculus in vteribus resistat, fatus, balnea, semicup. vias dilatando præsentaneo erunt remedio.

*Galen. lib. 5.
Simp. & lib.
10. de cõpos.
pharma. &
vtrius.*

De lapide vesicæ.

C. A. P. 49.

Calculus vesicæ si per fistulâ vrinariam exitum non habeat, sola chirurgiâ curatur.

 Alculus vesicæ curatur eodem modo, quo calculus renum. Nihilominus tamen in calculo vesicæ fortioribus opus est medicamentis, quàm renum.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Signa lapidis in pueris sunt, vrina aquea, similis lactis fero, sedimētum arenosum & tensio virgæ, alioqui non conueniens illi ætati. Cum factus est, difficultas micendi, vrina subcruenta, dolor in eius excretionē, pruritus in præputio ex motu lapidis & arena, vel etiam lapilli parui ex attritu. Certissimum signum, si micendo aliquid egerunt, aut egerendi cupiditate tenentur. Cum sedent repentē, vel sedendo concutiunt vehementer alterum pedem, dolorem sentiunt iuxta anum, in ima parte pudendi. Nonnulli iubent ad certioŕem distinctionem ægrum equitari, saltare, exerceriŕque vehementius. Inde exhiberi lapidem comminuētia, & subŕsidentia in vrina inspicere. In qua si tribus aut quatuor diebus pulvis appa-

reat, lapidem esse durum : si lapidum frusta, & quasi arenæ, tophum: si nihil horum appareat, lapidem proculbiò non esse. Sed cauendum, ne exercèdo in ardorem urinæ incident. Ponunt autem tripliciter in vesica lapidem generari. Ex arena, sed rarò, vnde fit tophus : ex lapide iam in renibus concreto : & ex fece urinæ. Cùm verò lapis iam vlcus excitauerit, aut carnem, signa còfundi. Omnibus tamen certiora signa digiti in rectum intestinum, cui vesica incumbit, immissio, & cathæter, sed quæ non sine dolore adhibentur. Suppressa vrina corpore supino & concusso si prodeat, lapis meatum occludebat. Neque cathæteri semper fidendum. Mercatori cuidam omnia calculi vesicæ signa aderant, Cathætere probari non potuit. Mortuo duo magni calculi inuenti sunt, singuli 3. ij. s. membranâ inclusi, vtriq; sua. Vbi còtenuit in vesica, ferè maior euadit ob maiorem capacitatem vesicæ, & colluuiem. Tum non mutatione ætatis, sed sola Chirurgia curatur. Atque aliquando liber est, interdù hæret vesicæ, nec nisi vi extrahitur. Nam vt matula excrementa hærentia contrahit, ita vesica imbecillior. Deinde imbecillitate vesicæ & angustiiis viarum impeditur exclusio. Hinc mors, quia febris & inflammatio sequuntur. In consilio secandi videndum quâ parte sit, & an sine periculo eximi possit, an pertinaciter hæreat, an sit in meatu virgæ, & anfractu colli eiusdem. Còrussio ab asperiore & longiore operatione inflammationem, gangrænam, mortè denique infinitis adfert. Sunt, qui iniecto oleo scorpionum & aliis per penem contendunt frangi posse. Vidimus mulierem, quæ inunctionibus & suctu penis multos liberauit. Sunt qui napo orbiculato oleum accommodatum immittunt. Napum coquunt; deinde ad modum emplastri pubi admovent.

Sunt, qui aperto vesicæ collo, quomodo Lithotomi faciunt, viam aperiant, nulla vi eiusmodi illata, quæ inferri solet à vario genere ferramentorum, vbi calculus extrahitur. Atque ea ratione facta viâ, aliquando sponte naturæ calculus, nisi grádior sit, excluditur. Hoc in mulieribus facilè ob breuitatem & rectitudinem colli vesicæ, vix tamen sine læsione aut laceratione siphincteris, vnde sequitur inuoluntarius urinæ exitus. In viris

DE MORB. INTERNIS

difficilius ob reflexionem, quæ fit in modum literæ S. Tutior tamen videtur hæc ratio. Sed si lapis grandior sit, instrumentis intrâ frangendus. Deinde sectio facienda paulò supra anum, qua parte est sphincter secundum fibras rectas.

ANTO. VALETII EXERCIT. XLIX.

Lapis vesicæ causa est morbi, nempe obstructio-
nis vrinæ excretionem præpedientis. Morbus
tamen in numero esse potest, si videlicet adeò sit
ingens, ut vesicæ ipsius circa vrinam obuolutionem
fieri vetet. Huius quoque causa crassus est & cru-
dus succus per venas cum vrina in vesicæ capacita-
tem delatus, qui tanquam fæx subsidens sensim la-
pidescit. Quam ad causam accedunt innata vesicæ
frigidity (neruosa enim est & exanguis) amplissi-
ma eius cavitates (vnde non necesse statim humore
illum excerni) longior in vesica eiusdem humoris
cunctatio. Sæpe tamen lapis ille è renibus per ne-
phríticos dolores excidit. Signa sunt assidua penè
pudendi frictio, erectio cum meiendi desiderio, in-
cessans alui soluedæ libido, vrinæ crudæ, &c. Quod
si calculus in vesicæ ceruicem se intruserit, vel vrina
continuo propellitur, & guttatim emittitur, vel
supprimitur omnino. Curatu difficilis est vesicæ la-
pis, quia medicamenta integris viribus, ob longitu-
dinem viæ, eò non pertingunt, & durior est in vesti-
ca, quàm qui concreuit in renibus, lapis. Si tamen
non ita sit magnus & prædurus, post vacuatum, si
fuerit opus, per venæ sectionem corpus, & redun-
dantem humorem perpurgatum, fient iniectiones
per fistulam argenteam in vesicam: quales ex succo
limonum, saxifragiæ & similium, vel ex decocto
conuenienti & oleo scorpionum concinnantur.

*Lapis ve-
sicæ causæ ex
Gallen. com.
ad senten. 15.
sect. 3. lib. 6.
Epid.*

*Signa lapi-
dis vesicæ.*

Vel. ʒ. creffion. parietar. ana M. i. petros. cum radic. p.
i. f. decoct. in aqu. pariet. & vino alb. ad lb. i. ex qua cum
melle Narbonensi f. hydromel. colatum & clarificatum
pro iniectione.

Satius etiam fuerit, maximè si suspitio sit calculum esse in meatu urinario, huius decoctionis vaporem in vesicâ recipi per infundibulum oris angustissimi, ut caculum, aut materiam crassam, viscidam, ipsi hærentem dissoluat. Ex usu quoque erunt inunctiones pubis & perinæ ex axungia cuniculi, ol. scorpion. ite emplastra ex gummi ammoniaco, bdellio, sagapeno, dissolutis in aq. saxifrag. oleo scorpionum, additis pulueribus lapidis Iudaici, lyncis, & similium antè explicatorum. His si nihil proficitur, tota spes curationis ad lithotomiâ conuertenda. Rarum est, & miraculo plenum naturæ opus: quæ nonnunquam viam sibi molitur, per quam calculum excludat. Id mihi aliàs, dum Burdegalæ agerem, videre datum est vnâ cum Emanuelle Phauorino, Medico & Philosopho eminentissimo, Præceptore nico mihi multis nominibus semper obseruando, colendo & memorâdo. Erat in suburbiis Diui Seuerini lignarius faber, q̄ calculo vexabatur, figura, ut postea ex conspectu constitit, longiore. Hic cùm ab ima parte acutior & asperior esset, vesicam prærupit: tum & testiculorum tunica præfracta post multos ac penè intolerabiles dolores, tandem in conspectum venit: quo facile deducto cùm multi hominem morituum iudicarent, ille tamen præter opinionem conualuit: hoc solum ex tanto malo homini incōmodo relicto, quod inde semper urinam reddit. Idem de quodam Nicolao

DE MORB. INTERNIS

Rustico recenset Beniuuenius cap. 78. libr. de abditis morborum causis.

De ardore urinae.

C A P. 50.

I Et distur-
narum, necno
crisi propria
partis alicu-
ius affecta,
aut etiã ma-
teria auer-
sione, vt in
parotidibus
& surditate.
2 Abraden-
do, exasperã-
do, & inflam-
mando.
3 Quia est
symptomati-
cus ipsi vesi-
cae, non autẽ
ipsius vesicae
symptoma.
4 Si serũ in
vitio sit, &
aestu incan-
duerit: aut si
a mistione bi-
lis ardor uri-
nae fiat.
5 Humorem
ad intestina
deriuãdo, qui
ferebatur ad
renes.

I N iudiciis acutarum i febrium bilis pluri-
ma aliquando excernitur à natura, quæ si
diffluit in vesicam, ardorem ² urinae facit.
Urina sero sanguinis & bile constat. Cùm autem
alterum acrius, vel augetur proportio bilis, ardor
urinae fit. Urina omnis acris est, sed multò maximè
sentitur acrimonia, si pars ulcerata est, effluit. Ad
vesicam glandulosa sunt corpora, quæ humorem
reddunt, vnde urinae acrimonia temperati potest.
Ea exsiccantur immodico coïtu, morbo aut medi-
camento, quæ causa ardorem urinae gignit. Sanies
quoque acris ex superiori corpore in vesicam de-
fluit, quæ urinae mixta ardorem facit. Cognita cau-
sa de phlebotomia, purgatione, & aliis remedijs co-
gitandum. Phlebotomia ⁴ tum conuenit, cum ca-
lidius corpus est, è brachio.
Purgatio ⁵ & diuertendo, & acriorem humorem
repurgando conuenit. Sed priùs considerandum
est, an solum leniendum, an etiam detergendum.
Vbi sola humoris acrimonia est, leniendum solum:
Vbi vlcus, etiam detergendum.
Leniendo conuenit Cassia: detergendo, terebin-
thina. Vtriùsq; virtus augetur, aut temperatur iis, in
quibus dissoluitur. Itaque si leniendum, imperabis
³.io. cassiæ, aut ³.i. dissoluẽsq; in decocto iuiubarũ,
passularum mundatarum, sebesten, prunorũ & si-
milium. Si detergendũ simul & leniendũ, dissolues
in aqua hordei, in sero caprino, in iulepo violato,

qui & lenit & deterget. Terebinthina, vt prius dictum est, vteris. Aliquando rhabarbari 3. aut 3. 4. 6. 3. 2. cassiæ commiscebis, atque ita dissolues, vel cū saccharo coques in bolum.

Quod attinet ad reliqua remedia, reuocāda sunt in hunc locum; quæ de Stranguria ab vrinæ acrimonia dicta sunt. Si tantum humoris acrimonia est, leniendum: si etiam vlcus præterea, detergendum & consolidandum. Leniunt iulepus & syrupus de violis, maluæ & bismaluæ frequens vsus. Aqua ex iisdem distillata. Decoctum glycyrrhizæ rasæ, pasfularum mundatarum, prunorum, iuiubarum, sem. communium frigidorum, psilij, cydoniorum, lac muliebre, oua & similia. Imperabis ergo.

4. aquæ maluæ 3. 4. iulepi violati 3. 1. 6. Atque vbi leuiter detergendum, vteris syrupo viol. de iuiubis, de nenuphare, de papauere. Et his quidem magis, si maior ardor est, hosque syropos dissolues in supradictis decoct.

Semina melonum excorticata & mundata 3. pōdere, aut ex iisdem feminibus, semine cucumeris & cucurbitæ cum amygdalis dulcibus imperabis lac amygdalinum, aut hoc ipsum iubebis comparari, dissolutis amygdalis in decocto prædictorum seminum: atque vbi vigeat ardor, semina hyosciami albi & papaueris albi & psilij cōmiscebis. Sem. lini, althææ & cydoniorū, eidem vsui esse possunt, si parentur, vt dictum est, vt vel hordeatis, vel lacti amygdalarum misceantur. Deterget iulep, id est, aqua sacchari: sed leniet magis, si saccharum violatum sit. Plurimum laudatur medicamentum ex trochiscorum alkekengi 3. 1. iulepi violati 3. 3. Hocque

DE MORB. INTERNIS

utendum erit, ubi maior ardor est. Lac muliebre & bubulum leniens magis. Ouillum confirmat. Caprinum & asininum detergent magis. Serum separatum ab his generibus lactis magis detergebit. Sed quia ardoris sensus magna ex parte sentitur ad colum vesicæ & extremitatem glandis, propterea iniectionibus in colem, turundis quoque in foramen virgæ utendum est. Leniendo lac muliebre iniiciendum est.

Liquor tenuis albuminis oui agitati, atque despumati, vel hoc.

℞. mucagi. sem. psilij & cydoniorum extractæ in aqua cucurbitæ, violarum, maluæ ana ʒ. ʒ. lactis muliebris vnc. i. liquoris oui drach. 2. misce pro iniectione.

In maximo ardore mucagines seminis hyoscyami & papaveris commisceri possunt, vel caphuræ Gr. 6. aut plura, vel opij Gra. 2. aut i. Turunda intingi debet cerato rosaceo Galeni, quod ita comparabis.

℞. olei rosarum ʒ. 6. lauetur sexies ex aqua rosarum. Deinde cum ʒ. 2. ceræ lotæ fiat ceratum liquidum in duplici vase.

Potest & hoc ceratum refrigeratum affundi succo plantaginis. Et hoc magis, ubi extremitas virgæ ulcerata est.

In dolore vehementi dissolues caphuræ ʒ. i. in aquæ rosarum aut violarum ʒ. i. vel in vino dulci: opij Gr. 2. atque ita linamentum, id est turundam, in his liquoribus madefacies, & molliter indes in virgam.

Si detergendum, supradictis iniectionibus addes

saccharum, vt non solum lenias, sed etiam detergeas, vel aquam hordei, vel serum lactis cum modico saccharo. Cum vero vlcera deterfa sunt, conueniunt, quæ consolidant, vt.

℞. sarcocollæ ʒ.i. amydi, cerussæ lotæ ana ʒ.ß. nutriantur in lactis muliebris aut caprini, vel ouilli ʒ.2. Fiat iniectio in virgam, quæ ter aut quater in die reperatur. Aliud.

℞. aluminis plumæ (scissile vocatur à Galeno) sacchari ana ʒ.i. mellis ʒ.i.ß. vini albi austeriusculi ʒ.2. leuiter bulliant. De colatura fiat iniectio. Conueniunt & hæc.

℞. succi virgæ pastoris depurati, succi plantaginis ana ʒ.i. boli armenæ, mummiæ ana ʒ.ß. misce pro iniectione consolidante.

Trochisci de carabe, de terra sigillata, bolus armena, tragacanthum, trochisci de spodio ʒ.i. pondere dissoluuntur in ʒ.2. succi equiseti, plantaginis iulepi violati, syrupi myrtillorum, diluti, vbi consolidandum est. Sed trochiscis de carabe in maiori ardore vtendum est.

In curatione ardoris vrinæ clysteres 6 ex iis, quæ leniunt, iniici debent. Quales multos habes de dysenteria. Atque vbi humoris acrimonia causa est, sudoris prouocatio & vomitus ex vsu sunt. Inunctiones pectinis & perinæ, è descripto cerato, rosaceo, oleo violato, de nuphare, de mandragora, de salice, cucurbita & cucumere.

Balnea, immersio pudendi in 7 decocto leniente.

Laudatur à multis iulepus ex aqua acetosæ & quarta parte sacchari violati. Postremo partes affectæ roborandæ, de quo in Gonorrhæa.

6 Vt ex decocto maluæ, althææ, violariæ, decocto capitis veruæ cini.

7 Vt in lacte in quo decoctum fuerit verbascum.

DE MORB. INTERNIS

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Per penem redduntur vrina, ramenta, pituita, vermes, pus, semen & sanguis. Vrina duabus partibus constat, sero & bile. Hæc si superat, aut serum sit acrius, fit vrinæ ardor aliquando etiam per crism. Sunt & glandulæ ac parastatæ humore quodam tanquam salinâ confertæ, quæ vrinam temperant. His resiccatis aut malè affectis idem quoque ardor excitatur, id est, dolor quidam, qui sentitur inter meiendum. Multæ quoq; sunt aliæ causæ, quæ ad dysuriam pertinent. Sæpe pituita putris, aut salsa, vt in senibus, aut pus acre permiscetur vrinæ, eamque acrem reddit, aut illa omnia cum vrina exeuntia dolorem excitant, præsertim si quæ sit exulceratio, aut inflammatio. Sed in vlceratione ramenta quædam simul conspiciuntur. Non erit inutile sigillatim de singulis agere, nō solum ad huius affectus distinctionem, sed multorum etiam aliorum, quibus hic permiscetur, aut similitudine quadam respondet. Puris & pituitæ differentia obseruanda, tum ex iis, quæ præcedunt, tum ex natura rei. Pus præcedit dolor, cruor, grauius olet, minus viscosum est. Contraria in pituita. Nam ratio dolor, nisi cum putris, salsa, frigidior. Memini frequenter vidisse interceptam vrinam crassa pituitâ, quæ dolorem & ardorem, vt in calculo, excitaret. Vidi & intolerabili cruciatu aliquot diebus affectû, qui pituitæ partes velut crystalli, aut concocti succi, quem gelatinam vocât, globulos colore aqueo pellucidos eminxit. Duos itidem, quibus pituita putrescens in vermes vertebatur, quos emingebant. Beaucler Aduocatus post dolores renum magnum vermem eminxit. Quidam literas ad Hispanum scriptas ostendit, quibus consiliū petebatur pro calculoso, cui eiectis calculis aliquot & arenulis prodierant duo vermiculi acuto capite, corniculato, vêtre & dorso testula inductis instar testudinis, nigri, nisi quod rubebât vêtre. In quo videtur generatio quædam esse à putredine pituitæ, calore multo totius venosi generis eam pituitâ ita conformante. Quemadmodum cum sit *vermiculus*, id est, capillitium illud, de quo agit Galenus Aphor. 76. lib. 4. id est, pituita, quæ in longum diducta à calore exurente capillos repræsentat aliquando ad dimidium cubitum,

*Vermes per
vrinas ex-
creti.*

ex usu crassioris alimenti genita, quæ cum vrina crassa excernitur. Viscidior enim fit, & resiccatur non omnino quidem, sed ut in longitudinem produci possit. Aliquando animatur, ut cætera animalia, quæ ex putredine ortum habent. Archigenes fieri putauit à fluxione mucosa, vnde & foliacea, & veluti pili, aliquando implexi, breues, longi, & materia quædam è venis ad renes, vbi cogitur. Galenus scribit, in quibus talia exeunt, semper vrinam esse crassam. Contrarium experientia docuit. Quidam annis plusquam viginti tales vrinas cum capillitio emisit ruffas, mediocri consistentia, non crassas. Temperamentum illi erat biliosum, satis tamen quadratum & carnosum corpus. Multis idem contingit: aliis cum crassa vrina. In Præside Longuel pituita lenta, corrupta, quam incredibili quantitate multis mensibus eminxit & deiecit, quoties sumpsit medicamentum, cum vrina tenui, serosa, simili sero lactis. Opportunus erat arthritidi & calculo. Sed vtròque affectu liberatus, vigiliis, frequenti mictu dolorifico torquebatur. Malum modò remissius, modò acerbiter per frigora & humidum cælum. Modò stillicidium, mictus exiguus & frequens, modò vrina largior. Remittebatur dolor, tum acerbior redibat. Penis & crura condolebant. Vrina modò mordax, modò contrà. Eadem omnino apparuerunt in procuratore ad Parium potem. Vtrique ætas annorum circiter 52. hepar calidius, sitis multa. Sed Præses naribus nihil expurgabat: alter contrà. In sacerdote Normano multa mucosa per vrinam prodibant, sæpe emingebat. In his omnibus cum pituita acris, salsa, putris, frigidior erat, dolor excitabatur. Creditur tamen pituita viscida & parum permixta, cum dolore excreta & magno conatu in vlcere renum aut vesicæ calculo tantum emitti. In asthma aut simili affectu, morbi vel magnitudinem, vel mutationem significat. Quæ omnino sine dolore exit, & in fundo crassiori farinæ similis apparet, crudus succus est. Quem sæpe sequitur renū aut articulorum dolor aut calculus, aut morbi longitudo, aut corporis cōsumptio. Pus resudat & effluit ab abscessu, inflammatione, vlcere. Non semper sanguini permiscetur. Multi enim renum abscessus reperiuntur, in quibus pus solum, certis

*Vrina cum
capillitio emi
ta.*

DE MORB. INTERNIS

interuallis cum vrina excernitur, vt in duabus mulieribus, altera vxore Senatorij Cónsulis Claudij Fabrij: altera vxore Vincentij Fabri negotiatoris. In aliis quoque, qui inde tabidi mortui sunt. Sanguinolentum aliquando. Vtrúmque exactè vrinæ permixtum, aut residens, sed post longum tempus, vrina etiam inde crassiore reddita, è renibus est, præsertim si dolor fixus in lumbis præcesserit, aut calculus reiectus fuerit, aut ex vreteribus vlceratis transitu calculi, vel in illorum cauitate orta post vlcus caruncula. Sed copiosius è renibus, quàm vreteribus. Cito subsidens, viscidum, mucò permixtū, cum scammulis minimè carnosis, è vesica, si nullus dolor in lumbis aut circa pubè grauius præcesserit. Sine vrina profluit è pene, vt dicemus. Neque tamen è renibus, aut vesica semper exit. Ab omnibus enim ferè partibus superioribus miro naturæ artificio, & per corpus confluxile facta exudatione modò in intestina, modò in vesicam exoneratur. Mulieri cuidam intolerabili cruciatu vrina purulenta profluebat. Mortua post quartū mensem, & dissecta, duo calculi in corde cum multis abscessibus paruis inuenti, renibus integris & viis vrinæ. In qua verisimile est, aut potius necessarium, pus acre per vrinas naturam expurgasse, quoad fieri potuit. Carnosa ramenta à renibus: furfuracea non semper à vesica. In febre enim ardente & colliquante à tunica venarū ita exesarum acrimonia (quo modo à cutis superficie pituita falsa & mordente erosa) furfures redduntur. Aliquando in eadem febre ardente ab adusto sanguine, præsertim crassiore & melancholico, ac veluti in cinerem resolutio. At in vrina mediocriter habente, ægroto non febricitate, à vesicæ scabie & prurigine oriuntur. Semen præter naturam & volūratem effluit vasis relaxatis, imbecilibus post immodicum coïrum, colliquato corpore, vlcere irritante, frigidis flatibus generantibus, acriore semine, retento ob contortionem pudendi. Si nihil horum neque renes neque vesica patiantur, frequentius Parastatæ, aut glandulæ semen retinentes, quæ sunt in vasis circulatoriis in parastatas desinentibus, aliquando præter naturam affectu laborāt. Sunt autem multi, vt inflammatio, vlcera, scissuræ, resiccatio. Inflammatio sine coïtu à semine

*Calculi in
corde inuenti
cum abscessibus.*

retento, & illuc putrescente, vnde puris reiectio, pudendi
 maior, electio, aliquando etiam à partibus vicinis inflā-
 maris, vt in hæmorroïdibus: nonnunquam defluxu hu-
 morum post equitationem longam, celerem, acrium vi-
 mium vsum. In vlceribus maior puris quantitas, minor
 ardor, quàm in inflammatione. In scissuris, solus vrinx
 ardor absque puris emissionem. Si post coitum præsertim
 cum infecta, Parastatæ aut glandulæ inanitz & calfactæ
 halitum quendam tetrum contraxerunt à concubitu,
 efficitur ardor vrinx, quem vulgò propriè vocant *Chau-
 despißes*. Erigitur vræthrum, vrina cum maximo dolore
 redditur, sanies liuida, virescens, mordicatio in meatu.
 In erectione pudendi fit etiam contractio cum dolore,
 non in neruo cauo, vt nuper nonnulli scripserunt. Nam
 sic erigeretur potius, quàm inflecteretur: sed ob plenitu-
 dinem, vel inflammationem, vel inanitionem in meatu
 vrinx. Vnde sæpe fit, vt qui tum vruntur coitu, vt erecto
 membro illis scissura fiat, aut vlcus. Hinc vel exitus vri-
 nx quasi cuniculis factis per anum, aut aliquam aliam
 vicinam partem, vel carunculæ, tanquam fungi concre-
 scentes, aut tubercula in anfractu colli vesicæ, aliquādo
 in reliqua fistula penis, à quibus & *ἰζουρία*, & dolor gra-
 uis in meiēdo. Oribasius calore loci scribit huiusmodi
φύματα celeriter suppurari ex Hippocrate. Experientia
 tamen docet sæpius carnem absumentibus curari. Sæpe
 hic decipimur specie calculi: vt in nobilissimo viro post
 vrinx cruciatum in octauum mensem ambigentibus
 Medicis & Chirurgis de calculo, adhibitis frustra reme-
 diis tandem apertio facta, vt solent Lithotomi. Libera-
 tus omninò dolore non inuento calculo, sed carne in
 collo vesicæ, quæ paulatim consumpta est conuenienti-
 bus remediis. Harum omniū affectionum curationem
 exponere non est huius instituti.

ADMIRA-
 LI D'AN-
 NEBAULT.
*Caruncula
 in vesica col-
 lo calculum
 emantita.*

ANTO. VALETII EXERCIT. I.

ARdor vrinx vesicæ potissimùm ceruicem, at-
 que adeò pudendi meatum infestat, puncti-
 les inferens cruciatus. Causam habet pituitam sal-

*Ardoris vri-
ne causa &
curatio.*

ſam, aut bile acri commixtam, iecoris & renum calore vehemētiore genitam. Ad hanc noxam quàm diligentiffimè attentum Medicum eſſe oportet: ſiquidem vrinæ acrimonia, dum perſeuerat, veſicæ & vrinæ meatuum exulcerationem creare ſoler. Quæprimùm igitur humor acris vacuatur, calor- que iecoris & renum reſtinguitur. Blanda purgatio ſit huiusmodi.

℥ glycyrrh. raf. polypod. quern. radic. oxylapath. ana 3. 2. fol. lactuc. & portul. ana M. ſ. ſebest. n. 4. ſemin. melon. & cucumeris ana 3. 1. flor. viol. p. 1. f. decoct. & colatura ad doſ. Infunde rh. elect. 3. 2. ſantal. citr. 3. 2. In expreſſ. diſſol. cathol. & ſyr. viol. ana 3. ſ. f. potio.

Ex caſſia ſola, vel cum rheo, ex catholico, vel terebinthina in aqua refrigerante lota, commoda quoque purgatio. Sanguinis miſſio calorem minuendo, & partem materiæ auertendo atque vacuando mirificè prodeſt. Secatur vena cubiti, maxime vbi plethora, tum deinde poplitis, ſi chirurgum naſti ſumus in artis operibus exercitatum. Iuuat vtriſque natibus deriuationis ergo cucurbitulas affigere. Dein verò humorum acrimonia obtundetur emulſionibus vulgò appellatis.

Vt. ℥ ſem. melon. cucurb. papau. alb. ana 3. 3. amygdal. dulc. recentes & mandat. n. 10. contundantur in mortario lapideo, ſenſim affundendo aquæ decoct. hord. lb. 1. ſ. f. emulſio, quæ edulcetur ſacchar. 3. 1. ſyr. violacei 3. 1. ſ. pro doſib. 4.

Alij imperant oleum recens amygdal. dulc. cum aq. hord. ſyr. viol. vel iuiubino, vel papauerino. Libebit & iisdem vti ſyrupis in decocto ſemin. refrigerantium ſolutis. Nec omittenda, quæ admouentur. Iecur calidius temperetur litu ex oleo roſ. & abſynth. pauco, aceti etiam roſacei tantillo addito.

Renes cerato refrigerante Gal. cum aceto emollito. Interim vesicæ regio cum toto pudendo decocto tepido fouebitur, ex floribus viol. nymphææ & frigidis feminibus instituto. Si vlcus relinquatur, tergetur iniecta per syringuam aqua hordei, aut saccharo rosaceo. Vnietur denique lacte vaccino, addita pompholyge, bolo armenica, aut similibus pulueratis.

De inflammatione renum.

CAP. 51.

Renes inflammari contingit vulnere, attritu, assidua equitatione, corruptelâ & affluxu humorum, potis pharmacis. Dolor pulsatis in lumbis, & superius ad nothas & hepar, si ren dexter, inferius ad vesicam & femur, pestinem, pudendum: stupor cruris respondentis. Sternutatione, concussione corporis & vehementi motu lancinatio vehemens. Extrema, suræ præcipuè & pedes, frigent, febris vehemens. Vrinæ primùm retinentur, aut tenues fluunt & aquosæ. Procedente morbo in peius, rubræ: deinde crassæ & mucosæ: quæ, vt augetur malum, ita augentur. Nausæa, vomitus biliosus, cordis morsus. Quibusdam animi deliquia & sudores syncopales. Sistitur vëter: vnde inflatio & ructus. Breuibz aut maioribus interual-
lis exacerbationes.

Initio molli clystere pauca quantitate leniatur aluus: detrahatur sanguis: frugaliter viuatur. Hordeato satis liquido, & iusculis mitigantibus vratur. Vino, mellitis, diureticis abstineat. Iniiciatur cum clysteribus, iam puro intestino, quæ leniant. Exacerbata inflammatione iterum phlebotomia, cataplasmata

DE MORB. INTERNIS

è farina hordei primum in mulla, deinde passo ex farina dicta, & iis quæ leniendo discutiant & roborant. Cataplasmatibus non cedente morbo cucurbitulæ cum scarificatione applicentur lumbis & ilibus. Infectiones deinde parentur ex decocto lenientium & resolventium, roborantium. Prius tamen cum vesica hydrelæo plena cum spongiis foueatur locus. Tum ad cerata & malagmata ex eadem materia eiusdem virtutis. Utendum quoque potionibus narcoticis, & cocta inflammatione (quod vrinis crassis euntibus & boni sedimenti intelliges) diureticis. Mesiæus initio ex farina hordei, rosæ & similibus repellentibus, deinde mixtis detergentibus chamæmelo, &c. Emplastrum de muscillaginibus, deinde de meliloto. Lactis asinini usus cum modico melle efficacissimus renibus exulceratis.

ANTO. VALETII EXERCIT. LI.

Renum inflammatorii nota.

Renes phlegmone tentari indicant febris inordinata, nec usque adeo ardens, sed cum horrore & rigore insultans, mictio frequens, grauis dorsaliū partium dolor, iisdemque in partibus pondus veluti propendens. Remedia sunt, venæ sectio (si modò nihil aliud prohibeat) citra cunctationem in principio celebrata, admota topica mediocriter refrigerantia. His si non cesserit phlegmone, neque symptomata conquieuerint, pus hac in parte colligi indicium est. Atque tum suppuratio, quæ alioqui fuerat declinanda, vitatis impendio calidis, promouebitur cataplasmate è mollientibus herbis, semin. lini, floribus chamæm. & similib. Prodeunte pure assumpta tergentia vsui erunt.

De mictu

De mictu ¹ sanguinis. CAP. 52.

¹ Synceri,
mixti, atque
serosi.

Quibusdam ² naturis eodem modo sanguis per vias urinarias excernitur, quo aliis per nares, ³ venas sedis, aut ⁴ vomitum. Hoc ipsum præter ⁵ naturam est, debetq; anteuerti se-
cta venâ è brachio dextro. Eiusmodi excretiones sanguinis excitantur ferè inclinante Vere. Veris itaque initio anteuertendum est.

² Ut sangui-
neis, vel etiã
proprij excre-
menti & so-
lita vacua-
tionis suppres-
sione, aut mē-
bro aliquo
mutilis.

Aliis ⁶ cruenta est vrina, similisque diluto sanguini ex laxitate atque amplitudine venarum, quæ à caua renibus inferuntur.

³ Ut melan-
cholicis.

Renum quoque infirmitas hoc idem efficit.

⁴ Ut mulie-
ribus, à sup-
pressis men-
struis.

Scriptū autem ab ⁷ Hippocrate, Quicumque sponte sanguinem mingunt, iis à renibus venula rupta est.

⁵ Quod san-
guis per com-
moda loca nō
feratur. Ad-
de quod ex-
sa, aperta,
aut rupta ve-
na, infirmie-
tiã renis sym-
ptoma est.

Sponte, hoc est, & repente, & sine manifesta causa.

Rupta verò vena propter humorū multitudinem ac crassitudinem, vnde venæ quæ renum ventres subintrant, distumpuntur, aut aliquando aperiuntur.

⁶ Talis as-
fectio hepaticæ dysentericæ
consimilis est.

Ex casu, saltu, ictu, aut vehemētiore motu idem potest contingere.

Rupta venâ confertim effluit sanguis: apertâ, paulatim. Laxioribus venis emulgetibus, infirma vi renum contentrice aut discretrice, statim à cibo serum sanguinis purum post coctionem cum ⁸ spongioso sedimento excernitur.

⁷ Aphor.
78. lib. 4.
Aphor.

In infirmitate vasorum seminalium aliquando exernitur sanguis, non cū vrina, sed in ⁹ coitu aliter, quàm vesicâ exulcerata.

⁸ Hoc spon-
giosum sedi-
mentum flatulenti spiritus est soboles: ex quo effatam vim renum liceat colligere.

Hic enim cum vrina sanguis emingitur quibusdam corpusculis immixtis. Nec in

⁹ Ut in iis, qui laborant fœda colluvie, aut quibus immoderato venereorum usu imbecillia sunt vasa seminalia.

mentum flatulenti spiritus est soboles: ex quo effatam vim renum liceat colligere. ⁹ Ut in iis, qui laborant fœda colluvie, aut quibus immoderato venereorum usu imbecillia sunt vasa seminalia.

mentum flatulenti spiritus est soboles: ex quo effatam vim renum liceat colligere. ⁹ Ut in iis, qui laborant fœda colluvie, aut quibus immoderato venereorum usu imbecillia sunt vasa seminalia.

10 Adstringentium sci-
licet & glu-
tinatiū, qui-
bus cām ve-
narum anā-
stomosi pu-
gnandū. Sūt
autē adstrin-
gentia, plan-
tago, balau-
stia, &c.
Glutinantia
verò bol. ar-
mena, terra
sigillata, sāg.
drae. gummi
arab. traga-
canth. Sed
trochisci Gor-
donij cum la-
cte ouillo re-
cens multo
propinati ho-
rum omnium
instar esse po-
terunt. Inte-
rim sit pur-
gandi & tē-
perandi vicis-
situdo semel
aut bis in heb-
domade per-
catharticum:
vt ex diluto
rhei cum mul-
to syrup. vio-

vesica solūm, sed etiam in cole, exulceratio esse po-
test. Sed vlceris sanies & dolor indicia sunt. In im-
becillitate primū cognoscendum est, an à frigido,
ferēque à calido esse volunt. Quod malum adstrin-
gentibus, refrigerantibus atque suprimentibus cor-
rigi debet: quā quia propter tardum motum non
facile penetrant ad renes, diureticis, maximē aro-
matibus, commiscenda sunt. Sed diureticorum mi-
nima sit portio. Non enim vt vrinas moueant, sed
vt adstringentia ad renes deducant, commiscentur.

10 Materia in sputo sanguinis, in hæmorrhagia è
naribus, descripta est, & aliis locis.

Auicennas nihil melius existimat confirmandis
renibus lacte ouillo. Datur ieiunis ad ʒ. 6. quibus a-
liqui admiscunt boli armenæ, aut similis medica-
menti ʒ. 1. alij etiam ʒ. spicæ, aut cinamomi.

ʒ. lactis ouilli ʒ. 4. aquæ millefolij ʒ. 1. boli ar-
mæ. ʒ. 2. spicæ. ʒ. ʒ. Aliud.

ʒ. lapidis hæmatitis ʒ. 1. dissolue in aqua plan-
taginis ʒ. 4. Quod si ardor sentitur in renibus.

ʒ. aquar. plantaginis & portulacæ ana ʒ. 2. phi-
lonij ʒ. 1. Aliud.

ʒ. mucaginis sem. papaueris albi ʒ. ʒ. trochisco-
rum de carabe ʒ. ʒ. rasuræ eboris & cornu cerui an.
ʒ. ʒ. Omnia incorporentur carne cydoniorum cō-
dita sine speciebus. Dentur auellanæ magnitudine,
duabus horis ante pastum.

Conueniunt radix consolidæ maioris, gummi
arabicum, tragacanth. macerata prius, deinde ferue-

laeco, ne labefactata vi retentrice ac secretrice renum, excrementis onerentur,
& augeantur symptomatis. Vt. ʒ. cassiæ recens extracta ʒ. 6. pulueris dia-
tragacanth. frig. ʒ. 1. cum saccharo f. bolus.

facta in vino austeriusculo: colatura bibitur. Maxime vbi solidandum est, & hoc quoque laudatum ab antiquis.

℞. aluminis plumæ 3. i. gummi arabici 3. ℞. tragacanthi 3. 2. cum vino adstringente fiant trochisci pondere 3. 2. dentur vt prius. Ad deterfionem vicerum & consolidationē repetenda sunt, quæ proximo capite. Aliud remedium.

℞. spodij 3. ℞. berberorum 3. 3. sem. lactucæ 3. 5. cum succo cydoniorum fiant trochisci. Detur 3. i. ex decocto sumach. Pulvis sem. lactucæ inspergitur vitello oui manē. In hæmorrhagia vesicæ, ilibus ac lumbis, atque etiam natibus & coxendici exteriori cucurbitula affigi debet. Inunctiones 12. renum, perinæ & pectinis ex oleo rosato, myrtillorum, de cydoniis, aut 13. oleo in quo adstringentia coxeris. Hinc fiunt cerota liquida, quibus cōspergi possunt fantali, bolus arme. cortex thuris, & similia commisceri, acacia, hypocystis.

Hic summum periculum est, vbi grumescit sanguis. Nam hinc sequuntur, quæ capite de difficultate meiendi dicta sunt. Conandumque est, vt incendantur grumi oxymelite, arthemisiâ, stœchade, asaf odorata, conizâ, sem. raphani, coagulo, summatis iis, quæ lapides comminuunt, datis ex oxymelite. Quibus si nihil efficitur, 14. inciso perinæo, quo modo calculi educi debent, molienda curatio.

EIVSDEM HOLLERII SGHOLIA.

Sanguinis nomine non intelligimus sanguinem purum, exquisitum, syncerum, mingi, sed aliquando serum, aliquando suo fero mixtum, & cum vrina, aliquando

11 *Ad resolutionē hæmorrhagiæ, non ad diuersionem.*

12 *Ad inflammationem prohibendâ, & perennem arcendum affluxum.*

13 *Mastichinum oleū, in quo fuerit decoct. myrr. ad id mirifice confert.*

14 *Ad vitandâ ischuriam, syncopem, & nec sic gangrenam.*

DE MORB. INTERNIS

cū pure. Ab vlcere id fit, aut læsione vasis alicuius. Sed vl-
cera intelliguntur tum ex dolore, tum ex pure & corpu-
sculis simul prodeuntibus, vt squamulis è vesica. Pus
ergo cum sanguine exit per vrinam, renibus, vteribus
mediis & vesicâ exulceratis. Nam si in pene exulceratio
fit, sine vrinis & pus exit, & sanguis. Exeūt quoque è re-
nibus sanguinis grumi in febribus assati. Nonnunquam
carunculae, verae renum partes, licet in Aphor. Galenus
id se vidisse neget. Sexto tamen de locis affectis, & initio
primi videtur agnoscere, vbi iam vlceris acrimonia era-
fit particulas renum: quo modo & in pulmonariis tabi-
dis cōtingit particulas pulmonis expui, & in dysenteria
partes intestini. In Aduocato Perrot vidimus minimas
carunculas, vt non ab re *σφαγία μικρά* dici deberēt, quas
sæpe emingebat, neque reuera erat grumus. Has carun-
culas præcedit dolor pulsatilis, qui ad lumbos & nothas
costas extenditur, & signa exulcerati renis. In concreto
sanguine & orobeis vrinis, non præcedit. In vtrôq;, he-
pate incolumi, possunt vrinae naturaliter cætera habere.
Si in aliis partibus fuerit exulceratio, ex dolore quoque
& simul exeuntibus corpusculis dignoscendū, hoc tan-
quam generali axiomate notato in his omnibus affecti-
bus, à renibus dolorem & sensum quemlibet à lumbis
ad nothas costas extendi: ab vteribus per illa oblique
descendere: à vesica, in pestine: à vesicæ collo, in perinæo.
Potest seorsum pus exire, vt diximus superiore capite.
Potest quoque & sanguis solus, aut cum vrina. De quo
præcipuè hic agitur. Si ergo vlcus nullū sit, huius cruen-
tæ excretionis causæ multæ esse possunt. Est quidā mi-
ctus sanguinis criticus & interuallis quibusdam motus,
qualis fuit in Moniali muliere, cuius meminit Musa,
quæ singulis mensibus, suppressis menstruis, multū san-
guinē emingebat. Archembault aduocatus per alium,
vomitum, vrinam interuallis sanguinem reddebat æta-
te virili. Quibusdam inclināte Vere multus emingitur.
Id ab Archigene scriptum reperio, quibusdam per cir-
cuitus, vt in hæmorrhoidibus, sanguinem multum col-
lectum renibus emingi, vnde subleuentur, idque acci-
dere iuuenibus, qui maiori licentia veneri indulgent.
Milesius quidam apud Aurel. *σφαγίον* sanguinem emi-

*Sanguinis
grumi per fe-
bres assati
interdū è re-
nibus sece-
dant.*

*Exigua ca-
runcula è re-
nibus excre-
ta.*

*Monialis
mulier sin-
gulis mēsi-
bus multum san-
guinē emin-
gens.*

*Archēbault
aduocatus
per alium, vo-
mitum, vri-
nam, sangui-
nē emingens*

Atum affirmabat esse ex infinitate seminalium vasorum. Ab Aureliano reprehenditur. Sed cum experientia doceat è renibus per vasa spermatica defluere, & ab his, & à renibus exire certum est. Vidimus, qui à coitu multū suanguinem effunderent, quique non facillè reprimeretur, laxatis nimium vasis, & imbecillioribus redditis profuso omni semine. Animaduertendum igitur, num grauitas renum & calor præcesserint, an immodicus coitus, an solita sit excretio. Quod si repentè, & nulla causâ antecedente profluat, è renibus & vteribus excidit. Neque enim à venis vesicæ id accidere potest duabus de causis. Vna, quia non ita multū sanguinem, ut renum, excipiant. Altera, quia renum venulæ nudæ sunt, inuestes & expositæ ruptioni. Quod contrà fit in venis ad vesicam perreptantibus. Ex illis igitur sanguinem tribus de causis exoriri consentaneum est, ut & in cæteris omnibus hæmorrhagijs: orificij venarū apertione: erosione: ruptione. Apertio fit ob nimiam laxitatem & amplitudinē venarum, quæ ad caua renū pertinent, & ob imbecillitatem retentricis, vel discretricijs in renibus. Hæc enim duo sæpe efficiunt, ut calfactis, & exercitio commotis cruentæ urinx profuant. Sed in laxitate, crassiores: in imbecillitate, tinctura est à sero. A cibo quoque serosus sanguis: post coctionem spongioso sedimento. Aperta enim & hiantia orificia venarū, nec confertim, sed paulatim, non crassum sanguinem, sed tenue, & quasi percolatum, reddunt, præsertim ubi apertio est parua. Maior crassiorem reddit. Rupta autē vena ἀγέως, id est, copiosè & repentè prodit, èstque crassior. In erosione denique, ἐκ τῆς ἀνατομῆς ὀλίγος: ut in anastomosi non sanguis, sed quid αἷμα πῶδες, ut vult Philot. Erosionis causæ sunt, quæcūque acriorem sanguinem reddūt & tenuiorem, aut quæ exulcerant, ut cantharides, quibus assumptis sanguis mingitur, penis distenditur, & quodammodo æger ad venæ irritatur. Rruptionis causas Galenus facit multitudinem & crassitudinem sanguinis interclusi in venis renū. Hoc etiam fit ictu, casu & vulnere, ut in rustico quodam ense transosso vidimus. Inde sæpe nascitur vlcus, nisi occurratur: ut in puero quodam, qui in ludo graui, Britone insultante, sanguinem minxit primum: deinde pus

*Sanguis
multus è coitu
effusus.*

DE MORB. INTERNIS

annis sequentibus. Ita aliis multis. Sed vlceris ratio distinguenda, vt aliorum vlcerum, quia putre, callosum, &c. In vniuersum ergò per penem sanguis exit à renibus, vteribus, vasis spermaticis, vesicâ, aut vesicæ collo. Sine vrina, è collo: cum vrina statim subsidens, & cum dolore in pectine, è vesica: cum dolore in lumbis multus, nec nisi post multum tempus subsidens, è renibus manat. In apertione, serosus: in ruptione multus & crassus: in erosione, paucus & tenuis. Singulis causis sua debetur curatio ex aliis locis petenda.

ANTO. VALETII EXERCIT. LII.

Cruentæ mictionis causa.

CRuenti mictus causæ sunt externæ, aut internæ. Externæ, ictus, lapsus, casus, coïtus immoderatus. Internæ sanguinis copia, qualitas, vtrâque simul (vnde venarum ruptio, apertio, vel erosio) renum calculus, vlcus eorundem, itémque vesicæ, & aliarum partium vreticarû. Quinetiam inter huius generis causas reponunt imbecillitatem renû, qui sanguinem retinere nequeunt, sed cum vrina simul excolari sinunt, iecoris infirmitatem, solennis alicuius vacuationis suppressione. Fernelio interna causa vnica est, calculus videlicet, qui per corporis laborem, præsertim per exercitationem validam, veluti equitationem asperiores, tenes eorûmque venas obterens, sanguinem ciet. A cuius autem partis vitio fiat, distinguendum dolore affectæ sedis, & sanguinis cum vrina permixtione. A renibus enim qui excidit sanguis, copiosior est, & vrinæ toti, propter longitudinem viæ, exquisitè permixtus: qui mox in fundo matulæ subidet liquidus & rubicundus. At qui à vesica defluit, vrinam nõ æquabiliter perfundit, & in ima matula in grumos cogitur. Adde quod paucus elabitur, propter venarû vesicæ

Fernel. cap. 13. lib. 6. Patholog.

angustias, nisi fortè à sphinctere ceruicis musculo dimânet.

Præsentaneum remediũ est venæ sectio, vbi ple- *Cruenti mi-*
thora huic malo causam præbet, aut cohibita va- *ctus curatio.*
cuatio. Vbi humorum acrimonia, purgatio ex cho-
lagogis: ex hydragogis, cùm dilutior & serosior
fuerit sanguis.

Exhibendi interim syrupi rosar. sicc. granat. cydo.
myrtill. zulap. ros. cum aq. chalyb. plantag. portul.
aut decocto adstringente. Valebunt trochisci, de
carabe, de terra sigillata. Vbi sanguis à vesica flue-
ret, posteriori coxendici, vel natibus vtiliter cucur-
bitulæ affiguntur. Quod si à lapsu sit, aut casu, crue-
tus mictus, linetur affecta pars vnguento ex bol.
armen. sang. drac. terr. sigill. hypocytide, cum oui
albumine, vel oleo rosaceo & aceto.

De 1 Diabete. & similibus. CAP. 33.



Υπέρκτους, Græci vocant, qui sæpius min-
gunt. Vitia, quę in sæpius meiando contin-
gunt, vrinæ ² multitudo efficit, renum vi-
tium, resolutio vel infirmitas musculi, qui collum
vesicæ claudit.

Diabetes proprium est 3 renum vitium. Nasci-
tur primũ humoribus 4 vitiosis substantiæ renũ
imbibitis. Vnde 5 insatiabilis appetentia potus, vt
in canina appetentia insatiabilis ciborum cupidi-
tas, ex vitioso humore, qui stomacho imbibitus est.

Sequitur perpetua renum attractio. Sed cùm in-
firma sit alteratrix & contentrix, quicquid hîc bi-
bitur, statim per vrinam effluit, quo modo in leu-
teria potus cum cibis.

1 De proflu-
vio vrinæ vi-
renum raptæ,
vbi potioni
concolor est
ipsa vrina.

2 Fusatoto
corpore mate-
riæ, aut à ca-
pite, aut seri-
copiâ.

3 Depraua-
ta alteratri-
ce renum fa-
cultate, &
infirma retē-
trice.

4 Vt bile,
aut pituita
salsa.

5 Eo enim
humore reni-
bus imbutis
repentina fit
vrinæ nullo
modo coctæ
attractio.

6 *Ex perenni & violenta feri attractione.*

7 *Defraudatis sero humoribus.*

8 *Hanc bitantum vidisse se commemorat Gale. cap. 3. libr. 6. de loc. male affect.*

Hic ardent 6 viscera, atque adeo vniuersum corpus, propterea quod quicquid aquosum est & serosum in venis, vnde videlicet sanguis temperatur, attrahitur in renes & emingitur. Ex quo fit, vt & humores solidarum partium exugant venæ, quod deinceps renibus attrahentibus emingitur. Rara hæc 8 affectio, & in ardoribus nascens, vbi vrina aquæ omninò similis est.

Alius affectus est vesicæ, cùm vel defluxione, vel frigore, ictu, casu, vulnere aut aliis eiusmodi causis, nerui, qui vesicæ muscolum claudunt, resoluuntur. In qua affectione & noctu & interdium præter voluntatem vrina effluit. Cui & alia affectio vicina est eorum, qui non satis vrinam continent, sed stragulas noctu permingunt. Quod vitium familiare senibus & pueris. Senibus quidem propter siccitatem: pueris autem, propter laxitatem & mollitiem.

Curatio.

9 *Partium solidarum exhausto.*

10 *Magnitudine cause, symptomatum vehementia, & curandi difficultate, labefactata omni naturali æconomia.*

In ardente febre diabetes 9 incurabilis. In aliis ægrè 10 curari potest, quia non facilè initio deprehendi potest. Quod si initio deprehenditur, mittendus sanguis est è cubito, sed moderatè.

Deinde vtendum iis est, quæ refrigerant, cõtemperant, & paulatim vitium renum corrigunt. Vitæ ratio omninò frigida, tum actu, tum potentiâ.

Cataplasmata quoque refrigerantia tum renibus, tum visceribus applicanda. Vomitus eius quod bibitum fuerit.

Sudor excitatus in dolio, vt tantùm exeratur caput.

Conueniunt cibi, lactuca, endiuia, oua sorbilia, recens caseus sine sale, lac in quo chalybs, vel calcu-

lus fluuiatilis sæpius extinctus sit. Pulli gallinarum hordeo mundato, vel quatuor sem. maioribus frigidis infarcti, hordeatum, lac amygdalarum, præparata cum refrigerantibus. Et quia hîc viribus plurimum detrahitur, 11 suilla caro, vinum crassum, rubrum, aqua frigidissima dilutâ, concedi possunt.

11 *Vel potius vitulina carnis atq; pulorum stellatitia.*

12 Farinam oxyrhodino subactâ, emplastri modo, & renibus, & hypochondriis applicabis. Vitis & rosarum folia, ea in summa, quæ 13 refrigerant, & adstringendo roborant, renibus applicabis.

12 *Præsertim hordei.*

13 *Vt ceratū refrigerās*

Cerata comparabis lumbis & pectini ex roseo, subigēsque cum lactucæ succo & similiū. Aliquando etiam in maiori ardore expresso succo è foliis papaueris cerota subiges, aut populeum vocatum cerato commiscebis. Eruntque 3.2. populei ad singulas 3. cerati.

Galenī cum caphura, vnguentū rosatū Mesuati, mucagines seminis psilij & cydoniorum,

Laudatur & infusio ex oleo, in quo vermes terreni fuerint cocti. Mirum est, quod theriaca ex natura sua calida & sicca sitim diabetis extinguit, data interuallis. Leges vltimum problema primi Aphrodisæi. Hunc morbum appellant syphonem, vrinæ profluuium, intercutem matulæ, dipsacum.

lamina plumbi tenuissima sæpe mutata.

14 *Ex suppressione feri, aut potu largiore, aut pituita colligatione.*

In paralyfi, diabetæ curatio.

Si paralyfis ex luxatione vertebrarum, non facile curatur. Alioqui balneis sulphureis, frictionibus asperis, inunctionibus dictis cap. de Paralyfi, dropace & sinapismis vti oportet, vt vim medicamentorum percipiant lumbi, perinæum & pectus.

15 *Vt decocto radicis iucate, abstinentiâ iusculorum.*

Quod si vrinæ multitudo in 14 causa est, victus ratione exsiccante, iis quæ ad 16 intestina diuertunt, vtendum est. Ad alios verò, quibus infirmitas claudens musculi causa est, conueniunt caro

16 *Cuiusmodi sunt cathartica, quæ leniendo aut trahendo purgant.*

DE MORB. INTERNIS

ericij, cerebrum aquilæ, cerebellum, renes, testiculi leporis, pulmo hædi, lingua anseris, galli guttur, vesica suilla, tauri, capræ, ouis, enula, thus, myrobalani, cyperus, coriandrum præparatum, myrrha, metha, calamentum, galbanum, castoreum, fesceli, lac ouillum & caprillum, oleum de ben, de spica, rutaceum, mastichinum.

Vulgare remedium est esus murium. Oleis itaq; vel inde comparatis cerotis pecten & perinæum inungenda sunt. Reliqua ex vino odoro, senibus: ex aqua, pueris ebibenda sunt. Laudantur & hæc.

℞. cinamomi electi ʒ. i. spicæ nardi ʒ. β. cyperi, coriandri præparati ana ʒ. i. vesicæ suillæ siccæ, testiculorum leporis siccorum ana ʒ. β. Omnia incorporentur conseruâ enulæ campanæ prius conquassata & subacta. Aliud.

℞. glandium ʒ. 2. corticis thuris ʒ. i. sem. coriandri præparati, boli arm. gumm arabici ana ʒ. 2. spicæ, cinamomi ana ʒ. i. testiculorum leporis, vesicæ suillæ ana ʒ. β. misce, fiat puluis, vtatur sæpe.

Laudatur & lac ouillum & caprillum cum modico saccharo, vel cum medicamentis descriptis.

Ne permingant stragula, vesica tauri vel suis prius madefacta oleo interiori parte debet è cole suspendi, & ita alligari, vt quicquid meitur, excipiatur vesicâ.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Vrina secundum naturam habens quantitate potui respondere debet, aut ab eo paululum distare, & tēpore conuenienti excerni. Ob id frequēs, aut pauca, aut plurima mictio præter naturâ est. Frequens fit tum ob causas superius dictas, tum ob resolutionē musculi onificiâ

vesicæ motu voluntario claudentis & aperientis, quæ sæpe fit luxatis vertebra, referturque ad Paralyfim. Pueris quoque molliores nervi, senibus sicciore, unde permungunt lectum, neque diu vrinam cōtinent. Pauca autem fit ætate ob sudorem & exhalationem: vel ob multam & humidam deiectionem, quia materiæ pars, quæ per vrinam fluere, ad intestina diuertitur: vel ob resolutionem & exiccationem, vt exardente corpore in febribus: vel ob ascitem. Multa, frequens & copiosa multis de causis contingere potest. Alimento & potu copiosiore: colliquatione aut dissolutione totius corporis: intemperie vel renum, vel hepatis, & crisi. Largior ergo potus vini tenuis & calidi, & medicamenta diuretica multas vrinas faciunt. Cruditas quoque multam efficit mictionem & deiectionem, & statim à cibo tractus sine mora succus ab hepate calidiore, aut inanito. Quod si hepar adhuc calidiore intemperie teneatur, robustum tamen sit & valens faciem, quæ est in intestinis, omnem fugit, unde sicca & pauca remanet, serum autem augetur, sicque fit plurima mictio, & pauca deiectio. Nonnunquam quoque ob imbecillitatem naturæ partes frigidiores alimenti transmutari non possunt, in quibus quoque plus iusto vrinæ apparet. In his omnibus nondum veteres diabeticam passionem posuerunt, sed in affectis renibus & vesicæ per consensum. Harum enim partium morbus est *Διαβήτης*, à τὸ τοῦ διαβαίνειν, id est *Διαβήτης*. est, pertranscendo, quod humor corporis subinde mutet locum, & veluti tantum per renes percoletur potus. Multum enim & frequenter mingunt ægri, & statim à potu vrinam aquosam & tenuem profundunt. Vnde *ἡδὲν αἰς ἀμυδα*, & *Διάβητα αἰς οὐρά*, & *Διὰ τὸν* Græcis etiā *Diabeta* quid dicitur. Habet enim hæc affectio aliquid simile cum *communis sit* leienteria & canina appetentia. Cum illa quidem, quia *cum leienteria* potus omnis subito per vrinas effluit: cum hac verò, *ria, & cum* quia perpetua sitis, ob inexplebilem cupiditatem attrahendæ vrinæ in renibus, & eiusdem retinendæ *canina appetentia*. potentiam. Si igitur huius vehementioris attractio *Diabeta* nis causam intellexerimus, natura huius morbi *tres cause*. picua fiet. Tres autem in vniuersum causæ videtur. Calida & sicca renum intemperies: humor biliosus

DE MORB. INTERNIS

acris, falsus, renibus impactus, quos assidue irritat ad tractionem: & venenum aliquod deleterium. Quibus addo feri tenuitatem & biliosum temperamentum. Ex his igitur sitis ingens excitatur, ob quam æger assidue bibit. Potum hunc avidè renes attrahunt, antequam coquatur in ventriculo, sed propter imbecillitatem non retinent. Hinc etiam vrina aquosa & tenuis redditur, licet sit ingens calor, quia breviori morâ retinetur, quàm vt coctionem & tincturam accipiat. Sunt tamen aliæ huius affectus species duæ, colliquatione renum, & totius corporis dissolutione. Huius meminit Aretæus, sitque frequenter in febribus, quam sequitur macies totius corporis. Cum dolore meunt ægri, viscera aduri illis videtur, omnia fastidiunt, animo sunt dubio, saluam habent albam & spumeam, præcordia graua. Increcente morbo calor mordax in visceribus, abdomen corrugatur, venæ intumescunt, fit tabes. Si vel modico tempore à meiendo abstinerint, tument lumbi, testes, & ilia. Rarus affectus, & bis tantum à Galeno visus, à nobis sæpius. Anno 1558. Augusti fine in vico vetere Templi Consuli du Val, in febre cõtinua non ita ardente, ad sensum lingua scabra, arida, nigra. Quotidie sex pintas (quas vocant Luteriæ) vrinæ mingebat, non ita siticulosus, cõstabat mente. Sub septimum diem obiit. Consuli Quelain nephritico, in febre profluuium vrinæ motum, in quo serosa vrina ad duas quartas emingebatur, ex quo euasit. Eodem morbo paulò ante eius pater obierat. Alter ab eodem profluuiò obiit in vico Sancti Ioânis Belouacensis. Quibusdam diutius vrina suppressa, sequitur vrinæ profluuium, aut morbus aliquis acutus per crism, qui malignitatem suam in renes deponit, vt ait Aretæus. In ardente febre rarè curatur, sicuti & in colliquatione. In aliis difficilè, nisi statim initio deprehenso morbo occurratur. Secatur vena in cubito, sed moderatè. Refrigerantur renes & confirmantur. Alimenta crassa, emplastica, minimè calida; vnguenta circa renes, inunctio spinæ, opiatæ.

*Gal. cap. 3.
lib. 6. de loc.
mal. affect.*

ANTO. VALETII EXERCIT. LIII.

Diabetes proprium est symptoma renum, in quibus calor ingens, aut impactus humor ardentissimus, trahendi ex omnibus partibus feri vim vehementer atque continenter vrget: quod tamen præ retentricis facultatis imbecillitate, & alteratricis depravatione continuo prolabitur in vesicam, indéque excernitur. Hinc inexplibilis sitis, quæ nimio cruciatu clamorem ægrotanti excitat. Per initia diabetæ, viribus adhuc integris, missio sanguinis è cubito, reuellendo, & ardorem temperando, maximopere confert. Dein verò vtilia sunt vretica frigida ad eum, qui renibus est imbibitus, detergendum & expurgandum humorem: quorum materia ex cap. de urinæ ardore repetenda. Refrænabûtur quoque humores, & cohibebitur sitis, syrupis de agresta, de oxalide, granatorum, in decocto refrigerantium & adstringentium dissolutis. Cacochymum si fuerit corpus, purgabitur cassia, myrobalanis, thamarindis, syr. laxatiuo rosar. pallid. Interea topica instituentur. Hepati quidem tale epithema.

℞. aqu. cichor. end. plantag. solan. ros. ana ʒ. 2. santal. citr. puluerati ʒ. 2. aceti ʒ. 1. f. miscella, quæ imbuta linthea hepati applicentur.

*Gal. cap. 3.
lib. 6. de loc.
mal. affect.*

Diabetæ curatione.

Renes verò inungentur oleo ros. cydon. myrtil. addito pauco populeo, aut cerato refrigerante Gal. vel fiet cataplasma ex farina hordeacea cum succo plantag. adiecto, si velis, puluere malicorij, balau-
stij, sumach, vel caphuræ modico. Sanabitur eodem modo inuoluntarius mictus, seu urinæ incontinentia, quæ ab hepatis & renum calida fuerit interperie. Quod si sit à resolutio sphinctère cervicis vesi-

*Mictus inuoluntarij
curatione.*

DE MORB. INTERNIS

cæ, atque iis nervis paralyſi affectis, qui è lumbis in eum muſculum inferuntur, potiores erunt inſeſſus & fomenta, ex ſaluia, iuæ arthriticæ, ruta, cortic. querc. meſpil. pin. nuc. cupreſſ. roſ. rub. decocto ex vino aſtero facto, adiecto ſub finem alumine.

1 Hippocrat. lib. 4. de morbis.

2 Ac rotundi

quidem ſigna ſunt cardiogmus, ſyncope ſtomachica, cum ad ſtomachum ſerpit, pruritus narium, tuſſicula ſicca, ſuffuſio ruboris in facie fugax cum viciſſitudine caloris, tormina in aluo & ſyſtrophæ, dentium ſtridor pueris dormientibus. Lati canina appetentia, bulimus, & vermiculorum, qui cucurbitæ ſemen referunt, excretio. Aſcaridum vero, anſi pruritus, tenesmus, prolapſus.

De Vermibus.

CAP. 54.

Vermium tria ſunt genera. Aſcarides in ſima parte recti inteſtini adultioribus pueris familiares. Rotundi, qui pueris ſuperiore ſerè inteſtino generantur. Latus vermis per totum inteſtinum aliquando extenditur, raro admodum, & paucis gentibus generatur: nunquã Athenienſibus, Thracibus, vt ſcribit Teophrastus. De eo tum antea, cap. de canina appetentia. Horum omnium generatio, putris materia & calor. Signa ex Paulo & Aëtio colligenda ſunt. Verminam hunc morbum, & verminationem appellarunt, non ſolum hominibus, ſed iumentis familiarem.

In genere conueniunt, quæ enecant vermes & excludunt, acria, amara, quæ vias lubricant, quæ à proprietate hoc efficiunt.

In aſcaridibus, quia inſimo inteſtino hærent, glandibus potiùs vtendum eſt, quàm potionibus. Fiunt glandulæ ex carne ſalſa, filo appenſa: fiunt ex lardo priùs in aqua frigida macerato. Item ex melle, mixta aloë, & iis, quæ interficiunt vermes: qualia ſunt coriandri ſemen & caulium, decoctum thymi, allium, abſynthium, hyſſopus, mentha, bouis aſtragalus uſtus, vermes terreni uſti, chamæmelum, zedoaria, abſynth. Santonicum, myrrha, puluis cõ-

tra vermes, securidacæ semen, succus portulacæ & endiuia, oleum omphacinum, medulla cerui, folia persicorum, rutæ, rasura eboris, vnicornis, rhabarbarum, cornu ceruinum. Superstitiosum est, quod scribit Scribonius, oportere è cornu cerui scobem fieri lima lignea: nam aliter iuuare potest. Plurimum laudatur decoctio sebesten. Alia quoque, quæcunque qualitate aliqua & vniuersali vermes interficiunt.

Aquæ conueniunt graminis, absynthij, portulacæ & rerum amararum. Purgatio quoque an cõueniat, quæstio est, de qua non dubitandum. Recogitata enim materia, vnde vermes generantur, vnà cum ea vermes excluduntur. Laudantur rhabarbarum, hiera tum simplex, tum diacolocynthidos. Veteres etiam Medici scammonio vsi sunt. Nunc licebit vti granis quatuor dacrydij, cum aqua absynthij, aut simili. Sed purgatio commodior, vbi in superiore intestino vermes sunt.

℞. decocti sebesten ʒ.3. cornu cerui ʒ.1. menthæ siccæ & piperis triti ana ʒ.2. Latos etiam expellit rhabarbari ʒ.1. aquæ graminis aut absynthij ʒ.2. spicæ nardi Gr.4. Clysteres ex vini lb.1. olei absynthij ʒ.4. pulueris hieræ ʒ.2. Poterit etiam adici ʒ.1. mellis, & ʒ.1. salis. Nam & sal deglutitum ascendentes vermes ad stomachum deorsum pellit.

Videndum tamẽ, ne odiosa vermibus per sedem iniiciamus, cum ad superiora eorum motus est. Tum enim iucunda potius, vt mellita & dulcia, iniicienda sunt, aut eiusmodi glandulæ subiiciendæ. Bibenda verò, quæ eosdem vermes deorsum pellant. Nam aliquando ad ventrem vsque as-

3 *Vide coctum graminis cum rasura cornu ceruini, pueris poterit prescribi. Vel hic pulvis sculus. ℞. absynthij. Santon. ʒ.3. b. rhei el. ʒ.2. rasura cornu cerui ʒ.1. f. pulvis sculus. cap. ad ʒ.1. cum insculo capi.*

4 *Dum hæc sunt, cataplasma ex aloë, absynthij. Sant. & felle fieri poterit, vmbilico ad-mouendum.*

cendunt, & stomachum lancinant, vnde syncope, conuulsio, mors.

Emplastra & cerota ex cerato facto è tribus partibus olei absynthij, amygdalarum amararum, nucleorum perfici, & vna ceræ amaræ. Deinde vbi refrixerint, subigi debent ex succo amaro, vt absynthij. Adiiciendum quoque aliquod genus fellis. Nā fel insigni amarore enecat vermes, ex quo & glandulas felle illinimus. Medullâ cerui venter, lumbi & perinæum inungi possunt. Mirum est, quod cōtigit aliquando vermes per inguina prorupisse, viâ exedendo facta. Aliis per vmbilicum.

Nonnullis quoque contigit, vt multitudo vermium tunicam sibi contexerit extensam toto intestino, & omninò similem veri intestini.

Vbi coniunctus est alui fluor, eligenda sunt, quæ præterquam quòd vermes enecant, etiam alui fluxionem retineant, quale est rhab. & plantago.

Et quia pueri ferè vermibus infestantur, refugiūt autem quæcunque amara sunt, diductis dentibus, clysterio, aut curuata fistula, medicamenta in œsophagum infundenda sunt.

Fiunt clysteria ex muria, aqua oliuarum, centauro, absynthij decocto. Sed vbi vermes exclusi sunt, roborandum intestinum, instituenda vitæ ratio, ne in posterum regenerentur.

Theriaca & mythrídium, si nulla febris, vermes enecant & excludunt.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Ex multis humani corporis partibus reiiciuntur vermes, ventriculo, intestinis, vesica, vtero, dentibus, vlc-
ribus.

ribus Puella quædam quæ in laterna ad portas D. Iacobi decumberebat, album vermem, latum, palmo maiorem, *Vermis latus*
 satis crassum reiecit per nates nulla tussi, nullo vomitu *naribus eie-*
 antecedente, 9. Aprilis, anno 1553. In quodam è renibus *ctus.*
 longi, præcedente magno dolore, lumborum, per urinam
 reiecti sunt, in aliis duobus parui. Musa Aphor. 49. lib. 4. *Vermes longi*
 scribit quendam tussi expulisse vermem, nescio an à ven- *è renibus re-*
 triculo, an à pulmonibus. De generibus vermium, ma- *iecli.*
 teria, generationis modo in intestinis, non eadem est
 omnium sententia. Vulgò tria genera faciunt, *ἐλμυνθας* *Vermium ge-*
 & gracilibus intestinis nascuntur, ventriculum subeunt, *σφοδρῆλας*, id est, teretes & rotundos, qui in superioribus *nera tria.*
 & per os sæpe, aut nates reiciuntur: *ἐλμυνθας πλατείας*,
 id est, latos, & longos, qui aliquando per tota intesti-
 na extenduntur, à quibus oriuntur cucurbitui, quod se-
 mina cucurbitæ referant. Tertium genus ascaridum, qui
 exigui sunt, teretes, vermibus cascæ similes, & in recto
 intestino continentur. Alij præter latos quartum longis-
 simum adiciunt, eumque tineam nominant, quanquam
 sub latis comprehendi potest. Cucurbituos etiam à la-
 tis separant, quod neque illius tineæ fortis esse possint,
 neque partes animalis, cum ipsi sint animalia. Sicque
 in vniuersum erunt, rotundi in superioribus intestinis,
 tinea, longi, lati, cucurbitui extensi per intestina, & asca-
 rides iuxta anum. In qua diuisione, cum ex rei natura
 sumptâ non sit, & membra simul permisceri queant, ni-
 hil mirum confusionem reperiri, & cōtrouersiam. Expe-
 rientia tamen omnia facilia. Constat enim longos & ro-
 tundos in superioribus intestinis contineri & per os reiici.
 Anno 1553. in Collegio D. Barbaræ puer annos 12.
 natus interuallis vomere solebat longos vermes, albos, è
 ventriculo. Sentiebat motum, morsum & commotionem.
 Dum urgebant, sitiebat, angebatur. Nutritus fue-
 rat lacte, & fructibus. Tineam vocatum vermem Arelatæ
 vidit F. Valeriola longitudine, si bene memini, nouem
 pedum, aut etiam amplius: cuius vir ille doctissimus in
 suis Obseruationibus copiosè meminit, & quæ ad eius
 generationem intelligendam pertinent, accuratè do-
 cuit. Cucurbituos quoque vermes esse certum est, ut
 iam quinque genera inter se vel loco, vel figura, vel ma-

Vermes longi
per interual-
la è ventricu-
lo exclusi.

DE MORB. INTERNIS

*Vermes aut
ab utero sua
ducant semi-
naria.*

*Aetius Te-
trab. 3. serm.
1. cap. 40.*

gnitudine distincta constitui eadem ratione possint. Ascarides quibusdam quasi sacculo inclusi & membranâ involuti latitant in fœcibus. Quod ad materiam pertinet, nonnulli ex Hippocrate 4. de morbis ab utero semina-
ria accipi volunt. Generari enim in utero matris, quoniam tunc fœtus non expurgatur à fœce. Non apparere autem, nisi ad id tempus, quo infans incipit vesci cibo, tum ob benignius lactis nutrimentum, tum quod humidiora, & minus calida sint illorum corpora. Quod certè principium longius petatum videtur, cum in grandioribus, atque adeò senibus frequenter, ut in pueris, nascantur. Musa scribit senem annorum 82. in extremis positum accidentibus, quæ vermiculosis pueris accidunt, & cum graui halitu, qualis pueris esse solet, plures 500. excreuisse medicamento è scordio, & corallina. Rusticæ cuidam mulieri plures prodierunt, cum antè incredibili palpitatione & fluctuatione ventris laborasset inde assurgentis & tumentis, ut in gravidis cõsuevit, robusto fœtu. Græci alios à bile, alios à pituita quosdam à melancholia generari volunt. Aëtius latum vermem, siue tineam, nihil aliud esse vult, quàm mutationem membranæ interioris tenuium intestinorum in corpus quoddam viuum, animatum, mobile. Quæ omnia parùm probabilia videntur. Bilis enim & melancholia humores sunt tota natura ad hanc generationem ineptissimi, nisi temperentur ab aliquo alio longè superante. Et Galenus tanquam admirandum proponit in dysenteria, hominem abrafa interiore tunica intestinorum viuere posse, cum tamè expulsis huiusmodi latis vermibus agri longè melius habeant. Rationi magis consentaneum & experientiæ, vel ex chyloso succo, vel pituita ortum habere quæ tamen aliquândo aliis humoribus tingi potest. Hoc intelligitur ex cruditate & alimentis eorum, in quibus reperiuntur. Deinde facîle in gluten resolvuntur, & secti rursus vniuntur. Neque alius generationis modus videtur, quàm per corruptionem & putredinē, in qua natura, id quod benignius est, calore viuifico tanquã opifice, efformat in animal, qualecūque possit effingi, ut Arist. docet in Meteoris. Id perspicuum est ex fœtore excrementorum, & halitu. Varia inducunt symptomata.

Nam chylū consumendo corpus minuūt: in ventriculo vomitū, famē, syncopē mordendo, instimulāt & aliquādo iugulare videntur. In recto intestino pruritus excitant & tenesmus. In ventre medio fluorem alui, leentariam, ventris inflationem. In omnibus aliquando febres quotidianis similes, inordinatæ & horrificæ, & si arrodant intestina, sæpe interficiunt. Hæc eadem vermium signa sunt, sicuti anhelitus fortens, tussicula inanis & sicca. Cum clamore expurgiscuntur ægri, arctius dormiunt, frident quodammodo dentibus, morsus, nausea, fastidium, & similia. Latus raro generatur, & paucis gentibus, nunquam Atheniensibus, ut dictum est. In intestinis obiectum rapit alimentum, ut alio statim opus sit. Inde erosio, fames canina, gracilitas, imbecillitas, sine manifesta occasione. Certissimum signum esse volunt, in recrementis similia quædam cucurbitæ seminibus reiecta. In omnibus nihil certius, quam si vermes aliqui reiecti sint.

Ascarides glandibus siue suppositoriis: rotundi portionibus: utrisque lati curantur, ex materia, ut est scopus necandi, alliciendi, purgandi. Conueniunt syripi, topica supra umbilicum, cataplasmata, vnguenta, inunctiones, clysteres, & similia.

ANTO. VALETII EXERCIT. LIII.

OMnium trium generum vermium origo, lumbricorum, teretum & ascaridum, ex cruda, crassa, pituitosaque materia putredini accommoda existit, vehemēti calore intestinorum accedente. Teretes & longi, etsi descendant atque ascendāt, in ileo plerunque gignuntur: in colo. lati: ascarides, teretes & breues, in fine recti intestini. Habent vermes interdū morbi rationem, ut cum quiddam toto genere præter naturam, quod est auferendum, adest: nonnunquam causæ, quam morbi excipiunt, febres, epilepsiæ consentiente cerebro, spasmi, verti-

*Gal. comm.
ad aphor. 26.
lib. 3. Aph.*

*Vermes quæ
variè conside
rentur.*

gines, dentium stridores: alias signi solius, quatenus considerantur, vt excrementa. Sic quando in initiis febrium eiiciuntur, malum indicant, putridæ scilicet materiæ multitudinem: sicut & in vigore symptomaticè expulsi, eius malignitatem. In declinatione autem, quum critica comitatur excretio, sanitatis spem portendunt. Vermium malignitas ex colore dignoscenda. Qui vnius sunt caloris, vt albi, minus censentur mali: qui versicolores deteriores, quia putredinem arguunt maiorē. Varia sunt vermium signa. Turbatur somnus, & vociferatio editur, ab excitatis à vermibus malignis vaporibus cerebrum petentibus. Pueri (qui propter lactis vsum & edacitatem in hunc affectum crebrius incurrūt) dormientes quasi cibum, vel lac ore trahunt, quia vermes humiditatem exugunt. Tussis adest sicca, propter partium spiritalium consensum cum naturalibus, à quibus putridi vapores attolluntur: qui cum lædunt os ventriculi, singultum mouent: cum caput conscendunt, narium pruritum, ruborem genarum, oculorum suffusionem leuem. Vermes, siquidem febris absit, imprimis necandi sunt, quòd viui intestinis adhærentes resistent: at mortui cum fæcibus excludantur. Vulgaris est vsus rhei infusi in aqu. gram. cichor. absynth. cardui, portul. vel plantaginis, si alui profluuium accesserit: cui expresso adiiciatur syr. de portul. vel de absynth. Vel.

℞. radic. gram. & cichor. ana ʒ. β. radic. petros. ʒ. 2. sebesten ʒ. 2. f. decoct. ad ℥β. In qua infunde summitat. absynth. Rom. & fumar ana p. i. Deinde è colatura cum saccharo sufficienti f. syr. Detur ʒ. i. β. cum ʒ. 2. aqu. portul. in quibus ponatur corn. ceru. præpar. puluer. contra vermes ana ʒ. β.

Vermiū malignitatis ex colore dignoscio.

Vermium signa.

Gal. sub finē lib. 4. Meth.

Diuitibus rasura vnicornis imperatur. Vermes vero vt ad superiora intestina, & ventriculum non perreptent, alliciuntur dulcibus clysteribus, ex lacte, oleo non addito, eo enim fugantur. Interea extrinsecus, vt vmbilico, linimenta, emplastra, ex amaris comparata admouentur.

℥.ol. ruthac. amygd. amar. & absynth. ana ʒ. ʒ. ʒ. myrrh. aloës ana ʒ. ʒ. ʒ. litus pro vmbilico. Vel. ℥. aloës elect. ʒ. ʒ. flor. tanacer. puluerator. ʒ. ʒ. ʒ. mythridat. ʒ. ʒ. ʒ. cum oleo amygd. amar. & felle bubulo, addita cera & farin. lupinor. f. emplastr.

Vel semuncia massæ interioris pilul. communium malaxatur cū oleo ruthaceo & felle bubulo, & super alutam extensa vmbilico adhibetur. Sed aduertendum, vt si febris adsit, minus amara vsurpentur: vt si ex farinæ hord. & lupin. ana ʒ. ʒ. ʒ. succ. limon. & portul. ana ʒ. ʒ. ʒ. aceti ʒ. ʒ. ʒ. cū oleo amygdal. amar. cataplasma fingatur.

De Hemorrhoidibus. CAP. 55.

Hæmorrhoides vniuersum corpus vacuant, aliquando cacochymiā, aliquando puro sanguine, quique sola quantitate peccat. It autem per venas, quæ à vena cava explantatæ vtero, pudendis & sedi implantantur. Hoc enim verisimilius est, quàm per venam, quæ à portis hepatis in extremū rectum intestinum porrigitur. Neque admodum verisimile hæmorrhoidum materiā per venam à liene repurgari. Ramus enim venæ, quæ à medio liene descendit, definit in omētum. Hæc vacuatio in genere præter naturam est. Ideoque periculosa, propterea que non facien-

1 Desanguinis, aut humoris melancholici fluxu, qui fit per venas ad podicē pertingētes, quæ ab ea affectio ne nomen habent.

2 Cacochymiā purgando, aut plethoram depellendo.

3 Melancholica, per mesentericas venas.

4 Per venā hypogastricā quæ musculis intestini relecti, ceruicibus vesicæ ac vteri sanguinem

imperit, atque etiā pudendo.

5 Vt in grauidis, in nimia sanguinis abundantia, mulieribus,

quibus suppressi sunt menses, aliquo etiam membro

mutatis. 6 A ramis elutriis inferioris venæ cavae.

da eius consuetudo. Quibusdam tamen naturis fit naturali cōsuetudine, & incolumis valetudinis causa est. Tale est, quod scribit Hippocrates. 7 Atrabile vexatis, & renum passionibus, hæmorrhoides superuenientes bonum.

7 Aphor. 11.
lib. 6. Aphor.
8 Sect. 3. lib. 6.

*¶ Et immodice.
& ad finem
lib. de humo-
ribus.*

9 Vnde cache-
xiā ad se-
runt, indeq;
hydropem.

10 Quod e-
rat alioqui
onustum hu-
moris melan-
cholici proue-
tu, aut sup-
pressi sangui-
nis plethora.

11 Quæ sue-
rant olim re-
stibilis fecū-
ditatis, hoc
est, singulis
annis parie-
bant.

12 Melācho-
licis, olim bi-
liosus: quorū
corpora bi-
liosa iā per-
spiratione ca-
rentia sunt
melancholi-
ca.

Præterea quod quartana, melancholia, angina, pleuritide & aliis eiusmodi grauioribus 8 morbis hominem vindicant. 6. Epid. Salutaris quoque hæc vacuatio epilepticis, & iis, quibus tubercula & maligna vlcera oriri solent. Fluunt tamē hæmorrhoides aliquando 9 immodicē. Oportet enim ea fluxione corpus 10 leuari, non infirmari. Atque vbi de commouendis hæmorrhoidibus consilium est, peculiaris natura ægri primū interroganda est, an ex consuetudine, & statis interuallis soleat eo modo repurgari. Sunt enim quibus periodicē fluunt. Mulieribus, 11 viduis, 12 senibus, & quibus aliter supprimuntur menses, sanguis interim diuertit à venis vteri ad sedis venas: & ita per periodos sese repurgant. Præterea interrogandus est æger, num sit opportunus grauioribus illis morbis, quos diximus. Hæc enim efficiunt consilium excitandæ huius purgationis.

Excitantur autem aliquando 13 purgationibus, quæ cacochymiaē cōueniant. Nonnunquam phlebotomo è malleolo, vel iis venis, quæ superiore parte pedis eminent: cucurbitulis item cruribus admotis & sedi. Leuissima via est per sanguiifugas.

Ferro etiam aperiuntur, vbi turgent, quas mariscas appellant. Tum etiam medicamentis, vt oleo è

13. Ex decocto folliculorum sennæ & cassia, diluto rheī & diaphanico, maxime verò aloës vsu.

nucleis persicorum, aut in quo res ¹⁴ acres & amaræ coctæ sint. Aut vnguento.

℞ pinguedinis lardi erasæ ex parte pinguißima ¹⁴ *Vi persicaria, myriophyllum, aparine, & præsertim rubia minor.*
 3. i. olei irini, ruthacei, aut similiũ 3. 3. Fiat veluti vnguentum molle, quod subigatur ex succo cœpæ rubræ. Eadem cœpa aceto macerata, contusa, & imposita. Verũ vbi dolor est, cum butyro subigimus, oui vitello, vel rosacco. Pulpa colocynthidis conuenienti oleo immergitur, ano alligatur: quinque horarum spatio aperit.

Collyria, suppositoria ex radice cyclaminis, ex radice caulium induntur. Fortiora, si taurino felle illinuntur. Fellis genera, maximè flaua, sedi illinuntur, vel gossipio excepta induntur. Pallida verò mitiora sunt. Forte hoc est.

℞ stercoris columbini in puluerem redacti 3. 3. inspergantur vnguento molli factõ ex pinguedinis lardi 3. i. olei, in quo matricaria coctarit 3. 8. salis 3. 2. omnia misceantur in mortario.

Celerius agent medicamenta, si antè confricetur sedes ex foliis ficus, parietarię, aut aliis asperioribus, vt linteo cannabino, vel detrito panno.

Fotus quoque ex cyclamino, centauro, abrotono, matricaria, bryonia, radice enulæ, ireos, absynthij, & similium. Reliqua materia cap. de commouendis mensibus dicitur.

Sed aliquando latent ¹⁵ hæmorrhoides: qua in re placuit Antiquis vt sedes euerteretur. Inusitatum nec ita tutum remedium nostris temporibus: Eueritur sedes, quò facilius remedia applicentur.

℞ piperis, nitri ana 3. i. læuigatis locum attingito. Vt licet & sale gemmæ, & pul. seriphij, & fel-

¹⁵ *Neque sub aspectum veniunt, siue sistendi, siue ciendi consilium sit, siue symptoma corrigendi.*

¹⁶ *Nonnulli esula lacte vtuntur.*

16 Nonnulli
esule lacte
viuntur.

17 Tum ad
remulsionē hu
moris eō fluē-
tis, tum etiā
ad prohiben-
dam sæculē-
ti sanguinis
generationē.

18 Alteran-
tibus, vacuā-
tibus & si-
stentibus.

Præter hæc
abstinendum
erit vino, vt
orgasmus in-
hibeatur.

le, absynthij 16 succo, & matricariæ. Postea verò re-
ponenda sedes ex iis, quæ capite proprio dicentur.
At verò vbi iam immodicè fluunt, sistere oportet.
Sistuntur autem, vbi odiosæ sunt. Atq; vbi grauius
aliquod malum non metuitur, ad eam rem vena 17
cubiti secatur, aut extremæ manus. Cucurbitulæ hy-
pochondriis, lumbis ac scapulis affiguntur. Reliqua
curatione 18 potionibus, topicis remediis, Chirurgiâ
perficitur. Quod autem ad Chirurgiâ attinet, me-
minisse oportet, anum maximè ea parte, qua sphin-
cter est, partim neruosa substantiâ, partim neruoso
circulo constare.

Neruosa substantia neque acria & mordacia
medicamenta, neque vstionem aut incisionem, sine
conuulsionis periculo, perferre potest. Exterior mu-
sculus recti terminus ignobilis & carnosus, qui vo-
catur podex, ea remedia perferre potest. Quod au-
tem scriptum est ab Hipp. quoddam ad consilium
sistendi hæmorrhoides pertinet, A diuturnis sa-
nato hæmorrhoidibus, si vna non seruetur, pe-
riculum est, ne intercus, aut tabes subsequatur, ita
intelligere oportet. Medico sanati hæmorrhoidas,
id est, dum sanguinem mittit, affigit cucurbitulas,
topica & reliqua remedia adhibet, rectam vitæ ra-
tionem instituit, vna quidē eo tempore relinquen-
da hæmorrhoids, vt paulatim non temerè ac præci-
pitanter fluxum cohibeat. Vbi verò persanauit,
nulla relinquenda est.

Potiones conueniunt, quæ partim cap. de sputo
sang. partim cap. de profluuiis alui & mictu sangui-
nis descriptæ sunt, & describentur cap. de suppri-
mendis mēsis. Sed quia in hæmorrhoidibus

ferè cruciat dolor, his vtendum est.

℥.olei violarum ʒ. 3. mucag. sem. psilij ʒ. 2. misce, vngatur sedes. Aliud.

*Symptoma-
tū correctio.*

℥.olei violarum ʒ. 3. cerussæ lotæ drach. 6. ceræ albæ quod sufficit. Aliquando vitellum oui cum rosaceo, aut violato oleo subigimus. Nonnunquam albumen commiscemus, vbi maior ardor est. Similiter & 19 micam panis albisimi ex supra-
dictis oleis subactam emplastri modo apponimus. Conueniunt & mucag. portulacæ, lactuca, sed maximè psilij. Fiunt quoque sacculi ex rebus anodynis. Fiunt fotus ex iisdem, atque vbi dolor vrit grauius.

19 *Violaria
in lacte cocta
ad pulis cō-
sistentiā mi-
rifice dolo-
rē sedat, si cum
tantillo olei
rosacei ad-
moueat.*

℥.olei violati ʒ. 2. populei ʒ. 2. Cum ouo integro fiat vnguentum. Quod si res vrgeat, opij ꝑ. commiscere potes. Postremò videndum, ne adstringentibus immodicè nimium resiccatus podex non præstet officium. Itaque fomentis humectantibus corrigendū vitium est. Similiter cum nimium podex refrixit refrigerantibus medicamentis & narcoticis, temperandus est.

Potest sisti hæmorrhoids siccantibus, causticis, volfella præhensis, & vinculo interceptis venis.

Laudatur farina volatilis, aranearum tela, & alia in fluxu sanguinis numerata. Vrunt, &, vt loquuntur, mortificant ex puluere radicis caulium torrefactæ, & stercore canino similiter cremato, fæce arida vini adstringentis cremata, adiecta tertia parte vitrioli Romani.

Extremū est arrheniciū rubrum, cum æqua parte aluminis plumæ. Oportebit autem, priusquam hæc admoueas, sedem madefacere vino adstringente.

DE MORB. INTERNIS

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

*σύνχωσις.
Marisca.
Thymus.*

Per anum effluit sanguis multis modis, vt per intestinorum fluxum, hæmorrhoidas, *σύνχωσις*, siue ficum, & Thymum siue Mariscam. In quibus multi sæpe falluntur, qui sine distinctione, statim fluxu aliquo in ano, aut tumore apparente, hæmorrhoidas esse putant, cum plurimum hi omnes affectus inter se differant, & natura, & curatione. Thymus à veteribus describitur tuberculum carnosum, quasi verruca eminens ad cutem, tenue, supra latius, subrubrum, in summo perasperum, oblongum, florem thymi referens, vnde nomen habet. Facile finditur & cruentatur, modòque vnus, modò plures nascuntur in pedibus, talis, palmis, mediis femoribus, glande, præputio, facie, & sæpe in ano. Alij sunt sine dolore carnosissimi, asperi, candidi, aut subrubri. Alij cum dolore pûctorio durtiores, asperiores, maiores, sœculenti, liuidi qui non facile curentur, nisi tota parte excisa, cui innascuntur. Sycoſis idem significat, nisi quòd minor est quantitate & magnitudine, vt scribit Aëtius.

*Aëtius Te-
trab. 4. Ser.
2. cap. 4*

De quibus sic Iuuenal. Satyr. 2.

Cæduntur tumidæ, Medico ridente, mariscæ.

*Mariscarum
& hæmor-
rhoidum ge-
neratio.*

Falluntur ergò, qui mariscas cum hæmorrhoidibus confundunt. Illæ enim generantur ex præpostera venere, immodica equitatione, vel attritione qualibet in ea parte facta. Hæmorrhoids verò (nomine pro affectu sumpto, siquidem partem affectam quandoque significat) nihil aliud est, quàm profluuium sanguinis per venas ani, aut in illis tumor ab influente sanguine. Quæ affectio vt distinguatur à fluxu sanguinis antea descripto superioribus capitibus, obseruanda est hæc methodus, omnium fluxionum causis inuestigandis accom-

*Fluxionum
omniũ causa
qui possint
dignosci.*

modissima, siue naturales sint, siue præter naturam. Tria enim sunt in genere, in quibus causam inuenies. Virtus quæ mittit: instrumenta seu viæ fluxionum, vnde, quæ, & quò mittuntur: postremò materia fluens. Virtus qua-

*Sanguinis
per intestina
reiecti signa.*

druplex attractrix, retentrix, concoctrix & expultrix. In materia notanda mixtio cõsistentia, quantitas, qualitas. Primum igitur per quam viâ sanguis fluat, obseruandũ,

an per intestina, an per venas ani. Hoc cum ex causis antecedentibus & sensu, tum ex mixtione coniiciendum. Nam simul cum recrementis reiectus & cum illis mixtus ab intestinis prodit: sine recrementis, ab ano. Illic causa est vel in sanguinis multitudine aut acrimonia, vel in virtute, siue non retineat ob imbecillitatē, siue excernat ob copiam: vel in via, vt vlcere aliquo in intestinis. De quibus omnibus dictum est superius Si à venis ani (simul cū arteriis: ab utrisque enim fiunt) hæmorrhoides erunt. Itaque videndum initio, vt fluxionis natura & origo exactè intelligatur, vnde venæ illæ oriātur, quā progrediantur, & vbi terminētur. Vna est insignis, quæ à ramo splénico venæ portæ per mesaræum circa collum & intestinum rectū extēsa terminatur in musculis ani & intestino interiore, cui circa lumbos occurrit arteria. In eundē locum, sed vltcrius ad cutim vsque à vena caua, tres cum suis arteriis, à duabus iliis & ramulo venæ sacræ dictę Syluio. Si per has effluat sanguis, quia exteriores sunt, hæmorrhoides apertæ dicuntur, siue externę, in quibus necesse est hepar, renes, & totū illud venosum genus à vena caua magis expurgari, proindeque sanguinem magis coctum esse, quàm qui fluit à venis mesaraicis, in quibus adhuc rudis est & splēdidus, licet ater sit & crassus, quem lien, & mesaræum maximè hac via expurgant. Nam hepar sanguinem coctum per venam cauam distribuit. Mesaraicæ verò sugunt à vētriculo, & omnibus intestinis, atque ad hepar succum mittunt, plurimūque feri continent. Lien autem sanguinem fœculentū exonerat in ramum splenicū. A quo descendit per mesaraicū ramū, vnde primus ramus, qui descendendo occurrit, hæmorrhoidalis est: paulò infrā, venæ mesaraicæ. Si igitur per venam à mesaraico ramo, qui à splénico oritur, fiat ille fluor hæmorrhoides internæ erunt, quòd intus lateant, nec oculis cerni possint, nisi descendente ano, aut immisso speculo. Vtræque rursus diuidātur in cæcas, & apertas: Cæcæ sunt, quæ tument cū maximo dolore, nec sanguinem reddūt. Quinquā nō ignoro cæcas etiā dici illas interiores, quia non videntur. Apertæ verò, in quibus est sanguinis profusio. Rursus vel sine inflammatione sunt, vel cum inflammatione. Inflammationis signa sunt dolor, rubor, tensio,

Hæmorrhoides cæcæ.

Hæmorrhoides internæ.

Inflammationis in hæmorrhoidibus nota.

renixus, febris. In cæcis grauissimus dolor, quia partes illæ acutiore sunt sensu. Sphincter enim nervosa quædam substantia est, quæ neque vstionem, neque sectionem facile ferre potest sine convulsione. Deinde habent è vicino osse sacro ductos nervos, & extremæ partes sunt: quales acerrimum habent sensum, neque sine periculo offenduntur. Indicio est è pollice pedis subita mors apud Hipp. 1. Epid. & læsis extremis digitis dolor grauissimus & oculis, & pudendis, & sedi. Rectitudo quoq; & tenuitas nervorum plurimum facit ad doloris sensum. Quæ omnia indicant, non sine causa, plenioribus vasis, & distenta membrana sedis, quæ orificiis venarum prætenditur, à plenitudine, aut inflammatione acutissimum dolorem excitari, qui sæpe ad se totam curationem traducit. Ex his etiam perspicuum est, non solum propter crassum & fæculentum sanguinem, sed etiam purissimum, hæmorrhoidas fieri, licet Gal. in Aph. contra sentire videatur. Si igitur sanguis, qui effluit, redundet & vitiosus sit, magna ex hæmorrhoidibus commoda consequuntur, quæ numerantur ab Hipp. Incipientem melancholiam prohibent, factam sanant, quod ferè is humor crassior & nigrior per has venas vacuetur, quanquã & alius. Varicibus, lieni indurato, arthritidi, nephritidi remedio sunt. Quibus (inquit Hippo. sect. 6. Epid. 3.) hæmorrhoides, ij neque pleuritide, neque peripneumoniâ, neque phagedænâ, neque furunculis, neque thermynthis, fortasse neque leprâ, neq; alphis corripuntur. Sed non solum his, quæ dicit Hipp. profunt, verum etiam vteri, vesicæ & pudendi affectibus. Ex eadem enim diuisione hæc omnia venas habent. E viduis quibusdam loco menses

*Gal. comment.
in aph. 11. Et
12. lib. 6. &
côm. in sent.
37. sect. 3. lib.
3. Epid.*

Hæmorrhoides fluentes menses loco. fluunt hæmorrhoides. In gravidis quoque notavi hæmorrhoidas vtiliter fluere in duabus mulieribus nobilissimis iam quatuor menses in vtero habentibus: in quibus partus tempestivius consequutus est, & saluberrimè adolevit. Erat autem frequens & multus fluxus, sanguis

Sanguine Et pus mingenti hæmorrhoids aperta saluti fuit. ferè dilutus, qui vbi subsistebat, grauius habebat. Aegrè excluso lenabantur. Quibusdam etiã familiis consuetæ sunt. Cuidã nobili in æde Ambrosij Paræi Chirurgi decumbenti, qui me ad consiliũ adhibuit, cum in grauissimo renũ dolore emingeret pus, sanguinem & crassam

pituitam, natura remedium ostendente, quia tume-
 bat hæmorrhoids, & alijs remedijs non cedebat dolor, eo sta-
 tim tempore iussi aperiri hæmorrhoidem, vnde incredi-
 bili celeritate dolor conquieuit. Sed hæc omnia intelli-
 genda de natura superflua exonerante, & si ægri leuiter
 ferant. Nam quæ ab infirmitate viscerum & intemperie,
 vnde sanguis vel acrior, vel serosior generatur, vel quæ
 à laxatione & hiatu venarum ortum habent, aut immo-
 dicè fluunt, in his celeriter tolli debet totius mali origo.
 Alioqui intempestiuè cohibitz deteriora longè & peri-
 culosiora vitia inuehunt. Nam suppressus sanguis ad he-
 par, hinc aliquando ad pulmonem, cerebrum, latus, aut
 in corpus diffunditur, vel aliqua parte consistit, vnde
 morbi illi omnes superius relati oriùtur, & si qua adhuc
 grauiora dici possunt. Paucis enim grauioribus annota-
 tis morbis alios intelligit Hippocrates, vt epilepsiam, &
 similes. Non immeritò igitur quæstiones illæ duæ po-
 nuntur, an prouocandæ sint, an sistendæ. Et si sistere cõ-
 siliu sit, an vna relinquenda, vt Hippocr. præcipit in
 Aphorismis. De quibus remota omni disputatione ab
 hoc loco aliena sic breuiter cõsemus. Assuetis & grauioribus
 morbis laborantibus, aut opportunis, aperiri posse. Quibusdam
 familiis consuetas esse, in quibus indiuidui ratio habenda.
 Et quia ante pùbertatem non fluunt, vt est author Hippocrates,
 impetus quoque naturæ considerandus. Alioqui non est facienda
 consuetudo. Aperitæ igitur non sunt si non tumeant, & si nunquam
 fluxerint. Quod ad alteram quæstionem pertinet, Curati (inquit
 Hippoc. 6. Epid.) importunè multo subito his morbis correpti sunt,
 & grauissimè. Galenus importunè curatos interpretatur, qui neque
 phlebotomiâ, neque medicamento subducente per interualla
 exhibito, vel exercitationibus vacuantur, qui item neque vnâ
 ex ipsis relinquunt, sed omnes in vniuersum tollunt. Vbi Gal.
 videtur sentire omnes quidem tolli posse, sed non ad eundem.
 Deinde oportere *καὶ πρὸς τὸν* vacuare corpus, phlebotomiâ,
 medicamento, exercitio: alioqui vnâ relinquendam. Quare
 vbi hæc remedia adhibita fuerint, & per interualla, nulla
 relinquenda videtur, præsertim cum ea purgatio non sit
 naturalis, & optima victus ratione de-

Hæmorrhoides quando prouocandæ, aut sistendæ.

clinari queat. In recentibus quoq; metu grauioris mali vna seruari potest. Multis percurantur. Sed experientia docet, nisi purgentur, & sanguis detrahatur, nescio qua melancholia & obscœnis somniis vexari. An autē vna relinquenda sit, quæ statis periodis effluat, an obligandus æger phlebotomiæ per interualla, & medicamentis, id ferè arbitrio ægri relinquendum, nisi si quis à phlebotomia, purgatione, exercitiis deterius habeat, aut hæc leuiter ferens, grauius ferat hæmorrhoidem. Relinquere autem vnam apud Hipp. nihil aliud est, quàm non secare, non vrere, non consuere, siccare, putrefacere. Nam liber est de hæmorrhoidibus, vbi omnes vrir, secat, curat, consuit, putrefacit, siccatur. Vrit autem non adhibito venæ ferro, sed tantum admoto, vt assetur, & siccetur. Quod igitur Aëtius nullam seruandam scripsit, Paulus contrà, non solum in diuturnis, sed vbi stillicidij modo effluit sanguis, cæteris oclusis, vnam relinquendam præcipit. Seruari duobus modis interpretari poteris, vel neglecta artificiosa curatione, vel adhibita. Si negligatur, vna seruanda est: si adhibeatur, nulla. Rursus sistendi consilium duplex. Alterum dum fluentes sistimus: alterum, dum fluxuras animaduertimus. In illis immoderatum fluxum adstringi debere non est dubium. Cæterum externæ faciliè deprehenduntur ex tumore. Internæ verò ex pondere circa sedem, egerendi difficultate, & clysteres aut glâdes immittendi, sanguine aliis excrementis non permixto, & consueta purgatione, atque indiuidui natura.

Multi sunt igitur curationis scopi. Tumentes aperiendæ: fluentes compescendæ: dolor mitigandus, & inflammatio tollenda. Quæ omnia propriis remediis perficiuntur. In omnibus, partis affectæ habita ratione, ab omnibus acerbis & mordentibus abstinendum. Cauendum à cancro, aut fistula: quæ vehementioribus medicamentis faciliè inducuntur. Nam cuniculi quidam sæpe latent, in quibus pus. Vnde longiores sinus in fistulas abeunt. Videndum etiam, ne nimium adstringamus, aut refrigeremus podicem. Hinc sequitur ani prolapsus, vel resolutio: illinc non præstat officium, & alius nimium resiccatur. Itaque post usum horum corrigi vitium debet, si quod illatum sit. Vbi remediis non est locus, Chirurgia

opus est, ligatis, vstis, tabefactis venis, Sed reuera in hæ-
morrhoidibus diuturnis, in varicibus, & reliquis influ-
xionibus & collectionibus iam inueteratis omnino pe-
riculosa sectio, quâ vel moriuntur, vel in aliquem gra-
uissimum dolorem incidunt, priore peiorem. Purgato
corpore fons conuenit cum vino adstringente, deco-
ctione ros. centinod. plantaginis, scoria ferri, & simili-
bus. Topica adhibentur & sedi, & ossi sacro.

ANTO. VALETII EXERCIT. LV.

Hæmorrhoides aliæ sunt internæ, externæ alię.
Illæ à splenico ramo & mesenterio: hæ po-
tius à venæ cauæ propaginibus ipsi sedi explanta-
tis, fiunt. Internarum sanguis parcior & aquosior:
crassior externarum. Sunt item aliæ vuis similes,
rugosæ, proptereaq; dictæ vulgò morales, quòd
moris similes conspiciantur. Corpus aliàs cacochy-
miâ expurgant, præsertim melancholica, aliquâdo *Gal. cōment. in senten. 25. sect. 5. lib. 6.*
plethoram deplent. Prorruptionis sanguinis ab hæ-
morrhoidibus cōmoditates vide apud Gal. cap. 7. *Epidem.*
lib. de venæ sectione aduersus Erasistratæos, cōm.
in sent. 8. sect. 6. lib. 6. Epid. & in 37. sent. sect. 3. lib.
eiusdem. Suppressarum verò incommoda comm.
in sent. 39. Prorrhetic. 3. Prima curatio est, vt mole-
stus dolor sæpe leniatur: secunda, si sistantur, &
mali grauioris metum afferant, vt aperiantur: tertia
si immodicè fluant, vt cohibeantur. Sola quippe *Gal. ad finē lib. de differ. sympt.*
vacuatio optima censetur, quæ quod graue, infen-
sūmq; est, velut onus inutile, deponit citra corpo-
ris infirmitatem, & virium iacturam. Sedabitur ita-
que dolor aluo molliore facta, vt minore cum ex-
pressionem & conatu fæces reciciantur, quæ alioqui
duræ hæmorrhoidas exasperant, fluxionem vide-
licet dolorifica duritie ingeminando. Et quia in-

inflammatio sæpe adiungitur, conuenientissimum hoc erit remedium.

℞. mucag. seminis psilij ʒ. 3. vnguenti populei ʒ. 2. misce pro linimento: quo pannus mollis, aut gossipium imbutum, in anum inditur.

Quòd si tensio sine inflammatione sit, satis erit bombacem imbuere linimento ex mucaginib. alth. lini & scœnugræc. vel oleo viol. aut simil. Dein aperiantur hæmorrhoides infinitis propè artibus ab Hollerio traditis. Vulgò tumentes venas inungunt sanguine gallinæ, aut colûbi: mox hirudines præparatas affigunt: quæ si satis sanguinis non exhauriant, sanguinem fluere sinunt. Quod si per se sistatur, ægrum iubent in aqua tepida insidere. Contra verò si per apertas hæmorrhoidas fiat profusior sanguinis proruptio, à qua periculum tabis, aut cachexiæ impendeat, auertetur sanguis secta dextra basilica, largo sanguine ducto, si multus substituerit, affixis dextro hypochondrio & interscapulio cucurbitulis, &c. Vbi tenuitas sanguinis & acrimonia in suspicionem venit, syr. incrassantes, refrigerantes & ora vasorum occludentes vsui erunt. Tutissimū etiam erit, rhei electi in aqu. cichor. plantag. rosar. aut solani cum paucis cinam. crassiusculè conquassato infusi fortem expressionem exhibere, adiecto syrup. aliquo adstringente: aut, si magna fuerit cum sanguine feri copia, syrup. laxat. ros. pallid. Facit & hūc maximè hic potus.

℞. sacch. ros. ʒ. 2. bol. arm. elotæ in aqu. ros. ʒ. 2. syrup. myrtill. ʒ. 1. aq. ros. ʒ. 2. f. potus.

Foris sedi admoventur ad sistendum fluxum eadem fermè quæ in ani procidentia.

De exitu 1 ani.

CAP. 56.

Nus totum rectum intestinum est, aut extrema laxitas eius. Excidit hæc infirmis musculis obliquis, qui sedem sursum reuellant, & laxitate 2 membranarum, quibus ossi sacro & lumbis colligatur. Nervi etiam 3 resolutione, qui ab extrema spina ad sedem porrigitur. Itaque primum animaduertendum, num quæ inflammatio adsit, quod tumore, rubore, calore & 4 duritie intelliges. Hic 5 sanguinem è brachio detrahes: deinde etiam è 6 malleolo. Si fuerit opus, materiam inflammationis resoluentibus medicamentis & laxantibus digeres, admixta etiam parte eorum, quæ repercutiant & corroborent.

Topica remedia frustra sunt adhibita sedi, si à læso neruo vitium est. Tuncque applicanda extremitati spinæ, vbi 7 coxa est: redeundumque ad genus 8 curationis, quod cap. de Paralyfi dictum est. Si verò infirmitas est eorum obliquorum musculorum, & corpus crassis ac viscidis humoribus abundat, purgatione primum utendū est ex hiera simpl. aga. hiera diacolocynt. & similibus: tum si qua fordes ano inhæsit, detergenda prius hydromelite, urinâ propria, decocto betæ, muria, marina aqua.

Postea verò fots cōueniet sæpe repetitus ex vino austero, in quo acacia, hypocistis, mirthus, malicorium, rosæ, scoria ferri, & alia eiusmodi adstringentia cocta sint, adhibita ratione, quæ iubet mollioribus minora, durioribus fortiora remedia esse adhibenda.

A fots vnctiones, insersiones puluerum, in seffio-

1 De vltima recti intestini partis prolapsu.

2 Ductarum à peritoneo, atque etiā à ligamētis lūborū & ossis sacri.

3 Quæ vel ab obstructio ne, vel compressione fit.

4 Dolore itē & pulsu.

5 Ad reuelendū & inhibendū fluxum.

6 Ad amotionem materie cōiunctæ.

7 Quæ parte ischium cum osse sacro cōnectitur.

8 Vt ad fortius, litus, emplastra, dropaces.

De his vide Hippocratē ad finē libelli de fistula.

nes & balnea vsurpanda sunt. Quanquam inunctiones & olea, quæque lubrica sunt omnia, non sine ratione quidam reiciunt, alij admittunt, quia firmiùs inhærent. Laudabitur oleum nardinû, costinum, laurinum, mastichinum, rosaceum, quæ ubi inuncta fuerint, pulvis ex arida pice trita, seta porcina, vsta galla, fimo canino, cornu cerui, carabe, sanguine draconis, mastiche, corallo & similibus.

Suffitus è bdellio, pice arida, pinea, Colophonia, exuio serpentis, lapide molari candente consperso aceto, in quo porri folia coxerint, vino austero nigro, in quo aliquid adstringentium ferbuerit, infusiones in aqua sulphurea, marina, bituminosa, aluminosa, & similibus. Pulvis.

℞. sang. draco. malicorij ana 3. i. gallæ, bituminis ana 3. 2. subtilissimè trita & cribrata inspergantur. Alius.

℞. carabe, cornu cerui vsti, coralli, balaustiorum, thuris albi, 2 antimonij, acaciæ ana 3. 8. trita inspergantur, aut incorporètur vitello oui, & modico petrolei, Vitellû oui vsurpam⁹, vt in eo pulueres incorporentur, quia non, vt oleum, sordes relinquit.

Emplastra fiunt ex ammoniaco, bdellio, malaxatis cum oleo nardino, & similibus conspersis pulvisculis, quæ adstringant: ossi sacro, perinæo & sedi apponi debent, & ne concidant, fasciis contineri. Tempus remediorum, ubi iam ægri deiecerint, & abluta sedes reposita fuerit.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Alexand.
Aphrodis.
lib. 1. Probl.

Rectum intestinum, Græcis ἀνδρομέρον dicitur, Hippocrati ἀρχός, Aph. 38. libr. 3. vt interpretatur Philoth. Prius nomen illi inditum est, quod cum alia intestina

flexuosa sint, recta lineâ sine gyris in anum siue podicē deducatur: posterius verò, quòd vel aliis imperet, vel aliorum sit principium. Excrementa enim excipit, & foras agit, adiutum septo transuerso, & musculis abdominis propellentibus. Opus igitur habuit musculo, à quo, tanquam crumena, constringeretur, ne ante tempus excrementa effluerent, quem Græci σφιγκτήρ vocant ἀπὸ τοῦ σφίγγειν, id est, constringendo. Quæ est illius propria actio, non autem excretio, vt multi voluerunt. Deinde altero (qui geminus est, vel etiam tergeminus) obliquè supra rotundum sito, quo sursum reuellitur. Adiectæ sunt membranæ; ad maiorem firmitatem, quibus alligatur ossi sacro & lumbis. In hac parte morbosus affectus plurimi oriuntur. Si excrementa nobis inuitis egrediantur, resolutio est sphincteris. Si verò extra anum prolabatur intestinum rectum, neque sursum retrahi possit, nisi manu protrudatur, necesse est causam esse in musculis, aut nervis sursum reuellentibus, vel membranæ alligantibus. Id autem fit laxatis illis nervosis corporibus, vel imbecillioribus redditis, vel intumescente & inflato intestino. Si resoluantur nervi, causæ ex capite de Paralyti exquirendæ sunt, topicæque ossi sacro imponenda. Imbecilliores redduntur aliquando ob nimiam mollitiem & humiditatem, vt in pueris, vel frigus à quacunque causa externa, vel aliquam aliam intemperiem, aut humorem madefacientem. Aliquando verò ob magnam aliquam contentionem in reddendis excrementis durioribus, aut acrioribus, vt in dysenteria, vel tenesmo. Inflatur autem à quolibet tumore, sed præcipuè inflammatione, quam sequitur dolor, febris, perpetua irritatio ad excretionem, stillicidium urinae. Fieri scribit Hippocr. de fistulis à pituita ex corpore in intestinum rectum decumbente. Quanquam in contextu Græco habetur ἀπὸ τοῦ φλέγματος. Certum autem est phlegma Hippocrati aliquando inflammationem dici, vt in Prognosticis. Nec dubium, quin ab aliis etiam humoribus, præsertim à sanguine, fieri possit. Mirum est, quòd nobili cuidâ mulieri contigit anno 1559. Nihil excludebatur stercoris: dolor ingens in ano, qui nullis remediis cedebat. De causa disputabatur. Nihil è speculo immisso apparuit

DE MORB. INTERNIS

interiore recto intestino. Tandem summa vi, & eo dolore, qui in partu difficili excitatur, rotundum globum tophaceum e cæco intestino deiecit. Hernia laborabat. Erat is globus tunica inuolutus, suberis substantiâ.

Non eadem omnibus curatio. Frustra adhibentur remedia ano, si spinę vitio resolutus sit neruus. Inflammatio curanda, vt cæteræ, indicatione sumpta à parte.

ANTO. VALETII EXERCIT. LVI.

PROcidit anus vel ab externa causa, vt ictu, lapsu, casu, nimioque egerendi conatu, velut in tenesmo, vel ab interna, vt frigida humida intemperie, calida humida, musculos resolvente, aut ab aliquo præter naturam humore. Hic affectus vt curetur, sordes imprimis, si quæ adhæreant, hydromelite, vel decocto betonicæ detergenda: deinde sedes sic fouenda.

*Vteri proci-
dentiæ causa,
& eiusdē cu-
ratio.*

℞. ros. rub. myrtill. sumach. cortic. granat. balaustior. cupul. gland. gall. nucum cupressi ana ʒ. ʒ. ʒ. Cōtusa omnia bulliant in sufficienti quantitat. vini austeri. Eo decocto foueatur. anus procidens, postea exsicceetur, & oleis sequentibus linatur. ℞. ol. myrt. rosar. & cydon. ana ʒ. ʒ. ʒ. misce.

Postremò sequenti puluere aspergatur, ac demum reponatur.

℞. corti. granat. ros. rub. balaust. myrtill. cupul. gland. ana ʒ. i. f. omnium puluis, vtendus, vt dictum est.

Intestinum verò sic repositum denuò fouebitur decocto præscripto, ægro quiescente, altis & inunctis clunibus. De conuenienti deligatione ani ex Hippocrate, Gale. & Heliodoro vide Cornel. Cels. lib. 6. cap. de condylomate. Hippocrates lib. de fistulis utitur zona, à qua deducta fascia per dorsum recta ano subinducitur, & superadductæ zonæ ad

umbilicum religatur: sed prius reponit anum, fouet decocto adstringente, tegit molli spongia, vel linteo in decocto insuccato. Vbi deiiciendi cupiditas vrget, angustissimis asseribus ani latera innitantur: aut, si puer est, femur pedibus infideat, vtrinque extentis cruribus deiiciat. Si dolor accesserit, sedabitur vt in hæmorrhoidibus.

De exitu matricis.

CAP. 57.

Relaxatis 1 vinculis, refrigerato 2 vtero, collecta 3 mucosa substantiâ vterus excidit, senibus magis, & iis, quæ ex instituto vitæ 4 nudos pedes in frigida continent, aut diutius in frigido lapide sedent, vel aërem frigidiorē excipiunt, maximè in puerperio, & 5 tempore menstruorum. Casu, ictu, resolutione quoque decedit. In vehementi motu eo modo, quo vrina & sterora præter voluntatem effluunt, ita etiam vterus 6 delabitur.

Totum vterum decidere posse quidam 7 è Græcis negant: contra quos 8 Arabum autoritas & experientia facit. Tūmque desperata res est, vt cum inueterauit malum, quod ætate senili non facile curari potest.

Initio animaduertendum, num retenta vrina, 9 aut stercus. Primū enim excludere oportet. Vterus enim in medio positus, & compressus magis expellitur, nec facile reponitur.

Aptè collocanda mulier est, sublati coxis inuicem dilatatis, reflexis poplitibus. Atque eo modo, crasso intesti 10 sphincteris constrictione obduruerit.

1 Quibus vterus coalescit, adiungitur, mouetur, nutritur.

2 Quod frigus vtero bellum indixerit.

3 Tū in corpore vteri, tum in acetabulis ipsis.

Vnde granior factus, vinctus suo loco contineri non potest.

4 Vt mulieribus lotricibus.

5 Quo temporis vteri pars vtrāq; hiat.

6 Accedit & coeundi libido, cum scilicet vterus defraudatur, et appetitum non explet. Arist. cap. 2. lib. 7. histor. Anim.

7 Vt Aetius.

8 Vt Auicenna.

9 Vt si in

10 *Ex balau*
stis, radice
cypri, nuce
cupressi, rosif.
 11 *Vt bacca,*
cortex & fo-
lia rose cani-
na, fol. rubj.
hypocytis,
balauftia.
 12 *Vt repofi-*
tus suo loco
contineatur.
Hinc semi-
spheram fi-
gurâ ouale,
cerâ obductâ,
filoque ap-
peſam in mu-
diebrè sinum
(ſiſquequâ-
que ſit prolâ-
pus vterus)
immittere, et
ſubligaculis
retinere de-
cuerit.
 13 *Vt maiore*
vi ſuſum at-
trahant vte-
rû prolapſum
 14 *Quod vim*
habeat cõfir-
mâdi & con-
ſtringendi:
cuiusmodi eſt
empla. contra
rupturâ vng.
Comitiſſ. emplaſt. de maſtiche, rubrum deſiccatiuum cum radice cypri.

quo in ſede diximus, detergendum, abluendum, fouendum, peſſuli quoque è lana molli inuoluta linteolo ſingendi ſunt. In ea lana 10 pulueres miſce-
 ri poſſunt, qui vterum confirment.

Peſſulus factus pro ratione ætatis immergen-
 dus eſt vino, in quo 11 adſtringentiâ coxerint, &
 ita in ſinuandus pudendo, priùs reposito 12 vtero.

Pectinem quoque & lumbos lana, bombace,
 aut ſpongiis imbutis oxycrato cõtegemus, & ne
 concidant, alligabimus.

Cucurbitulæ cum multa 13 flamma vmbilico
 & ſumini, atque etiam ilibus affigendæ ſunt, sæ-
 piùsque repetendæ. Atque interuallis cucurbitula-
 rum 14 emplaſtrum ſupra vmbilicum & lumbos
 affigendum eſt.

℥. galbani 3. i. β. myrrhæ, thuris albi ana 3. 2.
 terebinthinæ 3. β. ſem. lauendulæ 3. i. moſchi 3. β.
 incorporentur, & extendantur in aluta.

Peſſarium, peſſulus, priapiſmus.
 ℥. aſſæ foetidæ, myrrhæ, thuris albi, maſtichis an.
 quod ſufficit pro ætate, & ratione mulieris.

Fiat peſſarium malaxatum cum oleo laurino,
 vel de liliis, addendo 3. i. β. lauendulæ, & baccarum
 lauri 3. β.

Naribus odôra, vtero foetida admouenda, pan-
 nis lineis inuoluendæ partes pudendæ & vicinæ,
 perfumigatis cum myrrha & thure. Suffumigia &
 inſeſiones, vt priùs.

Sed hîc peculiariter ex lauendula, biſtorta, foliis
 & baccis lauri, adiecta portiunculâ myrrhæ, thuris
 cum cortice, & maſtichis.

Si putruit vteri pars, quæ decidit, placuit Græcis & Arabibus, vt quicquid corruptum sit, amputetur.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Vterus vinculis vndiquaque alligatur, antè, retrò, superius, inferius: dextra, sinistra: obliquè ad collum & inguina. Ossi pubis, ilion, & sacro per tunicam à peritonæo, dextra & sinistra parte annectitur: magnis vasis per arterias & venas, præsertim spermaticas & apophysim peritonæi: spinali medullæ per nervos: recto intestino per fibras quasdam tenues: vesicæ per alias, sed plures & laxiores: ossi pubis per vincula laxa. Omnia membranæ peritonæi præter vasa. Hinc maximus vteri consensus cum vniuerso corpore. Plato tanquam animal vorax moueri putat modò deorsum ad semen excipiendum, modò sursum, fugâ malè olentium, aut alia causa. Medici verò naturaliter quidem excipiendo semen, hiare, deinde constringi volunt, sursum autem non moueri, nisi vasis plenis reuellatur, aut infletur, vt in suffocatione: deorsum verò, cum peritonæum aut vincula à peritonæo relaxâtur, vel rumpuntur, vel fundum inuertitur, vnde vteri procidentia. Contorquetur etiam interdum vt ob abscessum, vel inflammationem, vel vim aliquam illatam, vel post partum. Videre etiam licet multas, quæ cum vtero gestant, dolore coxæ affectis ligamentis laborent, sic vt edito fœtu dolor maneat, vnde claudicant, cuius meminit Galenus 6. de locis affectis. Sunt igitur tres affectus vteri præcipui ex deprauato motu, vnde infinita & admiranda symptomata consequuntur, suffocatio, contorsio & procidentia. Hic de postremo tantum agitur, in quo aliquando collum, aliquando fundum in vuluam procidit. Vbi collum excidit, videtur veluti glâs viri rubens, quæ se ostendit in ore pudendi cum suo foramine. Fundum autem cum procidit, inuertitur. Quæ omnia ratione diligenter distinguenda sunt. Causæ igitur sunt, relaxatio aut ruptio aliquando vinculorum ad ossa pubis: nonnunquam peritonæi. Relaxatio fit ab humiditate, aut difficili partu, aut rupto peritonæo, aut tensis inferioribus ligamentis. Quod ramen fieri non

Vteri maximus consensus cum vniuerso corpore.

Vterum gestantes nonnullas vnde claudicare contingat.

DE MORB. INTERNIS

posse existimo. Sic enim traheretur ad ossa pubis potius. Aristoteles 7. de natura animalium scribit quibusdam desiderio coitus, aut longiore veneris abstinencia vterū excidere, quibus coitus & conceptus remedio est. Sæpius fit casu, ictu, vehementi metu, morā in aqua frigida, vt in lotricibus, difficili partu, magno conatu in reddendis excrementis. Ob rupturam peritonæi, aut difficilem partum, vix curatur, aut nunquam.

Si fundum procidat, sublati cruribus facillè redit: si vincula, declinet in latus, vnde dilabuntur. Puellæ cuidam (quod à nobis annotatum est) tremor sinistra parte in facie & thorace, nō inferioribus partibus. Decumbēti in sinistram mouebatur: quiescebat reuolutæ in dextrā. Manè & vespere mouebatur. Ardebat similiter & frigebat. Suppressi menses annis ferè tribus, facies saturato rubore, tenesmus, dolor stomachi, lien inflatus. Si ab humiditate fiat relaxatio, resiccantibus & adstringentibus vtendum. Vacua in repellendo debent esse intestina & vesica. Conueniunt fots, inunctiones, pessaria, odores foetidi, fumigia, emplastra, cataplasmata, vnguēta, cucurbitulæ admotæ lumbis & vmbilico. Extremum remediū est zona Hippocratis, quæ à cingulo zonā habeat à parte posteriore per perinæum adductam in anteriore partem ad idem cingulum. Iuxta pubem arctè colligatur. Alij ē subere ouales formas inductas cera, & quasi pediculo alligatas, immittunt in sinum pudendi, atq; alligāt coxis. Inunguntur oleis & vnguentis adstringentibus.

ANTO. VALETII EXERCIT. LVII.

Vterus procidit praua foetus extractione, violenta secundinæ depulsione, spiritus cohibitione, immensi oneris sublatione, plaga, partuum frequentia, animi affectibus, vel resolutione ligamentorum & musculorum vterum sustentantium. Quod ex vtero propendet, ouo simile existit. Vterus antequam reponatur, & alius clystère subducitur, & excluditur vrina, vt patentior sit ipsi vtero locus. Dein

fouetur eodem decocto vterus, eodem item pulvere aspergitur, quo prolapsa anus: tum verò obstericis manibus oleo mastich. aut ros. vel butyro inunctis sua statione locatur. Interim cucurbitula magna vmbilico sæpe admouetur: vel singulæ cucurbitulæ singulis vmbilici lateribus affiguntur. Pecten, lumbi, os sacrum, lana, vel gossipio, aut spongiis, oxycrato madidis conteguntur, superductis fasciis. Denique emplastrum de galbano dorso, vmbilico adhibetur.

¹ Cum scilicet fluunt immodicè, & præter modum peculiaris nature, ætatis, diætæ.

² Que commodo nature fit, & à natura suscipitur.

³ Vt si bis menses repetat.

⁴ Cum puella ad iustam magnitudinem & modum peruenere.

⁵ Vt salacibus mulieribus, que sero abundant.

⁶ Vt si mulier sit habitior, corpus habeat minus perspirabile, glabrum, cutim albam, capillos nigros & rectos oculos quo-

que nigros, vocem acutam, vt si sit iracunda.

⁷ Que triplex est: san-

De sistendis mensibus. CAP. 58.

Mensis ² naturalis est purgatio, nisi vel quantitate excedat, vel ³ præter statas periodos effluat. Decimo ⁴ quarto anno excitatur, nonnullis ¹²: rarissimè ⁷. Desinit verò ⁴⁰ aut paulò post, alioqui ad ⁶⁰. producitur. Aliis singulis mensibus, nonnullis vno aut pluribus mensibus intermissis, quibusdam sæpiùs vno ⁵ mense redit. Iunioribus ad lunæ plenilunia, aliis ferè decrescente luna, tribus, ^{4.5.6.7.} diebus; cò plus minùsve. Maiorem copiam efficiunt, ratio vitæ plenior, otium, temperamentum ⁶ frigidius, tenuitas sanguinis, vel acrimonia, amplitudo vasorum, quæ plurima & maxima ad vterum perueniunt. Subsistere debent in totum grauidis, puerperiis, lactantibus.

Vt sistas, primùm animaduerte ⁷ causam immerati fluxus, colorem sanguis fluentis. Si linteolo excipias, animaduertes. Calida enim menstrua, vbi sanguis calidior est: florida atque rubentia, vbi ⁷ quæ triplex est: sanguinis copia & qualitas, vasorum laxitas, facultatis retentricis infirmitas.

DE MORB. INTERNIS

8 Aut etiam sanguinis copia in causa est: subalbida, vbi sanguis
 frigidior est. 8 frigidior est. Rubentibus itaque menstruis, si
 tione feri. quidem corporis plenitudo est, 9 venam è cubito
 9 Ad reuulsio secato. Si verò magna pars plenitudinis iam 10 de-
 nem & ple-pleta est, aut alioqui non redundat in reliquo cor-
 thoram de-pore sanguis, cucurbitulas satis amplas cum multa
 plendam. flamma sub māmīs affigito: vinculis brachiorum
 10 Immode-utitor, 11 frictionibus manuum & calfactionibus.
 rato scilicet In vsu phlebotomiæ & reliquorum, interrogabis
 fluxu, vt ve-primū, qua parte vteri maior grauitas sit. Si dex-
 nam secare tra parte, basilicam dextram secabis, dextram manū
 tutū non sit. ligabis, fricabis, calfacies. Sub dextra mamma cu-
 11 Ad reuul- curbitulam affiges.
 sionem obscu-ram.

Si verò cacochymia est, biliosum sanguinem rha-
 barbari 3. i. 8. aut hierā picra repurgabis. Si pituita,
 eadem hierā aut rhabarbaro vtēris, sed addito aga-
 rico. Sed ferè vbi nulla plenitudo, aut manifesta
 cacochymia, cucurbitula sub mammis, aut in hu-
 meris apposita, vincula manuum, remedia quæ san-
 guinem sistunt, satis esse possunt.

12 At felicius In laxitate meatuum, adstringentibus: in tenui-
 aqua nuc- tate, incrassantibus vtendum est. Conuenit inter
 mentorū sali- Græcos & Arabes succum plātaginis efficacissimè
 cis, succo rad. mensēs sistere. Memini (inquit Gal.) cum quatuor
 virtute albæ, dieb⁹ iugiter sanguis fluxisset, nec sisti posset, cyatho
 succo burse vno succi plantaginis cōstitisse. Recentiores 12 aqua
 pastoris, at- plantaginis vtuntur. In aqua melius fuerit aliquid
 que lāceola. dissoluere corū, quæ sanguinem sistunt, vt 3. i. tro-
 Vt. 24. succo chischorum de carabe, de spodio, de terra sigillata, &
 rum depura- eorum, quæ iam antea sæpe enumerata sunt.

rad. vrtic. al. Loco pessulorum (quoniam mulieres non facilè
 3. 2. sacch. q. admittunt pessula) lana vel gossipium, aut mollius
 s. f. syrupus.

lindeolum succo adstringente, vt plantaginis, infucatur, & ita inditur genitalibus. Mulieres fingunt è peruinca, quæ iniiciunt cruribus. Laudant vngulas asini, pelles anguillarum, pelliculas interiores nucis auellanae, quæ cum succo cydoniorum coguntur in pilulas, aut diluuntur in succo conuenienti.

Pessuli, si finguntur, teretes sint ac rotundi ad instar digiti è lana, bombace, aut conferto linamento, quibus medicamenta adstringentia excipiuntur. Deinde conuoluantur, vel serico raro, vel lineo linteolo. Pendeat è filo, vt cum opus fuerit, retrahatur. Utuntur epithematibus lumborum 13 & crurum posteriorum, ex aqua plantaginis, sumach, vino rubro adstringente, & similibus.

℥. scoriz ferri crematae, & in aceto extinctæ, deinde pulueratae, lapidis hæmatitis triti ana ʒ.2. syrupi myrtillorum & ros. ana ʒ. ʒ. aquæ plantaginis ʒ.2. Fiat potus.

℥. trochiscor. ambræ citrinæ pulueratae ʒ.1. datur cum vino adstringente diluto modica aqua plantaginis.

℥. sanguinis draconis, boli armenæ, ambræ citrinæ, coralli rubri ana ʒ.1. Fiat puluis, detur ex aqua plantaginis.

℥. boli armenæ ʒ.2. coque in vino subtili subaustero ad ʒ.2. colatura bibatur. Opiata.

℥. 14 conferuæ veteris ros. ʒ.2. sem. plantaginis ʒ.2. sanguinis dracon. boli armenæ ana ʒ.4. ambræ citrinæ, coralli rubri ana ʒ.1. cum syrupo de myrtillis fiat opiata. Datur castaneæ magnitudo sero & manè ante cibum.

Laudant puluerem è pectunculis, quæ è Compo-

13 Ad regionem venarum spermaticarum qua ad fundum vterifertur. Iisdem etiam partibus emplastra admoventur è bolo, empl. contra rupturam, vnguentum Comittisse.

14 Huic ad des symphyti & nenupharis cõseruam.

stella & mari comportantur. Iapis, onix, id est, corallina, hæmatites, corallus ruber prodesse creduntur, siue in puluerem redacta vsurpentur, vel è collo pendeant, manui alligentur, aut supponantur mammis, distillatum è conserua consolidæ maioris & limacibus ana quod sufficit. Aliquando ad stupefacientia deueniendum est, vt.

15 Vt anno 53. 45. aliis serius, aliis celerius.

16 Vt in nutricib, quod per venam e-

pigastricam atque mam-

mariam san-

guis fiat & videretur ad

lactis gene-

rationem.

17 Quod nul-

la sint in his reliqua par-

tium sangui-

nearum ali-

menti.

18 Vt in mulieribus bene

carneosis, & propterea si-

ne incommo-

do valetudi-

4 philonij. 3. i. boli armenæ 3. i. cum vino stiptico fiat potus. Ablutiones ex vino austero, in quo saluia coxerit, aut aliquid ex materia adstringente. Inunctiones ex oleo rosarum, melino, vel in quo adstringentia coxerint, vnde & alia remedia ex aliis locis.

De prouocatione menstruorum.

Resistant menses 15 ætate, conceptu, 16 lactatione, & his prouocari nõ debent. Sunt quibus præter calidius & siccus temperamētum, præter frugaliorē vitam, exercitia maiora, vacationes tum manifestas, tum insensiles, vt sanguinis vacationem per nares, phlebotomias frequentes, & alia eiusmodi. Item in iis, 17 quæ à longo morbo se confirmant. Aliis propter pinguedinem, in quam totus sanguis cōuertitur. Nonnullis propter gracilitatem & copiam sanguinis. Neque his commouendus mensis, vt nec benè carneosis, si quidem cassatione menstruorum nihil offenduntur. Vnicum tamen est, 18 quod excipi debet ratio generationis. Nam vt mulier suppressa purgatione, nihil lædatur, quia tamen sine menstruo sanguine 19 generatio esse nõ potest, oportet quiddā naturam assuefacere, vt sanguinem in vterum deriuat. Nam in multis conceptum adiuuat bis aut ter detractus 20 sanguis in an-

19 Hippoc. sect. 7. lib. 6.

20 Vt in mulieribus.

20 E mal-

leolo.

no, sed iis maximè, quibus præ copia sanguinis mē-
strua resistunt. Huius rei author est ²¹ Hippocrates. ²¹ *Hipp. li. de carnibus.*
Frequentissimum est, vt vel crassiore sanguine, vel ²² *Lib. de curad. ratione per sang. missionē, & libell. de tremore.*
alio, qui interceptis vteri venis resistent menses: qua
in re consilium est ²² Galeni, vt vena maleoli ape-
riatur. Tria vascula detrahūtur aliquot post diebus,
duobus, tribusve. Balneum imperetur, in quo cha-
mæmeli flores, origanum, maiorana, arthemisia, fo-
lia lauri, coniza, baccæ iuniperi & lauri, ²³ aliæque ²³ *Vt matricaria, nepeta, hyssopus.*
eiusmodi coxerint. Statis à balneo ²⁴ melicratum ²⁴ *Vt 2℥. decoct. puleg. & calamethi*
propinandum è pulegio, calamentho, & eiusmodi. ^{lib. 2. quibus adde mellis}
Alioqui nostro more syrupus de hyssopo, prassio, ^{3.3. hieme: astate 3. q. f. melicr.}
calamentho, de bizantiis, de duabus radicibus, aut
quinque radicibus ad 3. i. ℥. cum aqua cuscutæ, de-
cocto cinamomi, aut cassiæ liquore ad 3.3. propina-
bitur. Quòd si fortius volueris, castorei 3. i. aut eò
plus adiicies. Hac arte semper expertus est Galenus
moueri menses, vt nihil inde mulier læderetur. Cu-
curbitulæ pubi, inguini, interiori femori affigi de-
bent. Purgationes conueniunt ex hiera picra, quæ
hoc modo parari debet.

℥. 25 aloës succotrin. 3. 2. spicæ, cassiæ lignæ,
cinamomi, xyloaloës, radicis gétianæ, mastichis, a-
sari, cubebarum ana Gr. 6. Gr. 3. Omnia puluerifata
incorporentur cum modico conseruæ anthos, aut
borraginis, propinentur cum vino albo tenui. ²⁵ *Vel 2℥. ca- storei 3. i. dis- solve in vino albo, fiat po- tus. Mirifice cōfert de cie- dos menses. Ceterum ad obstrucka li- beranda, & materiā præ- parādā sic imperabis. 2℥. sabina, folio- rum M. i. cu- ius decoctio- ni adde sy- rup. de radi- cibus, aut ca-*
Secretum est quarundam mulierum, vt conser-
ua borraginis dissoluta in vino albo tenui. Potest
& pulueri hieræ aliquid agarici commisceri. Lau-
dantur & pilulæ elephanginæ, mastichinæ & simi-
les. Laudatur quoque hæc purgatio.
pill. ven. 3. i. ℥. propinetur.

24. Cassiæ fistulæ 3.10. pul. liquiritiæ 3. 2. croci
Gr.3. mellis anthosati 3. 3. dissoluē in decocto cice-
rum rubrorum. Vacuato & bene purgato corpore,
aliis remediis vtendum est. Suffitus ²⁶ aromatum
muliebria ducit. Fiunt autem cum baccis lauri, iu-
niperi, siccis herbis odoratis, cassia lignea, & aliis
eiusmodi.

16 Aphor.
28. lib. 5. Sūt
autem suffi-
tus, aromatu
cautē per in-
fundibulum
administran-
di. His enim
plerūque
sicca ventri-
culi intempe-
ries contra-
bitur, imo
vasa & co-
tyledones a-
durnantur.

Inseffiones, vt prius. Vbi biliosi & pingues hu-
mores sunt, petroselino, porro, apio, allis, smyrnio,
styrace, melanthio, fœniculo, vtrāque centaurea v-
tendum est, & ad suffitus & olea comparanda, &
pessulos. Laudatur & oleum de ben, de nuce mo-
schata, laurinum, de iunipero. Sunt qui genitæ flo-
ribus ad dimidium vas impleant, oleū chamæme-
linum superfundunt, fideliter obturatum vas simo
sepeliunt, aut reponunt in furno calido, sinūtque
effervesce: quo oleo inguina inungunt, & pes-
sulos madefaciunt.

Optimum est imperare decoctionem cicerum
rubrorum coctorum cum radicibus petroselini, vt
cum modico butyro iusculum paretur, cui, vt ferē
consuetudo, puluerem cinamomi, & tantillum cro-
ci insperges.

Laudantur aquæ absynthij, cuscutæ, pulegij, ca-
lamenti, menthastri, rubiæ tinctorum, sabinæ. Vi-
num album tenue, colatum per manicam Hippo-
cratis cum saccharo in aqua anthos dissoluto, &
tantillo cinamomi.

27. Conserua
borraginis in
vino albo dis-
soluta mirifi-
cē menstrua
& lochia
ciet.

Hermodactylos scribit Mesuæus non habere par
remedium in mouēdis menstruis, & foetu mortuo.

Fortes quoque sunt trochisci de myrrha.

24. 27 myrrhæ electæ 3.1. lupinorū optimè tri-

torum ʒ. ʒ. foliorum rutæ, menthastri, pulegij, cumini, rubiæ tinctorum, ferapini, opopanax ana ʒ. ʒ. Formetur troisci pondere ʒ. 2. Detur vnus manè cum aqua, in qua iuniperi semen coxerit. Vel.

ʒ. myrrhæ ʒ. 2. assæ foetidæ ʒ. ʒ. cinamomi Gr. 10. croci Gr. 2. cum aqua rubiæ fiant pilulæ. Fœniculi radix, melanthium, quod quidem præstantissimum est. Alij dant tryphææ sine opio ʒ. 1. cum decoct. cinamomi. Eodem modo mythridatium dari potest. In summa omnia, quæ magis calfaciunt, & siccant minùs.

Pessulus.

ʒ. olei moschati, vel alterius conuenientis ʒ. 2. pulueris gentianæ ʒ. 2. misce cum bombace moschato in eo madefacto, fiat pessulus.

RIIUSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Mulierum purgamenta per vterum quædã sunt multum inter se differentia, quæ tamen similitudine sæpe fallunt, vt species quædam hæmorrhoidum, *ῥέχια*, spermatis corruptela, muliebris purgatio, & menstrua. Nam ex ramo illo venæ cauæ duæ sunt propagines, quarum vna Syluio epigastria dicta, sursum ascendit per musculos rectos, ac mammariz occurrit. Paulò suprà altera propago ceruici vuluæ & ori inseritur, sicuti & sedì hæmorrhoids, vnde fit consensus vteri cum mammis ob viciniam, sursum ac deorsum fluente sanguine ex vtero in mammas, & contrà. Ab hac propagine posteriore interdum fluit crassior sanguis non aliter, quàm per hæmorrhoidas. Aiunt Virgines & grauidas hac viâ aliquando purgari. Quod certè in grauidis magis necessarium videtur post aliquod tempus, ob arctam illam colli vteri adstrictionem, quasi nodulis quibusdam accuratè & artificiosè à natura instructam, vt ne vi quidem spe-

*Mulierum
purgamenta
per vterum
varia.*

cillum emitti possit, & ob acetabula, è quibus sanguis destinatur alendo fœtui. In virginibus non tanta adstrictio. Quæ igitur fluxio fit ex iis venis, eam ad mēstruam purgationem vulgò referunt, cum tamen & partis, & vatorum, & sanguinis fluentis natura diligenter perspecta, hæmorrhoidum potiùs species quædam appellari debere videatur. Non enim nisi solo situ differunt, nisi dicas in grauidis veram esse purgationem mēstruam regurgitante illuc sanguine, qui in capacitatem vteri per venas è seminariis vasis expurgari debebat. Sed cum hoc non sit omninò secundum naturam & ex iis quæ rarò cōtingunt, id etiam cæteris, quæ vterū non gerunt, haudquam conueniat, nec ita certis & mensuris interuallis fiat, minùs id videtur consentaneum rationi.

*Menstrua
purgatio in
gravidis du-
plici fit mo-
do.*

Non ignoramus tamen veram purgationem mēstruam in grauidis fieri posse, sed diuerso modo, eoque duplici. Vno, primo mense per vteri capacitatem, quia adhuc osillius non ita constrictum est, cum etiam fiat superfœtatio. Altero, per alterum ramum spermaticæ iuxta hederiforme, quæ ad latera vteri descendit, & hypogastricæ occurrit. Sed vnicuique liberum sit vocare ut libuerit, curationem tamen eandem nō habere perspicuum est. Curatur enim fluxus huiusmodi eadem ratione, qua hæmorrhoides, præsertim quod attinet ad venæ sectionem. Nam retentis mensuris vena cruris secatur, hæmorrhoidibus suppressis interdum vena cubiti. Quod hic quoque obseruandum est. Proinde hi affectus distinctione opus habent: λεχια quoque distinguenda, tum quòd edito fœtu tantum prodeant, tum quòd comprehendat quicquid post fœtū & secundas exit à puerperio.

λεχια.

Sæpe etiam à spermatis corruptela salacibus, venere abstinentibus, viduis & similibus redditur humor quidam crassus, & veluti seminalis in vtero corruptus, vel sanguis grumofus, qui ad mēstruam purgationem nullo modo referri debet. Quarta fluxio est illa, quam vocant muliebrem purgationē, quæ quibusdam quotidie, aliis post mensem purgationem, nonnullis inter duas purgationes contingit, vel à toto corpore, vel affectibus vteri. In hac excernuntur quædam excrementa serosa, & veluti ichores sine dolore, & in maiore quantitate,
quàm

quàm pus ab ulcere. Quæ colore intelligimur modo ab hoc, modò ab illo humore vitioso separari. Nunquam enim fit absque cacochymia. Ponamus igitur præter has quatuor affectiones, Menses propriè dici, quos Græci *καταμύια* vocant, cum sanguis ille generationi & alendo foetui destinatus à natura ratis statimq; diebus semel in mense excernitur per venulas è vasis feminariis in vteri capacitatem, non quòd ab vtero trahatur, sed quia illuc mittitur siue lunæ cursu, siue alia quapiam providentia moderante. Vnde non sine ratione multi contendunt neque præter naturam esse, neque excrementitium, nisi sola quantitate.

Nam si qua in eo maleficia reperiantur, quæ Plinius recenset, ea corruptioni illius, & diuturniori in vtero moræ, cum è vasis propriis excidit, accepta referri debent, aut mixtioni vitiosi alicuius succi. Quod satius est, quàm duas illius partes constituere puriorem beneficam, & fæculentam veneficam. Neque enim probabile est hominem veneno concipi, conceptum veneno conservari in vtero: in lucem editum eodem ali, nisi iam dicere velis infantis corpus aut totum, aut magna ex parte venenum esse.

Sanz igitur mulieri (inquit Hippoc. I. de Morbis mul.) sanguis menstruus exit intervallis victimæ iugulatz sanguini similis, rubens. Effluit autem duarum heminarum Atticarum mensura. Quæ non, vt Fuchsius Aph. 30. lib. I. olei mensura æstimanda est, sed sanguinis, vt redeat circiter ad tres semisextariolos Lutetianos, natura tamen, ætate, & similibus perpensis. Id autem absolvitur duobus aut tribus diebus. Excessus & defectus in vitio est. Illinc tenues fiunt, foetus ematcescit, aut parum vitalis est. Hinc si videlicet, minus quàm tribus vel duobus diebus, & pauci, crassæ fiunt, nec facile concipiunt. Quæ plus habent sanguinis ad quinque, septem: quæ sanguinem crassum aut venas exiles, ad plures etiam purgantur. Initio verò & sine pauciores & tenuiores: intermedia purgatione plures & crassiores, præsertim vbi multi fluunt. Aristoteles cap. 2. 7. de histor. animalium moveri scribit decremento lunæ, & hec crescente colligi, vnde cavillo sexum fœmineum lunæ tribuunt. Aliter tamen

Menstrua non esse virulenta.

Menstruorum excessus & defectus in vitio est.

DE MORB. INTERNIS

*Mulieres quædam concipiunt, quâ-
nus menses nō
profundunt.* sæpe experimur. Idem quoque voluit mulieres quasdam
esse, quæ concipiant, etiam si non fluant menses, quibus
non plus est sanguinis, quàm aliis restat à purgatione.
Sed haud scio, an id ex principiis Galeni admitti queat.
Consultat tamen multas concepisse antequam passæ essent
menstrua. Naturalis purgatio cessat 45. aut 60. ætatis an-
no experientia & iusta ratione. Incipit 13. 14. quo tem-
pore cessat incrementum, & in quibusdam 20. ob pitui-
tam, & sanguinis paucitatem. Ex his intelliguntur, quot
modis menses præter naturam esse possint. Vel enim om-
ninò supprimuntur, vel immodicè fluunt, vel tempore
non conuenienti. Sanguis autem peccat in qualitate,
quantitate, aut consistentia. In quibus omnibus perue-
stiganda causa, & an ob id morbosæ viuant. Nam aliis
debetur curatio, aliis præcautio, aliis cōseruatio, vt pro
ratione quadam peculiaris téperamenti, aut causa mor-
bifica semel in mense multis, aliis sæpius, quibusdam v-
no mense intermisso, nonnullis tertio quoque mense
prodeunt. Supprimuntur, quia vel sanguis absumitur,
vel retinetur. Illud fit aliquândo in sicciore temperame-
to & calidiorè, in pinguibus ob pauci sanguinis in pin-
guedinem conuersionem, venarū angustiam, vnde etiam
non concipiunt, aut imbecillos pariunt. Id etiam fit in
longo morbo consumptis, lactantibus auidiores pueros,
viraginibus, exercitio multo vtentibus, sanguine in na-
tritionem conuerso. In quibus frustra naturæ repugna-
mus mouendis mensibus. Retinentur autem euerfione
vteri & distortionè osculi interioris, in quibus quoque
frustra mouemus menses: aut obstructione, quia sanguis
crassior, aut acetabula mucō plena, aut condensata sub-
stantia. Mœrore quoque suppressi etiam, quæ iam fluât,
& præ doloribus, certum est. Tunc sanguis ferè tertio
mense incipit regurgitare in hepar, caput, pulmonem,
totum denique corpus, vnde sequuntur iidem ferè mor-
bi, quos de hæmorrhoidibus diximus, vteri suffocatio,
difficilis spiratio, vel ob plenitudinem venarum, vel op-
presso corde ab humore in pericardio. Si diutius, quàm
par sit, suppressionem mensium ferant, vix curantur ob-
ductis & induratis meatibus. Immodicè fluentiū signum
certiss. certissimum est imbecillitas virium. Hoc fit, vt cæteræ

*Menstruorū
naturalis pur-
gatio quando
cesset.*

*Menstruorū
retentorum
causa.*

*Menstruorū
immodicè
fluentium si-
gnum certiss.*

fluxiones, nimia vasorum laxitate, ruptione, erosione ab acriore sanguine, imbecillitate partium, causâ externa, in abortibus fractis vasis, aut obstetricis vnguibus irritato vtero in partu, aut natura imbecilliore reddita ob violentiam, & similibus cæterarum fluxionum signis, exquirenda sunt. Sanguis qualitate peccat, si malè coloratus sit, quia, vt vult Hippoc. colore similis non est sanguini recens mactati animalis. Albi, saniosi, loturæ carniū similes, à pituita: pallidi, flauī & acres à bile: nigri, crassi, pauci à melancholia. Iam atra bilis est, cum, veluti acetum, terrâ effusi radunt, fermentant, & grauiter exulcerant. Alij carbunculo similes, caliginosi, acres, turbati, falsi, purulenti. Quò magis à naturali constitutione recesserunt, eò periculosiores. Fluxus albus proëctis magis: rubens iunioribus: fuluus vtriusque. Aristoteles vult puellis albos fieri, vnde extenuantur, præsertim si victu humidiorē vtantur, sicq; incrementum prohibetur. Alio loco saniosas purgationes & humidiores puellis: senibus paucas, nigras, quæ faciliè concrecant, media ætate medias. In quo non videtur consentire cum Hippoc. Vt autem ex sanguinis colore humor peccâs internoscatur exactè, Hippoc. iubet substracta arenâ in sole superfundī menses, aut linteo excipi & siccari. Nam biliosi pallidū: pituitosi mucosum, grumosum, pelliculosum, albidum colorem relinquunt. A melancholia nigri, valde splendidi, paucissimi. Sed anteacta vita, temperamentum corporis, ætas, omnia cōsideranda. Tardiores crassiore materia, pauciores dēsatione & præclusionē acetabulorum, osculi vteri: è contrario, plures. Sed & frequenti coītu copiosiores fiunt. In omnibus colores fœdi. Quod tamen vitium aliquando simplex est suppressis mensibus: aliquando affectis visceribus & corpore: nō nunquam malo naturali contracto ante tempus mensium. Quod ad curationem ab ægra sciscitari oportet.

In cachexia sanguis generandus: in obstructione medicamēta aperientia, sanguis ad vterū trahendus cucurbitulis circa emūctoria. Sanguinis missio ex talo, poplite, ligaturæ in coxis, frictions, linimenta, suffitus, vnguēta, syrapi aperientes, incidentes, attenuātes, pessaria nuptis,

DE MORB. INTERNIS

omnia tempore quo fluxuri sunt. Hoc præcepto perpetuò obseruato, in omnibus morbis, qui fiunt per cōsensum, partem primario affectam primo loco curandam esse, & causam sine qua non remouendam. In locum missionis sanguinis succedit catharticum: fit enim affatim & plus è corde educit, vnde virium maior deiectio. Sed longè utilior. Vomitu & narium profusione leuantur à natura. An id medico imitandum? Ad redundantem sanguinem respicienti licet: ad menses mouendos, minimè. Nisi suppressis mensibus oriatur morbus, qui venæ sectionem requirat è superioribus. Tunc vena secatur è cubito. Vt enim natura viis interclusis per oppositas partes, aliquando per vicinas multitudinem vacuat: ita licebit aperto cubito multitudinem tollere, & morbo mederi, malleolò secto, sanguinem trahere. Neque naturę imitator semper esse debet medicus, sed minister, in quibus ipsa nihil potest, vt cucurbitulis affigendis, ligaturis, vene sectione. Natura verò id quod commodius est, sequi solet in iis quæ potest. Cum itaque viæ per venas brachij apertas non patèant, alias, quas sequi potest, aperit. Contraria omnia fiunt in sistendo. Reuulsio sanguinis missione è mediana: cucurbitulæ in circuitu mammarũ, ligaturæ in brachijs potius, quàm digitis, quia per plures venas fit attractio, & iter breuius.

*Medicus non
semper natu-
ra imitator.*

ANTO. VALETII EXERCIT. LVIII.

TRiplex mulieres exercet fluor, mēstruus vnus, in partu alter, tertius inordinatus qui quoniā proprium nomen nondum est adeptus, muliebris fluor vulgò nuncupatur: in quo quod excernitur, aliàs albicat, pallet aliàs, nunc alium colorem, pro cacochymia laborantis corporis, seque per vterum repurgantis, refert. Menstruus, si moderatus, naturalis est, & sinendus: at vbi exuberat, sistendus. Eodem enim morbos, quos sanguinis per hæmorrhoidas largior profusio, infert. Quanquam &

*Hippocr.
aph. 57. lib. 5.*

hæc affectio interdum sine noxa accidit, ociosis præsertim & sedentariam vitam agentibus, quæ victu sese inuitant copiosiore. Quantitas legitimæ purgationis menstruæ moderata erit cheopinæ vnius, aut duarum, pro cuiusque mulieris propria natura. Si maior est, & plurium dierum, symptoma est ex genere immodicè excretorum; non toto genere præter naturam, sed multitudine, vel qualitate. Fluxionis verò huiusmodi tres statuuntur causæ, fortis virtutis ratio, cum vterus sit à natura fabricatus ad corpus expurgandum: humor, vel multitudine, vel qualitate praua, acri videlicet & stimulante, peccans: membrum propter vasorum nimiam imbecillitatem, vel compositionem, læsum apertis scilicet, vel reſeratis, aut erosio osculis venarum. Itaque optimè curatio ut suscipiatur sanguinis quantitas consideranda, excretionis modus, necnon qualitas ipsa, obseruatis linteis quibus excipitur, ut intelligas an per anastomōsin, an per diaurosin, an per diapedesin vacuetur. Fluxus immodicus reuulsionis indicationem præbet. Vnde Galibid. & lib. 13. Meth. opportunè vena cubitum perreptans (partita interrim sanguinis missione) incidetur: cucurbitula magna sub mammis defigetur, ventri deinde medio. Interim austera & refrigerantia edulia plurimum iuuabunt. Mox propinabitur hoc medicamentum.

℞. myrobal. citr. 3. 3. coquantur in aq. plantag. & ros. In expressa colat. dissol. rh. elect. puluerati 3. i. syr. ros. sicc. vel cydon. 3. 6. vel 3. f. f. potio.

Quia verò biliosus est, ut plurimum, sanguis, syrup. zulapiis, opiatu temperandus. Ut.

℞. aq. ros. & plantag. ana 3. 2. syr. myrtill. 3. i. tro-

DE MORB. INTERNIS

chisc. de carab. 3. i. f. zulap. Vel. ʒ. aqu. ros. & anogloss.
ana 3. i. diacod. sine specieb. 3. i. f. pötio. Detur hora
somni.

Opiatæ hunc in modum concinnantur.

ʒ. conferu. ros. viol. & symphyti ana 3. β. semin.
portul. plantag. corall. rub. ana 3. β. bol. arm. rasur. ebor.
& corn. ceru. vsti ana ʒ. i. cum syrup. myrtill. aut ros. sic-
car. f. opiata.

Hûc quoque facient myrobalan. conditæ, gra-
na quoque berberis condita. Vbi suspitio fuerit ca-
lidioris hepatis copiosiore & calidiorẽ sangui-
nem generâtis, admouebitur epithema, ex aquis re-
frigerantibus, pulueribus trium santalor. ros. rub. &
boli armenæ, pauca caphura addita. Iuuabit etiam
emplastra adstringentia lûbis & pubi instituere. Vt.

ʒ. emplastr. contr. ruptur. & vnguent. Comitiss. an. 3. 2.
cum oleo myrtill. f. emplastr. pro lumbis & pube.

Erunt & ex vsu iniectiones in vterum, qualis
hæc esse potest.

ʒ. plantag. absynth. tapf. barb. ros. rub. ana M. i. ba-
laustior. calic. gland. querc. ana p. i. f. decoct. In 3. 3. cola-
turæ dissolue pulu. mastich. & trochisc. de carab. vel de
terra sigill. ana 3. i. f. clyster metrenchytes.

Vel ad eundem scopum comparantur pessuli è
pulueribus corall. rub. hæmatit. sang. dracon. bol.
armen. linamento, gossipio, aut re quapiam tali, in
vnguentum commodum demersa, excipiendi, dei-
de panno tenui integendi, vt in vterum indantur.
Vulgaris puluer. quantitas est 3. β. Paratu facilius e-
rit pessarium ex semima nipulo cõuenientis herbæ
leuiter tritæ, & (vt antè) tereti linteo inuolutæ. Inte-
rim si fractæ appareant vires, roborabuntur stil-
latis instauratis. Vt.

ʒ. conferu. antiq. ros. 3. 3. conferu. symphyt. & carn.
cydon. ana 3. 2. granor. berber. p. 2. femin. portul. acetos.

citr. card. pap. alb. an. 3. 2. specier. diamarg. diarho. Abba.
& triasantal. ana 3. 3. aq. plantag. arnogloss. portul. & ros.
an 2 3. 4. decocti vnius capi cum multa oxalide alterati
lb. 2. adde carn. pullor. 2. vel perdiculor. cum mica panis
alb. f. distillatio lento igne in alembico, vel diplomate.
℥. prædict. distillat. lb. 8. sacchar. ros. 3. 2. cinamom. 3. 8.
traiciatur per manicam Hippocratis.

Accidit etiam, vt supprimantur menses: quorum
secundum naturam eruptio vt melioribus sit natu-
ræ rebus, ita retentio præter naturam maximo est
detrimento. Suppressionis illius causam triplicem
assignat Galenus: priorem quidem partium ex-
purgantium imbecillitatem: angustiam vasorum
alteram: tertiam vitium sanguinis, crassi, lenti, mul-
ti, pauci. Quibus addi potest vitium corporis totius
à diuturna exercitatione, morbo præcedente, tenui
victu, aut per alias vias reuulsione & deriuatione
facta. Imbecillitatis parens est intemperies: angu-
stia obstructio, vel tumor præter naturam ab hu-
morum defluxione: obstructionis crassities, aut te-
nacitas humoris, aut cum aliquid, velut germen,
vasi adnatum est. Cùm autem tot sint *τρόποι* *ἰά-
σεως*, quot morborum ideæ, cognito per suas cau-
sas morbo, non difficile fuerit indicationes curati-
uas, atque medicamentorum euporiam venari. Sed
imprimis aduertendū, quibus cieri menses debeāt,
quibus minimè. Non enim ante tempus à natura
definitum, vt ante annum 14. aut circiter, & post 45.
aut circiter, citantur: non iis quæ vtero gestant, aut
quæ lactant: non quibus laboriosa vitæ ratio inita,
& quæ à suppressione nihil mali persentiscunt: non
tenuiter viuentibus, præpinguib. à morbo diutur-
no conualescentibus: nec ante solitum tempus,

*Suppressionū
mēsum cau-
sæ ex Galen.
cōment. 2. in
libr. de Hu-
morib.*

*Menstrua
quomodo &
quibus mo-
uenda.*

*Mēstrua ſup
preſſa quā
grauia infe-
rant incom-
moda.*

Curatio.

quo natura ad excretionem ſeſe componere con-
ſuevit. Tum verò prouocantur potiffimū, cum
grauia inducunt incommoda, tabem, ſædos colo-
res, lipothymiam, vertiginem, deiectam appeten-
tiam, dyſpnœam, hydropem, articulorum cruciatū,
dorſi & lumborum dolorificam grauitatem, quæ
nephritidem, ventris tormina, & colicum ementi-
tur affectum. Initio igitur, poſt aluum clyſtère aut
cathartico ſolutam, ſecabitur cubiti vena in pletho-
ra, aut obſtructione vaſorū, ne fluor ſequatur lar-
gior, quā vt liſti poſſit, ſi in poplite vel talo ſece-
tur, vel vt imminuatur & reuellatur ſanguis, qui
copia ſua obſtructionem fouet. Ad prouocationem
& vacuationem tum deinde in vtrōque poplite, vel
malleolo, vena aperietur. Reliqua autē materia ad
faciliorem euocationem apparabitur zulapiis, apo-
zematis. Vt.

℞. radic. comm. aper. in aceto temperatar. ana ʒ. i. rad.
rub. tinct. ʒ. ſ. ſabinæ, nepetæ, puleg. abſynt. menth. hyſſ.
arthemiſ. ana M. ſ. ſemin. petro. ſcœn. apij ana ʒ. i. ſemin.
end. portul. cucurb. melon. ana ʒ. i. ſ. flor. cardiac. genift.
& anth. ana p. ſ. f. decoct. ad lb. i. In colatura pro doſib.
ʒ. diſſol. ſyr. de arthemif. capill. ven. & de quinq. radic. ana
ʒ. i. f. apozema clarum, conditum cinam.

Ex iisdē ſyrupis & ſimilibus cum aquis apij, ſcœni.
aut cicer. rubrorum decocto diſſolutis zulapia pa-
rantur. Purgatio ſequetur.

℞. polypod. quern. gram. petro. rub. tinct. ana ʒ. i. ti-
chor. cum toro, agrimon. ana M. i. ſemin. anif. ſcœnic. apij
ana ʒ. i. flor. cardiac. ana p. i. f. decoctio, addendo ſub finē
folicul. ſennæ mund. ʒ. ʒ. In colatura infunde rhei elect.
ʒ. i. ſ. agar. troch. ʒ. ʒ. cinamo. ʒ. i. In expreſſione diſſol.
ſyrup. laxatiui roſ. pallid. ʒ. ʒ. f. potio.

Instante iam iam menſtruorum tempore balneū

utiliter imperabitur, ex origano, calament. arthem. matricar. parietar. florib. chamæm. melil. Vel decocto eorundem fouebitur imus venter, ilia & lumbi, adhibito deinde litu ex oleo liliaceo, aut irino. Repetenda quoq; venæ sectio in malleolo, altero, aut vtróque, cucurbitulæ interiori crurum parti affigendæ. Iniectiones in vterum, aut etiam pessaria hûc reuocanda.

℞. succ. mercurial. depurati, vel decoction. rub. rinet. ering. vel cyclam. vel radic. comm. aperitiuar. vel saluiz, matric. nepetæ ʒ. 3. pulu. melâthij ʒ. 2. f. iniectio in vterû.

Talis tamen acrior iniectio virginibus viros non expertis instituenda non est, sed potiùs secessus, aut suffitus. Pessarium verò sit huiusmodi.

℞. radic. ireos, cyclam. ana ʒ. 1. myrrh. elect. castor. ana ʒ. 1. sem. rut. melanth. ana ʒ. ʒ. Ex his omnibus fit puluis, ex quo terebinthina excepto fingitur pessus.

Ex semimanipulo mercurialis parû trit. & hier. simplic. & mythrid. ana ʒ. ʒ. granis aliquot moschi additis, f. etiam pess. Non omittenda cardiaca ad vires reficiendas capienda: conseru. bugloss. melyss. borrag. cort. citr. cond. ther. vet. mythrid. aut ex his & speciebus diamarg. trochis. de myrrh. rasur. eboris & cornu cerui cum syrupo limon. fingenda cõdita. Cæterùm fluor muliebris, qui ferè pituitosus & ferofus, purgantibus, sudores mouentibus, aut vrinas, sanescit. Lochia verò seu purgamenta à partu, eandem, quam menstrua, poscunt curationem.

De vteri 1 præsocatione.

C A P. 59.

Multa ad hanc rem ex capite 5. lib. 6. de locis affectis, & Aëtio colligenda sunt. Vocatus in paroxysmo primùm an 2 viuat mulier,

1 De suffocatione hysterica, quam alij stragulatione appellât.

2 Interdum enim mortua similis videtur, quòd spiritû non ducat.

3 *Ab impeditis respirandi instrumentis.* cognoscendū est. Nam sæpe fit, vt grauiore 3 accessione intereant, aut non aliter iaceant, quàm mortuæ. Infidele est signum vitæ, quod floccis naribus admotis, vel vase pleno aqua imposito regioni stomachi, colligitur. 4 Sternutatoriis potius de vita cognoscendum. Secundum est, vt causam cognoscamus. Causæ sunt, menstruorum suppressio, spermatis corruptela in nubilibus, virginibus, viduis, & iis mulieribus, quæ natura sunt salaces, & præter consuetudinem non miscentur viris. Aliquādo humor quidā crassus, & veluti seminalis, vtero 5 collectus corrumpitur. In tali causa præfocationis vteri in paroxysmo extremorum vincula, 6 frictiones maxime crurum ex sale & aceto, vel similibus. Odorata 7 vtero: grauius olentia naribus admouēda sunt. Malè olentia, vt castoreū, galbanum, 8 gagates lapidis, capilli hominis, assa foetida, plumæ crematæ, cornu cerui, cornua reliquorum animalium cremata, euphorbium. Quæ omnia excipi possunt pice humida, vel in puluerem redacta galbano, & rebus eiusmodi. Huius rei causam repetes ex proble. 60. Aphrodisæi. lib. 2. Odorata verò, quæ vtero admoventur, ziber, seu ciueta, bombax moschatus, aut gossipium moscho conspersum, oleum moscho perfusum, gallia moschata, alipta moschata, caryophyllum, & similia.

¶ aliptæ moschatae ʒ. 2. ligni aloës, caryophyll. ana ʒ. ʒ. aut ʒ. i. moschi, ambræ ana Gra. 3. excipiātur oleo de spica. Aliud.

¶ galliæ moschatae ʒ. 2. cinamomi, folij, macis, caryophyll. ana ʒ. i. ambræ, moschi ana Gr. 3. labdani, styracis ana q. l. cum aqua rosata moschata fiat.

veluti suppositorium, quod indatur genitalibus. Pulveres eiusmodi aliquādo inspergimus oleo costino, de spica, lautino, de lilio, vt inde intinctis digitus 9 obstetrix affricet os vteri in virginibus: in aliis etiam interiora. Et vt à paroxysmo excitentur, vellicandæ aures, nares, sed maximè pili, qui pudendis adnascuntur. Aliquando etiam piper, zinziber, sal gemmæ, & alia eiusmodi pudendis immittuntur, vt naturam irritent ad excretionem. Et quia magna ex parte plenæ sunt ventorum, glandulis, clysteribus, vnctionibus, quæ flatus discutiunt, vtêdum erit ex capite de colico dolore.

9 Vide Galenum cap. 5. lib. 6. de locis malè affect.

Excitatis à paroxysmo nullum remedium melius marito. Alioqui si retenti menses in causa sint, emouere oportebit ex proximo capite. Et si humor crassus, purgationes conueniunt. Imperabis igitur hieræ diacol. ʒ. 4. aut infusionem ʒ. i. ʒ. agarici trochisc. vel ʒ. 2. pulueris hieræ picræ. Alioqui.

ʒ. terebinthinæ lotæ in aqua matricariæ ʒ. ʒ. femin. dauci, agni casti, cinamomi ana Gra. 8. cum modico conferuæ anthos fiat bolus. Aliud.

Remedia clysterica suffocationi, quæ fit à seminis corruptione, dicata.

ʒ. terebinthinæ ʒ. 3. agarici trochiscati ʒ. 2. feminis dauci, cannabis, ligni aloës an. Gr. 8. cum eadem conferua fiat bolus.

Purgationes per interualla repetendæ sunt, sed paulatim imminuto modo. Laudatur castoreum per interualla datum. Hoc autem variis modis vtuntur. Nam in paroxysmo dissoluimus in aceto acerrimo, & naribus admouemus, vel eius ʒ. 2. aut ʒ. i. exhibemus cum aqua distillationis radicū dauci, vel arthemisiæ q. s. Acetum scylliticum, vel in quo

DE MORB. INTERNIS

pulegium, calamentum, thymum, origanum, coniza coxerint, naribus admotum, vel etiam potum adiuuat, etiam si vterum lædere videatur.

Laudatur ab antiquis succus & semen plantaginis. Cinamomum, lignum aloës, semen dauci, cannabis, rutæ, agni casti, radix nimpheæ, & quæ semē extinguunt. Vomitus, sternutatio, cucurbitulæ, primum quidem inguinibus & coxis, deinde ilibus cum multa flamma affixæ. Hypochondria quoque fasciis deligata & constricta. Glomeres filii anethino feruenti, inculcati & calidi alternatim appressi pectini. Laudatur pulvis conchulæ, seu blattæ byzantiæ, & pectunculorum.

Post alia quoque remedia dropaces & sinapismi extremæ spinæ & ventri appositi. Balnea naturalia, frequens coïtus, vinctio ex oleo dulci, in quo semen agni casti, cinamom. confracta omnia coxerint, ut eo fumen & lumbi inungantur. Adicitur aliquando pyrethrum, piper & similia. Sed ineunda ratio habitus corporis, temporis, anni, & reliquorum. Similiter clementer agendum est cum prægnantibus.

10 Nunquā
enim venam
secabis in suffo-
catione hy-
sterica à se-
minis corrup-
tione.

Quod ad phlebotomiam attinet, 10 suspectum remedium est, nisi cum suppressi sint menses. Tūmque eo modo, quo in mouendis mensibus. Si quidem nigella mulier est, malleoli venam phlebotomo aperies: sin alba & mollis, vel scarificatu, vel sanguisugis uteris.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Υστερὸν πῖς, Græcis dicitur vteri suffocatio, cum uterus sursum ascendit, vel quia inflatur & intumescit, vel quia plenis venis, quæ ad vterum pertinent, reuellit: in qua

passione, sine motu, sine sensu quasi mortuæ iacent, frequentiusque viduis & malè purgatis ac sterilibus accidit & iuueniculis ad venerem procliuioribus. Vnum commune symptoma est, defectus respirationis, non quòd strangulètur, vt inquit Galenus, quia nihil est, quod spiratione intercipiat, sed quia ita inflatus vterus primum intestina, deinde mutuo contactu ventriculum & diaphragma comprimit adeò, vt dilatari nequeant. Atque ob id non loquantur, quia aëris satis non attrahitur, aut extrà propellitur. Alij id referunt ad frigiditatem humidi & frigidi seminis totum corpus refrigerâtis, vt sic transpiratio per poros illis sufficiat. Quanquam in nonnullis hæc constant, & ratio, pulsus languidus, exiguus, & aliquando nullus. Sed quia vterus maximum cum corde per arterias habet consensum, cum cerebro verò per spinæ membranas & neruos, horum membrorum actiones variè læduntur, admirandæque subsequuntur symptomata, præsertim sublato tetro vapore sursum ex causa coniuncta ipsius affectus. Cum accessio imminet, torpor mentis, pigritia, crurum imbecillitas, pallor, quidam faciei. Hinc sopor grauis, mentis desipiëntia, sensuum interceptio, ἀσύνετα, crurum contractio & similia. Quibusdam risus, aliis lachrymæ, aliis vtrūque, vt D. de Rochepot: quæ cum varicosa esset, eo affectu corripiebatur cum delirio, risu, lachrymis, contractione oculorum. Alteri risus, deinde perturbatio mentis: hinc lachrymæ, à quibus etiam monitæ non cessant. Sed nihil admirabilius, quàm quod duabus filiabus Præsidis Rhotomagensis contingere solebat in motu sursum vteri, quo interuallis laborabant. Risu enim longo ad horam, & horas duas imminente paroxysmo capiebantur, quem neque metu iniecto, neque hortatu, neque aliis artibus poterant compescere. Parentibus interrogatæ & obiurgatæ respondebant se non posse continere risum. Aliis prius lachrymæ, deinde risus mouetur in eodem affectu. Sunt quæ magnam ducunt respirationem, in quibus necesse est nullam fieri compressionem stomachi & cordis, sed materiam aliò ferri. Inclinate accessione humiditas quædam è locis muliebribus prodit, ventris strepitus, laxatio vteri. Circuita quodam redit morbus, hyme præ-

*Vteri affecti
varia sympto-
mata, ob par-
tium, quibus
cum cōsentit,
sympathicā.*

DE MORB. INTERNI S

*Suffocationis
hysterica
causa.*

serim & Autumno. Causæ sunt refrigeratio vteri, spermatis corruptela, humor quidam crassus, & veluti seminalis in vtero corruptus, grumus, menses suppressi, lævigatus & nimium vacuatus vterus. Sic enim ad loca humida sese conuertit, & è capite ac reliquo corpore immodico labore siccatus trahit. Id quoque grauidis fieri potest inopiâ alimenti sicciore facto vtero, & concalfacto labore. Eodem modo è defluxione pituitæ à capite in præcordia, & impedita respiratione, vtero ad humiditatem concurrente. In remediis hæ omnes causæ distinguendæ. Alij aiunt vacuato vtero, vt per immodicam mensium fluxionem, aëre vterum repleri, & ita inflari conuiiente collo. Gratis etiam odoribus ad nares quibusdam ascendit.

*Suffocatio
vteri quando
cesset.*

Præfocatio vteri cessatione mensium naturali 45. anno, vel 50. vel cessat, vel ingrauescens interficit. Discernitur primùm à syncope, pulsu, sudore, pallore, odoribus admotis. Nam hîc pulsus est aliquis, licet languidus, sudor frigidus nullus, minor pallor, & odorata nocent, nisi admoveantur inferioribus. In syncope contraria omnia. A Catalepsi verò, quia rigor nullus, aut refrigeratio, qualis in corpore gelu cōcreto, nec oculi aperti, & similia. Ab apoplexia, sensu. Sentiant enim, cùm punguntur, licet obtusè. Ab epilepsia, quia corpus non concutitur. A flatibus fieri intelligimus, cum venter intumuit.

Remedia sunt, odores foetidi sursum admoti, vt bituminis, castorei, galbani, picis liquidæ, pilorum combustorum, ruthæ, cæparum, aliorum: grati verò deorsum, vtero, vel ad coxas, ligaturæ dolorificæ in inferioribus partibus, cucurbitulæ in inguinibus, pessaria trahentia, emplastrum ceroneum. Vbi frigiditas & inde dolor, cōfectio Neræ, quæ etiam cōceptum iuuat, pretiosissimum suffumigium.

ANTO. VALETII EXERCIT. LIX.

PRæfocatio ab vtero vehemens est totius corporis refrigeratio, cui causa continens vapor malignus ab vtero sublatus. Materia, ex qua effertur va-

por, semen, vel menstruum, putre, suppressum, mola, humores prauī, vteri abscessus. Pro magnitudine causæ, & partium vtero consentientium læsione varia insurgunt symptomata. Hinc ægra nunquam sensu & motu priuatur, sine euidenti respiratione & pulsu: aliàs illæsa ratione manente, animi deliquio concidit, & respirat difficulter: aliàs conuelluntur haud aliter membra, atque in epilepsia. Paroxysmus primùm tollendus: deinde, vt ne recurrat, prouidendum. Et quia vapor teter mali huius author sursum contendit, & vteri distensio à repletis vasis compressionem diaphragmatis, à qua præfocatio, molitur, vsurpanda sunt, quæ spiritum vitalem, animalémque vehementer moneant, atque vterum ipsum deorsum pellant. Itaque frictiones fiunt extremarum partium, plantarum pedum, manuum, ex sale gemmæ in aceto dissoluto, coxarum ligaturæ dolorificæ: cucurbitulæ inguini, iliis, lumbis, pubi, carnosæ tibiæ parti aptantur. Fumus rerum graueolentium naribus captus, expultricem facultatem stimulando præsentī est remedium. Vnde & sternutatoria è castoreo puluerato, aut helleboro, in nares indito, quàm citissimè opitulantur. Allio cocto & expresso additur tantillum aloës, eo imbuitur vmbilicus magno successu, quorundam opinione. His accedent propiora remedia, linimenta in collum vteri indita, si mulier virū iam sit experta: suffitus aromatum, si virgo sit. Linimentum erit ex olei moschati & nardini ana vnc. i. nuc. mosch. styrac. calamith. & ligni aloës ana 3. s. cera addita pauca. Suffitus ex pulueribus aromatu, benzoini, calam. arom. maioran. & simil. in trochi-

Hippo. lib. i. de morb. mulier. ad finem lib. de loc. in hom. Et Gal. cap. 5. lib. 6. de loc. affect.

Suffocationis hysterica curatio.

DE MORB. INTERNIS

scos ex aqua arthemisiæ cōpactis. Vbi ægra paroxysmo liberata, cardiacis recreabitur: tum verò emplastrum de galbano cum pauco moscho vmbilico apponetur. Cæterum quia dæmonij hoc genus (vt dici solet) non nisi ieiunio multo eiicitur, vitandus erit vsus ouorum, carniū, vini, & eorū quæ multum nutriunt, & semen augment.

Ad Rhagadas. CAP. 60.

1 Vt hæ partes dehiscant peride ac callosa Aquilonia tempestate manus.

2 Ad infringendā sanies ærimoniam, & vlcus detergendum.

3 Vel vnguēto diapopholygos: itē ex cerussa, pōmpholyge, adipe suillo & aqua plantagin.

Rhagades vlcera sunt 1 ani & vteri deducta in fissuras. Sed alia humida & saniosa, alia callosa, nonnulla canctosa & feruida. Saniosa primum 2 ablues sero lactis; mulla: deinde consolidabis tetrapharmaco in rosaceo dissoluto, medicamentis è lithargyro 3 chalcitide, & metallis. Callosa remollies æsypo humida, radice lilij, iride Illyrica, quam excipies terebinthina. Alioqui vitellum oui assum cum lacte muliebri subactū impones. Vbi feruet & cancri suspitio.

℞. cerussæ lotæ, tuthiæ præparatæ & pulueratæ partes æqual. misce. Aliud.

℞. succi portulacæ, lactucæ, plantaginis, psilij, horum vnius 3.3. Agitentur in plumbeo mortario pistillo plumbeo ad crassitudinem. Aliud.

Valebit etiam ceratū rosaceum Galeni cum succo solatri, vnguentum de cerussa, de plumbo, quibus tuthia lota & infriata commisceri debet.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Peridæ fissuræ, vel rimæ, quibus partes musculosæ veluti proscinduntur, vt labra quandoque & manus ex vehementi

hementi frigore. Nascuntur ex difficili partu, & violento coïtu: in ano ex vi aliqua. Aliquando in causa est humoris acris affluxus, aut condylomatum inflammatio & distensio, rupta cute. Hæc vlcera vel saniosa sunt, vel callosa, vel cancroſa.

Conueniunt, diapompholygos Nicolai mollium liquido cerato roſaceo, vbi callus eſt, mucagine & adipibus emollientibus: ſi calor eſt, vitellus oui, ſuccus cancrorum, plantaginis, clymeni, vnguentum de cæruiſſa, de plumbo, lithargyro, & ſimilia.

ANTO. VALETTI EXERCIT. LX.

Rhagades hiãtia ſunt vlcuſcula, acrium humorum decubitu accepta ferenda. In quibus ſanies cumulat, deterſio ex hydromelite ineunda. Callum ſi contraxerint, cū medulla cerui, oleo liliorum & cera emolliuntur. Si calor in parte adest, huic oleo roſaceo, vel vitello oui aſſo cum lacte muliebri ſubactio ſubuenitur. At vbi cancroſa labes inuri, cœpta eſt, vnguentum de plumbo, & ſimilia vſui ſunt. Cum interna ſunt id genus vitia, iniectiones ſiunt ex aqua hordei cum melle roſaceo. Vel ex ſeri lactis 3. 4. olei roſ. 3. 2. tuth. præparat. 3. 8. alumin. 3. 2. in mortario & piſtillo plumbeis ductis fit vnguentum, cuius portio in aq. hordei diſſoluta iniicitur.

1 Rudior, in digeſtione moles in utero ex ſeminis vitio, ſive eſta ſæta vi, & ſanguinis meſtrui largiore affluxu cœcepta. Hippoc. lib. de Sterilibus.
2 Aristot. c. 7. lib. 4. de gener. animal.

De mola.

CAP. 61.

Mola cruditas quædam eſt, & ¹ coagulatio materiæ, quam naturalis calor conformare non poteſt, vixque ² curatur. Utendum tamen eſt primū quidem mollientibus, ex capite de ſcirrho: deinde iis, quæ partum eiiciunt, & ſcœ-

DE MORB. INTERNIS

tum mortuum excludunt, quales sunt trochisci de myrrha, hermodactyli, & alia eiusmodi. Deinde opus erit manu chirurgica: vt nonnunquam speculum matricis adhibetur.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Ea est naturæ providentia, vt calor opifex & formator eorum quæ generantur, nunquam sit otiosus, sed quamlibet materiam in opus aliquod miro artificio ducat, quaecunque tandem sit. Sic Aristoteles in putredine vermes generari scribit, cum humidû substantificû, in quo calor insitus est, dissolvitur, & extrâ, calore externo illectum, effluit. Tum enim calor in exitu, ne proprio subiecto deserto intereat, quicquid est benignioris materiæ colligit, eamque effingit in animalculum aliquod, in quo conseruari queat, pro quantitate & qualitate illius materiæ, ex qua nihil maius efficere potest. Quod si eam quasi pro arbitrio tractare non possit, quia aut copiosior, aut minore copia, aut ex diuersis generibus constans, minusque sequax, monstrum generat, siquidem aliquid perfectius non licet. Sin inepta omnino sit, aut herbam, aut aliquid adhuc rudius efformabit, inducta quàm maxima fieri potest, perfectione. Naturæ enim, quæ in perpetua indiuidui successione continuatur, longè satius est creare aliquid, quàm nihil. Hoc idem nostra quidem sententia in vtero generationi à natura destinato fit, à spiritu illo gignituo & calore, quem non sine ratione sui domicilij architectum veteres Philosophi appellârunt. Materiam enim conuenientem & tractabilem si repererit exvtriusque sexus semine, fœtum pulcherrimum ad vtriusque exemplar diuinitus fabricatur, aut vni magis, quàm alteri similem, pro ratione materiæ & viribus imaginatricis facultatis, tanquam optimi moderatoris. Si verò ipse imbecillior sit, materia autem subiecta qualitate, quantitate, consistentia, aut mixtione alicuius extranei, vt sanguinis crassi, aut alterius succi vitiosi ineptior ad tantam perfectionem, aliquid tamen, ne nihil, generat, siue ani-

matum, siue rude & expers vitæ. Vidimus mulierem, quæ cum nouem mensium spatio vterum gestâset, omnibus, quæ in legitimo partu euenire solent, mirificè respondentibus, tandem nihil aliud præter animalia quædam ranis haud absimilia cum multis purgationibus eruentis & corruptis in lucem edidit: aliam, cui carnea moles informis exiit cum foetu, veluti superfætatione quadam. F. Valeriola multas protulit & admirandas in huiusmodi partibus obseruationes, maximèque curationem de mola, cui partus quatuor mensium erat alligatus, cum ipsa iam pro vero foetu nouem menses in vtero latitâset. Qui quia materiam hanc copiosissimè & doctissimè tractat, longiori demonstrationi supersedendum putamus, summam generationis tantùm complexi. Primum carnem hanc informem, & tanquam exiguum quoddam chaos non eodem modo, quo vermes, in vtero generari à calore tantùm coquente, & humore crasso ac viscido, sed ex semine & viri, & mulieris efformari à spiritu illo gignitiuo, indicio sunt membranz, quibus aliquando integitur, ligamenta, superfætatio foetu alligato, incrementum, motus quidam tremulus cum tumore vteri. Quæ omnia concepti foetus speciem per initia exhibent. Neque vnquam quisquam sine coitu concipi obseruauit. Causa igitur efficiens erit spiritus ille, qui opificis vices gerit: materia, semen cum multo crasso & spisso sanguine menstruo concreto & indurato: vel (vt ait Hippocr. de Sterilibus) morbosum semen viri & modicum, cum mensium copia: forma, modò perfectior & animata (nam & animalia illa speciem quandam molæ, quòd eodem modo, iisdemque de causis generentur, esse putamus) modò rudior & expers vitæ, licet augeatur & increseat. Galenus scribit foetum ita informari in vtero, vt primum viuat tanquam planta: deinde vt brutum: postmodò vt homo: non quòd tot simul formæ in homine contineantur, tanquam Geryone quodam, sed quia cum quatuor sint naturæ perfectiones, esse nimirum, vt in elementis: viuere, vt in plantis, sentire vt in animalibus, & intelligere, vt in homine, posteriores prioribus continentur, vt numeri minores maioribus. Vt enim vnitas

*Mola sine
coitu non concipitur.*

DE MORB. INTERNIS

non est binarius, neque binarius est ternarius, binarius tamen continet unitatem, & ternarius binarium: ita quod essentiam duntaxat habet, necesse non est ut viuat, neque quod viuit, ut sentiat, aut quod sentit, intelligat. Quod tamen intelligit & sentit, ut homo, necessario & in rerum natura coheret, & viuit. Atque hæc vera ratio est cur veteribus homo *μικροκοσμος* dicatur. Eius enim forma cæterarum omnium perfectionem complectitur, siquidem essentiam cum elementis, vitam cum plantis, sensum cum animalibus, intelligentiam cum formis diuinis habet communem. Cum igitur natura ita progrediatur, non ut ex specie aliam speciem procreet, ut ex planta hominem, sed formam perficiat gradatim ascendendo, haud absurdum fortasse fuerit, neque à Galeni sententia alienum in hac portentosa generatione idem fieri. Primum enim rudis quædam moles gignitur, in qua si natura vitio materię, quasi in itinere, intercipiatur, consistit, neque aliud quicquam addit. Sin ulterius nullo vitio repugnante progrediatur, paulatim perficit, ut iam videatur stipes, deinde animal. Cuius pro materię quantitate & temperamento variè figura immutatur, & corporis effigies. Hinc fortasse ex molis alię rudiores, alię propius ad legitimum fœtum accedentes, alię variis animalium imperfectorum figuris effictę conspiciuntur. Finis autem semper est generatio humanę naturę, ad quam perfectionem diuina facultas corporis nostri architectatrix, vteri vitio, colluuię humorum, materię ineptitudine, & caloris imbecillitate præpedita, peruenire non potuit, nonnunquam etiam alterato optimo semine ab aere externo, aut vteri intemperie, ut frigore. Locus generationis huius præter vterum nullus est. Tempus & reliqua ferè omnia, ut in legitimo partu. Hinc fit, ut in principio à vero partu distingui non possit. Menses supprimuntur, vterus attollitur, nausea & vomitiones incurrunt, motus in vtero tremulus percipitur, siue sit à mola, siue ab vtero veluti inutile pondus excutere contendente. Quod si animatum sit, quicquid illud est, difficilius adhuc internoscitur. Certissima signa sunt, primum si tempus legitimi partus excesserit. Nam aliquando gestatur mola decem,

*Homo est
μικροκοσμος
appellatus.*

*Mola concepti-
sissima
signa.*

duodecim & plures menses: aliquando toto vitæ spatio, sæpe foras expellitur primis mensibus. Deinde si motus instar lapidis percipitur à latere in latus, non qualis inest foetui, qui calcitrat & circumuoluitur, neque eo tempore, ut mense 3. in maribus: 4. in fœminis. Præterea sanguis menstruus, qui in uterum delabitur, in alimentum non ita absumitur, sed corrumpitur, unde uterum peius affici necesse est, & per consensum corpus vniuersum. Hinc ventris tumor maior & tensio, color fœdior, appetentia magis deiecta, grauitas difficilior, quàm in vera imprægnatione. Sed nihil adhuc certius, quàm si mammae tumeant sine lacte. Si initio deprehendatur, non expectandum tempus partus. Sic enim sæpe incurabilis est, aut onere grauata natura propulsatur, sed exequo interficit, aut dolores acerbissimos, symptomataque periculosa inuehit. Quibus Perpiniani visa est mulier nobilis interisse, cum molam gestasset duodecim mensibus.

Curatur sanguinis missione, laxatis partibus fotu, medicamentis aperientibus, & iis omnibus, quæ abortum prouocant. Alioqui Chirurgia est opus, videndumque an infideat ori uteri, an superiore parte, vel ad latera, ut remedia adaptes. Si vel ante, vel post veram imprægnationem oriat,ur, foetum necat.

ANTO. VALETII EXERCIT. LXI.

PAuco semine, eoque morbofo, ad multum sanguinem menstruum concedente, progignitur mola. Calor enim in illo debilis efficit, ut formatrix facultas eam materiam effingere nō possit: unde manet rudis quædam caro, quæ per suas venas non secus alitur, ac foetus. Sed certis quibusdam signis ex Hollerio facillè ediscendis internoscitur. Curationem autem recipit menstrua prouocantibus medicamentis.

*Gale. lib. 14.
de vsu part.*

1 *Vt ad dia-
gnosim, pro-
gnosim & cu-
rationē her-
nia.*

QUæ 1 ad hanc rem pertinent, plurima ca-
p. 18. & sequentibus libri 7. Cornelij Celsi.
Multa quoque apud Paulum & Aëtium.

Cæterum vinculum quoddam membranosum
est, utrinque ab inguinibus procedens, in peritonæum
exporrectum, cuius robore peritonæum confirma-
tur. Atque hinc omentum & intestina. Relaxatum
herniam facit, descenditque plus, minusve intestinum
& omentum, aliquando in inguina, nonnunquam
in scrotum, unde nomina enterocele & epiplocele.

2 *Labore,
ictu, casu.*

3 *Leue, distri-
butioni chyli*

& secretioni

*stercoris dica-
tum, quod à*

suo mesaræo

*diuisum de-
scendit. Quæ-*

obrem ent ero

cele ferè fit

cæci intestini

prolapsu, quæ

nihil aliud

*est, quàm apo-
phyxis quædã*

*cum mesen-
terio minimè*

*connexa, &
propterea ab*

Aliquando 2 rupto peritonæo idem fit. Graue
malum est, cum 3 intestinum descendit, intestinum-
que in scroto conuoluitur. Supprimuntur fæces, re-
gurgitantque in ventrem. Testiculus erythroides tu-
nica vestitur. Post hanc verò adnata est *ἀσπτος*.
In superficiem extenditur folliculus genitalis, quod
ὄσχεον Græci, scrotum Latini vocant.

Inter erythroidem & darton, & inter testiculum
& erythroidem, aut etiam in scroto, aquosa sanies,
aut aqua colligitur, unde hydrocele. Nonnunquam
soli flatus herniam repræsentant. Id recens natis
puerulis sæpe contingit, facileque discutitur. Vari-
cosus ramex, sarcocèle, testiculorum inflammatio,
tumor & similia extra rationem herniæ sunt.

Aquosa & ventosa hernia remediis curantur, quæ
descripta sunt in ascite & tympanite. In aquosa
peculiariter laudatur emplastrum factum è recenti
stercore vaccino, & tertia parte pulueris boli arme-
næ, vel sang. draconis. Laudatur & semuncia pulue-
ris è cremata radice brassicæ. Pulvis is incorpore-

*Comma. in
sent. 3. sect. 4.
libr. 6. Epid.*

tur adipe fuillo vetere. Ad enterocalem & epiplo-
 celem multa remedia sunt medica, tum quæ per os
 fumuntur, tum quæ apponuntur. Sed in primis ha-
 benda ratio, vt quod decidit, reponatur. Quies ad
 multos dies imperetur: molli lecto decumbant, pro-
 ratione corporis, abstineant clamoribus. Et in 4 e-
 gerendo manum apprimât pubi & scroto, ne quid
 recidat. Fasciæ seu loculamenta scroti ex panniculis
 comparentur, sed ita compactis, vt solida sint. Opti-
 mûmque fuerit materiam eiusmodi fasciarum ad-
 stringentem materiam primûm imbibisse. Possunt
 & ex ligno, ferro, aut alioqui solidiore materia con-
 fici, sed ita vt interiori parte, qua scrotum contin-
 gant & inguina, molliori corpore inducantur. Lau-
 datur succus iacæ 5 vtriûsque. Datur singulis die-
 bus manè, quantum testa oui capiat, cum modico
 vini albi. Ex eodem succo depurato iulepi & syrupi
 comparati possunt.

4 Imo dan-
 da opera, vt
 feces dure
 non sint, sed
 molles.

5 Presertim
 tamen alba.

Laudatur pul. & succus radicis consolidæ ma-
 ioris, rusci, omundæ regalis, sigilli Salomonis, panis
 cuculi, radicis valerianæ. Pulueris 3. 1. datur pueris
 in lacte cocto, addito oui vitello, aut ex solo oui vi-
 tello. Succis vtemur, vt succo iacæ, eodem modo,
 sem. thlaspi, vermib⁹ terrenis, limatura chalybis, la-
 pide, quem vulgò diament vocant, hepatica trita.
 Et hæc quidè probata multis. Herbula 6 est in fa-
 bulosis nascens: ramulos multos in terram spargit,
 foliis minimis & rotundulis, alis follicatis ex viridi
 flauescens, per ramulos sparsis, adstringente gu-
 stu, ex qua succus expressus subinde affuso vino al-
 bo, certissimum, & aliquoties probatum remedium
 contra descensum intestini. Nam nouem diebus ita

6 Hæc ber-
 miari dicta.
 Ab aliis ber-
 ba Hallery.

DE MORB. INTERNIS

7 Puerorum
pulticiæ ex
pane albiſſi-
mo in tenuiſ-
ſimum pulue-
rem redacto
& lacte con-
ficiatur: qui-
bus mellianõ-
nihil addi po-
terit, vt ali-
ſuat libe-
rius.

percurat, vt poſtea nõ redeat malum. 7 Facilis in-
uentu Autumno.

Ex radicibus Oſmundæ regalis repurgatis fiunt
ſyrupi, qui huic rei conueniant. Radices eiufmodi
in nigro vino auſtero coqui poſſunt, & inde em-
plaſtra fingi. Alioqui vtẽdum erit emplaſtro Phar-
macopolarum contra rupturam. Valet & lenticula
aquæ trita & alligata, ſimiliter & cicuta valet, radix
pẽtaphylli ſicca trita 3. pũdere ex vino data. Semũ-
cia foliorum equiſeti tritorum ex aqua calida. Pa-
rabile emplaſtrum ex 3. 1. bdelij, manẽ quidẽ ſuba-
cta cum ſaliua hominis: veſpere verò cum vino au-
ſtero. Radix cyperì, arnogloſſi, ariſtolochiæ longæ
& rotundæ in emplaſtrum formata, & trita prius,
deinde data potui.

Emplaſtrum.

℥. maſtichis, corticis thuris, nuci cupreſſi, myr-
rhæ, ſarcocollæ, glutinis piſcis (vſblach vocant, &
ichthyocollam) ana 3. ſ. ichthyocolla in aceto diſo-
luatur, reliqua trita miſceãtur, extendantur in aluta.

E nucibus cupreſſi & gallis immaturis ad con-
ſumptionem coctis emplaſtra fiunt parabilia, quæ
in menſem relinquantur, niſi ſuperueniat dolor.
Liquor autem, in quo coxerint, potui datur.

Probatiffimum iſtud eſt Oẽtauiõ. ℥ balauſtio-
rum 3. 1. ſ. gallarum 3. ſ. radicis aſphodeli, radicis
narciffi, aut (ſi hæ radices deſunt) radicis arnogloſſi
& betæ, loco perſonatæ, ana 3. 1. ſ. coquantur in vi-
no, tundantur in emplaſtrum, ſubigantur.

Aliud.

℥ ſpumæ argenti vehementer combuſtæ 3. 9.
aceti lb. 2. & 3. 3. olei cydoniorum lb. ſ. ſucci planta-

ginis 3. 2. Spuma argenti in aceto extinguitur, etiamdum feruens: deinde teratur. Tum adiecto oleo & succo, perpetuò agitando fiat decoctio secundum artem, ut habeas emplastrum, quod quidem diebus continuis adhibetur.

Aliud emplastrum.

℥. thuris, mastichis, sarcocollæ, acaciæ, lapidis hæmatitis, mummiæ, tracaganthi, gummi arabici, terræ sigillatæ ana 3. 3. boli armenæ, gallæ, lithargyri, balaustiorum, nucis cupressi, malicorij, aristolochiæ longæ & rotundæ, corticis olibani, rosarum, radicis vtriûsq; consolidæ, orobi, filiginis, sambuci, cyperi ana 3. 6. picis navalis 3. 2. 6. Colophoniæ, resinæ pini, terebinthinæ ana 3. 1. visci querni 3. 1. 6. ceræ 3. 2. pilorum leporis vstorum 3. 4. olei, in quo ficus pingues incoctæ sint, 3. 6. fiant magdaleones secundum artem, de quibus portio extendatur in aluta, applicetur. Quod si his remediis nihil proficitur, ad Chirurgiam veniendum est, quam ex 6. Pauli, 7. Celsi, & recentioribus colliges.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Ad ossa pubis non perforatur peritonæum, sed productio quædam illius descendit in scrotum, per cuius meatum vasa spermatica, arteria scilicet & vena, perreptant ad testes, & per eundem locum eiculatoria ascendunt, ut inferantur collo pudendi. In hac productione multi tumores fiunt, quos Græci *κίλας* vocant, modò in scroto, modò supra scrotum, qua parte in illud descendit. Quorum omnium causa est vel flatus, aut aqua ibi contenta, aut caro, aut tumor venarum varicosus: vel delapsa pars aliqua ex iis, quæ intra peritonæum continentur, ut intestinum & epiploon. Idque fit vel rupto peritoneo, vel relaxato & hiantæ. Ex omnibus autem intestinis so-

Hernia fit productio tantum non rupto, peritoneo.

DE MORB. INTERNIS

Ileon solum, vel cæcū pro-
cidit in her-
nia.

Hydrocele.
Pneumatocle
Sarcocèle.
Cirsocele.
Enterocèle
Epiplocele.
Bubonocèle.
Oscheocèle.

Seminis col-
lectio inter
testiculū tuni-
cas herniam
ementitur.

Aqua quo
loco in hydro-
cèle continea-
tur.

lum ileon, in quo chylus semper continetur, procidit. Nam rectum in anum, cum relaxatur, descendit. Colum aligatum est renibus, & altius ascendit ad ventriculum. Ieiuna & tenuia intestina sublimiora sunt. Ileon itaque tantum superest, vel cæcum. Neque enim de duodeno vlla dubitatio. Duo igitur in his affectibus statim initio distinguenda sunt, an sit aqua, vel flatus, vel caro, vel varicosus ramex: in mulieribus, laxatio foraminis ligamēti descendentis ad internam partem inguinis: aut ileon delapsum, vel epiploon: nonnulli addunt musculos ruptos epigastrii. Deinde si quid descenderit, qua parte sit, & an ruptione, an relaxatione id fiat. Si aqua fuerit, hydrocele: si flatus, pneumatocèle: si caro, sarcocèle: si varices, cirsocele: si ileon, enterocèle: si epiploon, epiplocele nominatur. A situ verò partium, bubonocèle, in inguine: oscheocèle in scroto dicitur. Quibusdam testiculus in inguen translatus imposuit, ut herniam crederent. Aliquando etiam hi affectus inter se complicantur. Sæpe vehementi imaginatione libidinis colligitur semen inter tunicas testiculi, ut videatur quædam esse sarcocèle, aut hydrocele. In quibus omnibus cauendum, ne iudicando fallamur. Primum in hernia aquosa cognoscenda omnis aditus lucis intercludatur, & obiecta candelæ cerea, videatur nunquid pelluceat. Est enim aliquando durities, quæ plenitudine & tensione fallit, ut videatur esse carnosa, aut intestinalis, sed pelluciditas fraudem detegit. Sed quia pelluciditas conuenit etiam flatusæ, ad leuitatem respiciendum. Nam aquosa obscurior est & grauior, quàm flatusosa. Vbi constitierit de aqua, videndum quo loco contineatur. Qua in re veteres satis perplexi & confusi videntur. Galenus de tumoribus scribit in tunicis, quæ testes ambiunt, contineri. Paulus in corporibus scrotum implicantibus. Celsus integris membranis colligi: alij ruptis etiam & relaxatis. Alii modò intra tunicas, modò intra membranas. Si inter tunicas, vel inter summam & mediam, vel mediam & imam. De loco certè & ad prædictionē, & ad curationem non est ambigendum. Nam aliquando in superficiali scroto continetur: aliquando profundius. Sed cum testiculus duabus tuni-

cis insignibus inuoluarur, erythroide, quā sequitur dartes, ferè semper hydrocele fit, vel inter has duas, vel in toto scroto. Hic totum scrotum intumescit sine rugis, vesicæ inflatæ simile. Illic tumor tantum in testiculo percipitur, videturque rotundus & tensus rugato & laxiore scroto. Aliquādo, ut Paulus scribit, peculiari quadam tunica humor ille comprehenditur, quæ supernascitur, veluti atheroma quoddam, aut steatoma, ut videatur esse tertius testiculus. Quinetiam videre contigit in puero Tydographi filio tertium testiculum. Nec desunt, qui asserant quibusdam familiis peculiare esse, ut tertium habeant testiculum. In mulieribus Aëtius tumorem aquosum fieri scribit circa pudendi alas inflationi similem, debilem, mollem, ut humor fluctuans appareat, modò in vna parte, modò in utraq; tantum. His perspectis de humoris natura cogitandum, an tenuis, an albugineus, an sanguineus & faculentus, ut naturæ humoris remedia adaptetur. Si ægro veter tumeat, symptoma est hydropis. In pneumatocele similia omnia, nisi quòd, ut dixi, perspicuitas & leuitas maior adest, quia dilatio fit à flatulento spiritu. Fit aliquando vel in quatuor vasibus testiculos alentibus, vel in arteriis darton intercurrentibus. Ille durior, nec compressu digitorum euanescit, recipitque curationem: hic oppresso digito intrò recurrit & euanescit, vixq; curatur, periculo ab incessabili sanguinis profusio imminente. Fit sine hydrope, & cum hydrope. Sarcocoele, tumore, duritiæ & colore ubique sui simili dignoscitur. Est enim tumor rotundus, oblongus, durus, formam testiculi referens, qui longo tempore pedetentim increuit. Quibus duobus ab enterocoele distinguitur, quæ distincta. mollior est & repente oborta. Fit à carne duriore in aliqua scroti parte nata. Galenus ad scirrhum refert. Aliquando testiculi, aliquādo nerui, à quibus testes dependent, indurantur, aut inter tunicas caro illa generatur. Causæ sunt, fluxio, ictus, succissio ramicis non rectè curata, & similia, quæ scirrhos procreant. Cirsocele, id est, varicosus ramex, cum venæ intumescunt testiculum nutriendes. Sentitur diuersitas tumorum & paruitas in epididymide & vasibus spermaticis, quæ sunt veluti conglo-

*Paul. Aeg.
cap. 45. lib. 6.*

*Sarcocoele ab
enterocoele
duobus modis
distincta.*

DE MORB. INTERNIS

*Enterocoeles
signa.*

merata & intorta. Paulus vasorum aut darti dilatationem *κισσός*, id est, varices simplici vocabulo appellat: eorum verò, quæ testiculum nutriunt, *κισσοκήλη*. Celsus ex loci varietate quatuor differentias facit, omnesq; vno nomine comprehendit. In enterocoele signa sunt, tumor mollis, repente natus. Augetur vel minuitur pro ratione materiae collectæ. Clamore & cibi satietate crescit, frigore contrahitur, scrotum multum distentum apparet, magis in vna, quam altera parte. Tactu sæpe discernuntur excrementa indurata, nec excerni possunt, ut videatur iliaca passio. Cum ad inguen retruditur, murmur flatulentum percipitur. Quod fit, cum æger supinus iacet, & quiescit. In epiplocele percipitur veluti strophium molliusculum, lubricum, inæquale: tumor paruus, frequentius in osse pubis, quam scroto. Idem semper manet, siue à cibo, siue ante cibum, & quouis modo collocetur, aut huc & illuc moueatur corpus, nec retento spiritu adeo increscit. In his duobus videndum an ruptum sit peritonæum, an relaxatum. Ruptura fit in lateribus ossis ilium post saltum, ictum, vehementer corporis contorsionem. Initio tumor paruus, progressu temporis augetur. Paulatim enim magis disrumpitur peritonæum. Quæ tumorem faciunt, in summâ cute apparent, quia extra peritonæum dilapsa sunt, atque à sola cute integuntur, magisque supra scrotum. Dolor punctorius sequitur, & quasi lacerans. Contrà in relaxatione. Tumorem enim efficientia cum maiore renixu sentiuntur, quia intendunt meatum illum peritonæi, per quem vasa & musculi cremasteres descendunt, videnturq; esse in secundo vase, quæ ubi in ventrem recipiuntur, tumor cessat. Si vel omentum, vel ileon remaneat in illo meatu, nec perueniat ad scrotum, bubonocoele erit, in ipso nimirum inguine affectu consistente. In mulieribus fit ob fœtus magnitudinem aut multitudinem Alioqui rarò hernia laborat, quod peritonæum firmitus continendo fœtui habeant. Omnium periculosissima enterocoele, præsertim si reduci nequeat intestinû. Sinistra parte adhuc grauior, ubi cœcum conuolutum definit in rectum, & multa intestina tenuia incumbunt. Quibusdam inde singultuosæ febres, in quibus reposito intestino, mors acceleratur.

*Peritonæi
rupti nota
à signis eiusdem
relaxati
distincta.*

*Enterocoele
omnium gra-
uissima, præ-
sertim si sini-
stre parti in-
cumbat.*

In aliis non reposito, gangræna. Experientia etiam docuit paulò post mori, quibus vi reponitur.

Carnosa insignis non curatur, sed testiculus extrahendus. Neque circocele, sed minus molesta est. Epiloon ob mollitiem vix reducitur. Remedia adhibenda vacuato ventre à stercore & flatu, blando clystère aut medicamento. Inunctiones, sacculi, ligamenta, subligaculum, decocta, emplastra. Extremum remedium in ferro. Alij aperiunt ventrem ad intestina, vt dissito retrahatur intestinum. Id fit supra ilia, via ad vasa spermatica, quæ proinde separantur, & peritonæi locus constringitur, non colligatur, ne impediatur generatio. Periculosum certè remedium, & sæpe frustrà tentatum: ex quo gangræna oritur & mors, vt cuidam in suburbio sancti Germani. Alij sectionem faciunt ad ilia: vbi alligant productionē illam peritonæi simul cum vasis spermaticis. Deinde curant vulnus callo illuc obducto. Alij id faciunt puncto vocato aureo in ilibus, quæ permeant vasa spermatica, acu ducta, & exceptis vinculo vasis illis & vicinis corporibus. Experimentum fit contrectato & deorsum tracto testiculo, vt intelligas, an sit vas spermaticū. Et certè si quis vasis illis non ligatis constringere posset peritonæum, neque testiculus excidendus esset, neque impediretur generatio. In aquoso quoque ramice si nihil efficitur fomentis, cataplasmatis, emplastris, diætâ, purgationibus, ad incisionem, punctiōem, cultellum, cauterium actuale, potentiale veniendum. Habita tamen ratione corporis, viscerum, partis affectæ, & multis diebus præparato ægro, ad mensem aut 40. dies adhibitis emplastris superiori parti, qua humor defluit. Sectio periculosa è cultello. Multis gangræna inde mora, atq; inde mors.

Melius cauterium potentiale, & alia remedia. Anno 1555. mense Martio in suburbio sancti Germani, nobili cuidam cultello aperta hernia aquosa, vnde in gangrænam, dolorem intolerabilem febrem & delirium incidit, vnde mors ab omnibus expectabatur. Exclusa multa aqua per vrethram, concisa magna parte gangrænæ, cōualuit præter expectationem. Cauendum quoque, ne asiduo fœtu excoquatur testiculus & corrumpatur, vt vidimus contigisse in aquoso ramice.

Sarcocele insignis non curatur.

Hernia aquosa aperta salutaris.

Herniarum frequentissima enterocoele non peritonæi solius, sed ipsius quoque tendinis eius musculi, cui peritonæos tunica innititur, morbus est, isque in situ, ob intestini ad alterutrum inguen, aut ad scrotum prolapsum. Hic si negligatur, testiculi corruptelam affert, ut ad curationem hic quoque sit auferendus. Purgato corpore clysteribus (qui minore quantitate, sed irritante facultate, imperari debent, ne portio in prolapsum intestinum feratur) vel catharticis, adeoque prægresso fotu instino reposito, sumpta & admota adstringentia proderunt. Itaque ex conseru. symphyti maioris, cortic. citr. condit. cum puluere osmundæ regal. bol. arm. terr. sigill. ros. rub. mastich. & similib. condita parantur. Admouentur hæc.

℞. mastich. sarcocoll. glut. pisc. ana 3 ℥. radic. consolid. maior. osmund. reg. sigill. Salom. ana 3. 2. Dissoluantur gummi in aceto: radices bene purgentur, cum oleo desipica & costino f. emplastrum, quod pinsatur cum salina limacum.

Utilissimum quoque est emplastrum è limacibus tritis cum thure, mastiche, bdellio, Item.

℞. massæ emplastri contra rupturam 3 ℥. mastich. sarcocoll. glutin. pisc. ana 3. 2. cum oleo mastich. & costino. f. emplastr.

Priusquam applicetur, vngatur locus pinguedine cerui. Mirabilis est Hollerianæ herbæ, herniariæ propterea appellant, ad hunc affectum profligandum efficacia. Eius aquæ stillatiæ arte Chymica extractæ vnico haustu, cum tentata alia remedia non responderent, paucis abhinc diebus curatus est adolescens in gymnasio Haricuriano, cui citatior sal-

tus insignem herniam conciliârat. Admotum autem emplastrum huiusmodi.

℥. emplastr. contr. rupt. & de grat. dei ana 3. i. sang. drac. puluer. radic. osmund. regal. oliban. puluerat. an. 3. 2. cum modico olei myrtill. molliâtur in igne, & f. emplast. super alutam.

De arthritide.

C A P. 63.

Curatio in 1 vacuando & roborando. Vacuamus & repellendo, & diuertendo, & propriè vacuando in cautionem, & initio morbi, etiam si arthritidis frigida est. Si quidem nihil aliud prohibet, detrahendus sanguis est. Ischio, id est, coxa, vel crure laborante 2 venas brachij diuidimus. Et, si quidè fluxio est à capite, 3 mediam: si à reliquo, corpore basilicam.

4 Hippocrates non satis manifesta ratione venas post aures aperit, vbi coxendix afficitur. Arabes vehementer laudant phlebotomiam ex interuallo annularis & parui digiti.

Brachiis laborantibus deplendus sanguis est è crure, & perpetuò secundum rectitudinem. In coxendice post phlebotomiam è brachio, venam poplitis & malleoli incidere oportet. Multò magis, si sanguis in causa est.

Quòd si dextrum crus, dextrum item brachium laboret, è sinistris membris vena secanda est. Si verò in omnia membra dolor sparsus est, ex eo, quod minùs laborat.

Purgatio.

In biliosa arthritide & serosa Arabes 6 fortioribus cathartice vtuntur. Alij primùm quidem leuioribus, vt cassia: deinde fortioribus. Melius fuerit

Arthritis enim ex humoris morbifici copia & articuli imbecillitate nascitur.

2 Ad prohibendū morifica materię generationē, & ad fluentis reuulsionem.

3 Et hepatis & viscerum ratio habebatur.

4 Aph. 22. sect. 5. Lib. 6. 7 Wimsdun.

6 Vt diacathamo, electario de succo rosarum.

7 *Vt cassia*, partem materiæ leui 7 pharmaco repurgare. Quod catholico, est reliquum, partim 8 *vrinis*, partim sudoribus excludendum.

In pituitosa alius magis ducenda, vt cum 9 melancholia in vitio est. Solo 10 potu lactis asinini, & decocto radicis graminis dulcorato cum modico saccharo, calidæ arthritides internæ curantur. Purgationes ex superioribus repetendæ sunt, & maxime ex morbis capitis. Peculiariter laudatur purgatio, quæ fit ex hermodactylis, Græcis & Arabibus pilulæ sunt de hermodactylis paratæ in officinis: maiores, in causa frigida: minores, in causa calida. Minoribus rhabbarum: maioribus agaricum adiciet, vt massæ pilularum 3.1. fit, reliquorum 3.1. Græci hoc modo.

II *Vel. 4.* 4. II hermodactyl. 3. 8. anisi, cumini, piperis aloës, hermodactyl. myrobala. turbit. colocynthid. sagapeni ana 3. 6. castorei, sarcocolla, opopanax, euphorbii, ruta agrest. ana 3. 3. cum succo brassicæ f. massa. 4. I hermodactyl. 3. 8. anisi, cumini, piperis communis & longi, croci, medull. sem. cartharmini ana 3. 1. moschi Gra. 2. cum aqua saluiæ fiat massa. Dosis 3. 4. ex hydromelite. Arabes hoc. 4. hermodactylorum 3. 3. 8. cumini, zinziberis ana 3. 1. trita incorporantur cum melle. Datur cum aqua tepida. Hæc in pituita magis conueniunt. In biliosa singulis dosibus grana duo aut tria dacrydij adici possunt. In biliosa hoc modo componunt. 4. aloës 3. 1. dacrydij Gr. 15. rosarum rubrarum, sem. apij & fœniculi ana 3. 8. hermodactyl. 3. 3. mastichis 3. 2. rhabbarum 3. 1. sacchari 3. 3. Fiat puluis, detur ex aqua calida.

Vtuntur electario de succo rosarum & diacydonio cathartico in biliosa. In pituitosa 3. 8. turbit gummosi in lacte cocti, vt expressio bibatur. Neq; reformidant 3. 1. dacrydij cum saccharo rosato.

Compar-

Comparant & pilulas ex 3.3. sarcocollæ, serapini vel opopanax. Sed videndum in usu fortium pharmacorum, ne æger macilento sit corpore, virtute non ita firma, maximè ventriculi & intestinorum. Periculum enim inde fit, ne citetur dysenteria. Et hermodactylus natura sua stomachum lædit. Propterea quidam è veteribus non radice, sed herba cius utebantur: nihilominus adiectis, quæ stomachum roborant.

Alexāder loco hermodactyli corronopodio herba utebatur.

Plurimum laudantur hæ pilulæ, nec stomachum lædunt.

℞. agar. 3.1. nucis moschatæ, zinziberis ana ʒ.ʒ. infundantur in aqua methæ. Fiat levis feruor super calidos cineres. Materiæ expressæ adde rhabbari ʒ.4. pul. hieræ diacoloc. 3.1.ʒ. dacrydij ʒ.ʒ. cū infusione, ex aqua methæ fiat pilulæ. Dosis 3.1. vel ʒ.4.

Quinquè topicorum scopi. Topica sunt, vt 12. do- lorem leniant, 13 repellant, 14 coquant, 15 discutiant, 16 robovent. Celebre iam olim, nunc etiam frequentatum remedium,

℞. 17. medullæ panis P.I. dissoluatur in lacte calido muliebri, bubulo, vel ouillo, cui adde croci 3.ʒ. Et si vehemens dolor fuerit & calor, adde opij ʒ.3. ad 3.2. plus minúsve.

℞. tria 18 albumina ouorum benè agitata & despumata cū 3.1. olei rosati, misce. Linteola in medicamento madefacta applica. Aliud.

crato parti admoneantur. Deinde parari poterit cataplasma ex foliis hyoscyami in lacte bubulo coctis, quod mirificè proderit. 18 Ouerum albumina non aequè profunt. Nam exitu prohibent humorem.

12 Tempera-
tiõe humoris,
& habitus
restitutione.

13 Incrassā-
do, acrimo-
niam infrin-
gendo.

14 Pepasmi
mitificando
inducant.

15 Inaspe-
ctabile pur-
gationem &
diaphoresim
faciendo.

16 Partē ni-
mirum infir-
mam.

17 At inēte
morbo sumes
micam panis
siliginei q. s.
maceretur in
aquarosea:
deinde coqua-
tur in lacte
vaccinos. ca-

taplasma. At
si pars sit ru-
bore suffusa.

℞. aqua plā-
tag. Et solani
lib.ʒ. aceti 3.

1. ʒ. buta sple-
nia eo oxy-

DE MORB. INTERNIS

℥. cerussæ 3. 2. dissolue in aqua endiuivæ & modico aceti, fiat liquidum vnguentū. Quod si ad narcotica per doloris vehementiam deveniendū est.

℥. ol. ros. 3. 4. opij 3. 2. concorporentur. Aliud.

℥. butyri recen. 3. 2. mandragoræ subtilissime tritæ 3. 1. misce.

℥. lactis muliebris 3. 2. opij 3. 6. Alia sunt etiam aliis locis descripta. Sola aquæ frigidissime perfusio, vel niuis, aliquando satis esse potest.

Verbasci flores & folia, lenticula palustris, psiliū, nymphaea, violaria, portulaca & similia trita per se, vel cum rosaceo, apponuntur calida. A quibus leviter digerentibus utendum est, ut cerato ex oleo chamæmelino, anethino, de Iliis, & similibus.

In frigida convenit oleum, in quo enula, aristolochia, gentiana, nepitha, rosmarina, id est, chamæpithys, salvia, maiorana, coxerint. Levius, in quo radix althææ, vulpes, vermes terreni incocti sint. Laudatur & oleum raphaninū, aut in quo galbanum liquefactum sit. Oleum de terebinthina, oleum expressum è granis tritici, vel nuce moschata in lamina ferrea candente, quibus aliquando axungia commiscetur. Arthritidem frigidam & ventosam fofus ex decocto origani, meliloti, chamæmeli, & spongia eodem decocto imbuta, patientiq; loco applicita, percurat.

Laudatur plurimum 20 humana & vrsina. Oleū, in quo folia ebuli coxerint, vel succus radicis eius.

Sunt qui dolentem locum primum quidem frigidissima perfundunt, idque diutius: deinde è petroleo fouent.

Quædam occulta proprietate profunt, qualia

19 Imò Castoreū ipsum si dissoluatur in oleo lumbricorum mirifice confert ad frigidam arthritidem.
20 Vt. ℥. axungia humana lb. i. fol. lauri, chamæpythæas, salvia, maiorana an. M. lb. Coquatur in balneo marie. Deinde illinatur locus affectus.

sunt ossa comminuta potui data. Deplume caput miluij crematum & tritum, corium canis marini admotum loco, corium torpedinis, stercus, vt cum adipe vsino fiat vnguentum.

Pulli ciconię, pulli cigni in oleo cocti, vt oleo medulla ceruina misceatur. Historia est Sexti Pompei, qui pedibus immisisis aceruo tritici perfanatus est:

²¹ quod remedium postea Medici sequuti sunt.

In tophis caseus inueteratus, acris, maceratus in decocto cruris suilli falsi, vt inde fiat emplastrum.

Stercus caprinum in oxycrato dissolutum cum farina hordeacea. Sed hæc durioribus corporibus. In mollioribus axungia, radices althææ commiscendæ sunt. Aliud.

℞. collæ, id est, visci, terebinthinæ, ceræ ana 3. i. galbani 3. 3. liquefactis vtor.

Vsus mythridatij & theriacæ post bene purgatum corpus.

Laudatur Græcis & Arabibus balnea, si nullum viscus infirmum est, si vacuatum corpus, remissionis tempore munita prius ægra parte ex puluere boli armenæ. Incorporato in oui albumine, vel hoc medicamento.

℞. corticis granatorum, sumach ana P. 2. Coquatur ad mollitiem. Incorporentur cum P. 3. farinæ hordei & succi semperuiui, applicentur loco. Hæc autem, ne balneo liquefactus humor in partem infirmam defluat. Quibus remediis & in repellendo vt licet in fine morbi, & ad cautionem. Origanum, menthastrum, nepitha in aqua salsa diu coquatur. Inde fit fots, vel vna parte salis, tribus aquæ & olei mixtis, locus affricatur.

DE MORB. INTERNIS

Abſtinentia vini multos ſanauit. Balnea quoque naturalia ad cautionem conueniunt.

Vere & Autumno podagræ excitantur, Aprili ferè & Septembri. Itaque prius cauendum eſt. Humor ferè calidior chiragræ: frigidior podagræ.

22 *Iſchiadicos vt cures, primum quidem (ſi nihil te auocet) iis vomitū imperabis, neque medicamentū pargās præſcribes. Deinde ad clyſteres lenientes, hic acres, veniendū eſt. Poſtea verò cum materia purgandū eſt. Admonēdorū cataplaſmatum materia vide lib. 10. 25* *τὸ πρῶτον.*

In 22 Iſchiadicis venæ ſectio, vt prius, ita & purgatio.

Clyſteres acres, cucurbitulæ loco affixæ. Repellentibus abſtinendū. Fortioribus remediis vtendū, phœnigmis, hiberide, naſturtio, dracūtio, batrachio, & ſimilibus. Cauterio, incifione cū ferro, vt in Eupolemo Hipp. fieri oportuit initio lib. 5. Epid. Hæc eadē reliquis arthriticis, vbi cōtumacius malum eſt. Inuentum quoq; hoc remedium eſt, vt ſuperiori parte, qua humor influit in articulum, caro nudaretur, venæ hamulo exciperentur, vinctulis interceptæ ſecarentur, atque ita via fluxioni præciditur. Plurima remedia ſcripta inuenies apud Aëtium.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Oſſa inter ſe connectuntur tribus modis in vniuerſum: vel enim inuicē coaleſcunt, modò ſine alicuius materiæ interuentu, vt in mollioribus & ſuauioſis: modò intercedente aliqua materiâ, vt in duris & ſiccis, per ſymphyſin: vel ita committuntur inter ſe, vt obſcurū habeant & difficilem motum per ſynarthroſim: vel manifeſtum & euidentem, per diarthroſim. In prima cōnexionē articulorū dolores nō fiunt. In ſecunda rarò, niſi tophi & œdematoſi tumores, vt in articulationibus carpi, aut metacarpij. Tertia arthritidis ſedes eſt, inter membranas, tendones & ligamenta, quæ oriuntur à periœſtio, & proinde ſenſum habent, ex quibus omnibus firmatur articulus. Vnde dolor vehemētiffimus excitatur, ſi qua materia illiſc intercipiatur, ſiue acrimoniâ, vt bilis: ſiue frigidityte, vt pituita: ſiue aſperitate, vt gypſea: ſiue diſtentione membranarum &

ligamentorū, aut inflammatione, quod ab omnibus humoribus fieri potest, sanguine, pituita, & utraq; bile cum propriis symptomatis cuiusq; humoris. Oportet autē intra ipsum articulum contineri, antequam verē dicatur arthritidis. Si enim vel sola intemperies adsit, vel humor diffusus per carnem partēsq; circumiacentes, diuersa est affectio. Nam quod Hipp. scripsit articulorū dolores fieri in siccitatibus, id non est intelligendum de arthritide, vt scribit Galenus, sed dolore, & difficili motu, qui fit absumpta humiditate, nisi quis omnes articulorum dolores hoc nomine complecti velit, aut eum locum interpretari de biliosa arthritide, quę fit immodicē calida temporis constitutione, aut sicca, quibus infirmis redditis articulis talis humor defluit. Imō Galenus podagrę materiam contineri tantū vult in articulis & ligamentis, quę tēduntur, non nervis & tendonibus, quę duntaxat ad tensionē aliorum contenduntur: argumento, quod inde non fuit visa conuulsio. Fluxionem enim humoris suscipiunt, primum quidē loca articulationum, deinceps omnia ad cutem vsque circumstantia. Verisimile tamen non est materiam ad articulum confluentē imbibi, & durissimis ligamentis, non mollioribus nervis, & tendinibus. Proinde Aëtius non solum distēdi, sed permadescere scribit. Materia hęc aliquando tenuis est, aliquando crassa vel tenax, nonnunquam simul & crassa & tenax, aut etiam gypsea, resoluta tenuiore parte. Colligitur enim duobus modis, per affluxionem ab aliis partibus, & per congestionem malē concoquente parte. Hęc naturam partium retinet, nisi quod mora & dolore incalescit, & aliunde nouam materiam recipit. Per congestionem magis fit in morbo Gallico sine tumore, cum dolore totius periostij. Quę fit per defluxionem, ferē materiam mixtam habet, & distentione, ac calore concepto potius dolorem parit, nomēq; accipit à parte affecta. In pedibus, podagra: in manibus, chiragra: in coxis, ischias: in multis simul articulis verē & propriē arthritidis nuncupatur. Tria igitur hīc consideranda: pars, quę recipit: origo fluxionis, & via, per quam fit. In parte necesse est imbecillitatem esse, alioqui nunquam admitteret fluxionem. Et contrahitur contagione seminaria à

Arthritidis non fit, nisi humore iam articuli ob-sidente.

*Aëtius ca. 7.
Tetrabibl. 3.
Serm. 4.*

Tria in arthritide consideranda.

DE MORB. INTERNIS

parentibus podagricis, in quibus semen erat vitiatū: deinde venere: postremo consuetudine fluxionis, & qualibet intemperie, aut laxitate. Non tamen necesse est, si adfit hæc imbecillitas, articulatem morbum generari, si in vita æger nihil deliquerit, ut ait Galenns. Nā humor non influet, si corpus liberum sit cruditatibus. Vnde etiā Poëta: Græci podagtam Bacchi & Veneris filiam esse finxerunt. Hippocrætes quoque ob eandem causam eunuchos, mulieres, pueros ante vsum venereorum podagrâ non laborare dixit. Quod intelligendum est, modò temperanter viuant. Nouimus tamen eunuchum Podagricum, eumque vehementer, Seneca quoque epistolâ quadâ inuehitur in mulieres, quæ per luxum Hippocratem mendacem fecerint. Sed reuera mulieres multò rariùs eo morbo corripuntur, quàm viri, ob menstruam purgationem. Et si laborent sæpiùs menstrua defecerunt, vel pauciora sunt quàm prohibendis borbis cōueniant. Alioqui vitam maximè immoderatam esse oportet. In pueris autem, cum ad pubertatem peruenerunt, naturalis est motus seminis, vnde rarefcir corpus & relaxatur. Accedente venere, concussio, motus, concalfactio articulorum, ex quo celerius eò materia decumbit. Atque etiam inde fit vt podagrici magna ex parte sint salaces, tum ob assuetudinem, tum ob frequentiore neruorum rigorem atque intensionem. Adde quòd crebro in dorsum decubitu humores ad partes genitales cōfluunt. Ob idque duo præcipua remedia podagræ futuræ esse putamus, abstinentiâ à venere & vitam frugalem. Seminaria autem quatuor, imbecillitatem hæreditariam: Venerem: vinum præsertim forte: & cruditatem ex intemperata vita. Origo defluxionis est à capite, vel hepate. Illic intra tunicas tendonum per foramen nuçæ pituita exudat, quæ per palatum, aut nares expurgari debebat. Hic verò cum venæ magnæ & hepar copiâ grauantur, quam cōtinere non possunt, aut irritantur qualitate aliqua vitiosa. Sic vel à plenitudine & redūdantia venarum fiunt defluxiones in articulos, vel à recrementis aliarum partium, vt cerebri. A capite autem defluxionem fieri intelligimus, si grauitas capitis & cervicalis præcesserit, sæpèque frigus vel horror paruus sentitur.

Podagra Bacchi & Veneris filia.

Arthritide mulieres cur rariùs corripiantur.

Arthritidis future duo præcipua remedia.

Arthritidis quatuor seminaria.

A venis magnis internis, si citra hæc dolor præhendat partem aliquam, sed cum febricula, vel aliqua inæqualitate fiat, pars citò intumescat, rubeat, doleat, ab vna parte in aliam moueatur. Quibus autem viis fiat huiusmodi fluxio, non eadem est omnium sententia. Alij à capite sub cute materiam per summa corporis in extimas partes influere aiunt. Alij negant, quòd cum sit fluxionis species, partibus robustis ad imbecilliores sua excrementa transmittentibus, probabilius sit non solum secundum membranas neruòsq; , sed etià per vasa, id est, venas & arterias eam fieri. Sed hoc vt verissimum est fluxione orta ab hepate, ita minùs consentaneum, cum pituita è cerebri ventriculis per spinalem medullam delabitur. Sic enim oportet materiam è venis egressam rursus venas subire. Fluxionis modus est, quasi inundatio aluei & eluies quædã *Fluxionis* in cavitatem articulorum, & partes vicinas. Sed cum per *modus in ar-* musculos fit transitus, dolor non percipitur ob laxitatem. *thritide qua-* Raròque defluxio sincera est à venis, cum in his humores *lis.* omnes contineantur. Sæpiùs si vel à recrementis cerebri oriatur, vel per cõgestionem fiat, humor syncerus est. Podagra fit modò in articulo maioris digiti pedis, modò calcanei extremo, aut cauo pedis. A pedibus paulatim ad genua progreditur: hinc ad cõxam & fœmorum iuncturas, postremò ad manus, vertebrae humerorum & maxillarum. Coxendicus tamen dolor sæpe fit multis, qui podagra nunquam laborarunt, fortassè à recrementis illius partis illuc congestis, vel in eam tantum partem defluxis. Dolor profundus est, & cum mouetur crus, sentitur. Causa quadoque est eluxatio, aut dissectio ligamenti, quod à periostio nascitur. In mulieribus à partu, aut cum vterum gerunt, dolor in parte interna inguinis, & magis ad interiorem partem, quàm exteriorem, cõtinuus quoque, siue crus moueatur, siue quiescat, non est coxendicus, sed à ligamenti vteri ob flatum, retractionem, refrigerationem, cõtortionem vteri, & similia. Humor vitiosus deprehenditur tribus potissimum modis, doloris propoietate: antecedentib; vt victu, anni cõstitutione, ætate, regione tẽperamẽto: postremò cuiusq; humoris effectũ. Multas enĩ humor distedit: acris erodit, calidus calefacit, & frigidus refri- *Humoris vi-* *tiosi in ar-* *thritide di-* *gnoscedi tres* *modi.*

DE MORB. INTERNIS

vt & cibus, & temperamentum, & ætas. A sanguine color rubens, dolor pulsatorius, vehemens, tumor non solum venarum, sed totius particulæ. Neque refrigerantia admodum, neque calfacientia tolerant. Accessiones quotidianæ minus diurnæ, quàm à pituita. A bilioso sanguine multi caloris sensus, irritatio à calidis, à mitigantibus remissio: color subpallidus, subrubeus, quandoque flauo permixtus, nullus euidens tumor. Si locus tangatur, facilè sanguis subterfugit, citius ab vna parte mutatur in aliam. Exacerbationes vt plurimum tertio quoque die. A pituita, color subalbidus, aquæ inter cutem similis, tumor tactui cedens, dolor mediocris, sæpe nullus, exacerbationes quotidianæ diurniores. A melancholia rarissimè fit. Color partis niger, frigoris sensus, dolor profundior instar scalpelli perforantis, exacerbationes quarto quoque die. Vere & Autumno magna ex parte mouentur dolores arthritici, vt scribit Hippocrates in Aphorismis. Signa præcedentia sunt, quòd non tantum mingunt, aut sudant, quàm solebant, & quòd humor crassior est, copiosior, densiore membrana inclusus, aut imbecillitas maior, eò diutius durant huiusmodi dolores.

Cura in præcautionem & curationem distribuitur. Remedia varia, & ex aliis petenda. Admonebimus tantum dupliciter hic peccari in topicis admouendis. Primum, cum nulla de toto corpore habetur providentia: deinde cum digerentibus resoluta tenuiore parte, calli, artuum durities, articulorum curuitas inducuntur, aut pars affecta immodicè calefit, refrigeratur, siccatur, humectatur, aut fortitet attrahentibus materia copiosior è venis extrahitur.

ANTO. VALETII EXERCIT. LXIII.

Gal. comm. ad apho. 49. lib. 6. Aphor. **A**Rthriticus dolor tactus deprauati symptoma est: quanquam improprie inflammatio dici possit, tū fluxionis ratione, tum quòd inflammatio huius sit affectus inseparabilis comes. Huius causæ sunt duæ, fluxio, & articulorum imbecillitas. Fluxio qui-

dem humorum est, non modò articuli cavitatem subeuntium, & eiusdem imbuentium vinculum, sed præterea superiectas membranas, nervos & tendones, quæ partes propter sensum eximium vel calida intemperie, vel frigida, & solutione continui per distentionem à repletionem facta, maximè infestantur, occupantur. Vt est humoris species arthritidis causa continens, ita arthritis frigida est, vel calida. Fernelius cap. 18. lib. 6. Patholog. aliquot rationum momentis, sed sanè leuioribus, quàm quæ debeant à meliore veterum dogmate nos abducere, omnis arthritidis materiam pituitosam esse omninò ac ferrosam contra Galenum arctissimè contendit. Addit & tenuem illum humorem, non è cerebro & interioribus eius ventriculis, sed à pericranio, parte capitis externa, extrâque caluam posita, non per spinalem medullam, per summa corporis sub cute deorsum decurrere. At, quæso, an calorem, ruborè, febrem, quæ arthritidem ferè comitantur, pituitoso potius, quàm feruenti humori, vt calido & bilioso, adscripseris? Fiunt dices, non à natura humoris, sed à distensione. Cur igitur idem œdematum generi non vsuuenit? Deinde aliquis (gratia exempli) ætate iuuenili, ætate media, antegresso victus genere bili generadæ accommodato, consentientibus etiam symptomatis humoris biliosi propriis, arthritide prehendatur, an eam potius à bile, quàm à pituita, quæ isto in corpore nullo modo peccat, fieri dixeris? Quinetià ad arcendam arthritidè nò perpetuò idonea esse eadem remedia còmunis docet experientia: siquidè dolori alicuius sedãdo, vt biliosæ, competit oleû rosaceum, quod pituitosæ noxium.

*Fluxionis
modus in ar-
thritide.*

*Fernelij de
arthritide, o-
pinio non fe-
renda.*

Sic humorem biliosum mitia digerentia satis resoluunt: pituitosum verò minimè, sed vehementiora longè requiruntur. Quod autem pericranium pars nō sit trāsmittens, à qua omnis fluxio fiat, hinc colligitur, quòd reperiātur multi arthriticis doloribus grauitè afflicti, qui prius nec capitis grauitatem vllam, nec vllum perceperint dolorè: cū tamen ex Hippocr. lib. de Natura humana omnis pars trāsmittēs, excipiēsq; labore in omni humorum decubitu, suisq; symptomatis se prodat. Præterea à pericranio in spinalem medullam qui potest esse aditus? Probabilius enim est fluxiones in spinale medullam fieri à cerebro, ex quo oritur. Et quid vetat, quo minùs sanguis, qualiscunq; sit in membranarū & cerebri venis, huiusque sinubus, per venas & arterias deuolui, deorsumque relabi possit, omnēque fluxionis genus parere? Adhæc sentētia est Hippocratis. *Cui intestinum à dextra parte, articulorum morbo laborauit, erat quietior: postquam verò id curatum fuit, erat dolentior.* Galenus in commentar. id fieri scripsit conuerso humorum impetu à colo intestino in articulos. At humorem eiusmodi semper à pericranio decidere quis dixerit? Accedit hūc, quod plerūque obseruarūt, à diarrhæa intempestiue cohibita arthritidem nonnunquam subsequi. Qui Fernelij partes mordicus tenent, validas huic sentētiæ machinas admotas putāt, si soli capiti adhibitis remediis tētatis frustra aliis, se fortè arthritidem curasse profiteantur. Sed hoc minùs verisimile. Reliquum ergò statuamus humorem morbificum magna ex parte ex capite, toto corpore, hepate, liene, manare.

*Hippo. sent.
3. sect. 4. lib.
6. Epid.*

*Diarrhæa
intempestiue
suppressa ar-
thritidē at-
tulit.*

*Arthritidē à
cause calida
curatio.*

Morbus hic vt liberatu, sanatuque difficilis sit, nō tamen lethalis est. Consuetudo enim fluxionis in habitum cū concesserit, non sinit magnam, ingē-
tēque copiam colligi, verū ex facilitate perpe-
tiendi in consuetos articulos excrementa illabun-
tur. Statim itaque si à calida sit materia, vena partis
oppositæ incidatur: aut, si venæ sectioni non sit lo-
cus, clementior purgatio è cassia, cathol. rheo, syr.
laxat. ros. pallid. imperetur. Atque etiam ipsis in
initiis oleum rosaceum, vel omphacinum pauco a-
ceto perfusum parti affectæ admoueat, quod re-
pellendo & roborando sit. Deinde verò temperā-
tur atque incrassantur humores syrupis accommo-
datis, de quibus in aliis affectibus biliosis diximus:
postremò cholagogis vacuantur. Pilulæ de her-
modactylis, Arabibus alioqui tantopere commen-
datæ, suspectæ sunt, nisi in robustis corporib⁹, quòd
hermodactyli ventriculo plurimū noceant. Ad-
de quod veris caremus hermodactylis. Topica a-
nodyna sunt infinita. In ardore magnovtilissimum
vnguentum ex æquis populei & vnguenti nutriti
partibus. Vel.

℞. cerat. ros. ʒ. i. mucag. sem. piliij ʒ. ss. opij ʒ ss. croc.
gr. 4. hæc postrema lacte vniantur, deinde cū aliis mis-
ceantur addito rosaceo, pro vnguento. us o-

Cum autem inclinat morbus, ex coquentib⁹
leis, & discutientibus, vt chamæm. sesamin. liliac. a-
nethino, additis eius generis farinis, pulueribus &
adipibus cataplasmata fingentur. Vel.

℞. mucag. semin. lini & fœnugr. extract. in aq. chamæ.
ana ʒ. 6. adipis anatis & gallinæ ana ʒ. 2. cum cera pau-
ca & oleo f. vnguent. Inunctæ ex eo parti succida lana
superponatur.

DE MORB. INTERNIS

Cum de præcautione tārū agitur, sufficiet incun-
te Vere & Autumno venam secare, & purgationē,
cæteris non repugnantibus, instituisse, necnon ad
desicationem humorum, & laxitatem articulorum
corrigenam, fomenta ex adstringentibus, balau-
stis, malicorio, vino nigro & austero incoctis vsur-
passe, vini vsu penitus subtracto.

*Arthriti-
dis à causa
frigida cura-
tio.*

Arthritis autem cum à causa est frigida, purgan-
tia primū requirit blandiora, vt ex rheo & aga-
rico in aqua salu. beton. aut cephatico decocto in-
fusus: deinde valida, sed præparatis antè humoribus,
apozematis, & iis, quæ nervosum genus roborant,
simplicibus. Materiam valenter purgant pilulæ au-
reæ, coccia, mollitæ cum aq. aut syr. cephal. infusio-
nis pauci turpethi benè gūmofi. Hūc etiā pertine-
bunt anodyna statim principio adhibenda: vt ol.
chamæm. vulpin. lumbr. tantillo addito rosaceo,
donec fluxio desierit. Diaphoretica sint valentiora.
In tophos aut nodos si abierit affectio, ferè semper
insanabilis. Iuxta illud.

Tollere nodosam nescit medicina podagram.

Vulgò tamen ad ea emplastra parantur ex
gummi ammoniac. opopan. bdellio, cum mucagi-
nibus alth. lini, fœnugr. extract. in aq. vitæ, in qua e-
tiam gummi dissoluuntur, adiectis medullis, adipi-
bus, pulueribus salu. cyper. ireos, hermodactylorum
cera & oleo sufficienti.

*Ischadis cu-
ratio.*

Ischias grauissima est, quæ nullum certè præ-
sentius habet remedium clysteribus sæpe ac sæpe
repetitis. Etenim præterquā quod humorem in af-
fectam partem ruentem reuellunt, oleorum etiam
calore digerunt. Clysterum forma hæc erit.

℥.malu. bismal. violar. centaur. minor. chamædr.
 chamæp.orig.puleg.calamenth.ana M.1. semin. anis.fœ-
 nic.ruth.ana 3.3.flor.rosmar.& chamæm.ana p.1.f.deoct.
 ad lb. 1. In colatur. dissol. hieræ simpl. & diaphoen. ana
 3.2. mell.anth.3.1. ol. lil. & chamæm. ana 3.1. β.f.clyster.

Paulatim augebis olea magis digerentia. Sectio
 venæ in cubito lateris eiusdem reuellendo pluri-
 mum confert, præsertim si phethoricus sit æger.
 Interim quia acerbissimus est dolor, exterius ano-
 dyna applicentur.

℥.olei chamæm.& aneth.an.3.1.puluer.chamæm.3.2.
 misce pro fotu partis.

Repellentia hîc nunquam vsurpanda: nam in-
 trò humorem regerendo dolorem augerent. Lini-
 menta verò magis digerentia sensim imperatur. Vt.

℥.mucag.semin.lini,fœnug.extract.in aqua. stillati-
 tia chamæmel.ana 3.1.puluer. chamæm.3.2.olei lilior.&
 aneth.ana 3.1.axung.anser.3.6.cum cera fiat linimentum
 pro parte affecta.

Efficacius erit hoc vnguentum.

℥.vnguent.dialth.vng.resump.ana. 3.1.mucag.sem.
 lini.& fœnugr.extract.in aq. chamæm. ana 3.1.β. puluer.
 ireos Florent.iuæ arthrit.ana 3.1.β.emplastr.de meliloto
 3.1.β. malaxentur omnia in oleo lilior. vel oleo de tere-
 binth.& modic.aq.vitæ f.vnguent.

Si his linimentis & similibus, quæ quisque suo-
 pte ingento effinxerit, non remittitur dolor, clyste-
 res iterabuntur: à quibus parti fomenta instituen-
 tur. Vt.

℥.mala, bismal. parietar. vcolariæ ana M.1. origani,
 calament.puluer.chamæp.chamædr.agrim. ana M.β.ros.
 rub.p.1.f.deoct. in aq. comm. cum pauco vino albo, pro
 fotu partis cum spongîis.

Ex magmate eius decocti parari poterit cata-
 plasma additis olei lilîac. & chamæm. ana 3.2. pul-

1 Decanro

universi corporis, aut tuberoso corpore, quod elephantis similitudinem fingit.

2 Signis significata propriis, ex quibus non generatio, verum perfectio significatur.

Cuiusmodi sunt rauca vox, resinae, patula & tuberosae nares, labia praeputia, aures retorta, totum corpus tuberosum, scedisque rimis exaratum.

3 Quod in habitu corporis omnino depravata sit assimilatio, in visceribus corrupti sanguinis omniumque humorum perennis generatio.


4 Mutatio ne diata, vacuatione & alteratione.

uer. chamæm. 3. 3. puluer. ireos Florentiæ 3. 2. axungia anseris, vel cati, vel teporis 3. 1. β. cum cera sufficienti. Syluitis probabat fotum ex vrina pueri biliosum. In cataplasmatibus vitanda nimium digerentia, ne tenuiore materia vacuata reliqua occalescat. Ad materiam ab alto ischio euocandam hoc emplastro utebatur Fernelius.

24. gummi pini, resine nigræ ana 3. 1. hermodactyl. puluer. sulphuris viui ana 3. 6. aristoloch. vtriusque 3. 3. ireos Florent. 3. 1. β. cum oleo lumbr. & cera f. emplastrum. Ad des, si velis, adipēs digerentes.

Neque verò interim omittendæ sunt cucurbitulæ, quæ in hoc morbo tantam vim habent, ut primam partem respiciant. Affiguntur sæpe ac sæpe partibus superioribus, à quibus in coxendicem defluit humor. Si ex calore febris corripuerit, ut ferè fit, electariis vires recreentur. Medicamenta purgantia alternatim fumantur. Viscidis alimentis & siccis, itemque syrup. myrtill. cydon. cum aqua multa chalybeata, vino etiam crassiore, nisi febris inhibeat, sanguis ad omnem motum ineptus reddatur. Si spes sit contractæ à lue venerea ischiados, decoctum guaiacini ligni, Cynaræ, falsæ Parillæ eri, ex usu. Si præ dolore somnum inire non potis sit, frontalia & hypnotici syripi imperabuntur.

De 1 Elephantiasis vera. CAP. 64.

 Onfirmata 2 Elephantiasis non 3 curatur. Recens 4 curari potest & prohiberi. Recētem autem volunt, quæ annū non superat.

Sæpiusq; Medicus, ut de morbo iudicet, quā ut eundem curet, appellatur. Signis itaque de mor-

bo 5 pronunciandum est. Temperamentum ho-
 minis spectandum est. Qui 6 sanguine sunt cras-
 siore, huic vitio magis opportuni sunt, & aliquan-
 do hæreditarium malum est. Locis calidioribus a-
 dustus sanguis aut à frigore congelatus hoc malum
 inuehit. A febribus continuis male curatis, ab usu
 alimentorum & medicamentorum, quæ melâcho-
 liam gignant, aut pituitam crassam, quæ nimium
 incidunt & attenuant, aut aliter calfaciunt, nonnun-
 quam huius mali initium est. His piger sensus &
 motus, 7 spiratio retardatur. Durescit 8 aluus, vri-
 næ 9 crassescunt instar iumentorum, aliquando te-
 nues 10 minguntur, spiritus 11 olet grauius, 12 fre-
 quens ructus & 13 sternutatio incitatur, 14 libido
 incenditur, 15 concidit appetentia, crassescunt ma-
 læ, mentum, superciliorum locus, crura & manus,
 16 labia crassescunt, tabescunt muscoli, & is pluri-
 mum, qui medius est inter indicem & pollicem. Fit
 corpus grandinosum. Sub lingua varicosæ venæ
 nigricant, facies rubet ad liuorem. Pili 17 è capite &
 superciliis decidunt, habitus corporis commutatur.
 18 Fiunt pterygodes, quasi alati. 19 Satyros repræ-
 sentant. Somnia 20 molestissima, 21 incubi, mæror
 & anxietas. Pulsus exiguus, imbecillus, creber, tar-
 dus, rubent oculi, & in rotunditatem coguntur, rau-
 celsit vox, narium pinnae dilatantur inferiore par-
 te.

5 Ne conta-
 gione morbus
 ad alios ser-
 pat.
 6 Ob gene-
 rationem hu-
 moris melan-
 cholici peren-
 nem, quia a-
 bundant fa-
 ces, & facili
 sanguis assa-
 tur.
 7 Oppressio-
 ne cerebri, mu-
 sculorum co-
 tumacia.
 8 Viscerum
 incendio, &
 humorum a-
 ræatione.
 9 Ex pertur-
 batione in ve-
 nis à flatulē-
 to spiritu est
 calore contra
 naturam.
 10 Viarum
 obstructione.
 11 Ab aluo,
 pulmonibus
 & cerebro.
 12 Ab hu-
 more melan-
 cholico in aluum fluente, & coctionis infirmitate
 13 Aucto symptomatis
 plethoricis cerebro. 14 A falsis humoribus & flatulento spiritu. 15 Alui
 impuritate. 16 Continuitate interioris tunice, quæ aluo & labiis communis
 est. 17 Nam neque aluntur, neque gignuntur. 18 Consumptione partis in-
 ferioris muscoli trapezite. 19 Mutato faciei colore, charactere, mole, aurib.
 retortis. 20 Materiam somni fera corruptione, 21 Oppressi lienis tumore.

te, nares constringuntur, dyspnœa, mollis auricula contrahitur.

Excrementa olida, interstitium nasi corrumpitur, fixus intuitus. Quibusdā detractus sanguis totus corruptus non cogitur. Sal iniectum calenti & recens extracto sanguini non dissolvitur. Acetum iniectum sanguini non dissolvitur. Si ad spondylia colli transfiguntur, non sentiunt. Perit tandē extremitatū sensus. Oportet igitur vocatū Medicum, ut de re magni momenti pronūciat, hæc signa omnia percurrere. Quæ ut aucta sunt, ita aucti vitij indicium est. Consilium est ²² Galeni, ubi eius mali suspitio est, ut Vere sanguis detrahatur, deinde resectis viribus exhibeatur medicamentum, quod atram bilem purget. Ratio vitæ instituatur, quæ sanguinem crassorem attenuet, ac depuret.

22. *Galen.*
lib. 2. Ad
Glaucon.

Vitato tamen immodico usu attenuantium rationem vitæ ex Aëtio & aliis colliges. Cōsensus est Græcorum & Arabum initio detrahendum eum sanguinem. Sed quia magna ex parte corruptus is est, particulatim ex utrōque brachio detrahes, eligēsque maiores venas, siquidem vires patiuntur, multò magis cū spiratio difficilior est. Alioqui venas extreme manus, vel malleoli aperies. Nonnunquam etiā contentus eris sanguine, aut cucurbitulis cū scarificatione apposis partim tibiis, partim scapulis. Auicennas venas etiam capitis incidit & iugulares, si suffocatio imminet.

A sanguinis missione purgatio ex hiera diacolocynthidos, deinde etiam adiecto dacrydio: postremò etiam helleboro, sed interuallis hæc fieri oportet. Quo tempore cessamus à pharmacis, sero lactis,

lactis, lacte etiam & iis quæ humores 23 præparât,
& depurant. Materia ex capite de melancholia.

Postea verò frequens vomitus. Primùm quidē è leuioribus: deinde raphano: postremò helleborismo. Cucurbitulæ 24 inanes stomacho & visceribus admouentur. Caputpurgia, gargarismata, vnctiones primùm, vt è butyro: deinde vbi pruritus est, ex iis, quæ detergent: postremò, cum vlceratæ partes, conueniunt quæ leuiter adstringunt.

Balnea 25 primùm dulcia. Persuasum 26 vulgò est balnea comparata sanguine humano morbum hunc persanare. Deinde si pruritus est, naturalia conueniunt. In multis remediis brassicæ & absynthij decoctum, stœchados, ligni 27 sancti, coramendatur.

Optimùmque fuerit cum his passulas, ficus, violarū flores, buglossi & borraginis incoquere. Mul-
tò magis, si feruidior sanguis est. 28 Castratio, vt
singulare remedium, ab antiquis probata est. Sco-
bes eboris, cornu cerui, succus Cyrenaicus, aselli a-
quarij, scyllæ semen, & hæc duo maximè contra
dyspnœam. Smaragdus trita, & ex aqua data, vel
cum aqua & gummi illita. Erinacei caput lauda-
tur à Galeno, nepitha, qua eo modo vtendum erit,
quo ligno sancto, id est, cum passulis & cæteris.
Laudatur theriaca, quæ in calidiore conditione
temperari potest, adiecta parte conseruæ violarum
aut borraginis. Laudatur vinum, in quo 29 vipera
viua extincta sit.

Viperarum carnes abscisso capite & caudâ ad
tur & tumescunt: vnde assimilationis deprauatio tollitur.

23 Vt succo
fumaria, ve-
ronica, scolo-
pendria, ce-
therac.

24 Ad vi-
scerum colla-
psorum resti-
tutionem,

25 Aqua ege-
lida scilicet
ex decocto
fumaria, a-
grimonie, be-
ta, mercuria-
lis.

26 Hoc co-
mentum ri-
det Gal. lib.

10. de sim-
plic. med. fa-
cul.

27 Modò
marasmus
πείψεν
viscerum te
non auocet.

Tū enim tu-
tus decoctū
radicis iun-
cata impera-
bis.

28 Sic enim
retenta ma-
teria sperma-
tica abundat,

qua partes
solida frun-

29 Lege Gale-

DE MORB. INTERNIS

putrilagine coctæ cum iure albo veterum, vel iis quæ huic morbo conueniunt, vt & carnes edantur, & iusculum forbeat.

Alioqui non tam suspectum remedium, si pabulis caporum & gallinarum iusculum illud & carnes misceantur. Senties penetrâsse virus, cum plumæ decidunt auibus, tûmque aues ad cibum elixabis. Sed theriacæ & remediorum vsus magis tempestiuus à thermis comparatis è fumaria, borragine, endiuia, nepitha, rosmarino, origano, meliloto, & aliis eiusmodi.

Vstio frequens circa caput satis fuit aliquando, alioqui in tibiis ac genu, aut musculosa parte brachiorum cauteria imprimuntur.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Αλφος.
Κνησμός.
Ψώρα.
Λέπρα.
Ελέφας.

Vitiliginis
tres species.

Leuce seu lepra alba
que fit sanabilis.

Αλφος, id est, vitiligo, κνησμός, siue pruritus aut prurigo, λεύω, id est, impetigo, ψώρα, λέπρα, ελέφας, nomina sunt affectionum, in quibus omnibus malè afficitur cutis à vitioso aliquo succo, qui nequit assimilari, cum aliqua contagione aliàs maiore, aliàs minore. Differunt autem magnitudine & propriis differentiis. Nam vitiligo & pruritus ad lichenem: hic ad pforam: pfora ad lepram: lepra ad elephantiasim veluti via quædam est. Vitiligo vitiosa macula est & foeda ex malo corporis habitu excitata, non in tota carne, sed in cute, sine manifesta cutis asperitate, squamis, exulceratione. Cuius tres sunt species: alphas nomen generis retinens ex pituitoso sanguine: color albus ferè subasper, similis quibusdam guttis dispersis: leuce paulò albidior, ad carnem vsque descendens, à pituita lenta & viscosa, vnde pili albescunt: & μέλας ab atro humore cum colore nigro, & vmbraè simili. Leuce dicitur etiam quibusdā lepra alba, in qua nō iam caro, sed alba caro, media inter sanguineā & exanguem, ac pituitosa generatur. Nō facîle sanescit, si locus pilosus

glabrescat. Cutim incidi iubent, aut acu pungi ad intelligendum, an sanari queat. Nam si sanguis exit, curationi locus est: si pro sanguine humor albidus, sanari nō potest. Aliæ duæ species facilius curantur. Pruritus sine asperitate etiam est & exulceratione cutis, sed excrementi acris sub cute sensum excitat & dolorem. Excrementum acrenitrosus, falsum & amarum, paucius, tenuiusque, quam in lepra, aut pfora. Nasciturque malum ex sorditie, cruditate, cibus vitiosis. Lichē deterior est, habetque duo symptomata perpetua, summæ cutis asperitatē, & leuem pruritū. Gignitur (authore Galeno) ex serosis, tenuibus, & acris succis cum crassis permixtis. Si augeatur & cutem in furfures resoluat, in pforā degenerat: si in squamas fit lepra succis illis tenuibus discussis & crassioribus adustis. Initio à ieiuno salua si quotidie fricetur, curationem recipit. Hoc nomine comprehendunt mentagram Romanorum & nouum illum morbum ignotum ante Tiberij principatū de quo multa sunt apud Pliniū. In pfora asperitas cutis est, furfures, pruritus & colliquatio corporis. Sed non tanta profunditate in carnem descendit, quanta lepra. Distinguitur ergo tum squamulis, tum profunditate à lepra. Paulus addit figuram, quæ varia est in pfora, circulatis in lepra. Materiam habet melancholicum humorem & sanguinem biliosum, sæpèque in squamas resoluitur, exulceratur, serpit: pustulas & sanie emittit vocaturque *ἀγρία* Græcis, Cornelio Celso fera scabies. Lepre propria sunt asperitas cutis profundior, pruritus maior, squamulæ. Scabedo æger non iuuatur, sed vlcera & phlegmonas inducit. Subiecta caro colliquatur, & corpus inuersū à calore præter naturā. Materia est melancholicus humor, multus, viscosus crassius, acris, terrestris, siccus. In quatuor differētiis distribuitur, sola intensione & remissione malignitatis humoris distinctas. Primæ symptomata sunt rubor, exulceratio maior quā in scabie pustule, squamule. Secundæ, quæ deterior est papule, asperitas rubor maior, figuræ variæ, squamule, rosio maior, & celerius, latiusque procedēs. Tertiæ, crassities, tumor, fissure, rosio, omnia, quā in prioribus, maiora. Quarta subalbida, recenti cicatrici similis, incurabilis. Elephantiāsis ab omnib⁹ differt magnitudine. Est enim veluti cācer totius

Lichenis duo perpetua symptomata.

Mentagra Romanorum

Lepre propria symptomata.

Lepre differentia quatuor.

DE MORB. INTERNIS

*Elephantia-
seus varia
appellationes
unde petita.*

corporis. Cuius descriptio copiosa est apud Arctæum. Ex deformitate figuræ & magnitudine affectus varia nomina habuit à Græcis. Elephas enim dicitur, quia corij crassitie, tenebricoso colore, facie fœda & informi, magnitudine Elephantem refert: λέον καὶ λέοντιον, propter extremarum rugarū frontis similitudinē cum leonibus: σατυρίσσις, tum ob faciem satyris similem, tum ob libidinem: ἡγάκλιδον, quia nullus morbus eo maior est. A liene & icore initio sumpto ad extremā cutim continuatur, ibiq; perficitur. Morbus cōtagiosus est ob materiam venenosam & malignam, quæ aërem, & proxima quæq; inficit, sed imprimis salivā, quæ cyathis adhærescit, propter lentorem & venenatum limum dentis. Et quia humor melancholicus triplex est, sanguis crassior, fæx sanguinis, & atra bilis, idcirco tres illius differentias constituunt, à sanguine crasso ὑπερφρεσὺς, subrubicundas, mitiores & minùs malignas: à melancholico humore cum pituita mixto, crassa, salsa, nitrosa & acri, ἐκλύκας, albas: ab atra bile omnibus deteriores, in quib⁹ vniuersum corpus scætet vlceribus, & extremā etiam decidūt. Causæ ferè sunt, semen parentum elephanticiū, victus ratio talem humorem procreans, suppressi menses, hæmorroides, varices cohibita, & quandoq; lues venerea. Quia igitur morbus hic contagiosus est admodū & abominandus, atque aliquando cognitu difficilis, optimè cōstitutum est à veteribus, vt & extra vrbis pomeria ablegentur elephantici, & Medici doctissimi, tanquam Critici ac Censores constituentur, qui hos explorēt, vt apud Belgas, & Arelatæ. Qua de re doctissimè scripsit F. Valeriola in suis enarrationibus. Initium est de annua elephantiorum apud Arelatam probatione vetere senatusconsulto instituta. Signa quædā vniuoca faciunt, alia æquiuoca. Vniuoca quidem, vt ab elephanticeis prognaros esse, etiam aus, aut a tauis repetita origine, cum elephanticeis consuetudo, excretionum consuetarū retentio, ciborum crassorum, salforum, acutorū, nidorosorū assiduus vsus, vini multi & crassi potus, vita ærumnosa in metu & mœrore, extuberationes in plerisque corporis partibus, sed in facie magis, & secundū frontem, aures acuminatæ, nasus simus, labra crassa, horrēdus aspectus, color faciei ex rubeo liuēs,

*Elephantia-
seus causa.*

*Elephantia
signa dupli-
cia, vniuoca
& æquiuoca.*

vocis raucitas, otulorū rotunditas. Signa æquiuoca sunt extuberationes extremorum & crurum, color morpheæ similis & tenebrosus, capillorū defluuiū, & tenuium regeneratio, musculorum, præcipuè pollicis, consumptio, stupor, aut sensus amissio in extremis partibus induratis & exiccatis, scabies, impetigines, gutta rosacea, extuberationes totundæ & duræ sub lingua, palpebris, auribus, vlcerosa lassitudo, cutis crispitudo instar implumis anseris, vinctuosa cutis, & tanquam respersa aqua, sanguis thrombosus, niger, liuens, obscurus. Ex his omnibus notis vel multis simul cōcurrentibus, vel paucis, sed essentialibus & pathognomonicis, explorantur elephantici.

ANTO. VALETII EXERCIT. LXIIII.

Elephantiasis canerosus est corporis totius tumor ab humoris assatione melancholici venenatæ qualitatis participis genitus. Ac citra tetram illam qualitatem id affectus non accidere hinc perspicitur, quod qui toto sunt corpore melancholici, eos non necesse sit elephantiasi prehendi. Alia Arabum elephantia, alia Græcorū & Romanorum. Illa pedum est cum varicibus tumor: hæc lepra vulgò appellata, dira, truculenta, crudelis, membra ad ossa usque erodens. In hoc affectu triplex morbi genus inest: intemperies calida sicca, quæ tandem deferuescente humore, imminutâque exustione frigida euadit: morbus organicus, qui figuram totius corporis immutat: continui solutio, suis signis satis manifesta. Morbificus humor impurus & malignus quanquam promiscuè summa & intima corporis inuadit, præcipuè tamen in iecore ac liene residet, à quibus visceribus in corpus spargitur vniuersum. Et vt in cute sese prima prodiderint labis indicia, eam tamen prius oportuit diu ipsis in visceribus delituisse. Contrahitur vel ab orru, vt à semi-

*Elephantia
Arabum &
Græcorum
distincta.*

*Gal. cap. 7.
lib. 2. de caus.
morbor.*

*Elephantiasis
vnde fit ge-
neratio.*

Elephantiasis signa.

ne, parentum elephantico: vel contagione, vt contactu, fomite, & ad distans, vt per aërem: vel proprio corporis vitio, à bile atra plurimum exuperante, & sensim, per adustionem, venenatam qualitatem asciscente. Incipientis elephantiasis signa sunt, decoloratio cutis, nigricans, flavescent, aut albicans, pro humoris, qui in peculiari cuiusque natura redundare consuevit, exustione. Eadem cutis densior, durior, asperior, in facie, manibus, pedibus protuberantibus. Torpet sensus, & extrema frigescunt, maximèque pedes, ob humorum crassitiem spirituum continuitatem intercipientem. Hinc segnities, spiratio tarda, motus difficilis, alui constri-ctio assidua, respiratio grauis & foetida, ructus continui, vehemens ad coitum alacritas: & vt malum increfcit, sordida ab humorum acrimonia & malignitate plerisque locis excauantur vlcera.

*Paul. Aeg.
cap. I. lib. 4.*

Miserrimum id mali genus postquam penitus radices infixerit, nunquam curationem admittit. Si enim cancer, veluti elephantiasis quædam, vni obortus particule inter morbos insanabiles vel ab ipso Hippocrate relatus est, quantò magis elephantia, ceu totius corporis cancer aliquis, ab omni re-

*Curabilis est
elephantia in-
cipiens.*

medio abhorrebit? Attamen si recens adhuc est malum, & manum quis ei rectè adhibeat, eoque quo debet modo præsidia applicet, ne saltem inuale-scat, augeaturque, prohibebit. Itaque remedia e-runt, mistio sanguinis frequens, pharmaca melan-choliam vacuantia annis singulis reuocanda, bal-nea, cornicula, vini abstinentia, aquæ potus, vsus la-ctis asinini, pullastrorum decocta, hordeata. In qua elephantiasis tota corporis moles putrescit, creber-

*Gal. comm.
ad aph. 47.
lib. 6.*

rimo theriacæ vsu fluxio & corruptela prohibean-
tur. Quod si scabie, papulis, & id genus similibus
eruptionibus à vitioso succo abortis fœdetur cutis,
valebit hoc vnguentum sæpiùs expertum.

℞ axung. veter. lotæ in succo limon. \mathfrak{z} 4. sulphur. viui
in aceto triti \mathfrak{z} 1. salis torrefact. & in succo fumar. modico
extincti \mathfrak{z} 8. f. vnguentum. Vel. *℞* vng. enulati, nutriti, bu-
tyr. torrefact. ana \mathfrak{z} 1. addito plantag. succo f. vng.

Cæterùm præter elephantiaſes ſuperius com-
memoratas habetur vna in ſacris literis lepra ap-
pellata, quæ cauſam agnoſcit longè ſuperiorem,
Dei, nimirum, iuſti vindicis iram. Nam pro peccati
ratione lepra hæc antiquitus ſænibat: vt ſi pecca-
tum paruum eſſet, in parietibus domus maculæ
pullularent: ſi maius, in veſtibus perciperentur: ſi
maximum, peccantium corpota eiſdem deturpa-
rentur: qua lepra infecti quatuordecim in diebus à
Sacerdote ſummo iudicabantur, an extra confor-
tium hominum eſſent relegandi: Non enim ad
eam proſtigandam humana manus ſufficiebat, ſed
diuina potiùs opus erat, cùm nulla remedia illi ad-
hibita conferrent, ſed ſola Dei optimi maximi vo-
luntas.

*De cutis excoriatione, ulceratione, puſtulis &
rubore faciei.*

CAP.

65.

EXcoriationi cutis, qualis eſt ex attritu, lon-
giore decubitu, ceratum ex tribus partibus
olei myrthini, vel roſacei, & vna ceræ, con-
uenit. Quòd ſi calor eſt, ex ſucco plantaginis, deco-
cto ſumach, aut rei frigidæ adſtringentis ſubigatur.
Eidem rei cōuenit vnguentum de ceruſſa. Vbi verò

DE MORB. INTERNIS

rubor faciei & pustulæ, sanguis è media vena brachij detrahendus est, imperanda purgatio, quæ partim flauam bilem, partim melancholiam purget. Cucurbitulæ & ceruici, & scapulis affigendæ cû scarificatione. Sanguisugæ malis, extremo naso, extremis labiis, lateribus menti affigendæ. Abluenda facies primùm ex remollientiũ decocto, vt ficuum, passularum, ab hĩsque fumus excipiendus. Tum vel aqua plantaginis, vel terebinthinæ, in qua mellis portiuncula dissoluta sit, faciem lauabis. Inunges autem axungiaũ vrsina, vel vulpina: alioqui taurina, vel porcina, in qua farina ciceris incorporata sit. Caseus recens ex aceto subactus Aestate conuenit. Vnguentum mixtum ex sapone gallico, & vnguento albo. Ex vnguenti albi parte 1. & 3. olei rosarum subactis cum aqua plantaginis, nenupharis, semperuiui. Sanguis leporis calidus & reliquorum animalium vtilis est. Conuenit aqua distillationis florum salicis, succus limonũ, sulphur viuum, cerussa, caphura. Vbi pustulæ eminent, vnguento enulato, siue hydrargyro concidunt. Argentum viuum ex saliuâ hominis ieiuni extinctum, & cerato, vel adipi incorporatum, efficacissimum est. Hyeme theriaca vti licet, vel vnguento citrino, vel pomulato, vel lithargyro auri, modo Seruitoris præparato. Sed interim dum hæc fiunt, vitæ ratio instituenda est, quæ calorẽ hepatis attemperet. Deinde etiam quæ fumos prohibeat à cibo. Qualis est dragea communis, puluis cõmunitatis, adiecto coralli modico.

ANTO. VALETII EXERCIT. LXV.

Cvtis in facie à carne inseparabilis existit. Et quia assiduè detecta patet, densior fit, illicque

propterea facilius pustulæ insistant, rubor, &c. Hûc quoque faciunt intemperies & imbecillitas. Vacuato prius corpore curabuntur pustulæ, vlcerationes & maculæ litu ex radice lapathi acuti ad putrilaginem in aceto cocta. Rubor aquâ solatri, morellæ, succo limonum. Vnicè commendabat Honoratus Castellanus Medicus Regius hoc remediû.

℞. succor. plantag. portul. vñ immatur. an. 3. 6. album. ouor. numer. 10. farin. hord. lb. 3. semin. papauer. alb. 3. 8. Concludantur omnia vase vitreo, & distillantur in balneo mariæ. Referuetur aqua vsui, de qua abluat faciem manè & vesp̃eri.

Noui celebrem quendam Medicum, cui nasi & faciei totius rubor disparuit his duobus auxiliorum generibus. Horis matutinis ante pastum fructu rosæ caninæ cydoniati more cum saccharo preparato utebatur. Totis verò quinque mensibus ab initio Martij continuò diluebat vinum cichorij decocto.

De dolore

CAP. 66.

DE dolore iam multis locis dictum est, ac postea dicetur. Fit autem vel intemperie, vel solutione continui. Remedia vel paregorica, vel contraria qualitate pugnancia, vel narcotica. De narcoticis multis locis. Paregorica sunt, oleum simplex, anethinum, chamæmelinum, lini, oleum ouorum, oleum in quo althææ radix cocta sit, axungie suis, gallinæ, anatis, vituli, ouum crudum, alia sæpe enumerata.

Cōtraria qualitate & hæc paregorica, caryinum, laurinum, oleum de galbano, de sulphure, & similia calida olea ex refrigeratione nato dolori subue-

DE MORB. INTERNIS

niunt. A calore verò excitato repugnant, oleum violatum, oleum rosaceum, de nenuphare, papaerinum, & similia. Dolorem à siccitate corrigunt, aqua tepida, hydrelæon, lac, buryrú, oleum, axungia, cespypus. Dolorem à sanguinis copia tollit phlebotomia. A flatu, oxycratum tepidum, decoctum ruthæ, anethi, serpilli, & alia, quæ capitibus de morbis intestinorum descripta sunt.

A crassis humoribus cum flatu oxycratum, in quo hyssopus, thymum, pulegium, calamentum, & similia coxerint.

A contusione caseus recens, aloë, aut mastix in oleo myrthino liquata. Vbi locus intumuit, spongiæ fottus ex sero lactis, si quidem inflammatio non est. Sic enim ex aqua tepida fouebimus. Oleum ricininum, caryinum, & in his inculcatus pānus, & parti impositus.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Dolore scilicet quæ sunt observanda ex Galen.

Galenus in aphorismis, & plerisque aliis locis, in doloribus hæc observanda esse vult, qualitatem, vehementiam, diurnitatem, remissionem, intermissionem, comparisonem in diuersis ægris, & in genere dolorum, sensum peculiarem hominis, quod alij aliis vegetiore sint sensu, ut hinc cognoscas, prælagias, remedia distinguas. Qualitas est, ut grauis, pungens, tendens, stimulan, feriens, torpidus. Vehementia ex natura partium & materiæ, vel eiusdem qualitate & multitudine, vel loco affecto pendet. Diurnitatem facit materia pigra, multitudo, naturæ imbecillitas, via intercepta. Ex iisdem & remissio, & intermissio. In duobus aut tribus ægris ita differunt, aut sunt similes. Ex his omnibus periculum, aut contra, facile intelligitur. Sed de his omnibus alio loco accuratius.

ANTO. VALETII EXERCIT. LXVI.

VT sunt causæ dolorum multæ, ita anodyna numero penè infinita. Communis docet experientia hæc præsertim iuvare.

℞. furfur. ʒ. 6. semin. lini recent. ʒ. 2. f. sacculus. Bulliat in tribus partib. aquæ decoctionis chamæmel. & vna vini.

Sic ex mucagineis feminibus cum furfure licet alia dolorem sedantia instituere. Vel.

℞. furfur. lb. ʒ. frigatur cum sapa, & fiat cataplasma.

Plura passim descripta reperias in dolorificorum affectuum curatione.

Hæc sunt, studiosè Lector, quæ desultoriè, & nimium sanè festinanter, in priorem Hollerij Librum, dum sub prælo gemeret, exaravi. Tibi, quæliacunque sunt, si probentur, & me meæ præcocis operæ non pœnitebit, & ad maturiora, palatòque tuo gratiora futura, edenda, quæ certior cognitio, iudicium acrius, & peritior exercitatio parturierint, maiore accedam alacritate.



SINGVLARES ALIQVOT AVTHORIS OBSERVATIO-

NES, QVÆ AD CONSILIA
curandi pertinent.

I



N intolerabili cruciatu capitis, qui & assiduus sit, nec aliis cedat remediis, ferro & igne vtédum est. Frustrà enim pharmaca, cucurbitulæ, topica &c. cōperta sunt, quia hētica quædam capitis intemperies atque infirmitas adest. Et constat quidem permultos meliùs habuisse in eiusmodi malis, & epilepsia, mania, melancholia, hemicrania, terebellis vel cycliscis aperto capite, vel inuisto. Sed ignis toto capite periculosus. Inuenta ergò melior ratio. Locus in brachio medius inter axillarem ferro aperitur. Vulnus continetur, ne coëat, vt hâc perpetuò excurrat materia, atque hîc meliùs, quàm exteriore brachio: quia minùs opportunus locus est occurrentibus externis, minùsque visui patet. Sed interim capiti priùs & vniuerso corpori consulendum, vt pura sint, vt paulatim reducantur ad naturam. Odiosum enim fuerit, si perpetuò locus defluat. Eodém modo in coxariis, & aliis contumacibus malis, ferro & igne vtendum est.

II.

In oculis affectis remedia inspiratu hominis anhelantur. Declinatur frictio capitis, & pectendum in partem posteriorem. Quod si abluendum caput, reclinatum abluatur, atque oculi muniantur. Cauendum ab errhinis & sternutamentis: his enim facile decurrit materia in oculos. In naso multò magis, si ad radicem constrictus est, videndum ne acris materia capitis illac deducatur. Nam inde contingit, ut exeso nasi initio è naso loquantur, & vox vehementer vitietur.

III.

In dolore capitis sæpe sanies subest inter cranium & pericranium. Molliter digito contingendus locus, ut si quid illuc sit puris, intelligatur: multò magis si fixus illuc dolor est, aperiendus locus. Nam sæpe sanies aperto loco defluit, & liberantur: atque inde metus est, ne os corrumpatur. Si qua illuc vena est, aperiri, vel ferro rescindi debet, nisi admodum sit insignis.

IIII.

Cuidam è fluxione acri palati pars mollior ad radicem linguae perforata est. Purgatum corpus, detractus sanguis, imperatum gargarisma è decocto guaiaci, & lacte, contactus locus aqua alchymistarum cocta cum galla, malicorio, & rosis. Acus imperata benè longa, postrema parte incurua, & sub mucronem perforata, quà filum suendo loco traderetur è filo sericio cerato: præterea ut primum coagumentum vulneris rescinderetur, ac rursus resueretur. Ex quibus cum consequuta non fuisset integra sanitas, locus cera, vel sponsia occlusus man-

OBSERVAT. AD CONSILIA

fit, & postea benè habuit æger.

Y.

Alteri è luis venereæ reliquiis capitis dolor, aurium tinnitus, & veluti articulorum confractio, dolor, pustulæ parvæ celeriter inarescentes contigerunt. His conualuit remediis.

℞. radic. ireos, acor. fœnic. ana ʒ. β. radic. gram. & acetos. ana ʒ. 6. summit. lupul. fumar. absynth. beton. ana M. β. salu. p. 2. femin. anis. fœnic. melon. limon. cucumer. ana ʒ. 2. passul. hord. glycyrrh. ana p. 1. fol. sennæ mund. ʒ. 3. agar. trochis. ʒ. 1. β. f. decoct. ad quart. 3. In colatura dissolue sacchar. alb. quart. 3. f. syrup. mediocriter coctus secundum artem.

℞. supradicti syr. ʒ. i. ℞. hydromelit. ʒ. ʒ. f. potus. Vtatur interuallis.

℞. pulueris specier. hieræ diacolocynth. ʒ. 2. puluer.
hieræ picr. agar. troch. ana ʒ. i. mac. ros. & mastich. an. ʒ. i.
semin. citr. limon. an. ʒ. ʒ. croc. gran. 6. cum syrup. de stor-
chade f. pilulæ. Vtatur interuallis.

4. rasur. ligni sancti lb. β. maceretur per tres dies in tribus pintis aquæ, deinde coquatur ad dimid. Utatur mane initio pastus, & sub somnum.

Ab his tempestivius fuit illitus scapularum, spinæ & articularum.

VI.

Quidam curatus est tophis & doloribus hac po-
tione.

℥. lign. Indic. raf. ℥. j. aqu. ℥. ij. folior. card. bened. p. 2
femin. card. ben. p. 1. iuz arthrit. marrub. salu. radic. enul.
ana ʒ. β. summitat. attractylid. ʒ. 2. Macerentur diem vñ
in olla vitrea : deinde bulliant leui igne, & sine fumo, ad
medietatis consumptionem. In colatura refrigerata deco-
quantur ʒ. 4. palm. sanct. puluerat. ad dimid. In alio vase
maceretur per diem ʒ. 2. cortic. palm. sanct. cum vini alb.
odoriferi cheopinis tribus : deinde misceantur cum prio-
re decoctione, & coquantur omnia vnica ebullitione, cola-
tura bibatur mane in lecto, initio pastus, & ad somnum.

Rurfus magna fupradictorum coquatur in lb.8.aq. ad dimid. & fub finem decoct. adde vini alb.lb.1. Vtatur tempore fitis interdium.

VII.

Claudicans ex ifchiade veteri, fine luxatione, fed relaxatis & mollitis articulis, fequentibus auxiliis liberatus.

℥.agar.rh.elect.ana ꝑ.1.puluer. hieræ diacolocynth. 3. ſ. cum fyr. de ſtoechad. formentur pilul. Poterit addi aliquid pilular. de hermodactyl. Vtatur his pilul. per intervalla, aut etiam fyr. obſervatione ſ. præſcripto.

℥.ſalu.maioran.calamenth. ebul.iuæ arthrit. ruth.roſ.mar.beton.ana M. ſ. radic.acor. 3.1. fol laur.p.2.f.decoct. in aq. & vini quantitate ſufficienti. Impleatur vaſculum hoc decocto, benè clauſum plantæ pedum admoueat, dum calor ad cruris ſuperioris articulos perueniat. Eodẽ decocto pars foueatur. Materia cum oleo laurino ſubacta articulo apponatur.

℥.euphorb. caſtorci, ſtyrac. calamith. ana 3.2. liqueſcant in vaſe duplici cum olei chamæm. & laurin. ana 3.3. Cum eo oleo calido ſ. forus. Vel. ℥.olei ſupradicti 3.4. ceræ 3.1. ſ. terebinthinæ vnc.1. miſce pro vnguento.

Poſt verò vbi materia fuerit reſoluta, vtatur balneis naturalibus, vel factitiis è ſulphure, ſale & alumine, cum dupla aqua. Emplaſtrum etiam valet ex ebulo in vino cocto. Potus hydromeli, & ratio vitæ conueniens.

VIII.

Mulier honeſta, mollis & rara, annorum 30. febre, diſtillatione veteri in pulmones laborabat, foetum geſtans octimeſtrem. Imperatæ ſunt aliquot purgationes. Phlebotomia iterata. Ratio vitæ ex expreſſis carniū ſuccis, iure crur. ariet. colatit. diſtillatis. Cōtra exulceratum guttur ſic pugnatũ eſt.

℥.hord.mund.benè medulloſi 3.3.decoquantur in aquæ

OBSERVAT. AD CONSILIA

℞. 3. Colatura traiciatur per manicam Hippocratis cum sacchar. cand. vel rosacei quarta parte, & modico cinamo.

Extrahatur succus ex amygdal. dulcib. velut lac, sine igne, & affusa aqua illa hordei modica, deinde edulcetur cum saccharo Cando, rosaceo. Teneat alternatim ore saccharum Candum, rosaceum. In difficultate anhelitus cucurbitula alternatim scapulæ affixa. In difficultate partus decoctum veteris galli cum modico cassiæ lignæ & croci, & tantillo vini odoriferi.

Vnctio pubis & sub vmbilico cum ol. liliac. mucag. sem. alth. ana ʒ. i. β. medullæ cerui ʒ. i.

Appensus Iaspis, Aëtites, radix aristolochiæ, cyclam. & similia, coxæ. Vel admota trita radix cyclamini & similibus pudendi orificio.

℥. rad. gram. & petros. ana ʒ. β. arthemif. nepith. ana p. β. femin. anif. & fœnic. ana ʒ. β. f. decoct. ad vnc. 3. Transfundatur colatura per manicam Hipp. cum cinam. elect. ʒ. i. cass. lignæ ʒ. 2. sacchar. vnc. i. Detur in labore partus. Item. ℥. arthemif. nepith. ana p. 2. f. decoct. in vna aquæ parte & tribus vini pro fotu.

Obstetrix intingat digitos in oleo nardino, vel costino, & molliter contingat sinum pudoris.

Si vomitus moueatur, iuuetur oxymelite & aliis præsiidiis. Peperit die 7. leuata febris, & omnia imperata, quæ instaurant: consumptum è crure veruccino, capo, & thorace vitulino, dum omnia propè ad tres lances consumpta sint, colatitia, expressa, vinum album tenue. Amygdalata ad leniendum, hord. decoctum vt prius, & lac expressum ex amygdalis. Contra tormina decoctum feminis fœnugr. benè loti in aqua calida, colatum per manicam Hippocr. cum sacchar. & modic. cinam. Syrup. capill. ven.

ven. cum succo amygdal. Inunctio ex oleis, & litus, ut prius. Sacculi è milio. Prohibitus somnus in horam vnam, aut duas, propter multas vacuationes. Stomachus illitus mastichino.

Contra animi deliquia mica panis intincta vino. Mortua est decima hora à partu. Apertæ vterus grumis plenus inuentus est, totus venter flatibus tumens, ren dexter purulentus, hepar quantitate peccans, lobo vno nothis costis hærens, colore totum vitiatum, aridum ac veluti frixum, aliis partibus quasi putredine mucosum. Similiter & pulmones, in quorum summo ad arteriam vomica pure plena erupit.

IX.

Mulieri cuidam natæ ann. 28. tibia posterior vehementer intumuit, ut inde dolor grauis, præcipue noctu, excitaretur, & tendines crurum extensi nimium membrum incuruarét. Initium morbi quatuor antè annis. In vteri gestatione puerperio minuebatur. Mansit tamen reliquum quid, & tertio conceptu plurimum intumuit. Minuebatur resoluentibus malacticis: suppurantibus non concessit. Ingrauescit malum: parit. Apertus tumor cauterio frigido. Nihil exiit, præterquam cruenta sanies. Caro emortua, inania quædã loca, nullus ea parte sensus. Cataplasma è farina hordeacea & oxymelite, quæq; putredinem arcent, admota. Expuit sanguinem: commota aluus multa deiecit mala. Biduo priusquam moreretur, pulsus vehemens fuit & frequens, neque tamè respondebat febrilis calor. Decimo die postquam aperta vomica est, expirauit. Præfagio iam antè facto liberati calumnia Medici

172 OBSERVAT. AD CONSILIA
& Chirurgi.

X.

Alteri post 15. annos à connubio parere contigit. Laboravit multum à partu. Secundæ substituerunt; euulsæ frustulatim. Obstetrix assererat superesse aliquid. Febris nata. Hinc nigra lingua, dentium interualla scabritie nigricantia, facies *νεκρώδης*. Septimo die mortua. Secta inuēta caro oblonga adnata vtero, & membranarum pars, quæ computruerat.

XI.

Homini hirsuto, nigro, & habitu melancholico solennis erat singulis mensibus diarrhæa quædam torminosa, declinante Luna. Defluxione in testiculos facta, & sarcocele, excētus est. Nimis laboriosa vita, & itinere per æstus & frigora, incōmoda cœpit valetudine viuere, interuallis leuiter febricitare. Cessabat tardiùs diarrhæa. Correptus est febre lenta, quæ noctu exacerbabatur, & tumore duro, dolentēque in dextris ilibus. Dolor à rene dextro incepit, tum in dextrum ilium & sinistrum progressus. Ad sinistrum renem rugitus erat, & velut borborygmus exaudiebatur. Vomitus vna hora à cibo. Quæsitum vnde ea materia, num ab intemperie earum partium, aut alia parte. Alij ab hepate, quia solennis erat diarrhæa, os amarum, vomitus amarus aliquādo. Mihi hoc placuit, partes excētas, in quibus obduruerat callus, naturâ frigidas, equitatione & venere fessas & infirmas fuisse, resistentem diarrhææ materiam, & aliam eò confluisse, intercepta via refluxisse partim ad peritonæi partes, partim ad obliquos epigastrij musculos, atque ita tumorem succreuisse. Si verò ab hepate id esset,

vel per venas, atque ita potius ad intestina, vel per superficiem, quia in membrana cingente hepar vesicæ quædam ὑδατώδεις excitatæ exudarent in epigastrij medium inter peritonæum & omentum. Os verò amaricare non à bile, quæ ab hepate refunderetur, sed potius à putri humore, & fumis, hydropicis id accidere, & aliis vomitiones in colica frigida, & sitim, & amarorem, & cætera apparere. Materiam tumoris non esse bilem, sed frigidam, crassamque pituitam. Itaque videndum fuit, ut reuelleretur materia, quæ influeret, non per vrinas, quia partes genitales infirmæ exciperent, sed per aluum. Æger enim clysteribus plurimum leuabatur, tum medicamentis, quæ agaricum & alia phlegmagoga reciperent. Quod ad tumorem videndum esse, ut remolliretur & discuteretur: sed metum esse ne suppuraret, quia à ventris dolore diurno (ait Hipp. aph. 22. lib. 7.) suppuratio expectanda est, nisi peccetur ab ægro, aut medico, aut æger præripiatur. Id etiam Aurelianus annotauit in Chronic. Et veteres cataplasmatibus vsi sunt & potionibus, quibus acceleraretur suppuratio, sperantes ut ea materia tenuata in intestina transfunderetur. Id quod sæpe probârunt, ut aliquando per vrinas, aliquando per aluum purgaretur. Et Aniceti est medicamentum apud Galenum, quod hoc polliceatur efficere.

Hoc tamen metui propter virium imbecillitatem.

Crus oppositum deinde tumuit, & loco vno ventris persistebat dolor. Tensio aliquando ad testiculos. Vtróque crure intumescente, & sursum

OBSERVAT. AD CONSILIA

refluente materia, ad diem ferè quadragesimum mortuus est. Facto ulcere in crure, quà materia extra flueret, seruari fortasse potuit.

XII.

Cuidam podagrico malum ad stomachum conuersum est. Vnde dolor tendens & grauis. Imperatum est primùm hoc oxymel, & quæ sequuntur remedia: à quibus præter spem multorum integrè curatus est.

℞. oxymelit. simplic. Galen. lb. ss. In fine decoctionis eius infunde fol. menth. siccor. p. ss. Deinde traiciatur per manicam Hippocr. cum cinamom. drach. ss. galang. & calam. aromatic. ana ℥. i. Vtatur primùm frigidò, deinde tepido ad vomitum.

℞. aloës succotr. optim. ℥. i. rh. elec. 3. ss. mastich. ros. cinam. galang. ana gran. 8. Incorporentur omnia cum syr. de menth. dentur ex cochleari.

Purgato corpore cucurbitula super vmbilicum applicetur, quæ priùs immersa sit in vino decoctionis ruth. menth. absynthij.

℞. mellis anthosat. mell. ros. ana vnc. 2. aqu. vitæ 3. i. Bulliant in balneo mariæ, vel cinerib. calid. ad consumptionem aquæ. Deinde insperge cinamom. calam. aromatic. galang. mastich. ana ℥. i. Misce. Vtatur antepastum vno cochleari.

Manè vtatur zinzibere viridi, & nuce moschata viridi, conditis. Auiculis, alauda, perdicibus &c. confixis caryophyllis. Fiant fomenta ex oleis de ruth. spic. mentha, absynthio. Vel.

℞. horù olear. 3. i. ss. mythridatij 3. ss. misce, & affrica ventriculi orificium.

Vtatur vino albo, veteri, pane albo bene cocto, & aniso condito. Item.

℥. puluer. menth. siccz drach. 2. puluer. absynth. 3. i. caryophyll. ligni aloës, xylobalsami ana ʒ. i. cinamom. mac. ana ʒ. ʒ. f. puluis. Viatur mane cum ouo sorbili, aut in consumpto.

Mollis frictio circumducta in ventrem, etiam in articul. deinde longè à cibo, vt facta iam coctione.

℥. oleorum de spica & menth. ana vnc. i. ol. rut. ʒ. ʒ. ol. de castoreo ʒ. 2. mythridat. ʒ. i. zibetti gr. 8. misce pro litu stomachi.

Fiet fots hepatis cum oleo de absynthio & chamæmelino, vt Hyeme. Vel.

℥. ceræ albæ nouæ vnc. ʒ. ol. rosac. chamæm. & absynth. ana ʒ. ʒ. f. cerotum molle: malaxetur cum vino albo leuiter adstringente. Intendatur in linteo molli, & tepidum apponatur.

℥. fol. rut. ment. absynth. rosar. ana p. x. cumini cōquassati, carui, dauc. anis. ana ʒ. i. galangæ, piperis longi ana drach. ʒ. Conquassata omnia distemperentur in aquæ vitæ vnc. 4. Deinde cum vnc. 4. olei de spica leuiter coquantur in balneo Mariæ ad aquæ consumptionem. Expressum oleum seruetur. Cui adde zibetti gran. 6. mythridatij vnc. ʒ.

℥. olei de spica, absynth. & menth. ana ʒ. ʒ. caryophyll. mac. cinamo. cardamom. rosar. corall. galliæ moschatæ ana ʒ. i. cum cer. mastich, aloës ana drach. ʒ. f. linimentum. Loco rosar. & corall. addes galang. granor. paradisi ana ʒ. ʒ. vbi non ita magnus est calor.

XIII.

Quadragenarius febre ardentissima correptus, doluit etiam à latere. Detractus mediocriter sanguis ad vascula duo. Perseuerant omnia, neque cedit dolor remediis. Sexto die detractus iterum sanguis ad duo vascula, putris & corruptus. Sudor septimo leuis, tenuis, & tantum in capite & thorace. Nihilo melius habet. Deliria nocturna, æstus & inquietudo magna, vrinæ turbidæ, sudauit nono

OBSERVAT. AD CONSILIA

& vndecimo, nihilo leuata febre. Decimo leuius habere visus, nocte eadem patitur. Vndecimo vrinae subsident, sed diuulso & nigro sedimento. Sudat vt prius. Pulsus perpetuò frequens & magnus cum pauca inæqualitate. Iam tendines manuum sine manifesto membri motu reuelli sentiuntur. Vrinae benè coloratae & corporatae cum sedimento nigro. Decimotertio floccos colligit, manibus reuelluntur digiti, delirium ferè perpetuum. Decimoquarto media nocte mortuus est. Pulmonibus corruptis, nigricantibus, inuentus est.

XIIII.

Puero annos nato 12. repentè syncope correpto & muto, in lecto reposito, temere, quasi gesticulando, mouebatur corpus, crura & manus. Subinde garrulus vocatus non respondebat. Diem integrum ita habuit. Clysteres non retinebat. Balano acuta cum hiera diacolocynthide, & cucurbitulis in ceruice rediit, & sanatus est.

XV.

Principi Lotaringo, magno priori ordinis Rhodiorum Equestris, ancyle in dextro cubito sequentibus remediis curata. Post habitam totius corporis rationem, victus & domicilij, hæc ordine sunt instituta. Frictio partis è molli manu: ex quo vapor è decocto molliente: immersio in idem decoctum partis ægræ: ficcatio loci: inunctio ex axungia humana benè purgata, colata, lota in aqu. mistura. Ceratum ex cera molli, pingui mollita ad igne, manibus intinctis butyro, deinde liquata cū butyr. recent. & axung. humane supradictæ aqua quâtitate.

Ab vnctione superdatum molle gossipium.

Decoctum institutum guaiaci ex vnguinosâ, odorâ, & media parte ligni, initio.

Interuallis acerum album, aqua vitæ decocto vaporationis intermissa. Ex quo ceratū celsi descriptione Philagrii.

Capiti tunso gossipium conspersum puluere caryophyllorum. Errhina, masticatoria.

Saluia in sartagine concalfacta, & conspersa aqua fœniculi, vel saluiæ, frictio capitis & spinæ.

Immersio totius brachij in animal recens matatum. Exercitium molle partis. Effectum fotu & axung. vt octo diebus dissoluto tumore, liberatis neruis omninò, sanus euaserit, liberis omnibus motionibus totius membri.

XVI.

Quinquagenarius longo corpore & collo, satis oportunus tibi, tussicula, flatibus, pituita tres annos laborauit. Audiebatur quasi aqua fluctuans ad diaphragma & ventrem. Alij vitium lienis causabantur. Purgationibus, decocto guaiaci, & aliis vexatus nihilo melius habuit. Subtrahidus, malè coloratus. Tandem decretum est, desperantibus Medicis & ægro, vt aperiretur thorax primùm cauterio potèntiali, deinde cultello. Nam proprius ad mota aure intelleximus materiam diaphragmati insidere, non esse in ventre. Itaque inter quartam & quintam vertebram aperta via est, monitis ægri amicis, quantum periculi immineret, ægro quoque monito, & id postulante. Effluxit pus multum crudum. Quinque post diebus mortuus est. Dissecto ægro inuentus pulmo aridus, scirrhis plenus, syderata pars mē-

OBSERVAT. AD CONSILIA

branz succingentis & costarum. Venter inferior integer. Nunquam pus expuerat, neq; sanguinem. Laborauerat longo antè tempore, vt ferè triennio, pleuritide.

XVII.

Cuidam perforatus venter acuto ense, intestina tenuia vulnerata, & pars crassorum. Exierunt intestina per vulnus, & stercus. Desperatus erat à Medicis, sed longa cura conualuit.

XVIII.

Alteri ad scapulas inflitum pugione vulnus, deorsum inclinans. Apertum latus ad quartam & quintam vertebram, vt pus, quod in diaphragma decumbebat, hâc efflueret. Vixit annū aperta plaga. Expuebat sanguinem & pus.

XIX.

Nobilis adolescens annor. 15. Baro Dessaulx, Provincialis, molliter educatus, deinde ad aulā translatus, febre ardente correptus est, deinde lenta. Ortis exanthematibus tumuit ab utrôq; hypochondrio: & velut materiam purulentam seorsim ab excrementis alui, & aliquando ante alui excrementa reddidit. Erat autem, qualis est materia atheromatis. Quæsitum vnde prodiret. Nam ab abscessu credebatur. Alij pituitam esse à cerebro, alij ab intestinis autumabant. Sed quia nihil mordebat, nec iniecto clystère sensus vllus doloris erat, & pituita tantum detergebatur, verisimilior sententia putauit abscessum esse in inferiore mesenterio. Data visceribus quæ molliant, & leuiter discutiant. Atque cum clysteribus non iuuaretur abscessus, vsus fuit conuenientissimus apozematum solutiuiorum, te-

rebinthinæ, pilul. ex hiera picra & aloë, datæque hæ ad 3. ℥. iusto effectū. Imperatum decoctum ligni sancti. Consultum viribus. Desiit pus excerni: mansit tensio in dextro hypochondrio, & febricula post retentum pus, non à medicamento, sed à reliquis obstructionibus. Imperatum est catharticum è syrup. de cichor. compos. cum rhabarbaro, & decocto radic. oxalidis & gram. Conualuit.

XX.

Quinquagenarius, aut ad circiter, è febre tertiana æstiuâ Autumno in quartanam simplicem, hinc in quartanam triplicem degenerauit, atque ad Nouembrè in hydropem. Desperatus est à Medicis, quia Practici confirmatum hydropem dicunt post secundum mensem. Relata causa ad hepar refrigeratum partim morbo, partim vsu aquarum distillatarum acetos. & cichor. quibus plurimum fuerat vsus. Itaque læsa sanguifica virtute visum est primùm hepatis roborando consulere oportere his tabulis.

℥. diarrhod. 3. ℥. lign. aloës & rasur. ebor. ana 3. i. cinam. 3. ℥. sacchar. in aq. agrimonie solut. q. s. f. tabell. que pendeant 3. 2.

Deinde etiam syrupo de cichor. simplic. ad obstructiones liberandas, &c. Frequens fuit foris faculis ex iis, quæ discutiunt & roborant. Datæ sunt pilulæ Raucedsen. auctæ rh. & agar. troch. infuso in succo ireos. Syrup. laxatiuus præscriptus, qui reciperet aperientia, semen cartham. polypod. sennam, agaric. &c. cum 3. i. ℥. succ. ireos. Deinde therma sicca, illitus primùm ex ol. aneth. & chamæm. deinde ex fermento, emplastro de baccis lauri, sterco-

re caprillo, postremò cauter. in tibiis. Instituta diu-
retica. Atque omninò in roborantibus hepar &
ventriculum, in purgationibus per intervalla, reli-
qua curatio posita. Mortuo Februarij initio inuen-
ta sunt syderata intestina, similia aquatilibus Colu-
bris, omentum corruptum, hepar multis occu-
patum scirrhis.

XXI.

Quidam Germanus adolescens 18. annorum, v-
sus antea Beria, in Galliam venit: vbi crapulæ in-
dulgens cœpit vertigine laborare, reuomere quæ
sumebat, dolere ad ventriculum. Adhibito reme-
dio cessauit vomitus & vertigo. Melius habuit. Sed
post quartum aut quintum diem rediit malum.
Languit leui febricula. Inuasit leue delirium, vnde
facile redibat ad se. Pulsus languidus. Decimoquar-
to sudor multus, perturbatio, pulsus concidens. De-
cimoquinto in eo sudore mortuus. Aperto inuen-
tum epiloön putrefactum, hepar, sicciior ventricu-
lus interior ad finem quasi contusus, nigro succo
ex dimidio plenus.

XXII.

Hispanus nobilis, qui seruiebat Duci Albano,
quo tempore Carolus Quintus cogitabat bellum
contra Germanos Anno 1545. Lutetiam venit, fru-
strâ petitis auxilijs in Italia, Hispania Germania,
remedijs sequentibus curatus est. Ad venerem in-
eptus erat, quòd flaccido esset pene, quique erigi
non posset. In quam rem cum ad me venisset, vo-
catis è senioribus & celebrioribus Medicis Parisië-
sibus ad cõsiliũ, visum imprimis malũ ab vlcere ef-
se, & læsis nervis atque arteriis, quæ impletæ flatu

penem erigunt, partes ita lædi, vt spirituosum sanguinem non exciperent. Curandum fuit vlcus, instituenda omnia quæ calidos flatus gignerent, & partes genitales corroborarent. Atque habita primum ratione corporis totius per medicamenta, leuem phlebotomiam & decoctū guaiaci, hæc compositio singularis & diuina erigendo peni, & excitandæ veneri instituta, quæ cum, remediis aliis frustra tentatis, conualuit.

℞. vitellor. ouor. 3. i. β. butyr. recent. pudend. tauri, cice. galang. satyrion. zedoariæ, zinziberis conditi, menth. testicul. galli, testicul. vulpis ana 3. i. cerebellor. colubar. & passer. benè coctor. & assor ana lb. i. medull. auellanz Indicæ, pineolor. mundator. fisticor. iuiubar. amygdal. dulc. mund. semin. maluz; sem. mercurialis, auellan. ex-corticatarum, dactylorū an. 3. i. semin. dauc. caryophyll. piperis, trium generum linguæ auis, semin. capæ, porri & scariol. cinam. an. 3. i. Coquantur simul omnia in lacte ouino: postea fortiter terantur. Omnia conficiantur cum melle rosaceo, & saccharo albisimo: coquantur lento igne, benè misceantur.

Poterunt aromata post coctionem aliorum inspergi, quo modo fit in conseruis, conditis.

℞. dialatyrionis ex 2. descriptione Mesuzi 3. 2. vtriusq; diamargariti, aromatic. ros. ana 3. i. cinam. 3. β. pudend. ceru. 3. i. cum melle anthosato & radic. vna zinziberis viridis misce omnia. Detur manè & hora somni ad modum maioris auellanz cum vino albo. Item. ℞. ol. de spica, lior. & mastichini ana 3. i. adip. cunicul. & anar. ana 3. β. adip. passerulor. farctorum radice satyrion. & modico zedoariæ, adipis columb. an. 3. 6. semin. eruc. raphan. capæ puluerat. zedoariæ ana 3. β. croc. ʒ. 6. f. linimentum pro lumbis, pectine & perinzo.

His sanatis remediis abiit.

XXIII.

Nobilis Picto, cui paulatim ganglium excreuerat

OBSERVAT. AD CONSILIA

in inguine dextro tam magnum, quàm pueri caput, cum adnato crassiore tuberculo, in consilium adhibuit Medicos, Fernelium, Syluium, Holleriũ, Chirurgos, Thierryum, Riuiarium, Ambrosium Paræum. Medicis cum Ambrosio periculum declarantibus, si excinderetur (nam hoc vnum erat remedium) alij contrà senserunt sine periculo incidi posse. Vicit consilium plurimum, quia metuerent hæmorrhag. gangrænâ ab incisione, claudicationem. Post aliquot dies reuocatus æger cum Chirurgis de incidendo agentibus, altero voluit die rem longa disputatione agitari. Tandem conuentum, ægro impellente, & profitente se mori malle, quàm diutiùs malum perferre, quia & armis ineptus esset, & cõiugio atque coïtui, oportere in circulum molem incidi, circulo longiùs ab inguine & scroto circumscripto, deinde ad membranâ tumorem paulatim exsecari, paulatim quoque pellem separari, quæ esset versus radicem: venas & arterias, vt detegebantur, contra hæmorrhagiam ligari. Quod post aliquot dies Fernelio & Hollerio præsentibus à Theodorico Thyerio & Riuiario, tribus aliis Chirurgis assistentibus, effectum fuit. Euulsa moles cum tunica, glandulosa, albicans, intus sine sanguine & carne, multis constans glandulis, à sua pellicula seu pediculo facilè separabilis. Glândulam pinguem representabat. Iam sanescente vulnere, febricula, oris amarus, fastidia incurabilia, virulenta sanies, foetida, dolor in altero inguine, pube, ventre. At tandem soluta aluo, liberatur amarore, & aëri commissus, vt ad suos rediret, perbellè habuit.

XXIII.

Cuidam deuorata piscis arista difficilis labor in gutture, abscessus, raucedo, difficultas spirandi. Iussus vt ex longo traheret spiritum, facile trahebat: vt semel & confertim audiebatur strepitus in gutture, aperto ore, nihil vitij apparebat. Collum anterius erat subtrudum. Visum itaque vitium esse imbibitum musculis laryngis, & vicinis partibus. Institutum pharmacum quod vniuersum purgaret corpus: er rhina, quæ caput: frictiones quæ diuerterent: decoctum ficuum, in quo oxymel simplex, scyllitic. & similia dissoluta. Foris, quæ leuiter discuterent, cum lana fordida. Iussus æger non bibere frigidum, tenuiter viuere, lacte amygdal. & simili victu detergente, incidente & tenuante vti. Mox curatur.

XXV.

Brito quidam nobilis correptus febre tertiana in prima accessione summa virium imbecillitate laborauit, vt videretur mori. Tertio die in secunda accessione eodem modo habuit. Somnolentus in vtrâque, vt vix somno posset prohiberi. Aliis accessionibus vigil, neq; ad somnum verti potuit. Sexta mortuus est. Adhibita etiam ab initio fuerant remedia, quæ vim vitalem sustinerent.

XXVI.

Cuidam mulieri Aurelianæ excreuit caro à ginguinis parte interna durior, externa mollior, insignis vtrâq; magnitudinis. Mulier erat sterilis, male purgabatur, habitu melancholico. Adhibirum consilium, monitumq; iam ab annis tribus initium esse mali, crescere in dies cum dolore, sed sine putredine, odore graui, sine dentium vicinorum corruptione.

OBSERVAT. AD CONSILIA

Vnicum in incisione remedium. Sed ab incisione metus hæmorrhagiæ, convulsionis, irritationis partis, unde cancer. Tandem visum fuit exteriorem debere vel ferro incidi, vel filo præligatum tabefieri. Ut videretur num quid ossis, quod erat ad pediculum, corruptum esset, ut inureretur radix, & si quid esset corrupti ossis, igne corrigeretur. Quod ut succederet, ad interiorem simili ratione veniendū esse, à qua periculum maius, quia durior, quia interior pars propter tunicam & nervos magis periculosa: ac cauterium, quod inderetur, decisa carne immitrendū per canaliculum. Hæc omnia post purgationes frequentes, phlebotomiam, cucurbitulas, derivationes, integram sanitatem attulere.

XXVII.

Cuidam adolescenti annor. 15. tumor, velut inflammatio, ad malleolum dextrum. Adhibita iusta remedia. Quarto die cœpit balbutire, causari stomachum, deliravit. Cum autem videretur qualitas venenosa efferri à pede, putavi adhibendum loco cauterium potètiāle, aut locum eum scarificandū esse. Quod minimè factum est, reclamante pertinaci & imperito barbitonsore. Clyster iniectus, à quo cōveniēter deiecit. Auctum delirium. Phreniticus eodem die quarto mortuus April. mense, Anno 1548. in collegio Barbarano. Febris erat latens & obscura, sitis ingens, lingua fuliginosa.

XXVIII.

Stephanus Hæcquē cœpit leuiter è catarrho laborare. Rubor quidam apparet in facie: multa loquitur, prudens futuri delirij coniectura. Quarto die, quo statim detractus sanguis, melius habere

visus. Sexto delirauit nocte. Matutino melius habuit. Sequenti nocte phreniticum auctum malum, conuulsio totius corporis & maxillarum. Adhibitis remediis cessat phrenitis & conuulsio, nisi quod leuis quidam tremor subapparebat. Decimo apparuit vrina melior cum leui sedimento diuulso, acuto. Sub meridiem sudor frigidus. Eodem die, rite omnib⁹ alioqui institutis, & nullo peccato ab agro, neq; à ministris, morbi malignitate mortuus est.

XXIX.

Quidā apoplexia correptus frictione, motione, phlebotomia excitatus est. Sequuta febris continua satis mitis, sed cum delirio. Negligentiùs curatus, neque expuens, quæ in pulmones defluebāt nono die à febre, decimo ab apoplexia suffocatus est.

XXX.

Qua parte recti musculi ad sternum pertinent, puero cum abscessu in ventre tumor manifestus, digito cedens, obtigit. Vocati ferè omnes iudicârunt abscessum in rectis musculis: alij in ventre, qui attenuato vehementer puero, & consumptis musculis facilè emineret tumor. Paucissimi in hepate, quòd quibusdam hepar totum ventrem ad partes sinistras pertendat. Aperto loco exiit pus virosum & grauiter foetens, corrupto peritonæo. Abscessus sedes in parte hepatis, quæ illuc perueniebat. Quod magis apparuit mortuo & dissecto puero.

XXXI.

Quidam Luteriæ dum dentem euellit, simul & partē maxillæ, & vicinōs dentes detrahit. Hæmorragia sequitur periculosa. Vocatus in ius Chirurgus liberatur, quia inuenti dentes nō inferi, sed omninò

OBSERVAT. AD CONSILIA
maxillæ continuari.

RARA QVÆDAM.

- 1 Quidam Lutetiæ vomicam membrana tectam, ovo similem, è pulmonibus expurgavit, cùm antè fuisset asthmaticus: & ita paulò post extinctus est.
- 2 Aluis eminxit multa quidem similia liquidis margaritis, admodum pellucida, alia crassiora, mediocriter cocto oui albumini similia.
- 3 Nouimus quendam, cui è regione hepatis vena per interualla dehiscebat, quæ sanguinem funderet. Restitante sanguine vestigium non apparebat.
- 4 Rigida Hyeme anno 1543. ad fines Ianuarij & initia Februarij salutes pleuritides grassatæ sunt: quarum quidem aliquot per vrinas nigras, crassas, in quibus supernatabat multa spuma crocea, crassa, glutinosa, iudicatæ sunt.
- 5 Aperta mulier à nobis in Scholis Medicorum Lutetiæ lapidem habens in vtero, in cranio anteriore, & quæ sine liene inuenta sit.
- 6 Visa mulier à nobis, quæ in altera mamma duplicem papillam lac reddentem haberet.
- 7 Cuidam mulieri Lutetiæ totum corpus molle, flexile, & sine solidis ossibus fuit.
- 8 Lutetiæ cuidam mulieri grauidæ fœtus exerta manus est per vmbilicum, & quindecim dies ad partum sic stetit, saluâque matre euasit viuus, & vitalis.


FINIS.



IACOBI
HOLLERII STEMPANI,
MEDICI PARISIENSIS CE-
LEBERRIMI, DE MORBIS IN-
tern. Liber II. febrium Historiam
& curationem continens.

ANTONII VALETII OPERA I AM-
nunc multò quàm antea auctior ac inte-
rior factus, & scholiis non pœ-
nitendis illustratus.

Quid sit febris.



FEBRIS ¹ calor est præter naturam, ² accēsus in corde. Substantia ³ ergò febris est calor præter naturam, qui omnino in corde accenditur. Aliàs verò ⁴ toto corpore sparsus, aut saltem in quamplurimis partibus, vel certè principibus inest. Pessimum genus febrium, cùm vruntur interiora, exteriora frigēt, ⁵ vt in lipyriis, & cùm viscera interiora inflammantur.

¹ Hinc est, quod febris ad intemperiem calidam, tanquam ad summum genus, Galeno referatur, cap. 5. libel. de different. morb.

DE MORB. INTERNIS

2 Cor cū sit fons innati caloris, principiū quoque sit febrilis est necesse: siquidem nō alius ab illo calor sit, qui in igneum conuertatur. Gal. com. ad aph. 14. lib. 1. & ad sent. 18. lib. 1. de vict. ratione in morb. acut.

3 Galen. comm. 3. in lib. de fractur. sent. 8. & in aphor. 5. lib. 6.

4 Satis tamen est ad febris constitutionem, si calor ille plurimas, aut nobiliores occupet partes. Gal. comm. ad sent. 29. sect. 1. lib. 6. Epid.

5 Neque enim in causo, neque in tertiana, quę febres omnium calidissimę perhibentur, internę partes usque adeo aduruntur perfrigerata cute, atque in lipyriis; quas propterea Gal. maximę malignas appellauit cōm. ad aph. 48. lib. 4.

Malignum quoque, 6 quod *αἰσώδης* vocatur: in quo exteriora quidē moderatē calida sunt, intus ardor est, sitis insatiabilis, perpetua corporis iactatio, vigilia, deliriū: quod fere fit crasso atq; contumaci humore in primis venis putrefacto. Aliquando in corde vehemens æstus est, quod vehemēti palpitatione (cordis motu præter naturā) intelligitur, moderatus tamen ad manū calor est. Pereunthij celeriter, & sub mortem tenuis quidam & frigidus sudor effluit. Itaque febrilis calor 7 non perpetuò toti corpori æqualis est. 8 Optima ratio diuidendę febris ex Galeno lib. 1. de differentiis febrium, est, vt è substantia, hoc est, iis, quę definitio eius continet, differentiæ sumātur: è calore videlicet, iis in quibus calor est.

6 *Αἰσώδης* id genus febres seu fastidiosę comitem habent anxietatē ingentis malignitatis indicem, ex Gal. comm. 2. in lib. 3. Epid.

7 Imò multis in partibus sæpe non apparet, vt in lipyria febre.

8 Varię febrium diuisiones, de quibus Hippocr. sub finem sect. 1. lib. 6. Epid. & fusiùs Gal. in commentar.

Calor itaq; ali⁹ ⁹ ficcus, ¹⁰ alius humid⁹, alius ¹¹ vaporosus: ex quo febris alia sicca, alia humida, quædam vaporosa, Maligna sicca est. In hac squalescit cutis, arida lingua est, vehemens sitis & vigilia, calor acris, nihil vaporum, nihil sudorū excluditur. Talis est exquisitè ardens. Hæc autem aut ¹² breuiter occidit, aut in hecticam vix curabilem conuertitur. In humida perpetuo sudore ac madore corpus resoluitur: quales sunt ¹³ typhodes & elodes. Quanquā typhodes ab Aëtio & quibusdā aliis dicitur, quam erisypelas hepatis, lienis, renis, aut cuiusuis partis, incendit. Salubris ferè, in qua madidus & mollis calor est, cutis quoque eiusmodi, & sudores in tempore erumpunt.

⁹ Vt in hectica, causo, & reliquis febribus biliosis.

¹⁰ Vt in febre sanguinea, pituitosa.

¹¹ Vt in diaria.

¹² Exquisitè ardens vt plurimum funesta, causæ magnitudine, symptomatū vehemētia, & excrementorum suppressione.

¹³ Gal. ex veterum placitis febres typhodeas sine vllarum inflammatione partium fieri asserit, eadēmq; humidas in summo Lib. contrā Lycum descripsit.

Rursus calor quātitate & qualitate distinguitur. Nam aliās ¹⁴ copiosus, ¹⁵ aliās paucus, ¹⁶ nonnunquam in medio est. Similiter hic acerrimus, hic (vt febris est, & quantum natura febris patitur) suavis, & mitis, ille medius: magna vis est febris, cūm & plurimus, & mordacissimus.

¹⁴ Vt in synocho utrāque, maximè verò plethoricis in corporibus.

¹⁵ Qui scilicet in pauca materia accensus, vt in tertiā exquiritā.

¹⁶ Vt qui copia moderatus, & in sanguine, aut pituita, accensus, vt in synochis febribus & pituitosis: & tum est essentialis.

Febris alia morbus, vt ardor: alia symptoma, vt in pleuritide: alia simplex, alia cum grauib. symptomatibus, & iis, quæ ὀνιόμια Græci vocant: vt quæ febris cum frequenti syncope, cum singultu, cum synceris deiectionibus. Rudis illa & nimis antiqua 17 Hippocratis distinctio, laudanda tamen, vt fuit ætas. Febres aliæ manu mordaces, aliæ mansuetæ: quædā vehementer rubræ, nonnullæ admodum flauæ, aliæ crocæ, aliæ crudæ, &c. quæ pluribus 6. Epid. ab Hippocrate & Galeno, tum initio librorū de differ. feb. explicata sunt, nōdum tamen satis intellecta: quòd 18 vox Pemphigodes satis ostendit, non satis intellecta interpretibus. Alii enim ad pestilenciales, nonnulli ad vaporosas & humidatrasferunt. In qua sententia fuisse visus est Galenus in exegeſi vocum Hipocratis.

17 Hæc ex ſent. 29. ſect. 1. lib. 6. Epid.

18 De hac vide Gal. cōm. in citatum Hippocr. locum.

Alia verò diuiſio febrium, quia hæ acutæ ac celeres, vt ardens & tertiana: aliæ longæ, vt typhodes & quartana: nonnullæ mediæ, vt quotidiana & ſemiteriana. Acutæ ſunt, quia propria tempora ad ſinem vſque celeriter percurrunt. Acutum enim & celer idem eſt.

Sunt è Græcis, qui ex ratione prægreſſæ cauſæ ita diuidunt. Aliæ febres de repente atque ex cauſa manifeſta ortæ ſunt. Hæ minùs periculofæ, minùsq; fallax præſagium oſtendunt. Aliarum cauſa ignorata, quòd latenter atque longo tempore cōtracto in humoribus vitio ortæ ſint, de quibus hoc verbum Hipp. maximè pronuntiat, cōmune quidem reliquis morbis acutis, 19 Acutorum morborum non

omnino certè sunt pronúciationes salutis aut mortis. Atque hæ ferè periculosiores.

Longas item ex causarum varietate diuidunt. Longæ enim sunt vel quia materia frigida, crassa & cōtumax est, vt quartanæ: vel multa, vt typhodes: vel quia pars affecta frigidior est, vnde primùm calor succensus est, vt quartana à liene longior, ab hepate breuior: vel imbecillitatis ratione, ex quo 20 in senibus longior, in iuvene breuior: vel denique exteriorum vitio, quæ τὰ ἐξωτέρω vocat Hipp. ægri, Medici, ministrorum, loci, æris, temporis anni, & simil.

20 Facultas enim naturalis senibus infirma: iuuenibus robusta. Vnde illi tardius: hi celerius febre defunguntur.

Aliæ item febres 21 peruigiles, aliæ 22 soporosæ nonnullæ mediæ. Somnus atque vigilia, utrâque si modum exceßerint, malum. ex lib. 2. Aph. Praxagoras quasdam febres soporosas annotauit, ab anno 12. ad 16. & 17. priuata quadam perniciē. In soporosis, 23 grauius periculum est, si præter soporem & silentium, saltus partium, ac veluti cōuulsio, faciei rubor, oculorum fixus intuitus, à somno manuum neglecta abiectio, mœror, anxietas, deliria conuulsifica, motio articulorum, frigus.

21 Quod acres profundant vapores, sua caliditate & siccitate cerebrum continuo percellentes.

22 Ab oppressione cerebri nimia humiditate persusi, nimiumque perfrigerati.

23 Hæc enim cerebrum grauioribus auctum symptomatis ostendunt.

Sed, quod ad institutum maximè pertinet, alia febris in solidis partibus, hæctica: quædam in spiritibus, diaria: tertium genus in humoribus, putrida.

De hecticæ differentiis & diariæ suo loco dicetur. Putrida fiet vel à bile, quæ tertiana: vel pituita, quæ quotidiana: vel atra bile, quæ quartana. An 24 verò à sanguineo, postea differetur.

24 Agitur hæc quæstio paulò post, capite de febre continua putrida.

Putrida rursus vel intermittit, vel continua est. Quæ intermittit, Hippocrati quidem aph. 43. lib. 4. sine periculo est: Diocli minus periculosa, quàm continua, ac ferè salutaris: sed quæ tamen aliquândo interficit, & maximè ubi talis est, qualis soporosa, quæ proximè descripta est. Continua magis periculosa, quæ tertio quoque die exacerbatur, auth. Hipp. & Archigene. Accedit ad periculum, si quarta die vel tam grauis est, vel etiam asperior, quàm fuit tertia.

Cætènim quandoquidè hîc de curatione febriû agitur, primum est, vt febris species cognoscatur, ex propriis signis, communibus & externis cõiecturis. Cognita febris specie, causæ magna ex parte innotescût. Secundû est, vt febris cõstitutio intelligatur. Quod fiet, si obseruemus qualia sint, & quanta fuerint & futura sint vniuersalia febris tẽpora, principiû, incrementû, status & declinatio. Deinde 25 quod in toto morbo, idè in particularib⁹ accessionib⁹ obseruemus, & has rursus inter se cõparemus. Postremò adiungemus externa, anni tẽpus, ætatẽ, locum, regionẽ, peculiare ægri naturã, &c. eiusmodi: videbimûsq;, ne quid ministri peccent, & vt æger imperata faciat. Ita fiet, vt & morbi natura cognoscatur, & remedia medica fideliter adhibeantur. Certû denique ac minimè fallax præsagiû de febre instituat.

25 Vt si ex longo morbi principio morbum eundem fore longum dignoscamus.

De Tertiana.

Tertianam facit ¹ putrefacta bilis, ² non quidem in venis, sed toto corpore dispersa. Tertio quoq; die accessiones habet (vnde tertiana appellatur) quòdq; putrefactum accessionibus singulis excernitur, ferè per sudores & insensibilem trāspirationē, aliàs etiam ³ vomitu, ⁴ & deiectione alui repurgatur. Duodecim s horas exquisita tertiana non superat accessione particulari, nec pluribus quàm septem accessionibus sollicitat. Sic enim scriptum ab Hipp. aph. 59. lib. 4. Quanquam in Coacis præsagiis 5. 7. aut 9. circuitu ad summum iudicari scribit. Statū ferè habet quarta accessione, hoc est, die septimo. 9. 11. Decimotertio, qui septimæ accessionis dies est, declinat: atque ita soluitur. Initium ferè prima accessione, incrementū secunda ac

¹ Quælibet, pallida, rubra, vitellina, porracea, eruginosa: cuius certus locus est fomes, propria cystis, hepar, mesenterium, aut quæ circum præcordia, cauæque viscerum sunt loca.

² Alioqui enim ardens esset, cōtinuā ve febris, à qua tamē sola intermissione differt. Gal. cap 3. lib. 2. de crībus.

³ Effusa scilicet in ventriculum bile, sed non primis diebus. Præproperea nāq; isthæc esset excretio, nec melioribus naturæ rebus instituta, quæ ante concoctam materiam veniret.

⁴ Prout bilis viam affectat.

⁵ Accessio longior aut breuior pro bilis copia maiore aut minore, eiusdēmq; tenuitate aut crassitie, ægrorū viribus, raritate aut densitate corporū. Adde quod miscella pituitæ cum bile efficit, vt his in regionibus vel paucas exquisitas tertianas, vel propè nullas agnoscamus. Vnde nihil mirum, si paroxysmi vltra horas 12. 20. 30. etiam, itēque circuitus vltra septem producantur: siquidem pituita bili admixta à natura non faciliè superetur.

tertia : accessionis tempus, à quatuor horis ad duodecim: inuadit cum rigore, in quo veluti pungentes aculeos sentiunt ægri: initio quidem vehementior, paulatim mitescit, ex quo increſcit calor. Intima vruntur,⁶ iactatur corpus, vexat sitis & vigiliæ, solitudo quæritur. Hæc verò vt progreditur accessio in statum, calor admodum acris & mordax est. Pulsus⁷ initio tardus, paruus, rarus, debilis: postea magnus, celer, frequens, velox, & vt declinat accessio, paulatim redeunt omnia ad naturam. Post vigorem vomitus, sudores aut excretiones: & vbi iam concoquitur ad salutem febris, vt principio tertię & quartę accessionū, vomitus, in fine sudores fiunt. Vrina⁸ subrufa, subflaua, rufa, mediocri substantia, aut, vt Arabes, rubra, tenui, substantia ignea. Parte quidem inferiore subtilior: superiore vmbrosa atque nebulosa. In qua si⁹ nebula alba, aut eiusmodi sublimamentū initio appareat, nō trāscendet quartum circuitum. Si verò primo die vel secūdo¹⁰ sedimentum album est, læue & æquale, tertio circuitu terminabitur febris. Quod si talia non apparent primis diebus, id est, prima vel secunda accessione,

6 A bile per ipsum delata, quæ maius ac maius cundo acquirit incendium.

7 Primis enim febris inuasionibus calor ab inuicta adhuc materia oppressus, non potis est citatiore pulsu emicare. Huc accedit, quod tum temporis nondum accensa bile habitus corporis refrigescit.

8 Ab ardore & biliosi humoris permixtione. Ex commentar. ad sent. 26. lib. 2. Prognost.

9 Nebulę enim albę in vrina concoctionū sunt notę. Cóm. 3. in Prorrhet. & in sent. 43. li. 4. de vict. rat. in acut.

10 Nam certius coctionis signum ab hypostasi, quàm ab aliis contentis, sumitur.

septimus circuitus expectandus est: tūmq̃ue rufæ magis sunt vrinæ. Et si contingit longiores esse accessiones, id efficit materiæ copia, aut crassior consistentia. Alioqui ad densitatem cutis, aut ad imbecillitatē naturæ causa referenda est. Describunt autem Græci & Arabes tertianā, quæ sit veluti ¹¹ idea quædam & exemplar tertianarū omnium, quæ vt proprius ad ideā illā accedūt, ita & manifestiora signa proferunt, vel minùs manifesta. Excitātur hæc febres ferè æstate, tēperie calida & sicca, cœlo, ætate, ratione vitæ & aliis, quæ corpus reddūt calidius & siccāt.

¹¹ In naturis enim quantumvis biliosis, victus ratio, aut vitæ institutū, aut quippiam simile generādæ pituitæ accommodatum concurrit semper, quod tertianam à sola fieri bile prohibeat. Ex cap. 3. lib. 2. de differ. febrium.

Curatio ad duos scopos relata est veteribus Medicis, alterationē & vacuationem. Alteratio, refrigerantibus & humectantibus: vacuatio per sudores & vrinas, perficitur. ¹² Paulus rectè quidē infirma hæc remedia credidit, propterea quòd non tertiana illa, quæ idea & exemplum quoddā est reliquarum, nobis curanda est: sed quæ iam aliquid pituitæ cōmixtum bili habet. Oportebit ergò intendere in scopos illos veterum, sed ita temperare, vt quantum declinet curāda febris ab ideā illa, tātūm curatio euariet. Initio ergò, si resistit aluus, ¹³ clystere leni, vel debili

¹² De hac re ampliùs nihil apud Paul. Æginetā cap. 20. lib. 2. scriptum, quàm pud Galen. lib. 2. ad Glauc.

¹³ Clyster eiusmodi parabitur ex decocti remollientiū & refrigerantiū, & lactucæ, portul. violariæ, florum: nymphææ lb. i. vel ex decoctionis eorundem refrigerantium & feri lactis ana lb. ss. cassiæ, aut cathol. dissolut. 3. i. vel cathol. & diapruni solutiui ana 3. i. saccha. alb. mell.

DE MORB. INTERNIS

viol. ana ʒ. i. olei violacei ʒ. ʒ. Verum hic non nisi ante paroxysmum, vel post immittitur.

14 quodam pharmaco mouenda est. Medicamenta sunt, vt Calsia fistula ex decoct. violarum, prunorum, tamarindorum, & similibus.

14 Vt si bolum è cassia præscripseris, addito, si velis, rheo, atque etiam, si nihil vetet, diaphœnico pauco. Vel hanc potionem imperabis. ℞. cathol. ʒ. 6. diaphœnici ʒ. 2. syrup. capill. vener. aut simil. ʒ. i. cum aqua cichor. aut decocto cōuenienti f. potio. Nunquam tamen adducere, vt paroxysmi die purges, ne geminum naturæ negotium facessas.

Vehementer cōmendant hanc potionem. ℞. succi granati acidi & dulcis ana ʒ. i. β. per noctem salubri loco resideat, postridie in eo suc. dissolue sacchari optimi ʒ. i. Et si vehemens calor est, sacch. violaceum sit, & addatur potioni aquæ ros. ʒ. i. Si verò pituitæ aliquid mixtum est, loco aquæ ros. misce
15 vini tenuis ʒ. i. Lenies aluum, reuocabis appetitum, partes naturales roborabis. Quod si 16 obstructionis suspitio est, aquam end. aut hordei, vnius ʒ. i. commiscebis. Alij ʒ. 2. 17 oxyf. simplicis, succi end. depurati ʒ. i. vtuntur eadē vtilitate. Vbi verò plus pituitæ mixtum est, pro succo end. succus rad. fœni. pro oxyf. oxymel simplex miscendū est. Atq; vtilius oxymel volunt, in quo ferbuerint fron-

15 Ad pituitam incidendam, & ventriculum roborandum, quod cætera omnia refrigerent.

16 Obstructionis notæ erunt, tensio, durities, dolor hypochondrij dextri.

17 Loco huius licebit zulapia concinnare è syrup. de cichor. simpl. capill. ven. acetosi simplic. granator. & aquis conuenientibus, cichor. end. bugloss. borrag. Vel

hoc apozema ℥. radi. polypod. quern. cicho. oxylapath.
ana 3. i. rad. petrosf. asparag. scenic. in aceto per noctem
vnam (si magnus æstus) maceratarum ana 3. i. folior.
agrimon. cich. end. nō lotē, scariol. an. M. i. capill. omniū
ana M. β. semin. frigid. minor. (si æstus sit) vel maiorum
(si hyems) ana 3. i. semin. anis. & scenic. ana 3. 2. flor. car-
diacorum ana p. i. f. decoct. In colatura pro dosib. iij. dis-
solue syr. de cichor. simpl. & capill. ven. ana 3. i. β. f. apoz.
clar. cōditum pauc. cinam. & santalo citrino. Ab eo, si vi-
debitur, purgato.

des nucis, vel tenues asparagi & hyssopi summitates.
Alij 18 contenti sunt 3. 4. decocti prunorum cum
sacch. viol. 3. β. Eodem modo & tamarind. vti licet.
Iam remollitā aluo de phlebotomia statuendum.
Saluberrimum, 19 inquit Gale. febrib. omnib. non
modò cōtinuis, sed iis quæ ex putredine natæ sunt,
secare venam, si ætas, vires, &c. permittant. Omis-
sum tamen hoc remedium à Græcis, & omittendū
quidem, si exquisita tertiana est. Alioqui admodum
salutare: quod tamen temperare oportet, 20 vt ter-
tiana, quam curamus, vel ad exquisitam accedit, vel
ab ea recedit. Arabes ex vrina rubra consilium su-
munt phlebotomiæ, fallaci quidē coniectura: quòd
eam dominātis sanguinis, vel grauioris incendiij, in-
diciū esse putēt. Talis enim vrina, aliquādo infirmo

18 Hoc remedium aluum tantum mollit, non purgat.

19 Id scriptum passim reperias lib. ii. Meth. med.

20 Vt videlicet sanguinis minor sit detractio, si ter-
tiana propius ad exquisitam accedat: amplior, si minùs
propē. Cæterum auocare nos à venæ sectione minimè
debet, quod iam pridem est ab Arabibus proclamatum,
sanguinē nempē bilis frænum esse & refrigerium: nam
& phlebotomē totius corporis refrigerationem indu-
cit, in qua magnum est ad curationem momentum.

DE MORB. INTERNIS

ex hepate, vel rene plus æquo attrahente, aut aliis de causis, non ex natura febris, procedit. Addunt præterea non esse detrahendum sanguinem ante tertium paroxysmum, obtruduntque experiētiam, quod quibus aliter sanguis detractus est, iis ferè exasperatum malum: secant ferè sexto die: aut prædici iubent fore, ut proxima accessio, quæ quarta est & die septimo, grauissima, ne id ex phlebotomia & peccato Medici contigisse videatur. Conueniunt cum Græcis in usu eorum quæ vrinas mouent & sudores. Utuntur plurimum oxysach. simpl. syrup. acetoso. Græci, si materia sursum ascendit, & æger nauseat, vomitiones adiuuant: si mordentur intestina ²¹ lenib. clyst. excludunt, alioqui lotia & sudores mouent. Vomitus cient ptisanæ tepidæ ℥. 4. fac. ℥. 8. Aliud. ℥. decoct. lact. atripl. portul. an. ℥. 8. olei communis ℥. ij. ²² tepido vtatur. Sed abstinendum vomitionib. in iis maximè, qui ex consuetudine non vomunt. In clyst. cass. ℥. 8. aut catholici, plus etiam, ut res exigit, dissol. debet oleo viol. In iisdem vtendū est sacch. potius, quàm melle. Apio & anetho mixtis in potu, aliisque leuiorib. diuret. utebantur. Sudores mouendi sunt, si quidem resistunt, sub finem accessionum. ℥. ptisanæ vulgaris calidæ ℥. 4. aut ℥. 3. cum ℥. i. decoct. flor. cham. vel diluto oxymel. in quo nepethæ modicū ferbuerit,

²¹ Iuxta aph. 21. lib. i. Quæ ducere oportet, quò maximè vergunt per loca conferentia, eò ducere oportet.

²² Vbi plus pituitæ adest, oxymellitis ℥. iiij. v. vel vj. ex tepida propinantur. Interdum ptisanæ ℥. iiij. cum ℥. j. syr. acetosi simplic. Cietur autem vomitus initiis accessionū, si per se natura satis non moueat.

idque magis, si crassior humor fuerit. Visitatus est ptisanæ vulgaris potus calidus cum subduplo syrupi acetosi, ut sint ptisanæ 3.3. syrupi acetosi 3.1.ß. Vinum 23 quoque album, tenue, oligophorum, & vrinæ & sudores mouet. Verum neque vrinæ mouendæ sunt, neque exprimendus sudor, nisi cum apparuerint manifesta signa coctionis: multò maximè, cum iam perfecta signa coctionis apparuerint, & quæ vomitiones mouent, 24 tepida: quæ sudores, 25 calida exhiberi debent. Quod si superioribus remediis non concedit febris, 26 rhabarbaro vtendum est ad 3.1.ß. vel 3.2. Si verò neque his concedit, & 27 vires sustinent, phlebotomia de eadem vena axillari interna dextra repetenda est. Alioqui cathartici paulatim deducenda materia est, quale hoc est. 28. syrup. de cichorio simpl. 3.6. rhabarbari puluerati, & nodulo raro inclusi 3.2. suspendatur nodulus, & syrupo immergatur, capiat diebus intermissionis 3.1.ß. syrupi, cum aquæ hordei in calidiore conditione, hydromelitis in frigidiore 3.2. Atque iam declinante morbo, & longius progressu medicamentis cathartici 28 aliquid eorum, quæ melancholiam purgant, miscendum est. Pars enim materiæ ardore febris in melancholiam versa est. In accessionibus, vbi vehementer sitiunt, sed maximè in statu, aqua hordei, 29 iulep violatum, syrup. violatus cum aqua frigida, vinum etiam album oligophorum, si quidem iam tempus est sudoris promouendi & vrinæ, exhiberi debent. Nec hoc quidem exigua quantitate, 30 sed semel quantum appetunt. Ratio victus, quæ refrigeret & humectet, non tam tenuis, quam ab antiquis præscri-

DE MORB. INTERNIS

pta est, propter consuetudinem victus. Licet enim
viti iusculis plurimum alteratis cum lactuca, acetosa,
portulaca, hordeato cum seminibus frigidis altera-
to. Postea verò apparentibus signis coctionis, lacte
amygd. pedibus ouillis, piscibus saxatilibus, cancris,
percis & similibus, vitellis oui: de quibus quia con-
trouersia est, postea dicetur. Tùmque iusculis com-
misceri debent, quæ aperiunt, & vrinas mouent.
Vsitatæ sunt radices acetosæ, petroselini hortensis
& cichorij. Sed per omnia meminisse oportet, ma-
iora remedia, vt venæ sectionem & cathartica, con-
uenire diebus quietis. Excrementa verò promouē-
da, cùm iam manifesta coctio apparuerit in vrinis.
Vigilant, æstuant, sitiunt, & alia patiuntur, contra
quæ remedia suo loco dicetur ad finem libri huius.

23 Nam omnem in partem celerimè distribuitur, cùm
tenuium sit partium. Sed vinum antequam tutò impere-
tur, febre facta remissione concoctionis signa apparere
est necesse. Poterunt etiam sudores excitari frictionib.
inunctionib. & sudorificis potionibus: vrinæ quoque
cieri, decocto aperientium cū syrup. capill. ven. aut simil.

24 Talia siquidem ventriculum relaxant.

25 Vt celerius distribuantur, & ad habitum corporis
peruadant.

26 Vel hæc potio præscribetur. ℞. rhei electi ʒ. 2. in-
fundantur in decocto refrigerate: vel in decocto è passul.
mundatar. & tamarindor. ping. ana ʒ. 3. additis semin.
anis. melon. ʒ. 1. flor. cardiac. p. 1. In express. dissolue ca-
thol. ʒ. 6. syr. capill. ven. aut de cichor. simpl. aut viol. ʒ. 1.
f. pot. vel ex syr. de cich. compos. cum rheo ʒ. 1. aut ʒ. 1. ʒ. ʒ.
cum decocto conuen. aut lactis sero purgatio institue-
tur. Pauperioribus imperantur diaprunum simplex &
solutium, electar. de succo ros. diaph. diacarth. Sed hæc
calidioris cæli tempestate non carent periculo.

27 Atque tum si vires effætæ langueant, eas imprimis

confirmare oportebit, maximè verò hepatis & ventriculi robori cōsulere. Vt. ℥. conferuæ borrag. & buglof. an. 3. i. electar. triasantal. & diarhod. Abbatis, vel aromatici rosat. an. 3. 2. rasur. ebor. & cornu ceru. an. 3. s. cum syr. de limonib. aut de bugloss. f. opiata, vel cum saccharo rosaceo conditum. Et quoniam non rarò humor aut flatus in præcordiis colligitur, tumorem, durtiem, aut tensionem faciens, optimum erit, si prætumida, vel tēsa sint hypochondria, fotum & litum imperiare. Fodus erit huiusmodi. ℥. malu. bism. cichor. agrim. schœnuath. absynth. an. M. i. flor. chamæm. viol. anet. ros. an. p. i. f. decoct. in aqua & vin. alb. rum aceto pauco in fine addito pro fotu hypochondrij dextr. cum spongia. Post fotum exsiccatu locus illinetur ex olei liliac. olei amygdal. dulc. & absynth. ana 3. s. cum cera pauca comparato linimento. Si ardor vrgeat, epithemata refrigerantia, itémque cerarum santalinum, vitata nimio perfrigerio expirationem cohibente.

28 Vt folia fennæ, diaphœnic. diacatholicum.

29 Aut syr. nenupharinus, acetosus simpl. oxyfacch. syr. de limonib. cum tripl. aqua, aut quadrupla.

30 Vt calor febrilis extinguatur, & partes contemperentur.

Remedia quædam sunt vulgaria, quibus quidem vti licet, non neglectis aliis, quale hoc est. Sonchus tritus, sambuchus, plantago, ex aceto subiguntur, & carpis alligantur. Sunt, qui & 32 semperuiuum, & alia eiusmodi refrigerantia trita hepatis regioni applicent. Suspectū quidem hoc remedium, quāquam aliquando febrem extinguit. Sed nunquam hoc vtendum est, vbi obstructionis suspitio. Alij pul. fuliginis è furno, & saluiam contusan vnā miscēt cum oui albumine, & ita imponunt carpis. Nonnulli eandem fuliginem cum alliis, cæpis, albumine oui & germine, miscēt, acetum affundunt, admouētq; carpis. Temeraria verò remedia cau-

DE MORB. INTERNIS

stica, quæ vesicas excitât : quale est, quo vulgus vti-
tur, radice ranunculi trita, alligata carpo . Eadem
quoque 33 exteriori gutturi admonent. Itaque pru-
denter vtendum est vulgi remediis.

31 Ex his vulgi remediis alia refrigerando, & febrilem
calorem extinguendo prodesse creduntur : alia calida
foras humorem mortificum trahêdo. Sed temere his nō
fidendum . Eorum enim vsu sæpe fit, vt feruor quidem
& intemperies reprimatur, materia adhuc restitête, quæ
recidiuæ sit soboles.

32 Satiùs fuerit oleo rosaceo hypochondrium, irriga-
re, pauco aceto addito.

33 Hac enim arte scabritiem à fuligine oriri solitam
prohiberi putant.

De Tertianâ nothâ.

Tertiana ¹ nothâ cum rigore quidem inci-
pit, sed ² languidiore. Materiam habet pi-
tuitam commixtam bili. Inuadit, vt pluri-
mum, febris hæc otiosos iuuenes & intemperatos,
sub Autumnum frequens. Signa eadem quæ tertia-
na, nisi quod habet commutata ex proportione pi-
tuitæ ad bilem, media quodammodo inter signa
quotidianæ & tertianæ . Alternis diebus inuadit:
aliquando tamen, vt etiam tertiana duplex, 3 singu-
lis diebus . Neque enim singulis inuadere diebus,
neque alternis tertianam facit : oportetque non
tantum ex periodis, sed propriis signis & sympto-
matis, cuiusque febris speciem cōstituere . Accessio
vltâ duodecim horas producitur : aliquando ad
triginta & eò plures. Non terminatur septem pe-
riodis, vt tertiana vera, vixque duodecima periodo,
aut 14. terminatur. Sæpe etiam in mensem, quadra-
gesimum

gesimum etiam diem extenditur. Nonnumquam sex menses integros perseverat, ferèque desinit in 4 vitia lienis. Hic plurima grauitas corporis, dolor vertebrarum, inflatio ventriculi, fastidia, sitis, magna oris amaritudo, vrina citrina & crassior, quàm in vera, ob crassitiem humoris à pituita permista. Clysteribus primùm; non ita molliibus vtendum est deinde leui pharmaco: vnde primæ venæ repurgentur. Postea consentientibus numeris, phlebotomia, è basilica dextra. Auicennas post tertium vel quartum paroxysmum venam aperit, dextram æstate, hyeme sinistram.

1 Hæc vel ex vitellina bile (quam parit adustio) in ventriculo putrente ac inacius in hærente, vel ex permutatione bilis & pituitæ, vt antè dictum est, gigni cõsuevit.

2 Languidior & diuturnior est rigor, quia pituita bilis acrimoniam, velocemque motum impedit. Hinc fit vt mitior sit rigor, sed alioqui longior.

3 Id accidit propter humoris copiam, & pituitosæ accessionem materiæ: quæ ambæ quotidianis accessioni- bus efficiendis sunt satis.

4 Nam in tanta febris longitudine melancholicus accumulatur succus: à quo lienis tumores, obstructions.

5 Vt. ℥. malu. beton. mercurial. origan. calamenth. ana M. i. femin. anis. fœnic. ana ʒ. i. herd. integ. p. 2. flor. chamæm. melil. ana. p. i. f. decoct. ad lb. i. In colatura dissol. cathol. & diaphœnic. an. ʒ. i. vel. catholic. ʒ. 6. diaphœnic. ʒ. ʒ. aut diaphœnic. loco tantumdem hieræ. mellis ros. aut anthos. sacchar. rub. an. ʒ. i. olei chamæmel. & aneth. ana ʒ. i. ʒ. f. clyster.

Victus aliàs parcior, aliàs plenior, vt breuitas, vel longitudo febris expectatur. 6 Nam in longis plenius nutrimus: in celebribus, parcius. 7 Victus sit incidens & abstergens, coctu facilis. Vrinæ & sudores paulò calidioribus, quàm in tertiana moue-

tur. Iam apparētibz signis coctionis, Gal. hordeatis aliquid piperis adiecit. Amygdalino lacti aliquot amygdala amara cōmiscere licet, alioqui amygdala dissoluemus ex decocto rei, quæ incidat & detergeat. Græci mulsā utebantur, in qua hyssopus ferveret, aut aliquid tale, quod videlicet sine insigni calfactione & exsiccatione urinas ducat. Qualia sunt, spica Celtica, cinamomum, radices apij hortensis, semina anethi, fœnicul. comē absynthij, sed quæ, cū adstringant, non tam ad mouendas urinas & sudores, quàm ad ventriculi robur, & biliosi humoris euacuationem faciunt. Oxymel quoque conuenit conditum aliquo aromate, vt spica vel cinamomo, puluere hyssopi, méthæ, calamenthi, stœchade.

6 Ex aphor. 7. libr. 4.

7 Qui bilis crassitiem, quam permixta efficit pituita, tenuet. Idem verò victus sit *συνετός*, id est concoctu facilis, vt qui partium naturalium imbecillitati prospiciat.

Potiones autem dilues magis aut minùs, 8 pro ratione febris, materiæ, quæ febrem facit, temperamenti, ætatis, temporis & similium. Iam ferè paratur hydrosachar. ex lb. i. aquæ coctæ col. per manicam Hippocratis cum ʒ. ʒ. sacch. & ʒ. ʒ. cinamomi, vel ʒ. i. Veteres loco hydrosacch. mulsā utebantur. Nunc verò in frigidiori conditione, loco sacchari, melle albo vti licet, vel partim saccharo, partim melle albo.

8 Vt si plus affuerit bilis, vinum sit dilutius: si vberior pituita, meracius. Idem esto de melle iudicium in hydromelitis, aut oxymelitis vsu.

Vbi iam apparuerint signa coctionis, molliter

subducenda alius est ex iis, quæ postea dicentur. Non omittendum, quod Hipp. primum, deinde Gal. & Auicennas annotarunt, 9 vomitum à cibo tam efficacem esse in hac febre, antecedentē morbi causam vacuando, vt hoc vno remedio permulti conualuerint.

9 Vomitus à pastu potius excitatur, quia morbificus humor cibo mistus facilius expellitur. Adde quod trāsuerſæ ventriculi fibræ, cibo & potu humectatæ, ruptioni minùs sunt opportunæ.

Historia est apud Hipp. de vxore Theotimi, quā mulſo succo granatorum percurauit, inde vomitu citato. Licebit itaque vti oxyſacchara tepida, vel oxymelite ſimplici cum aqua tepida, in qua ſex rotulæ raphani coxerint, ſtatim à cœna. Alioqui.

℥. hydromelitis ʒ. 2. decocti hyſſopi ʒ. 2. ſ. detur tepidum à cœna.

Noſtra æras non feret tenuem victum, quem veteres, tertio tantum quoque die ægrum nutrientes, præſcripſerunt. Nutriemus itaque, 10 vt ſemel in die comedant, remiſſionis vel intermiſſionis tempore. Vino tenui vti licet extra acceſſiones. Pullus iam ſatis adultus in aqua coctus 11 cum borragine, cerephyllo, oxalide, petroſelino, hyſſopi modico: coques autem ad putrilaginem, & ſi vis, iuſculo ſacchari aliquid iniicies, vt oui vitellum omphacio diſſolutum.

10 Cibandi anſam ſuadebunt longiores acceſſiones, vires debiliores, ægrorum naturæ bilioſæ, & pleniori victui aſſuetæ.

11 Hæc comparantur cum ad compeſcendum incendium, tum ad obſtructa liberanda.

Hordeato & lacte amygdalino vteris, ſed benè cōditis 12 ſaccharo, vel melle albo. Ptifana vulgari, in

12 Vt pituitæ lētor magis detergeatur.

qua anethi coma, aut aliquid seminis eius, apij, feniculi, spicæ, cinam. piperis maduerit, vti oportet: aut in ea octauam partem sacchari, vel mellis albi liquefacies. Poteris imperare hanc ptisanā. ʒ. hordei mundati q. j. hyssopi, glycyrrhizæ mundatæ ana ʒ. ss. iuiubarum, passul. mundatarum, cicerū rubrorum ana ʒ. i. fiat decoctio in aqua purissima ad lb. 2. Colatura trāsfundatur per manicā Hippocratis cū ʒ. 4. sacchari. Fiat 13 ptisana clarificata & aromatizata cum ʒ. ij. 14 cinamomi, vel mulla, vel hydrofacch. parabitur ex aqua, in qua pugillus spicæ Celticæ, aut stœchados efferbuerit. Materia clysterum, quibus interuallis vtendum est, furfures, hordeum, chamæmel. melilot. absynth. anethi coma, beta, scariola, ficus pingues, addita etiam lactuca, portulaca, acetosa, si refrigerandi consilium est. Quod si alius sit durior, addenda sunt remollientia. In decocto ad lb. i. olei cōmunis aut chamæm. ʒ. 3. mellis communis ʒ. 2. dissolues. Nonnunquam etiam vel cathol. ʒ. vj. 15 vel diaphœni. aut benedictę ʒ. ʒ. Suppositoria acuātur cū ʒ. 2. hier. picrę & ʒ. i. salis gēme.

13 Refrigerat, deterget, incidit, tenuat, sitim sedat.

14 In vehementiore febre, & capitis dolore, aut cinamomum nullum, aut paucum exhibendum, quod suo calore febris afferat incrementum, & vaporosa sua substantia caput tentet.

15 Plerumque duorum ex his ana ʒ. ʒ. vel tantundem hieræ picræ dissoluitur.

Purgationes 16 conueniunt ex rhab. mixta parte agar. trochiscati, vt vtriūque ʒ. 2. cathol. ʒ. 6. incorporentur. Alioqui pauperibus imperabis ʒ. 6. cathol. ʒ. 2. diaphœnici cum hydromelite.

16 Iis præsertim diebus quibus minimè febris exacerbatur, 2. morbi die, 4. 6. 8.

Vel diaphenici 3.2. agari 3.1. cum hydromel. Quòd si ab infirmitate ventriculi metuatur, ʒ. pul. hieræ picræ recentis, rhab. electi torrefacti & subtiliter puluerati an. ʒ.2. incorporentur 3.3. terebinthinæ, fiat bol. cooperti auro, vel nebulis, vt faciliùs transglutiatur. Laudatur pilulæ de rhab. maximè Autumno, de eupatorio. ʒ. 17 aloës, rhabarbari, myrobala. citrincrum, succi agrimonix ana 3.ʒ. vniuntur cum succo endiuix, aut foeniculi. Laudatur trisera Sarracenicæ sine scamonio. Syrupi imperandi, 18 oxymel simplex, oxysaccharum, syrupus acetosus, de scolopend. capillorum veneris, dilutum cuscutæ, cichorij, absynthij, cicerum rubrorum, sed diluta saccharo & tantillo cinamomi condienda sunt. Maximè probatur syrup. de cichorio compositus, qui etiam catholicus est, & ad omnes humores valens. Datur ad 3.2.

Nonnunquam quia metuitur, ne degeneret in quartanam, imperamus dissecandis humoribus & aperiendo, quale hoc est.

17 Harum pilularum ʒ.2. sumat æger per horam ante cibum semel in hebdomade, maximè si ventriculus male sit affectus, vt ferè est semper in hac febre. Aut integra drachma semel capietur à somno noctu, & intermissionis tempore.

18 Hæc continuis quinque, aut sex diebus mane atque etiam vesperi duabus ante cœnâ horis exhibita humores præparant, obstructions explicant & referant. Licet etiam urgente in ipsa accessione siti eadem imperare, si refrigerantibus, vt syrupo acetos. simpl. oxysaccharæ, & similibus, oxymellitis pars aliqua adiiciatur.

ʒ. summitatum lupuli, cich. an. M. ʒ. rad. apij. petroselinij, gramin. an. 3. ʒ. sem. melonum, cuscutæ,

DE MORB. INTERNIS

anisi an. 3. i. ℥. glycyrrhizæ rasæ 3. i. fiat decoctio ad ℥. ℥. pro dosib. 2. In col. dissolue syrup. de bisantiis & capill. vene. an. 3. i. ℥. fiat apozema clarificatum & aromatizatum cum tantillo cinamomi, vel pulvere diarhodi Abbatis, vel triasantali. Aliud.

℥. rad. petroselini, acetosæ, graminis an. 3. ℥. seminis anisi & fœniculi torrefacti, liquiritiæ an. 3. ℥. summitatum lupuli, fumariæ, cichorii cum toto an. P. i. trium florum cardiacorum ana P. ℥. fiat decoctum ad ℥. ℥. In colatura dissolue syrup. capillorū veneris 3. 2. oxymelitis simpl. 3. i. fiat apozema, vt prius, pro duabus dosibus: 19 tempestiuus vsus erit tempore remissionis febris. Ab his verò cathartica imperanda sunt, quale hoc est.

℥. passularum mundatarum, hordei integri ana 3. ℥. cinam. santali citrini an. 3. i. violarum P. i. fiat decoctio pro vna dosi: in qua infunde rhabar. elect. 3. 2. expressioni colatæ adde syrup. de cichorio simpl. 3. i. 20 fiat dosis. Aliud.

19 Tale apozema in febris declinatione si propinetur, urinas mouebit, aut sudores.

20 Dosis hæc molliora tantum corpora mouerit, non robustiora, & duriorem aluum habentia, præsertim tempestate Aquilonia. Verum valentior fiet si addideris cathol. 3. ℥. vel diaphœnici 3. 2. vel si 3. 2. fol. sennæ in decocto infundantur.

℥. hordei integri P. i. summitatum lupuli & absynthij, cichorii, eupatorii ana P. ℥. seminis melonum, & cucumeris ana 3. ℥. stœchados arabic. 3. i. folliculorum sennæ mundatorū 3. 3. fiat decoctio ad 3. iiii. In colat. infunde rhabarbari electi 3. iiii.

agar. trochiscati 3. ℞. Expressioni adde sacchari al-
biss. 3. ℞. vel, vt purget efficacius, syr. laxat. ros. pallid.
3. i. fantali citrini & cinamomi an 9. i. Probatum in-
unctio hypochôdriorū ex oleo de cydoniis, de ab-
synthio, chamemelino, anethino, & aliis quę stoma-
chū corroborant. Balneū quoque probatū antiquis
post signa coctionis. Sed iam vsus exoleuit, & perit
industria parandi, quæ suspectū auxilium reddunt.

De 1 Semitertiana.

DE hac febre 2 parum constat inter veteres
Medicos, dubitatūque, vtrum cōtinua an
intermittens: qua in re etiam Gal. dubius
est. Ex tertiana interim semitertiana fit, inquit Gal.
cap. 3. lib. de typis, & contra: eadēque ferē habet
accidētia, sed hæc periculosa. Stomachū & neruo-
sa lædit, lethargicas attonitāsque passiones infert,
colliquat corpus, animi deliquia excitat, profunda
vehementer commouet, typo ferō 3 & periculi ple-
nissimo, ætati virili familiaris, 4 Autumno peculiari-
ter commouetur, tūmq; periculosior, frequens Ro-
mæ, in Æthiopia & toto littore tractūq; terræ, vbi
cælū calidius cum aduēticia humiditate. Non sem-
per continua, sed aliquādo intermittens, 5 acutis nō
solūm, sed diuturnis connumerāda ex Hippocrate.
Auicennas author est ad septimū mensem aliquā-
do protrahi. Mitissima accessiones habet 24. hora-
rum: mediocris, 36. fortis 48. aut iam continua est.
Primo epidem. & 2. de diff. feb. multis disputat Gal.
contra Agathinum & Archigenem cōtinuam esse,
nec posse ex 6 duabus intermittentibus componi,
aut 7 ex duabus cōtinuis. Pessimum verò hoc genus
februm, quæ in crudis & biliosis humoribus in-

cenduntur. Cæterum duplex est semitertiana: altera simpliciter, id est, exquisita, quæ ex quotidiana continua, biliosa, tertiana, æqualiter mixtis bile & pituita, constans, primo die 8 horrificas habet accessiones, & ingeminantes: horrificas quidem ex natura intermittentium. Tetiana enim rigorem, quotidiana frigus facit. Itaque mixtis causis frigoris & rigoris initio accessionis fit horror, qui horum medius est. Ingeminatio verò propter naturam humorum: commotâ bilis putrefacit de integro pituitam. Pituita putrefacta calorem accendit, & bilem acuit, ita fit ingeminatio, horrorque inæqualis. Hæc stomachi labor est, totiûsque nervosi generis. Secundo die, quo quotidiana continua sola regnat, nullus horror est: tertio die idem horror qui fuit primo. Est & altera semitertiana non exquisita, in qua alter humor superat. Vter verò superet, ex signis coniicias. Nam si biliosæ febris indicia superât, bilis pituitam vincit: utriûsque autem symptomata concurrunt, seseque proferunt. Quo enim tempore biliosa inuadit, 9 rigor: quo desinit, vomitus, sudor, deiectio. Cum verò pituitosa, frigus, cæteraque quotidianæ propria sese ostendunt. Quo verò tempore uterque humor confusus incenditur, symptomata confusa medium quid efficiunt. Sed interim 10 semitertianæ tertiana complicatur, qualis est historia mulierculæ 2. de Crisibus, variè quidem scripta in Græcis codicibus, nec satis fideliter versa à Latino interprete. Ergò semitertiana cum horrore inuadit, diebus imparibus: paribus verò tantum frigus est, inæqualis pulsus, 11 calor quoque inæqualis. Modò enim increscit, quasi procedat accessio in

statum, aut in medio sit augmento: modò derepente horror inuadit, extrema frigent, calor in medium corpus contrahitur, soporosi fiunt, è stomacho laborant, conuelluntur, vrina ferè crassior, ac turbulenta. Animaduertendùmque in hac febre, num aliquando proferant se signa propria tertianæ. Sic enim tertiana complicata semitertianæ. Rursus videndù est, num semitertiana sit, cum tertianæ quotidiana complicata est. Neque idem est apud Medicos *ἑπιπλοκή*, id est, complicatio febrium & semitertiana. In semitertiana, bilis & pituita omninò confusa sunt, & æquali proportionem mixta. In semitertiana quotidiana, ferè cōtinua est, tertiana intermittens. In semitertiana, neque quotidianæ, neque tertianæ propria signa apparent: sed veluti ex duplici horum genere vnum quoddam confusum & mixtum genus coalescit. In complicatione verò manent integra signa tertianæ, integra signa quotidianæ, quæ suis interuallis proferuntur. Huius febris semitertianæ & proximorum generum Cornelius Celsus lib. 3. ex Asclepiade, ex eodémque auctore Aurelianus meminerunt. Est & alia de nomine cōtrouersia. Ridet Gal. primo Epid. qui nomen tale semitertianæ indiderunt, propterea quòd potius dupla tertiana appellanda sit. Duplicat enim accidentia omnia tertianæ, eadémque duplo peiora habet, nò dimidio minora, vel clemētiora, quòd sonare nomen semitertianæ videtur. Secundo de differentiis febrium institutionem nominis approbat, quòd dimidio sui semitertiana constet tertiana. Nec id reprobatur ex Agathinò li. de typis. Ratio nominis ad curationem nihil pertinet. Recentiores Me-

dici eadem ferè dicunt. Alij tria genera instituunt. Minus, in quo pituita in vasis putrescit: extra vasa, bilis. Medium, in quo bilis putrescit in vasis, & extra vasa pituita. Pessimū verò tertium genus, quod continuum est, ac ferè interficit. Urinæ rufæ, spissæ, superiore matulæ parte ex liuido flauescunt, pulsus durus, inæqualis, frequēs, dolor est capitis, grauitas, sopor, sed à quo vocati statim excitantur, cui si succedit acuta febris, admodum lethalis est. Curationes temperant mixta curatione tertianæ & quotidianæ. Eadē ferè curatio, quæ tertianæ nothæ, nisi quòd in semitertiana ¹² maior pituitæ ratio habenda est. Itaque descripta curatione quotidianæ, & repetita, quæ in tertiana dicta est, semitertianæ curatio fiet manifesta.

1 Semitertiana febris dicta est, quòd ex quotidiana continua & intermittente tertiana sit temperata, vt scribit Gal. cap. 8. lib. 2. de differ. febr. Istam tamen appellationem idem reprehendit comm. ad sent. 5. sect. 3. lib. 1. Epid. quòd tantum absit, vt semitertiana quicquā tertianæ concedat, cum cōtinuitatis causa longè grauior existat, tum verò duatum accessionum, quæ tertio quòque dieprehendunt, atque etiam longitudinis ratione.

2 Etenim Hippocrati citato loco lib. 1. Epid. cōtinua est: necnō Galeno cap. 8. 9. & 10. lib. 2. de diff. feb. Ac cap. 4. li. de typis intermittētē aliquādo vidisse Gal. proficitur.

3 Sic Gal. eodem cap. de typis hanc febrē ait esse perniciosissimam, quam sæuissima comitantur symptomata. Vnde eā Hippoc. φειχώδης, id est, horrificā, appellauit.

4 Propter retorridā ab æstate prægressa bilē. Febrem verò eiusmodi periculosiorem faciunt maligna qualitas bilis, & morbi longitudo.

5 Habet enim à continua quotidiana vt chronica sit, seu longa: à tertiana, vt acuta, propter symptomatū magnitudinem.

6 Quæ alioqui non esset continua.

7 Nam tum horrida nō esset: siquidē rigor & horror periodicus solarum sit intermittentiū, non cōtinuarum.

8 Maximē verō cum contingit vtriusq; febris reduplicationē in idem tēpus incidere, horrida ista accessiones ingeminatur. Horror verō potius excitatur, quia bilis pituita permixtione refracta verū rigore facere neq̃t.

9 A delata per partes extimas bile: quanquā & ab ea, quæ mouetur per partes internas circa viscera, materia, rigor etiam suscitari possit, vt recentiores Medici obseruātunt.

10 Vt si quæ bilis semitertianā parit, in alia parte corporis putreat, & alius biliosus humor in alia quoq; parte succendatur, & hic moueatur alio die ab illo, qui semitertianam facit.

11 Quia bilis facilius, pituita difficilius inflammatur.

12 Maior enim est pituita: prouetus in semitertiana. Vnde alterantia magis incidere, attenuare & detergere debent, cūm medicamenta, tum alimenta.

De febribus horridis.

¶ *Περί* Græcis, horror est, vnde febris, *Περίοδος*, horrida. Horror remissus est rigor, media quædam affectio inter rigorem & frigus. Is autem fit calore flauæ bilis, humorem crudum commouente, & putrefaciente. Itaque febres omnes horridæ, succensa bile in crudis humoribus enascuntur, atque vtrōque humore æqualiter mixto, si quidem cruditas putrefit in venis, bilis extra vasa, exquisita fit semitertiana.

1 Febris horrida est, non cui inuasionis, atque etiam accessionum ipsarum initio comēs est horror, sed in qua per plurimam totius accessionis partem horrore Symptoma extēditur. Gal. comm. ad sent. 24. sect. 1. lib. 1. Epid. Cæterū non hic noua febris species, sed eius quæ horrorem, vt symptoma perpetuum, habet, mos & natura explicatur.

DE MORB. INTERNIS


2 Alta enim & profunda bilis est putredo propter eius incendium ingens.

Aliae febres horridae, in quibus horror repetit, breuibus interuallis & eadem accessione, estq; eiusmodi motus horrificus inæqualis, cum videlicet natura conatur excludere materiam. Sed hæc propter crassitiem, aut quia densior cutis est, vel denique quod natura non ita robusta est, resistit, nec potest discuti. In hoc genere tardissimè incalescunt, longaque sunt & principium accessionis & incrementū. Aliis simul atque motus bilis remissus est, nouus reddit insultus, quia dum calor affligit corpus, frigidi humores putrescunt, nouamque accessionem commouent, & inde frequens reduplicatio, quam ἀναδίπλωσις vocant: fitque ut succedens accessio longè sit deterior præcedere, 3 quia iam lassata virtus est priore accessione. Sudores in his febribus mali. Etenim vi exprimuntur, non victoria naturæ effluunt: idque vel propter crudorum humorū copiam, vel virium imbecillitatem. Frigent extrema, vrūtur intima, soporosi fiunt, vērres cruda deiiciūt, vrinæ crudæ, decolores, tenuēs, aliàs turbulentæ, & crassitudine præditæ, nullo sedimento, aut malo, inæquali, diuulso. Fastidia, animi deliquia, syncopæ, conuulsiones, mala omnia. Pessimæ enim febres, ut antè diximus, in quibus crudorum copia bili confusa est.

3 Horrore etenim affecti multum insuper exudantes, difficili, funestoque malo implicatur. Hippoc. in Coacis animaduersionibus.

Curatio, ut antè, mixta, nisi quod summa ratio adhibenda est, ut intelligamus vtra materia superet, cruda, an biliosa.

De pituitosis febribus, & primùm de quotidiana.

 Mnem humorem frigidum & humidum in corpore pituitam appellari scribit Gal. 2. de diff. feb. Generatio pituitæ ab infirmo calore est, cibus phlegmaticis, intemperantia vitæ, otio, intempestiuis exercitiis, ætate puerili & senili, hyeme, constitutione cœli humida. Tria eius genera à Gal. ferè statuuntur. A forti frigidityte, acida: à calore præter naturam, salsa. Vbi verò leuiter affectus calor, & pauca est frigiditas, dulcis & fatua. Salsa sitibundos: acida famelicos: dulcis somnolentos facit. Acida concoqui debet: salsa repurgari: dulcis & fatua naturæ relinquendæ sunt, quia faciliè in sanguinè cōuertuntur. Fit aliquādo, vt phlegmaticus cibus non coquatur in ventriculo: quod inde generatur, cruditas est, nō pituita, aut pituita cruda dicitur, quæ appetentiam tollit, inducit fastidia, & pallorem. Qui humor à cerebro per nares emungitur, aut distillat in corpus, pituita non est: quemadmodum nec humor ille vitiosus & crudus, vnde pruritus, vlcerosus affectus, lepra, scabies, & alia eiusmodi.

Saliua ore contenta potius pituita est, ad pituitā naturalē propiùs accedens. Vniuersali nomine hæc omnia pituita sunt. Frigidissima & humidissima pituitæ species, quæ vitrea appellatur, ouorum albumini persimilis, vel vitro fuso, vehementes dolores infert, & quasi palo fixo impetentes, vbi loco calido, aut laxiore intestino impingitur, frigus infert, si immota est. Si verò mouetur per sensilia, rigorem, vt acida, commouet: nam & acoris est participes. Vnde sub acidarum genere sunt, qui compr-

hendant. Leuiter hæ putrefactæ, aut ex parte epialam inferunt. Vbi verò putrescunt magis, præcedit rigor, febris. Alia dulcis rigore non infert. Oportet ergò cum de pituitosa febre agitur, diligenter animaduvertere in quo genere pituitæ febris incenditur. Nam ex eo & curandi ratio euariet, & præfagiū certius instituitur. Græci ferè in genere de febre quotidiana scripserunt: Arabum familiæ plenius distinxerunt. Febris 1 autem quotidiana rarò aduenit sine 2 offensione stomachi & hepatis, 3 pulsu minino, raritate medio inter pulsum tertianæ & quartanæ, tarditate simili tarditati pulsus quartanæ. Accessionum initia habet circa vespërâ: & noctu magis, quàm interdiu, vexare consuevit, quòd pituita eo tempore moueatur. Vnde Hippocrates li. 3. Epidem. nocturnas febres quas appellat, intelligit quotidianas. Non inuadit cum rigore, sed frigus vehemens est partium extremarum: aliquândo & 4 horror quidam est.

1. Hæc febris omnium est rarissima, si exquisita intelligatur, quòd ægrè pituita putreat. Seruatur enim à natura tanquam sibi familiaris, vt quæ deficiente sanguine cedat in idoncum naturæ alimentum. Gal. comment. 2. in lib. de rat. vict. in morb. acut. sent. 44.

2. Nam superuacua potissimùm multa pituita in intestinis, mesenterio, circum ventriculum, visceriâmq; caua sepè coërcita putrescit, febrilem qualitatem nanciscens, quæ plurimum partibus illis negocium facessit.

3. A calore nativo crudorum copia humorum obruto, impeditis instrumētis, & minore necessitate instimulante. Gal. lib. prioris ad Glauco.

4. Cum pituita putruit, vel salsa est,

Difficulter eius materia accenditur, vixque in calorem commutatur frigus, vnde longum habet incrementum: materia est crassa & frigida, pigra ad motum, calor non ita magnus, 5 pori angustiores ac ferè constricti: ex quo fit, vt materia non possit tam celeriter discuti. Atque inde accessiones producuntur, aliquando ad horas octodecim: atq; vbj desit accessio, vestigia quædam febris reliqua sunt. Vnde nonnullis non tam intermittens, quàm continua credita est. In declinatione 6 sudores nulli, aut si qui sunt, à multitudine materiæ, non victoriâ naturæ excitantur. Postea iam progresso morbo, 7 paulatim sudor effluit. Primùm quidem certis partibus, deinde verò toto corpore emanat: calor ferè similis ei, qui fumoso igni comparetur, humidus, vaporosus, non deurens, 8 sed tantùm leuiter acris est.

5 Pituitosa enim corpora minùs sunt perspirabilia, quia frigidioris temperamenti dominatu tenentur.

6 Primis præsertim diebus, in quibus humoris crassities, lentor, caloris infirmitas, & cutis densitas sudores erumpere vetant.

7 Cum scilicet cocta aliqua ex parte est materia, & obstructions liberatæ.

8 Qualem dixit Hippocrates initio quidem ad mitem esse, sed paulatim incrementem esse, sub finē fecit. i. libr. 6. Epid. Hic enim calor tardè augetur, quia materia ligni viridis more tardè inflammabilis existit.

Ægri non 9 vruntur, non iactant corpus vehementiùs, non nudat pedes, aut pallia deiiciunt. Neque vehementer spirant, aut efflant igneum. Non appetunt frigidam, 10 & leuiter sitiunt.

9 In his enim calor minimè est acris, sed vaporosus.

10 Id fit quia ventriculus multa madidus est pituita, quæ calorem & siccitatē sitis effectrices causas reprimat.

Vrinæ albæ, tenues, aquææ, crudæ initio ab infirmitate caloris, progressu temporis, vt facta concoctione & obstructionibus solutis, crassescunt, multumque deponunt sedimentum. Frequentior febris hæc constitutione phlegmatica, quam proximè descripsimus. ¹¹ Longa quidem ex ratione materiæ, sed non ita periculosa. Addunt Auicennas & Arabum sectatores, grauitatem capitis, totiùsque corporis, sopores initio accessionis, inæqualitatem frigoris partium extremarum, animi deliquia, ¹² syn- copas. Atque ex ratione generum pituitæ ita distinguunt. Primum quidem ex eo quod gustus indicat falsus, dulcis aut acidus. In falsa horrificus motus est, vrina rufa, mediocri substantia. Pulsus fortior, velocior, densior quàm in cæteris pituitæ generibus, incertis nec statis temporibus comouetur, sitis maior est, nausea à frigore, calor sequitur, à calore sudor.

¹¹ Ex Gal. lib. priore ad Glauc. Quo loco quotidianam periculi non expertem esse scribit, cum breue tempus naturæ relinquatur, quo suas vires colligat.

¹² Quales dixeris stomachicas, vitio ventriculi orificij à crudis humoribus perfrigerati obortas.

In phlegmate naturali fatuo, saliuatio, vrina citrina vel alba & spissa, pulsus tardus, rarus, nullus saliuæ gustus, grauitas capitis. In phlegmate dulci vrina rubra vel subrubra, per totum spissa, pulsus velox, densus, paruus, inuadit media nocte. In declinatione sudor, oris ¹³ amaritudo, sitis, capitis grauitas, excrementa foetida. De vitreo in epiala & aliis. Excrementa omnibus quotidianis deiectiones & vomitus periculosa.

¹³ Quæ putredinem materiæ morbificæ insequitur.

Curatio.

Curatio.

14 Primis diebus cum tenues sunt urinae, saepe etiam albae, utendum est incidentibus & aperientibus: materia enim crassa, quam incidi oportet, & iisdem medicamentis liberantur obstructions. Verum in falsa & dulci, iis quidem 15 leuioribus & paucioribus diebus utendum est. In vitrea & acida, fortioribus, idque pluribus diebus Graeci & Arabes ad septimum diem utuntur. Iustus terminus definiri non potest.

14 Curandi ratio euariat secundum morbi tempora, & materiae naturam. Initio itaque, antequam ad ista incidentia & aperientia veniatur, oportuum fuerit clystere alui subducere, aut bladiore cathartico: a quibus interdum de venae sectione cogitatur, ut cum aucta febris, & quae generis eiusdem coeunt indicationes, id precipiunt faciendum.

15 Pituita enim dulcis, itemque ea quae falsa, minus est contumax, leuioribusque cedit incidentibus & aperientibus. cum alioqui a vehementioribus metuendum sit, ne in utraque febrile incendium magis inualescat.

Conueniunt itaque oxymel simplex, & hoc leuior, syrup. acetosus, aqua sacchari condita cinamomo. Fortiora 16 sunt oxymel diureticum, scylliticum, syrup. de duabus & quinque radicibus, & alia descripta capitibus morborum phlegmaticorum. 17 Laudatur plurimum melicratum, hyssopi, thymi, pulegij, stoechados, rerumque similium.

16 Hi syrapi crassos humores potenter incidunt, extenuant, separant.

17 Huius aut illorum loco hoc poterit apozema sufficere. ℞. rad. polypod. quern. petros. asparag. cichor. totius feminis cartham. & passul. mundatar. ana ʒ. i. agrimon. cuscut. fumar. ana M. i. thym. aspleni, adianth. ana M. ʒ. glycyrrhiz. ras. ʒ. ʒ. sem. anisi. fœniculi, melonum & cucumeris ana ʒ. 2. flor. cardiacor. & anth. ana p. i. f. decoct. ad ʒb. i. In colatura dissol. oxymeli. simpl. & syrup. capill.

DE MORB. INTERNIS

ved. ana ʒ.ʒ. vel (si valentiùs incidendum, attenuandũ & detergendum) eiusdem oxymelitis & syrup. de duabus aut quinque radicib. tantundem, f. apoz. clarum, cõditum cinamomo, pro dosib. iij.

Verũ habenda est ratio, vt iusta sit proportio mellis ad aquam. Nam vbi natura ægri frigida est, materia febris contumax, frigidum anni tempus, & cætera eiusmodi, 18 sexta pars mellis misceri potest, alioqui vel octaua vel nona. Hocque perpetuò meminisse oportet, in vsu syruporum oportere aliàs plus, aliàs minùs dilui. Neque consuetudo recipiẽda, quæ tantũ duplum aquæ aut similis liquoris imperat, vt syrupos diluat.

18 Contra verò in naturis ægrorum calidis, calida tempestate, morbifica quoque materia calida, dilutius melicratũ esse debet: promptè enim alioqui bilefceret, & morbum adaugeret.

Iam præparata materiã, si quidem vrinæ crassæ & rubentes appareant, videndum est, an phlebotomia conueniat. Nam & antè, si tales vrinæ fuerint, conueniet multò magis, vbi vel pituita dulcis, vel salsa est. Arabes calida constitutione cæli, dextram basilicã: frigida, sinistrã pertundunt. Oportet autem parũ detrachere, quia affectus est frigidior.

Quod autè ad purgantia pharmaca attinet, neque cassiam, neque tamarindos, aliãque eiusmodi leuiora recipiunt: quia stomachum offendunt, & tantũ quod est subtile, euacuant. Itaq; & 19 aloë, turpetho, carthamo, & aliis, quæ dicẽtur, vt i malũ.

19 Vt si in dosi vnã superioris apozematis infundas agarie. recens trochiscati ʒ. 2. zinziberis gran. 6. & in expressione dissoluas diacartham. & diaphœnic. an. ʒ. 1. ʒ. & syrup. de absynth. ʒ. ʒ. f. potio accommodata. Catapotia quoq; clemẽtiore ac humidiorẽ cœlo poterũt imperari.

Et quia semel non potest repurgari tota materia febris, 20 epicrasi vtendum est. Primum enim, vt antè dictum est, materiã incidimus, & obstructions liberamus, tum pharmaco vtimur, eoque leuiori, sed quod stomacho non noceat. Quinetiã omnibus medicamentis commiscere oportet ea, quæ stomachum roborant. Etenim in quotidiana stomachus ferè laborat: idque meminisse oportet, sal- sam & dulcem pituitam leuioribus educi posse, vi- tream & acidam non posse. Propterea in dulci & salsa poterit conuenire hæc potio.

20 Vt sensim quod noxium est, vacues. De epicrasi vide Galen. cap. 10. lib. 9. Methodi.

℞. summitatum absynthij P. 2. passularum P. 1. glycyrrhizæ. sem. anisi, & fœniculi ana 3. i. Fiat decoctio: in qua dissolue catholici 3. i. mellis rosati colati 3. ʒ. Fiat 21 potus.

21 Hæc potio vt sit efficacior, addetur 3. i. aut 3. i. ʒ. diaphœnic. Pauperioribus 3. ʒ. diaphœnici, vel 3. 3. diacarthami, vel electarij Indi (quod Parisiis præparari minimè consuevit) totidem drachmæ in aqua absynthij, menthæ, buglossi vel cichorij dissolutæ satis erunt.

Catharticum Auicenna.

℞. mastichis, zinziberis, turpethi benè gummosi ana ʒ. i. sacchari albiss. 3. i. cum decocto passularum fiat potus. Licet vti pil. elephanginis, de hiera, assa- ieret, vt sint harum alicuius ʒ. 2. agarici ʒ. i. & incorporentur syrupo ros. pallid. laxatiuo. Laudantur quoque hæc pilulæ.

Pilula composita.

℞. aloës lotæ in succo maioranæ, qui ventriculũ roboret, 3. i. agar. ʒ. i. mastichis, cinamomi, piperis ana Gra. 8. cum succo absynthij formentur pilulæ.

Alioqui.

℥. massæ interioris pilul. hieræ pieræ Galen. 3. 4. agarici trochif. 3. 1. sem. carthami, sem. vrticæ ana 3. β. turpethi benè gummosi 3. 1. mastichis, rosarum, cinamomi, galangæ ana Gr. 6. sacchari in vino albo tenui dissoluti q. l. cum oxymelite fiant duæ lozengæ pro duabus dosibus, sumendis tertio, aut quarto quoque die. Aliud.

℥. 22 pul. hieræ diacol. 3. 2. agarici trochif. 3. 1. nucis moschatæ & cinamomi ana Gr. 8. cum syrup. de absynthio fiant pilulæ.

22. Hæ pilulæ potentiores sunt, & extirpandæ materiæ dicatæ: quibus cautè utendum.

Pilula probate.

Auicennas agarici 3. 1. aut 3. 4. corporat melli, aut eandē dosim 23 sem. vrticæ præcipit, datq; breuibus interuallis. Quæ sequuntur pilulæ, multis probantur.

23 Vrticæ semen soluit aluum, non trahēdo, sed pungēdo & instimulādo, ac veluti titillando, ex cap. 13. li. 6. de simpl. med. fac.

℥. pul. hieræ picæ 3. 1. agar. troch. 3. β. pulpæ colocynth. 3. 1. mastichis 3. β. nucis moschatæ & cinamomi ana Gra. 6. cum succo absynthij, formentur pilulæ pro duabus dosibus. Aliæ.

℥. agar. albi, turpethi benè gummosi ana 3. 2. aloës, rhab. corticum myrobalanorum citrinorum, & chebulorū ana 3. 1. sem. cuscutæ & absynthij, eupatorij ana 3. β. mastichis, laccæ, anisi, sacchari albi, spicæ nardi, glycyrrh. ana Gra. 18. 24 esulæ pulueratæ 3. j. cum oxymelite scyllitico 25 formētur pilulæ.

24 Quæ ad purgandas aquas est valentissima.
25 Idem præstabunt pilulæ de agarico solæ, vel cum iis, quæ vulgò sine quibus vocantur. Aggregatiuz quo-

que & aureæ, adiectis, vt videbitur, gran. 3. aut 4. trochiscorum albandal. Pilulas si æger abhorreat, ad portionē ex agarico & rheo infusis in decocto conuenienti recurrendum.

Conueniunt tempore frigido ad 3.1. nec his tamen recentibus vtendum est, ²⁶ sed post mensem. Quæ sequuntur, caput & stomachum visceraque purgant, sensus acuiunt, colorem reddunt, & diuturnam quotidianam sanant.

²⁶ Tum enim singula medicamenta cum singulis melius permixta, fermentataque sunt.

℞. aloës optimæ 3.3. mastichis 3.4. rosarum, epithymi, caryoph. absynthij ana 3.1. laccæ, cuscute ana 3.1. croci, esulæ ana Gra. 8. cum succo absynthij fiant pilulæ Dosis 3.1. ad 2. Dantur breuib. interuallis. Simul atque apparebunt vrinæ crassiores, & magis coloratæ, stomacho consulendum est per ea, quæ postea dicentur. Conueniunt ²⁷ fots ex oleo cham. anethino, iasmino: quibus totus venter fouendus, spina inungenda est, idque cum frictione. Laudata est veteribus frictio ex tela araneæ, quæ imbuenda est prius oleis supradictis.

²⁷ Fomentis istiusmodi locus nullus erit in viribus minimè constantibus, & febre plurimum intensa. Fomentaria autem talis erit formula. ℞. origan. calamenthi. salu. maioran. absynth. ana M.1. seminum anis. & fœnic. ana 3.1. cyper. & calam. aromatici an. 3.2. flor. chamem. melilot. & ros. rubr. ana p.1. f. sacculi: qui bulliāt in aqua & vino albo pro stomachi fots, veletiam alterutrius hypochondrij. Licebit litum comparare, qui fots proxime sequatur, ex olei absynth. & mastich. ana 3.1. olei nard. 3.1. addito caryophyl. nuc. moscha & ros. rub. ana 3.1. cum pauca cera. Oleum moschatæ nūcis chymica arte extractum horum omnium instar esse poterit.

Laudantur quoque diuretica. Balnea quoque

in declinatione.

Sed neq; frictionibus, neq; diureticis, neq; phar-
macis, multò minùs balneis vtendù est initiis febris.

Quod ad clysteria & suppositoria attinet, vbi re-
sistit aluus, imperari possunt. Cõparantur autem ex
eorù decocto, ²⁸ quæ incidunt, attenuant, & flatus
discutiunt. Inflatur enim magna ex parte præcordia
iis, qui quotidiana laborant. Vomitus quoq; maxi-
mè, vbi nausea est, & iis, qui facilè vomūt, utilis est.

²⁸ Vt ex decocto parietar. mercurial. origan. cala-
menth. hord. semin. anis. fœnic. & similia.

Post initia iam vacuato corpore dantur horâ
antè accessionem quæ sequuntur.

²⁷. ²⁹ theriacæ vel mythridatij 3. i. propinetur ex
vino tenui. Probatum quoque decoctum apij, vel
quod sequitur.

²⁹ Theriaca præterquam quod indomitum humo-
rum cõtumaciam discutit, & viribus ipsis confert, ad re-
frigerationē etiâ incutis paroxysmi inhibendâ cõducit.

²⁷. zinziberis, origani, ameos ana 3. 3. coriandri
præparati 3. 4. rosarum, calamenthi ana 3. 3. passula-
rum 3. i. coquantur in lb. 6. aquæ ad consumptio-
nem medietatis. Dantur 3. 3. horâ ante accessio-
nem. Vitæ ³⁰ ratio institui debet ex iis, quæ co-
quunt, attenuant, incidunt: & vt progreditur mor-
bus, horum vis augenda est. Vinum sit album, te-
nue, aut vermiculum, vel hydromeli vinosum.

³⁰ Eadem fermè vitæ ratio incunda, quæ in tertiana
notha, sed quæ humida sit minùs. Et quia quotidiana est
longior, paulò pleniorē victum requirit, parciorē,
cum tendit ad vigorem.

Abstinedù est multis iusculis, quia nec decoctionē
ita iuuât, & replēt caput, nec stómacho amica sunt.

Quibus si utimur, alterare oportet iis, quæ has noxas prohibeant. Adultis auius vtédum est potiùs, quàm iunioribus, quæ sunt humidiores, & excrementosiores.

De febre epiala.

Ηπιάλον Græci vocant algorem, & febris gen^o, in quo sensus totius corporis inæqualis est. Nam 1 partes simul algēt & calent: ac alor quidem vehemens est, & calor mitis. Hinc epialon appellatum volunt: ἡπιον Græcis blādum & mite est. Febris huius materia est pituita vitrea, omnium humorum, qui in corpore sunt, frigidissima. Illa, siquidem integra est, neque putrefacta, 2 inexpugnabile frigus infert corpori, & ea, quæ superiore capite pituitam inuehere diximus, symptomata. Vix multa colligitur in corpore: eiùsq; causa, vel ciborum materia, vel languidus calor, vel utrūque. Si tota putrescit, quotidiana febris est: si tantum ex parte, epiala. Quæ ergò pars non putruit, algorem: quæ putruit, vapores calidos demittit in corpus, vnde febrilis sensus. Initio oscitatio, 3 pulsus minimus, tardus, rarus, urinæ crudæ & aquosæ, quotidie ferè inuadit. Accessio à quatuor horis ad vigintiquatuor, sed ferè breuior. Aliquando tertio quòque die, aut quarto commouetur, fortasse etiam maioribus interuallis. Neque falli oportet, vt tertianam existimemus, vel quartanam: quia tertianæ vel quartanæ periodis moueatur. Ad cognitionem huius febris antecedens vita, cœlum, ætas, temperamentum, & cætera adhibenda sunt.

Hic abstinendum 4 phlebotomia. Medicamentis 5 incidentibus & calfacientibus vtendum est: vt

DE MORB. INTERNIS

hyssopi, calamenthi, origani, thymi, stœchados, melicratis, quibus quarta pars vini poterit commisceri. Alioqui syrupis vtimur in curatione quotidianæ descriptis, initio factò à leuioribus, vt syrupo acetoso, oxymelite, ad fortiores, vt oxymel compositum, scylliticum, & similes.

Iam incisa & concalfacta ex parte materiâ, vtendum erit medicamento ex 6 puluer. hieræ picræ Gal. pul. hieræ diacol. ana 3.ß. videndumque erit, vt recentes sint, & electæ species, ex quibus pulueres componuntur. Post purgationem redeundum est ad incidentia medicamenta & alimenta. Atque interuallis glâdibus & 7 clysteribus acrioribus vtendum, in quibus pulueres proximè dicti dissoluuntur ad 3.ß. Probant thermas siccas, vbi iam se produnt signa coctionis. Meliores thermæ, si ex rebus incidentibus & calfacientibus comparentur. Itaq; calamentum, mentham, origanum, rosmarinum, thymum, satureiam, stœchada, & alia eiusmodi, quatuor partibus aquæ, & vna vini (albi, in fine decoctionis positi) incoquemus, atque inde pro ratione virium, 8 thermas cõparabimus. Valent statim à thermis diatriumpipereon, diacalamynthes, aurea alexandrina, dianthos, & similia data ex vino tenui. Dosis 3.℥. Poterit quoque his vti tẽpore matutino. Sed optimũ fuerit statim à thermis fricari corpus, sed spinâ maximè: deinde inungi oleis suprà numeratis cap. de quotidiana, aut iis, quæ capite de paraly si scripta sunt. Post hæc reponatur in molli lecto, & sumpto diatrio pipereo, vel simili, conquiescat.

Vitæ ratio eadem, quæ in quotidiana, sed attenuet magis, & incîdat.

1 Ex libr. 2. de different. febrium, & libr. de inæquali intemperie.

2 Vt pote sæuissimū rigorem: quemadmodum de colico Galeni dolore ab eiusmodi pituita vitrea oborto scribitur libr. 2. de loc. malè affect.

3 Non enim, vita superstita, tanta vis vnquam frigoris corpori inest, quæ multam congerere possit.

4 Ex quo febrilis caloris, non intensi, certa sit significatio.

5 A misso namque sanguine tenacior pituita magis recrudesceret, vnde febris diuturnitatis metus impederet.

6 Qualia erunt, syrup. de hyssop. oxymel scylliticum, syr. de duab. & quinque radicib. de bizantiis, cum aquis absynth. bugloss. borrag. Vel apozemata è radicib. aperientibus, irēmque enulæ campanæ, ireos, & quæ capite superiore scripta.

7 Raro in potu datur ob amarorem insignem, quo plurimū ingrata est.

8 Tales ex origano, calamenth. centauro minore, seminibus calidis, decoquendis, diaphœnico, electar. diacarthamo, hiera, melle anthosato, & oleis calidis, dissoluendis, instituentur.

9 In eorum simplicium decoctum igniti lapides iniciuntur, & æger papilione vndiquaque tectus toto corpore vapores excipit.

10 Hæc antidota emendandis affectibus frigore conceptis inseruiunt. Idem præstabit mythridatij, & theriacæ vsus. Vel talis opiata præscribetur. ℞. conseruæ anrhos, acor. conditi ana 3.2. mythrid. 3.1. puluer. aromatic. ros. descript. Gabriel. 3.1. cum syrupo conseruationis citri fiat opiata, detur ad 3.℞.

De Quartana.

Quartanæ materia succus melancholicus, vel atrabilarius: quorū generatio apud Græcos superaffatus sanguis, vel flaua bilis. Arabes torrefacta pituitâ et etiam melancholiam

gigni existimant. Quartana alia primum inuadit, alia febres alias sequitur, ² maximè erraticas, quam *ἡ μέλαινα* appellant, de specie in speciem facta febris mutatione. Arabes verò quartanam notham hanc faciunt, de qua sent. 29. lib. 3. Prognost.

¹ Imò Græci pituitam sua consistentia crassam, ob idque melancholici humoris naturam referentem, quartanarios circuitus efficere profitentur. Qua in sententia est Galenus lib. 2. de crisi- bus.

² Harum enim humor non integrè vacuatus, exurit, crassior fit, melancholiæ naturam induit, tandemque putrescens subiecta quartanæ materia subsistit.

In quartanam verò firmatur febris, quoties inter- mittit,prehenditque modū erraticum. Autumno; propè est, & cū tricesimus, aut tricesimusquin- tus agitur annus. Febrium enim præcedentiū ma- teria non solū putrescit magis cum tempore, sed torrefit, ac velut cinis quidā relinquitur. Quæ ma- teria torrefacta, si aliis quidem partibus putrescit, feruet & commouetur: aliis verò non putrescit, ne- que commouetur, quibus febris erronea fit. Con- trà verò, si æqualiter hæc fiunt in corpore, quarta- na fit. Hoc genus quartanæ nothæ ætati consisten- ti magis familiare. Quæ verò quartana vera est, ⁴ declināti ætati, hoc est, post trigessimūquintū annū.

³ Vnde aphorismus Hippocratis 25. lib. 2. Æstiuæ quar- tanæ magna ex parte breues, autumnales, longæ, & ma- ximè quæ hyemem attingunt.

⁴ Hinc ille Hippocratis aphorismus lib. 5. *Apoplexie fiunt ab anno quadragesimo ad sexagesimum.* Quod intelli- gendum scribit Galen. de melancholicis apoplexiis, quòd ea ætas melancholico succo coaceruando op- portuna sit.

Qua ætate languescit calor, sanguis melancholicus colligitur, densatur cutis, & putrefacto sanguine melâcholico quartanæ excitantur. Æstate breuiiores magna ex parte, quia humor tenuior est, cutis laxior, & materia facilè discutitur. Autumnales longiores, maximè quæ hyemem attingunt. Harum materia crassior, cutis durior, externum frigus est, quod excretionē prohibet, & materiam febris intro repellit. Nec perpetuò æstate breues, sed cum materia tenuior, sanguis tempestiuè detrahitur, & iusta vitæ ratio obseruatur.

Aliæ febres, vitio 5 hepatis: aliæ, vitio 6 lienis: nonnullæ, vitio vetriculi. Ab hepate color albidus, sub-tumidus corporis habitus, vrinæ subrufæ sandarachæ colore: dextrum hypochondrium intumescit, 7 maior spirandi labor & tussis, quàm à liene. Atque hinc 8 ineuitabilis ferè hydrops. Aliquândo vitio ventriculi crudus humor vere potissimùm colligitur, tam crassus & contumax, quàm attrabilis.

5 Hepar feruidius atram generat bilem, febris quartanæ suscitabulum. Idem esto iudicium de cæteris melâcholicis affectibus, quorum materia sæpè vitio hepatis non minùs, quàm lienis, congeritur.

6 Qui infirmus si fuerit, impotens est sanguinis faciem secernere: à qua retenta obstructio, putredo, febris.

7 Obstructum enim & repletum iecur magis diaphragma suo pondere premit.

8 Siquidem hepatis istius materiæ multitudine grauitati natus calor sanguinis author obruitur, atque adeò extinguitur: vnde *σῆψις τῆς αἱματέως*, sanguificationis priuatio.

Hinc quartanam gigni posse scribit ⁹ Aristoteles, id est, febrem, quæ quarto quoque die repetit. Nec id quidem repugnat Græcis, aut Arabibus Medicis. Etenim pituita quantitate pauca, sed consistentiâ multum crassa & viscida quartanarios, aut etiam rariore, circuitus facit. Sed quæ quartana hæc est, ad epialam referri potest. In vera ac simplici quartana, quæ sæpissimè contingit, ¹⁰ initio quidè frigus est, quod in altum penetrat, ut etiam ossa pertundere videatur, calor sequitur non ita magnus. Non desinit in vomitus biliosos, sed ferè pituitosos. Tenuis ¹¹ sunt urinæ & aqueæ, pulsus parvus, rarus, debilis, tardus, occultus, quarto ferè die repetit. Aliquando tardiùs Autumno, & ætati declinanti familiaris, melancholicis naturis, magis etiam, si constitutio anni frigida & sicca est, vita refrigerans & siccans.

⁹ Scribit enim Aristoteles problemat. 19. sect. 1. pueros quartanæ obnoxios esse, forsan quia in his melancholici humoris (cuius nomine pituitosum & crassum subintellexerit cum Hippocrate, & aliis antiquis Medicis) sit exuperantia.

¹⁰ Quartana vera, quæ est ab humore melancholico, his, quæ nunc colligit, circumscribitur signis.

¹¹ Octo primis diebus: quia tum materie crassæ nimium in venas intrat, ingentis obstructionis necessariâ consecutionem afferens. Quo fit ut crassior portio nequeat in principio exolari. At longiùs progresso morbo, coloratiores & crassiores prodeunt urinæ, natura co-coquente, & obstructa liberante.

Post initia rigor fit, in declinatione sudores fluunt.

Quod si etiam lien intumuit, ¹² diuturnius malum est, quam si ab hepate ortum sit. Resistit alius, facilius in sinistrum latus decubitus, metuitur hydrops.

Soluuntur quartanæ vrinis crassis, aliàs albis, aliàs
nigris, euntibus mēstruis, aut hæmorrhoidibus fluen-
tibus, profluuiò sanguinis è naribus, abscessu in cru-
ra. Accessionem ¹³ ferè habet viginti quatuor hora-
rum, aliàs breuiorem. Quartana ¹⁴ salubris est, ne-
minemque iugulat. Quòd tamen intelligi debet
non simpliciter. Senes ¹⁵ enim magna ex parte in-
terficunt. Aliquando quoque viscerum tumor est, de-
fluxio in viscera, aut aliquid tale, vnde mortis peri-
culum est. Producitur ferè in tertiū vel sextum mē-
sem, aliquando in annum, Auicennas in duodeci-
mum annum produci scripsit. Nec id mirum. Nam
Mecœnas ¹⁶ tota vita perpetua febre laborauit, su-
premo triennio nunquam dormiuit.

¹² Et ad hydropem ferè semper ducit. Est enim lien
sanguinis depurandi officina. Vnde suo si supersedeat of-
ficio, aqua in ventrem affluens hydropem accersit. Hip-
pocr. lib. 2. de morbis mulieb. Cæterum difficilius cura-
tur lien, ob eius calorem imbecillior.

¹³ Quinæ etiam quartanarum accessiones ita interdum
inualescunt, vt duplicem & triplicem quartanam repre-
sentent, atque etiam ad cōtinuitatem progredi videan-
tur. Quod crassiori & copiosiori materiæ acceptam fe-
rendum est. Gal. lib. de typis.

¹⁴ Hippocr. sent. 4. sect. 3. lib. 1. Epid. & Gal. commen-
tar in sent. 71. sect. 3. lib. 3. Epidem.

¹⁵ Omnes enim febres in senibus periculo non va-
cant. Funestæ verò his sunt maximè quartanæ, quia, vt
vincantur, multo calore egent, cum facultas concoctrix
in senibus elangueat, & expultrix quoque sit infirma.

¹⁶ Vide Plinium cap. 31. lib. 7. Sic Antipater Sidonius
poëta omnibus annis vno die tantum natali corripie-
batur febre: & eo consumptus est longa satis iam sene-
cta. Ex eodem Plinio.

Ad genus quartanarum longiores periodi referri

possunt. Hippocrates sect. tert. lib. primi Epid. quasdam 17 quintanas, hásque pessimas, facit: quæ aliàs ante tabem fiunt, aliàs tabidis superueniunt, & interficiunt. Idem septimanas longas, verùm non lethales. Præterea nonanas cæteris longiores, sed non lethales.

17 De his quid Galenus senserit, videre est comment. ad sent. 7. sect. 3. lib. 1. Epid. Vbi febris accessiones quinto quoque die, atque etiam septimo, recurrere quidè posse fatetur, sed novas febrium species constituere negat: quòd illarum causa non alia agnoscenda sit, præter materiæ humoralis portionem, & prauam victus rationem. Vnde vel ad quotidianam, vel ad tertianã, vel ad quartanam, circuitum referantur.

Verùm Gal. in commentario hæc non Hippocratis, sed alterius esse putat: scribitque nullas se vidisse periodos vltra quartanariam. Agnoscit tamen aliquando fieri posse, vt à præcedente febre semen aliquod relinquatur, neque iusta vitæ ratio obseruetur, atque inde fieri, vt vel 7. vel 9. 5. vel 6. 18 die repetat febris. Verùm non protinus quintana, sextana febris est. Quòd si in ratione vitæ nihil peccatum est, & fiant eiusmodi periodi, quintana fit febris, sextana, &c.

18 Pro maiore, aut minore humoris synatrismo, celeriore vel tardiore putredine & motu.

Paulus libr. secundo quartanæ periodos interim producit vltra quartum. Epialæ circuitus rariores aliquando, quàm quartanarij.

Rhazes & Auicennas, aliorum quoq; experientia, eiusmodi circuitus cognoscunt. Rariores etiam,

vt qui repetant decimoquinto quóque die, semel in mense, semel in anno. Existimántque hæc fieri à materia melancholica, pauca & crassissima, quam exusta crassior pituita generauit. Nec, si vltra quartanarium, circuitus quintani, septuimani, & alij admittentur, propterea nouæ humorum species fingendæ sunt.

Curatio.

Cum quartana ¹⁹ clementer agendum est initio: neque medicamentis catharticis natura irritanda: medicamenta quoque incidentia, & (vt vocant) digerentia media sint. Nam quicúnque initio non solum catharticis, sed etiam fortius incidentibus, & digerentibus vtuntur, ex simplici ²⁰ quartana duplicem omninò maiorem & difficiliorem, ex duplici triplicem, vel omninò ambas maiores, difficilióresque reddiderunt. Nonnunquam in tempestiuo vsu remediorum continua fit, quæ ægros occidit. Tempora igitur huius febris diligenter animaduertenda sunt. Neque vrina sola, sed omnia accidentia consideranda sunt. Paroxyismi inter se comparandi, videndúmque an grauiora, an minora accidentia superueniant. Verùm quod ad pharmaca attinet, ²¹ non perpetuò expectanda sunt manifesta signa coctionis. Aliquando enim multa materia est corporibus neruosis impacta, sequiturque paralyfis: cuius si qua ostenduntur signa, etiam si manifesta coctio non apparet, maioribus remediis vtendum est. Neq; leuioribus pharmacis & clysteribus interdictum est. Verùm, vt primæ venæ leuiter repurgentur, exhibebitur cassiæ fist. ʒ. ss. æstate in scro caprino dissolutæ: hyeme verò in hoc decocto.

DE MORB. INTERNIS

19 Non defunt, qui vehementioribus vtendum medicamentis præcipiant, quòd à leuioribus humores tantum commoueri, non educi, putent. At melius fuerit ad Galeni mentem totam curationem cōuertere, blandiora vniuersali morbi principio exhibere, ne naturæ perperam irritatæ vlla inferatur noxa, instante verò coctione valentiora. Lib. 1. de art. cur. ad Glauc.

20 Validiora enim incidentia & digerentia febrilem calorem accendendo maiorem putredinem accersunt.

21 Vulgò lene catharticum, minoratiuum appellant, propinatur: cuius vsu subducta parte aliqua materiæ, reliquam natura iam leuata euincat, ex Gal. comm. ad aph. 29. lib. 2. Quale erit. ℞. cass. ʒ. 6. rhei elect. puluerati ʒ. 4. vel rhei loco (si purgare valētius est consilium) confect. hamech. ʒ. 2. cum sacch. f. bol. Sed vtilius fuerit potionem imperare. ℞. cath. dupl. senn. & rh. ʒ. 1. cum decocto conuenient. vel sero lact. vel aq. lupul. scolop. cich. f. potio.

℞. passul. P. l. foliorum 22 sennæ ʒ. 1. cinamomi & seminis anisi an. ʒ. ʒ. Fiat decoctio pro vna dosi: in qua dissolue vel cassæ, vel catholici ʒ. ʒ. Alioqui ex iusculo galli vel capri alterato cum multa borragine, buglosso, apio hortensi, lactuca, scariola, infundimus, & cum nodulo incoquimus ʒ. 2. foliorum sennæ, & iusculum colatum sorbendum exhibemus: vel eadem folia liquidiore iure pisorum, aut ciccerum rubrorum incoquimus, butyrum & modicum salis adiicimus, cinamomi etiam puluisculum, & ita damus. Eadem folia in puluerem redacta 23 pondere ʒ. 2. inspergimus decocti absynthij ʒ. 3. Frequens vsus veteribus fuit epithymi. Nunc folia sennæ plurimum vsurpantur. Iam apparentibus signis coctionis vtimur agarico, 24 pul. hieræ picræ, hieræ diacol. quibus folia sennæ trita cōmiscemus. Veteres etiam elleboro, quidam lapide armeno & lazuli,

lazuli, fortioribúsq; catharticis, quæ ex cap. de melancholia repetenda sunt. Quod ad digerentia attinet, conueniunt syrupi 25 capill. ven. de lupulis, scolopendrio, adiantho, violatus, de pomis, de fumo-terræ, oxymel simplex.

22 Parua nimirum hæc sennæ dosis. Itaque poteris ad 3.2. vel 3.3. imperare.

23 Dosis hæc satis efficax, plúsque facit, quàm semuncia foliorum eorundem infusorum. Sunt qui eundem puluerem pari dosi cum vino albo assumunt, sed nimis torminosum illud est medicamen.

24 Vt sint puluer. hier. diacolocynth. 3.4. puluer. epithym. & fol. sennæ ana 3.2. quæ modico melle excepta in sero caprino dissoluatur. Sed huius remedij tutus nō est vsus in calidiore tempestate.

25 Ex his syrupis parabuntur zupia aquis conuenientibus additis, scolopendr. fœnic. cichor. fumar. borrag bugloss. vel apozema institues hac forma. 24. polypod. q.3. radic. cappar. tamarisc. petros. & fœnic. an. 3.1. agrimon. scolopendriæ, aspleni (ceterach vocant seplarij) adianth. bugloss. lupul. fumanæ ana. 3.1. semin. frigid. maior. & anis. ana 3.1. flor. cardiacorum & genistæ ana p.1. f. decoct. ad lb.1. In colatura dissol. syr. de scolopend. & de bizantiis, vel oximelitis simpl. & syr. de lupulis ana 3.1. f. apozema, vt decet.

Deinde etiã apparentibus signis coctionis, 26 oxymel diureticum, syrupus de bizantiis, syr. de epithymo, Saboris, oximel scylliticum. Alioqui melicrata ex absynthio, eupatorio, chamædri, scolopendrio, radice capparis, fœniculi, petroselini, rusci. genistæ, fraxini, polypodij, tormentillæ, tamarisci, glycyrrizæ, & similiū. Aut ex his syrupos, apozemata, comparamus, ferèque passul. borrag. 27 cuscutam, scariolam, cichorium, quatuor semina frigida ma-

iora, se. anisi, fœniculi, carui, sem. portulacæ, coriandri commiscemus. Mel item passularum prius descriptum, aliquid aceti, decoctum limacum, ²⁸ ranarum viridium, succum pomorum odoriferorum, ex quo etiam syrupus concinnatur.

²⁶ Hic, si vitium aliquod iecur obsederit, miscentur syrupi de cichorio, de endiu, acetosus.

²⁷ Hæc præsertim adduntur, si atra bilis sit vsta.

²⁸ Remedia id genus empirica minimè vsurpanda sunt. Ranae autem virides si cui quartanae sunt vsui, cum à venenata sua qualitate, qua virus quartanae oppugnant, depromunt.

Sed in his omnibus diiudicandum: initio enim leniora conueniunt, vbi neque fortiter calfaciendum, neque refrigerandum est. Eligenda que sunt, quæ vel temperata, vel proxima temperatis sunt. Vfus calidorum, cum iam viget morbus, & apparent signa coctionis manifesta, vt sudores & vrinas moueant.

Quod ad ²⁹ phlebotomiam attinet, si quidem corpus crasso sanguine abundat & redudat, si gracile corpus est, si ³⁰ venæ turgide, si suppressa aliqua solennis purgatio, vena secanda est, satis amplo foramine facto.

²⁹ Satiùs fuerit post purgationem initio institutam venam perturbare, quàm febris incrementum expectare, maximè verò si affulserit plethora, aut solennis aliqua vacuatio fuerit suppressa. De teporis missionis sanguinis delectu non inter omnes conuenit. Aliis placet hora paroxysmi, qua commotus humor se sequaciorem præbeat: aliis improbat. Sed tutius die paroxysmum præcedente vena secatur.

³⁰ Vide ne flatu tantum turgcant.

Atque vbi niger & crassus sanguis effluit, pro ratione virium & multitudine sanguinis deplendū est. Si tenuis & flauus, statim claudenda vena est, feréque aperitur basilica sinistri brachij, vel saluarella, siue splenica vena inter annularem & auricularem sita, si quidem ³¹ viribus metuimus. Atque aliquando periculi gratiâ, vt qualis sit sanguis, cognoscamus, vena inciditur.

³¹ Interna enim axillari pertusa maior sit præ vasis capacitate spirituum effluxio. Attramen splenicæ illius & paruarum eiusmodi venarum sectionem Gal. irridet lib. de curatione per sang. missionem.

Suppressa purgatio suo modo incitanda est. Est & in quartana thermarum & balnei vsus. A balneis (inquit Galen. lib. i. ad Glauc.) penitus arcendi non sunt: à quibus si omninò abstineant, solis contenti frictionibus plurimū iuuari possunt. Galenus videtur omninò reiicere, nisi consuetudini ³² aliquid concederet. Hippocrates & Arabes, recentioresque practici hoc modo vtuntur. Ante signa coctionis ³³ dulcia quidem balnea, leuiter calfacientes thermas, vt brevis mora sit, permittunt, idque ante cibum, obstructionis metu, ³⁴ extrâque paroxysmum, vt die accessionem præcedente. Apparentibus verò manifestis signis coctionis, fortiora balnea & stuphas permittunt, eadēque frequentiora. Quorum iusta ratio esto. Nam in quartana, per initia quidem, ³⁵ omnis motus corporis & animi, qui quidem vehemens sit, vitandus est. Postea verò is conuenit, siue fiat ³⁶ per pharmaca, siue ³⁷ per potiones, & alia quæuis remedia. Debent autē & thermæ, & balnea ex dicta materia comparari: gra-

tiâ exempli. Chamæmelum, melilotum, anethum, herba fœniculi, postea etiam calamentum, melissophyllum, pulegium, stœchas, origanum: coquatur aquâ, vnde lauacra fiant, & vapor thermarum excitetur. Iam apparentibus signis coctionis, à thermis & balneo tempestiuus vsus est theriacæ. Quartanarios (38 inquit Gal.) multos sæpe hoc ordine curavi: eo die, qui accessionem præcedit, vomitû à cœna commoui: postridie manè cremorem absynthij exhibui, tum duabus horis ante accessionem, theriacam dedi, idque tam fœliciter cessit, vt postea nō redierit accessio. Hoc modo igitur ex Gal. Arabibus, & recentioribus Medicis in quartana te habebis. Vbi iam apparent signa coctionis manifesta, pridie accessionis, ex decocto sem. atriplicis vel raphani ad 3.5. vel 6. dato, aqua, vel prisana tepida digito immisso in gulam, pēna illita oleo, 39 vomitum à cœna commouebis. Stomachum oleo absynthij inunges, somnum in noctem procurabis manè.

32 Cui tamen perpetuū parendum nō est: Non enim semper inhærere iis, quibus assueuimus, sed & contraria tentare nonnunquam nos oportet. Gal. comm. ad aph. 50. libr. 2.

33 Qualia, quæ ex aqua potabili comparata calore temperata sunt, & leuiter digerunt.

34 Quam cibi nondum cocti, & humores crudi caloris impetu ad cutim protrusi ingenerarent.

35 Quamuis enim tum temporis mitis sit febris, & intermissionis diebus ad consueta munia eger redire possit, concitatiore tamen corporis motu, aut animi cōtentione, verendum ne melancholia efferetur, & proinde concepto incendio febris ingrauescat.

36 Vt si in expressione 3. 2. aut 3. 3. folicul. fennæ in quantitate suff. apozematis superior. cum 3. 1. seminis

anif. infusorum diffolueris cathol. & fyr. de scolopend. aut capill. ven. vel lupulor. ana ʒ. i. confectionis hamech ʒ. 2. vel, huius loco, diacarthami, aut electarij de succo rosarum tantundem. Pridie accessionis, quo tempore se ad morum natura componit, commodius sumetur.

37. Præparantes, roborantes, vt per electaria, condita, &c.

38. Ex Gal. lib. de Theriaca ad Pison. cap. 26. Theriaca (inquit) exugēs atram è venis & liene bilē, veluti virus quoddam, quartanis & melancholicis affectibus plurimum confert.

39. Impuritas enim ventriculi cibo permista facilius vacuatur, iuxta aph. 13. lib. 4.

ʒ. summitatum absynthij M. ʒ. fiat decoctio in aqua ad ʒ. 3. colatura detur, quæ modico cinamomi cōdiri potest. Ex quo duabus horis antè accessionē,

ʒ. 40 theriacæ bonæ & antiq. ʒ. i. vel ʒ. 2. dissol. in vino albo tenui ad ʒ. 3. in quo calido chamædreos pugillus maduerit. Alij etiam initio paroxysmi eundem potum imperant: hocque meminisse oportet, eum diem, qui præcedit paroxysmum, commodissimum esse & pharmacis, & aliis remediis.

40. Videndum diligenter, ne theriaces vsu intempestiuo, vt pote ante coctionem, febrem ingemines, & ex euentu fermè incurabilem reddas.

Alia quoque 41 antidota interuallis sunt danda, multò magis vbi manifesta signa coctionis apparent. Plurimus vsus theriacæ, mythridatij, auræ alexandrinæ. Dosis à ʒ. i. ad ʒ. 2. ex vino, decoctione chamædreos, aqua ligustici (quæ ad stomachi inflationes præcipuè valet) cuscute, scolopēdrij, fumariæ, lupulorum, capill. ven. valerianæ, calamenthi & rerum similium. Probatum quoque & hoc.

DE MORB. INTERNIS

41 Cuiusmodi erunt, quæ incidunt, obstructa soluant, cruditates tollant, flatus discutiant, vt diatriasantalum, diatriumpipercon, diaspolitic. & similia.

℞. 42 cinamomi 3. 2. piperis 3. 1. croci, myrrhæ, sty-
racis, sagapeni, ana 3. ʒ. benzoini 3. 3. rad. gentianæ
3. 2. excipiantur melle. Dosis 3. ʒ. aut ʒ. 2. ex aqua
calida. Eadem dosis castorei, vel bituminis Iudaici.
Dentur autem duabus horis ante paroxysmum.
Fotus & 43 illitiones non solum stomachi, sed & vi-
scerum, lienis præsertim, primùm quidem ex iis, quæ
remolliunt & relaxant: deinde additis, quæ flatus
discutiunt & aperiunt. Conuenit oleum chamæ-
melinum, aneth. absynthij. Adduntur & semina a-
pij, rutæ, cumini. Solenne fuit veteribus Medicis,
obseruatum quoque recentioribus, vt præter supra
dicta remedia, quæ antè paroxysmū descripta sunt,
44 spinam, scapulas, brachia quoque innungerent,
imminente febre. Cui rei conueniunt oleum cha-
mæmelinum, de cucumere agresti, oleum, in quo
rosmarinus coxerit, & ea quæ in paralyti dicta sunt.
Sic enim præciditur causa paralyseos, quæ aliquan-
do quartanariis accidit, ob crassos humores neruis
impactos. Deinde rigor anteuertitur. Probatum
hoc linimentum.

42 Hæc vsurpari non solent: quæ si in vsum reuocen-
tur, summa cum cautione præscribentur. Facit autem hæc
mistio ad ventriculi cruditates, flatus, obstructions, &
coctionem mirificè iuuat.

43 Sæpius enim hîc inflatur ventriculus, intumescit
ac induratur lien: quibus partibus malè affectis litu-
bus, fomentis, emplastris, & aliis eius generis remediis
succurritur.

44 Ad lenienda symptomata, atq; imprimis horro-
 re vehementiam. Illitæ siquidē oleis calidioribus hæ par-
 tes præterquam quod frigori fortiter resistūt, sudoribus
 sæpè sensim diffluunt: vnde subtracta materiæ, quæ fa-
 ctura erat paroxysmum, parte, vel nullus sequitur paro-
 xysmus, vel certe multò minor.

℞. succi rutæ 3.2. olei scorpionum 3.4. vini mal-
 uatici 3.3. feruefiant ad succi consumptionem, & ad-
 dito ceræ momento fiat linimentum. Aliud.

℞. cinamomi, piperis ana 3.2. terantur tenuissimè
 & misceantur: & postquam spinam oleo chamæ.
 inunxeris, puluerem inspergito: sequentibus paro-
 xysmis idem & in scapulis & brachiis facito.

Post hæc autem, quæ fieri debent imminente
 paroxysmo, molli lecto ægrum reponito, bene
 contegito, lateres calidos perfusos vino tenui odo-
 rifero, & linteolis conuolutos, 45 plantis pedum,
 & volis manuum admoüeto, vel aliter contra fri-
 gus munito.

45 Sed eum succensus fuerit calor, lateres submoue-
 to, ne pro quartana continuam inducas.

Iam vigente morbo, urinæ & sudores mouean-
 tur. Cui rei melicratum è calamentho, mulsâ, in
 qua anethum, ruta & similia coxerint: 46 gaiaci
 decoctum conuenit.

46 Dummodo quartana mitior sit à succo melan-
 cholio, non atrabilario. Decoctum dilutius erit propter
 febrē: vt si maceres in libris aquæ 10. vel 12. lb. s. gaiaci, &
 singula coquantur ad tertias, addit. cichorio, vel oxalide
 & liquiritia ad finem decoctionis. Interim diligenter
 consider. an tumidū sit dextrum hypochondrium: tunc
 enim gaiaci vsus non admittendus.

De vomitu sic habeto. Qui isagogem seu Medi-
 cum scripsit, initio paroxysmi extrema calfacit, in

DE MORB. INTERNIS

remissione 47 vomitum prouocat. Græci à cœna vomitum ferè imperant.

47 Melancholici potiùs per inferiora purgandi, ex Hippocrate aphor.9.lib.4. Sed cum in quartana vomitus imperatur, id fit non ad cõiunctam febris materiam, quæ rarò per vas venosum appellatum in ventriculum recipitur, sed ad antecedentem exigendam.

Auicennas antè cibum, post cibum, hora ante paroxysmum, initio paroxysmi. Practicis recentiores initio vomitum prouocant, & ante paroxysmum. Commodissima hora est commota materiâ, & facilè sequenti. Id fit initio & remissione paroxysmi: fit etiam iam cœnatis.

In clysteribus eadem ratio seruari debet, quæ in pharmacis. Primùm enim ex remollitiuis vocatis, adiecto fursurum cremore, prunorum & passul. decocto. Postea verò vbi materia cœpit concoqui, paulò acriores clysteres conficimus. Dissoluimus autem initio quidem cassiam fistulam. Denique etiam cum materia decoctionis epithymum, folia fennæ incoquimus, ad 3.2. vel 3. hierâ picrâ 48 dissoluim. ad 3.ß. vel Galeni, quæ leuior: vel Oribasij, quæ acrior. Cuius hæc est descriptio.

48 Sepiùs melle incorporata datur bolo, vel pilulis deglutienda: rariùs propter insignem amarorem dissoluitur, vt antè dictum est.

℥. aloës 3.2. & Gran.6. spicæ nardi, asari, mastichis, croci, xylobalsami ana Gra.9. corticis rad. ellebori nigri ʒ.ß. terantur omnia, incorporentur ex decocto pulegij, vel succo absynthij, alioqui melle, vt gratiora sint. Dissol. autem huius picræ melle incorporatæ 3.2.3. vel 3.ß. qua & vtilicet iam progressio morbo ad 3.1: vel ʒ.4. si inde formentur pilulæ.

Alioqui imperabis pul.hieræ picræ 3.1.pul. fennæ 3.ß. incorporabis ex succo absynthij, in quo semiscriptulum corticis rad.ellebori nigri madefeceris.

Quòd ad victum attinet, conuenit initio è materia media, interuallis quoq; ab initio ad vigorem rebus acribus, vt sinapi & pipere, & salsamentis vti licet: quanquam & post vigorem tempestiuus vsus est. Similiter 49 diatriumperéon, dialpoliticon ad 3.2.ex 3.3.vini vel maluatici, vel tenuis & odoriferi, idque ante paroxysmum. Id autem fiet commodè, vel tertio, vel quarto quóque die. Salsamentis veterum ferè caremus, neque, vt salsamenta Græcis & Arabibus permittantur, quibúsuis rebus sale cõditis vtendum est. Non enim bubula aut suilla, non iëthiocola seu molluta, 50 in summa iis, quæ crassum sanguinem gignunt, quæ nimium siccant, quæ viscidam materiam relinquunt, vti oportet. Nam ideo salsamenta imperantur, quia sal incidit, attenuat, discutit excrementa, siccet, virtutem colligit & roborat.

49 Regione & tempestate frigida, necnon declinante ætate. Impensius enim æquo electarium istud calfacit.

50 Tale aliquid scribitur à Galeno lib.3. de loc. mal. affect. cap. de melancholia.

Vitanda sunt, si quæ refrigerant & siccant, nisi temperetur aliquo, quod humectet. Siccant capillares & refrigerant, scolopendriũ, & alia, quibus hic vtimur. Sed aliis, vt saccharo & aqua, corrigatur. Refrigerantia verò & humectantia prohibet ex Græcis Aëtius.

si Vt enim ratione febris conducant, nocent tamen, humorem melancholicum altius impingendo. Quarta tamen ab atrabilario si fuerit, non æquè obsunt.

Auicennas permittit iusto modo, vt scilicet, facilis sint coctionis, boni chymi, quantitate modica, & si quidem nihil metuimus, ne inde vis concoctrix ventriculi offendatur, tuncq; corrigenda sunt. Numerat lactucas, endiuia, melones, persica. Melius fuerit vti persicis conditis, cerasis & eiusmodi fructibus æstiuis, 52 qui saccharo conditi solent, & ita seruari. Alioqui persica coquuntur, si recentia sunt, nec condita. Cerasa duobus vasis conclusa cum modico vino macerantur. Saccharum inspergitur: ita prodesse possunt, nec nocent. 53 Vino quoque contra errorem multorum persica infundi possunt. Nam hoc à vino accipiunt, quod & inde frigiditate temperantur, nec facile corrumpuntur.

52 Alioqui enim si conditi non sint hi fugaces fructus, humores facile generant obstructionis & putredinis authores.

53 Vinum sit album & oligophorum, capillo. ven. aut. vnius decocto aspleni dilutum.

Lactuca & endiuia leniter feruefiant ad acetariam parandam. Saccharum inspergatur. Proban- tur conseruæ violarum, rosarum & borraginis. Sed perpetuè distinctio adhibenda est, vt in vfu horum omnium remediorum rationem ineamus naturæ, materiæ, ægri, cœli, regionis & reliquorum eiusmodi.

De 1 febre ardente.

CAusas habet procatacticas quidem, res non naturales, quæ siccant & calfaciunt immodicè.

1 Quæ hoc nomine donatur καὶ ἑξοχλή, & passim ab Hippocrate ignis, ob insignem, quo ceteras anteit febres, ardorem, appellatur. Quamquam tamen non tantum de vero causo, sed etiam febre qualibet vehementissima, vt

syncho vtrâque, interdum febris ardens dicatur. Fit à bile flaua in latioribus vasis vnà cùm sanguine efferuescente. Gal. comment. in sent. 73. sect. 2. lib. 1. Epid. Quòd si, vt plerùmque fit, pituita falsa bili commisceatur, ardens non exquisita erit. Ex commentar. ad sent. 13. lib. 4. de vict. rat. in morb. acutis.

Qualis est vehemens ardor solis, liberalior potus vini fortis, longa sitis, alimenta quæ calfaciunt & siccant. Plurimus labor, venus, vigilia, cæterâque eiusmodi: ex quo venæ exhauriuntur, exsiccantur, efferuescit sanguis, affectio sequitur, quæ febris ardēs appellatur. Huius indicia ² pathognomonica eadem, quæ in tertiana: sed vehementiùs aucta, nisi quòd neque præcedit rigor particulares accessiones, neque sequitur excretio: nam hæc fieri solent in ardore, cum ³ omninò morbus iudicatur.

² Pathognomonica causi signa duo sunt præcipua, sitis inexpugnabilis, & exurens calor. Gale. comment. in sent. 34. sect. 3. lib. 3. Epid.

³ Tum enim iudicatio fit & morbi solutio, quum febre ardente laboranti superuenit rigor. Ex Hippoc. aph. 58. lib. 4.

Sitis est vehemens, fastidiû, ⁴ iactatio corporis, ⁵ lingua arida, scabra, nigra, deliriû, ⁶ ventris erosio, effusio alui perpallida, ⁷ vigiliæ intèrim perpetuæ,

⁴ A tenuium humorum acrimonia corpus vndique lacescente.

⁵ Ab immodico calore, & tota corporis affectione sicca.

⁶ Si contigerit humores acres hîc confluere.

⁷ Non enim hîc vlla ἀνέγνυμιαις, seu blanda sanguinis euaporatio exurgit, quæ somni conciliandi sit potens: imò continua fit acrium vaporum cerebrum exsiccantium ad caput metastasis.

DE MORB. INTERNIS

interim ⁸ profundi somni, eleuatis vaporib⁹ crassis, qui cerebri meatus obfarciant. Nonnunquam fatigata virtute, vigilandi impotentia, & falsus somnus, interim nimium resiccato guttore, vox clāgo-
fa & propterea mala, part. 13. lib. 1. Porrhetic. ac veluti ⁹ rauca, pessimum signum & lethale. Celerri-
mè interficit hic morbus, ¹⁰ quarto aut sexto fere die, cū à merabile natus est. Nam & ardor est, in quo flauæ bili crudus humor aut pituita salsa com-
miscentur. In hoc genere magna corporis pertur-
batio, capitis grauitas & dolor, conuulsio, à quibus mors. Vrinæ crassæ sunt & turbulentæ.

De ea re historiæ scriptæ sunt ab Hippocr. libris Epidem. de Polyphanto, Philini vxore, & Sileno in Epidemiis. Actuarius cap. decimoquarto libr. I. de vrinis adolescentis meminit: qui post densum & conturbatum lotium conuulsus expirauit.

Causa huius vrinæ crudus humor & crassus, putrefactæ bilis ardore agitatus, multo præditus spiri-
tu: vnde turbatio: à qua in caput sublatus vapor crassus & mordax, qui dolorem, grauitatem, cōuul-
sionem, mortem denique inferre solet. Celerrimus hic morbus, atq; periculosissimus. Initiò ergò præ-
sagium instituendum est, vt calumniam declines.

⁸ Non morbi ratione, sed temporis, vt austrini. Com-
ment. ad sent. 34. sect. 3. lib. 3. Epidem.

⁹ Ab arteriæ inæqualitate ex siccitate contracta.

¹⁰ Quia tantum ardorem perferre natura nequit. Ita-
que vel breui molestam causam excutit, vel ab eadem
euincitur, & triumphata fatiscit.

Si itaque omnia supradicta accidentia statim
initio magna sunt, si anxietas, timor modicus, rigor

subinde motus, sudor lenis in fronte & clauiculis, multa deliria sunt, squalescit cutis, carpuntur flocci, conuelluntur vestes, stragula colliguntur, frequens motus est digitorū, difficilius spiratur, ¹¹ vehemens cordis motus est, extrema non ita calent, aut etiam frigescunt, nec faciliē ad calorem reuocantur, si diebus paribus exacerbatur, si tertius & quartus difficiles sunt, si vrinæ tenues, nigræ, crudæ, paucæ, aluus quoque adstricta est, aut deiicit, quæ colliquationē indicant, vel ea excrementa, quæ ab Hippocrate, lib. 2. Prognost. ¹² lethalia describuntur, si guttæ ¹³ sanguinis naribus extillent, si non sitit pro ratione, curatio tentanda non est, sed prædicenda mors. ¹⁴ Hyeme ferè periculosior ardor est. Eorum verò si nihil est, aut lenia omnia, vel pauca quidem, & ea quidem minùs lethalia, desperandum non est: quæ admodum & spes est salutis, si omninò adfuerint contraria.

¹¹ Propter conceptum incendium. Extremæ verò partes vel frigent, vel minùs calent, à reuocato ē circūferentia corporis in eiusdem centrum & meditullium calore.

¹² Qualia aquosa, candida, crocea, spumantia, pingua, glutinosa, nigra, liuida, æruginosa, fœtida. Ista sanguinis stillicidia Philisci, Epaminonis & Sileni exemplo improbantur Hippocrati constitutione temporis tertia lib. 1. Epidem.

¹³ Indicio enim est vel virtutis extinctionem in propinquo esse, vel resolutam fore facultatē appetitricem, aut mentem labefactatam collabi.

¹⁴ Non enim est tempori congener. Itaque oportuit causam concurrissē maximam, quæ contrarietatem temporis superârit. Ex comm. ad apho. 34. lib. 2.

Differt à Synocho putrida. Synochus enim pu-

DE MORB. INTERNIS

trefacto fit sanguine: ardor à bile. In synocho, ¹⁵ vna est, sibi que similis ab initio ad finem exacerbatio. Ardor alternis diebus exasperatur. Iudicatur ferè hæmorrhagiâ, vomitu, sudore, alui deiectione, vrinis, in summa, excretionem. Genus autem excretionis his signis iudicabis. Sanguinem è naribus ostendunt aures & cernix rubentes, cætera pallida, spontaneæ lachrymæ, caligo oculorû. Interim cum splendore grauitas capitis, colli, frôtis & téporum, pulsatio venarum, quæ illic sunt, pruritus narium, contentio hypochondrij sine dolore, pulsatio spinalis arteriæ, faciei rubor, vrinæ, & alui excrementa sine causa manifesta candicantia, pulsus magnus, manus tremulæ.

Est autem salutaris fluxus sanguinis, si die fiat decretorio, quod & reliquis excretionibus criticis cõmune est. Si è directo fluit, si fluit affatim, non stillat guttatim. Stillare enim pessimum, præsertim quarto, ex sect. 3. lib. 3. Epid. Verna constitutione, aut calida, temperatis corporibus, & biliosis iis, qui nondum triginta annos superant, vel etiam agentibus annum 35 magis accidit. Vomitus autem signa sunt horror inferiorum partium, frigus, pulsus durus & inæqualis, mordax capitis dolor, tenebræ obiectæ oculis, ventriculi dolor, ¹⁶ inconstantia labri inferioris, tenuis sputatio. Fit post annum trigessimum. Pueris etiam & in febribus admodum biliosis. Sudorem prænũtiant ¹⁷ pulsus vndosus & præmollis, rigor proprius ferè ardoribus, cum imminet crisis, supressa alius simul & ¹⁸ vrina, suppressa vrina & modicè mora alius. Deliria incrementi, partes calidiores & rubidiores, vapor calidus, humida

anni constitutione fiunt magis. Sudores calidi esse debent, & toto corpore dispergi. Aliarum excretionum nulla propria signa sunt. Sed cum superiorum signa non apparent, & crisis imminet, inferiorem excretionem prædicimus per aluum, & vrinas. Interim etiam lumbis prægrauatis, tensis & dolentibus in mulierib⁹, menstruorū fit eruptio salutaris.

15 *Increfcens, decrefcens, aut æqualis.* Quo fit vt his in synochis locum non habeat ille Hippocratis aphorismus. Circa finem & initium morborum omnia sunt remiffiora, in ftatu vehementiora.

16 Is labri inferioris tremor fit à bile interiorem ventriculi tunicam, quæ oris partibus communis eft, mordicante.

17 Significat enim multam subefle materiã, quam folui in fudores oporteat.

18 Si quidem transfertur ad cutem materia vrinis cum fudoribus communis.

Curatio.

Bilis repurganda & extinguenda. Primūmq; animaduertendum, vtro remedio potiùs vtendum fit, phlebotomia, an cathartico. In idea & omninò exquisita, 19 phlebotomia omittenda eft. Suspecta quoque in ea, quæ ad ideam proximè accedit. In aliis fi numeri phlebotomiæ consentiunt, etiam ad animi deliquium, 20 authore Galeno, fanguis detrahi poteft. Nunc verò animi deliquium expectandum non eft. Veteres etiam 21 purgationibus vtantur aliis quidē fortioribus, aliis leuioribus: præferendæ 22 leuiorcs. Hippocrates quarto de vict. ratione in morbis acutis 23 afinino lacte cocto, Gal. etiam fero vtebatur. Mollibus clyfterib⁹ ex iis, quæ feruorem febris extinguunt, vti licet: vt paratis è se-

DE MORB. INTERNIS

ro lactis, è decocto violarum, maluæ, rostri porcini, & similium. Saccharum potiùs, quàm mel, in his dissolue, oleum violatum potiùs, quàm commune. Catharticum conueniens ²⁴ cassia est in sero lactis dissoluta, aliquando etiam infusum ²⁵ rhabarbarum, quæque cap. de febre tertiana dicta sunt. Maxima pars curationis in ²⁶ extinguenda bile consistit. Extinguitur commodissimè victus ratione. Decumbat igitur loco suaui auræ exposito. Quod si locus sine ventulo est, flabello vtendum est.

19 Quia in ea sola bilis putret citra sanguinis copiam.

20 Galen. cap. 4. & 5. lib. 9. Method. & commentar. ad aph. 23. lib. 1. Aphorism.

21 Exoletæ sunt fortiores istiusmodi veterum purgationes, vt scammoniata & acriores.

22 Sequax enim humor est bilis, qui cathartici cedit clementioribus. Humores tamen turgere si contigerit, paulò fortioribus præstabit vti.

23 Hoc lac selegit Hippocrates, quod nullius sit acrimoniæ particeps, & coctione longa flatus suos demiserit, quia humidissimum est, & promptius aluum subit.

24 Præstiterit cassiam bolo dare ad 3. i. vel 3. iō. cum rheo puluerato, aut alio cathartico: dissoluta enim implacida est.

25 In decocto scilicet conuenienti, vt pectorali vulgò dicto: vel tamarindor. endiuia, lactue, scariol. & simil. refrigerantium, vitatis tamen adstringentibus.

26 Plus enim qualitate, quàm quantitate, peccat.

Mollis sit culcitra, stragula & linteamina tenuissima, minimè aspera, & fordida. Ideoque contra errorem vulgi ²⁷ subinde commutanda sunt.

27 Nisi tempus institerit crisis, quo nihil mouendum.

Lectus amplior sit, vt subinde locum commutet æger, atque vt aër, qui imbibitur, frigidus sit: corpus reliquum ²⁸ non ita perflatur ac refrigeretur, præfertim accessionis initio, & incremento. Obscurum aërem commendat Hippocrates. Alij ²⁹ neque obscurum, neque lucidum. De ea re iam disceptatum est cap. de phrenitide. Æstate etiam aër cubiculi flabellis excitari ac refrigerari potest: aqua putealis alioqui frigidissima è vase in vas sæpius transfundatur, vt etiam strepitus ad aures ægri perueniat. Solum insternatur rosis, capreolis vitiū, lactucis, nymphaea, portulaca & similibus, aquâ rosarum & aceto, aqua frigida: rami quoque è salicibus toto cubiculo componendi sunt, ac subinde commutandi. Siccati enim iam lædunt. Quòd si aër non admodum calidus est, sed temperatus, eo contentus esse poteris. ³⁰ Victus potus sit magis, quàm cib⁹; ³¹ mulsæ cocta, sed diluta, nostro more, aqua cocta modico saccharo cōdita. Quæ ex hordeo potiones, forbitiones, alimenta comparantur, detractō cortice hordei (ad tollendā siccitatem, cortex enim siccatur) cōparentur: hordeata diluta sint. Aqua frigida ante vigorem vsui esse non potest. Aëtius permittit, si quintam partem aquæ temperatæ ad aquam frigidam adiicias. Verùm potius vtēris aqua, vt prius, cocta, & modico saccharo violato cōdita, vt sit octupla aqua, sub octuplum saccharum.

²⁸ Perflatum nāmque corpus minùs liberè perspirat: vnde augetur putredo & febris.

²⁹ Sæpius aër deligitur ad ægri arbitrium.

³⁰ Vt iusculum pulli gallinacei cum herbis refrigerantibus, oxalide, portul. lact. omphacio & similib. alterati & cocti: gelatina sine cinamomo, expressa, destillata.

DE MORB. INTERNIS

Atque hæc quidem humida instituuntur, quia liquidus victus magis humectat, celerius & facilius coquitur.

31 Mulsæ vsus, quamvis dilutæ, non probatur. Satius erit saccharo edulcatam aquâ coctam (Hippocraticam appellant) vsurare, cui tantillum limonum, aut granatorum succi sit immixtum.

Alioqui pane prius eloto, abiectâq; priore aqua, aquam conficies, quam panatam vocant, eamque frigidissimam propinabis, sed maximè in vigore, & declinatione particularis accessionis, multò liberius.

Iam apparentibus signis cœctionis, pruna multa aqua cocta cibo esse possunt. Præter hæc ceratum album refrigerans Galen. ilinendum est partibus, in quibus maior feruor est, vt hypochondriis & thoraci. Dictum autem prius ex vna parte ceræ, quatuor partibus rosacei simul liquatis, vase duplici comparari. Atque vbi refrikerit, in aquâ frigidissimam demergi debet, subigiq; vel succo lactucæ, vel semperuiui, vel eorum, quæ refrigerât simul & humectant. Si in thorace feruor est, loco rosacei, violaceû eligendum est, meliusque fuerit olea prius elui. Rosaceum ex aqua rosarum, violaceum ex aqua violarum quæ quia statim incalescunt, subinde commutanda sunt. Fiunt & 32 cataplasmata ex farina hordeacea, subacta succo lactucarû, cucurbitæ, cucumeris, nenupharis, polygoni, plantaginis, capreolorum vitis & similium. Folia lactucæ, ramenta cucurbitæ, aut cucumeris, manibus contrectentur, & 33 admoveantur plantis pedum.

32 Talia cataplasmata viscida non sint: alioqui incendium penitus intrudendo suspecta.

33 Columbos alij per medium sectos: alij Tincâ piscem admovent.

Extrema 34 quoque aqua frigidissima immergantur, cui, si vis, tantillum vini commixtum sit ad penetrationem, vel ad refringendam frigidæ vim. Cōtineat in ore & lingua, folia portulacæ, lactucæ, aut acetosæ. 35 Genitalia inuoluantur linteo subinde inculcato in miscella ex aqua rosarum, vino tenui & aceto. Etenim mirabiliter contra æstum facit. Poteris os colluere aqua frigida, vel simplici, vel refracta quinta parte temperatæ. Veteres etiam cochleare succi rosarum, 36 contra æstum stomachi propinabant. Verum in usu horum omnium frigidorum obseruandum tempus est. Nam 37 initio & augmento febris non conueniunt. In 38 vigore & declinatione cum iam in superficie calor diffusus est, æstum extinguit. Alij pulmones recens mactatorum animalium, columbos, pullos, catellos diuisos medios, & vt dicunt, exenteratos, raso capiti, pectori, plâti, hypochondriis admovent, vt tepido calore, calorem igneum foras attrahant, laxatis viis fuliginem ducant, & per accidens refrigerent.

34 Si tamen crisis proximè immineat, id minimè ferendum.

35 Confert ista pudēdorum refrigeratio propter eum, qui sibi partibus cum principibus intercedit, cōsensum.

36 Valent in hunc usum mala agrantia, citria, limones: orbiculatim secantur, & ex aqua rosacea & saccharo sumuntur.

37 Tum enim calor internas partes grauiter exercens frigidorum appulsu fieret intensior.

38 Summa summo in vigore febris vrgente necessitate detonderetur capillitium, & rosaceo oleo caput totum inungitur. Hūc faciunt & irrigationes ex decoctis frigidis instituendæ, & futuræ præsertim coronariæ asfundendæ.

DE MORB. INTERNIS

Veteres thoraci, & pectori linteolum hydrelæo calente madefactum applicabant. Alioqui lanam, quantum manu capitur, in aqua & oleo rosaceo, vel violaceo calefactis madefactam, exprimebant & sublimi in pectus, modicum quoque salis & aceti adiungi potest: sic enim sudorem excitant.

Ad refrigerium quoque lactucarū tenella 39 germina, calente posca immergantur: deinde vel saccharo violato conspergātur, alioqui ex oleo & aceto comedantur. Melius oleum rosaceum, sed prius abluatur. Practici recentiores miscella ex oleo chamæmelino, aceto albo, & aqua rosarum, hypochondria, pectus & latera, qua maximè parte feruent, inungunt, & ita dolores mitigant. Galen. 40 lini semine in hydrelæo cocto, & tepido admoto hypochondriis, æstum dolorémque mitigabat, oxymelite quoque diluto utebatur, multo maximè, ubi obstructionis suspitio. Quietos 41 esse oportet, quantum febris patitur.

De syrupis & eorum usu iam antè dictum est. Familiaris est iulepus rosatus, 42 syrupus de limonibus, violarum, oxysacchara simplex, syrupus acetosus. Verùm syrupos multa aquâ cocta, vel aquâ hordei excorticati, aquis scabiosæ, buglossi & similibus dilui debent.

Aëtius 43 diacodio vitur: nunc syrupo de papa, de nenuph. vti licet. Aquæ conueniunt distillatæ è cucurbita, cucumere, melone, portulaca, rosis, violis, oxalide & similibus. Sed oportet vel quarta vel sexta parte sacchari condiri, vt fiant iulepi. Iusculis quoque è carnibus vitulinis, iuniorū pullorum galinaceorum, alteratis cum herbis refrigerantibus

æstum temperamus. Multa verò incidunt, vt deliria, vigiliæ, sitis, linguæ scabrities, animi deliquia, dolores, singultus, russes, colliquationes, aliæque eiusmodi, contra quæ remedia propriis capitibus dicentur.

39 Hæc conueniunt tantum robusto ventriculo, & iisdem assueto.

40 Ex cap.9. lib.3. Simplic. Eodem lini semine vtitur Hippocr. sent.49. lib.4. de rat.vict. in morb.acutis, quia molliat sine manifesto calore: quod in omni sedanda phlegmone est maximum.

41 Nam quietis commoda sunt multa: morbi coctio, virium custodia. Ex comment. Gal.in aphor.6. lib.6. & ad sent.48.lib.4.de ratione vict.in morb.acutis.

42 Ex his syrupis cum aquis stillatitiis dissolutis, vel decocto herbarum refrigerantium & humectantium, fiunt zulapia, apozemata, liberandis infarctibus, bili extinguendæ, humori ad euacuationem præparando dicata, bis quotidie sumenda, vel etiam quauis sitis hora.

43 Sine speciebus appellato. Exhibetur autem dormituri duorum cochlearium mensura.

De febre & putrida continua.

Bstruuntur pori corporis & constringuntur, quia vel cutis densatur frigore, vel contrahitur immodico calore, vel rerum adstringentium contactu, vel balneorum naturalium, vel duritie obfarciantur, & impinguntur humorum lentore, crassitie, copia. Præclusis itaque spiramētis corporis, fumosi effluxus quotidiani excremēti retinentur: nec iam perflatur calor & spiritus, quos necesse est libera trāspiratione refrigerari, vt & excrementa diffluant, & externus aër excipiat. Cō-

DE MORB. INTERNIS

mutatur ergò natiuus calor à fuligine retēta acrior factus, & alteratur in qualitatem præter naturam. Præterea humores corporis, qui ² motum caloris & spiritus consequi solent, iam non perflantur, neque liberè agitantur. Itaque & peculiarem quandam calorem præter naturam cōtrahunt, & ab alteratis calore & spiritu commutantur. Tria ergò iam concurrunt, quæ putredinem faciunt: impeditur transpiratio, calor natiuus in igneum commutatur, ³ hinc putrescit humor.

1 Quæ fit à concepta in humoribus putredine, quæ continenter & assidue cor contingit, nec prius desinit, quàm exhausta fuerit putredo, & quæ est à putredine vindicata humoris massa, ad pristinam redierit naturæ gratiam. De febris huius causis vide Gal. lib. 9. 10. & 11. Method. medend.

2 Calor enim, spiritus & sanguis vnum sunt subiecto.

3 Iuxta vulgatum illud theorema. Corpora calida humida loco calido conclusa, nisi dissentur, statim putredinem acquirunt. Ex Galeno cap. 7. lib. 8. Meth. cap. 5. lib. 4. de temperam. & lib. 5. de Sanit. tuend.

Quòd si hæc modica sunt, diaria fit, tantùm alteratis calore & spiritu, non etiam putrefacta materiâ. Si verò maiora sunt, putrescit humor. Et si hoc quidem in venis, continua est: si extra vasa, ⁴ intermittens. Nascuntur continuæ ex inflammatione partium: intermittentes non ita. In continuis maligna putredo est & periculosa: in intermittentibus non ita.

4 Citius enim & expeditius tota discutitur materia, quàm cum in vasis est immersa.

Putrefit autem aliquando ⁵ sanguis, nonnunquam pituita, aliàs etiam vel flaua, vel atra bilis. Et continuæ quidem materiâ ferè habent putrefactam ⁶ in venis primis, quæ circa hepar sunt, ⁷ suisq; intermittentibus materia quidem & nonnullis accidentibus, ⁸ non omnibus tamen, respondent. Hinc febris continua pituitosa, biliosa, melancholica: verùm an sanguinea aliqua sit, non sine re dubitatum ab antiquis: de quo certant Arabes cum Græcis. Galenus id pernegat. Idem etiam Alex. Aphrodiseus in Problematis. Quòd si sanguis putriscit, parte quidem ⁹ tenuiore in bilem, crassiore in melancholiam commutatur.

⁵ Et cum maximo humores teneantur commercio, omnes putredinis participes fiunt. At ei potissimum putredo attribuitur, qui copia maiore & cacochymia inuenerit, & promptius computruerit.

⁶ Quæ per se continuæ sunt febres, materiam habet putrefactâ non in venis quidem omnibus, sed præcipuè in maximis, vt iecoris, pulmonis, inter alas & inguina.

⁷ Nominibus secum conuenientibus

⁸ Vt rigore & horrore intermittentes, & continuæ congeneres non sunt.

⁹ Et ista sanguinis tenuioris in bilem commutatio huic controuersie attulit occasionem. Sed vt cõstet Galeni sententia de sanguine in syncho putrente libro septimo Methodi proposita, dicunt candidiores interpretes sanguinem tenuiorem in bilem non demurari, cum putret, sed bilis veluti naturam referre, vt acrimoniam & motum.

Contrà Galenum Auicennas multis disputat. Hippocrates 6. Epid febres quasdam ἐξερύθρους, id est, valde rubentes facit. Galenus in Commentario valde rubentes intelligit à sanguine, materia in

qua calor insensus est, vnde diffunditur & calor & rubor in corpus.

Et quo tempore, ei qui continua febre laborat, pulsus magnus, velox, æqualis, vrinæ sanis proximæ, horror nullus aut rigor, calor mitis ac vaporosus, succulentum corpus est, ætas ad iuventam inclinans, vernum tempus, regio & cætera temperata sunt, verisimile admodum febrem esse sanguineam continuam. Verùm Galenus negat esse putridam: alij contrà Galenum certant his argumentis. Putredo (Galeno definitore) cōmutatio est putrescentis substantiæ: exempli causa, sanguinis ad corruptelam. Commutatio ergò motus est. Huius motus terminus à quo (vt loquuntur) sanguis est incorruptus: terminus ad quem, bilis flaua, aut atra, in quam, igneo calore, sanguis degenerat. In eo igitur motu substantiæ, quæ putrescit, hoc est, sanguinis forma deletur, & 10 noua inducitur, vt iam sanguis non sit, qui sanguis fuit, sed flaua vel atrabilis. Si ergò putredo est motus, suis terminis concluditur. At verò motum esse hæc verba indicant inclusa definitione, putredinis commutatio, & putrescentis iam acquisita noua forma. Cum iam è sanguine bilis est, motus ille desinit, ergò & putredo illa desinit. Iam verò constituamus synochon illam Galeni sine putredine, & ex ea commutationem in febrē biliosam. In eo tempore cōmutationis febris est, & putredo est. Commutatio enim putrescentis, &c. Febris ergò putrida est. Quòd si dicas non consequi, quæritur cū in eo motu febris sit, ea aut putrida, aut non putrida est. Nemo enim dicat non putridam. Neque enim est talis, qualis

fuit quæ sanguinea non putrida dicebatur, & iam putredo cœpta est. Reliquum fit, vt semiputridam appelles mediam inter febrem sanguineam non putridam, & febrem, quæ fit iam mutato sanguine in flauam bilem, vel atram. Quæritur ergò cur non voces putridam, cùm portio humorū iam putruerit. Nec enim necesse est ¹¹ vniuersam materiā putruisse, vt febris putrida sit. Nec in omni febre putredo per vniuersum corpus sparsa est: sed aliquando sola parte aliqua, vel partibus resedit. Et in intermittētibz putridis exiguum est, quod putruit: plurima materia integra est.

¹⁰ Noua enim est generatio, in qua ortus vnius alterius interitus existit.

¹¹ Non enim potis esset vitam consistere, putredine corpus vniuersum obūdente.

Neque satis constitutum est, cur putridam biliosam appelles iam corrupto sanguine in flauam bilem. Nam bilis illa ex ¹² sanguine facta vel putrida est, vel non putrida. Si non putrida, non erit febris biliosa putrida. Alioqui estate, ætatis flore, cùm sanguinis bona pars bilis fit, putredo esset, corruptio videlicet sanguinis à calore præter naturā in flauam bilem. Si putrida bilis illa est, vnde putruit? Nam ea ætate & æstate, cùm sanguis in bilem commutatus est, bilis putrida non est. Rursus si putrida est, quæritur an bilis putrida bilis sit, an nō bilis? Bilem non esse putredinis definitio & natura motus secundum substantiam, quæ ¹³ mutatio appellatur, satis ostendunt. Nam in putredine corruptio est, eius commutationis finis. Si corruptio, ergò ab esse ad non

esse motus. Bilis ergò putrefacta, bilis non est. Iam sic collige.¹⁴ Bilis putrida bilis non est, & tamen biliosam febrem putridam denominat: ergò eodem modo sanguis corruptus in bilem, etiam si sanguis non est, febrem sanguineam putridam denominabit. Quòd si in tēpore motus febris illa putrida est, dicetur putrida sanguinea potius, quàm biliosa. Nā lignum, dum corrumpitur, etiam dum lignum, nec dum cinis est. Eadem ratione in aliis.

12 Bilis per affationem sanguinis facta aliquando impuris est, vt cum per inedias, labores longos, vigilias, ætatem, bilescit sanguis: aliàs putrida, vt in febribus acris calore sanguinis corruptelam inducentibus.

13 Insistit in tempore mutationis, quo nondū bilem generatam ait.

14 Consecutio non est necessaria: quia tres reliqui humores, dum corrumpūtur, speciem non mutāt, quamuis aliqua qualitate à sese differant.

Deinde queritur an¹⁵ necesse sit sanguinem, qui etiam vehementer incaluit, conuerti in bilem? Quòd si necesse dicas, cur igitur in reliquis generibus febrium, quas vel pituita vel bilis commouit, sanguis non corrumpitur? Cur in inflammationibus in bilem non degenerat? At in his etiā, vbi multos dies febris exarsit, sanguis¹⁶ plurimus, isque integer, per nares effluit? Idem è venis integer aliquādo detrahitur, & in phlegmone apostema sanguineum facit, non biliosum? Ergò corruptus in venis febrem sanguineam faciet, non biliosam. Et cum scribit Galenus in febre sanguinea sanguinem putruisse in omnibus venis, vel ergò totus putruit, vel tantum pars. Si¹⁷ totus putruit, non constabit vita, toto scilicet sanguine partim in bilem flauam, par-

tim in atram conuerso. Oportet enim, vt consistat vita, sanguinem reliquos humores superare: qui si nō superat, sed iam nullus est, nulla quoque vita est.

15 Hoc eger distinctione. Nam vel sanguis syncerus intelligitur, vel quatuor humores complexus: ille necessariò per febrem bilesct: hic non necessariò, quòd haud ita sit facilis pituitæ & melancholiæ in bilem commutatio.

16 Sanguis enim vbique vniuersimodi non est: & potest in vna tantum parte corrumpi, & in altera esse integer.

17 Ex cap. 3. lib. 9. Meth. sanguis totus omnibus sui partibus in synocho putret, neque tamen sanguis putridus est totus, quia recipere priuinā naturæ gratiam potest, haud aliter ac vinum, cum accessit.

Si tantum pars putruit, cur¹⁸ nō & totus putruit, cum toti sanguini præsens sit calor, & reliqua, quæ putredinem faciunt? Deinde si pars crassior, vt vult Gal. quæ natura sua & ficior & frigidior est, magis resistere debuit putredini, putrefacta est, & in atram bilem versa, & multò magis reliquæ celerius putruerunt, & in aliam substantiam conuersæ sunt, vt iam nullus sit sanguis. Sunt & alia permulta, quæ Arabum sententiam confirmant. Sed in eo laborandum magis, vt fideliter curemus, quàm vt subtiliter differamus.

18 Non enim, vt dictum est, omnibus sui partibus est ad putrendum æquè aptus.

Curatio.

In febribus putridis & continuis quædam intermittentibus respondent, nisi quòd neque rigor, neque frigus præcedit.

DE MORB. INTERNIS

Non sequitur vomitus, aut sudor, intermissio nulla est, sed tantum remissio, quarum curatio eadem in genere, quæ intermittentium est, ¹⁹ seruata ea ratione, quæ in exquisita tertiana & ardente dicta est. Sunt & ²⁰ synochi peculiariter appellatæ febres. Aliæ quidem homotoni, quia ab initio ad finem vna eademque exacerbatio est, ac veluti tenor vnus accessionis: aliæ ab initio ad finem perpetuò crescunt, & epacmasticos appellat Hippocrates: vt paracmasticos, quæ initio efferantur, paulatim decrescunt, quibus materia est sanguis: qui in maximis venis conclusus, inguinibus & claviculis interceptus efferuescit. Is autem aliquando superat quantitate, aliquando crassior est, nonnunquam etiam putredinem contrahit: ex quorū distinctione consiliū vniuersale curationis transferri debet. Fingamus ergo Dionē iuuenem, aut ea ætate, qua desinit adolescentia, continua febre laborare: pulsus magnus sit, velox & æqualis, vrinæ sanis proximæ: horror nullus aut rigor, calor mitis ac vaporosus, corpore bene carnosum, tumentibus venis, sensu distentionis, rubente facie: adsint quoque cætera, quæ sanguinis generationem ostendant: statim colliges febricitare ex obstructione, quam efficit sanguinis plenitudo. Itaque ²¹ facile consilium est. Detracto enim sanguine tollitur plenitudo, & depleta copiâ sanguinis liberatur obstructio. Nihil verò reliquum est, quàm vt corpus, quod per febrem alteratū est, suæ naturæ restituamus. Quod quia nimium incaluit, refrigerandū est, vt hæc duo remedia sanguinis missio, & ²² tepestius frigide vsus, vel eorū quæ refrigerant & humectant, exactè percurēt synochon.

19 Curatio synochi imputris hîc potius describitur, quàm putris.

20 Hæ synochorum differentiz à Galeno explicantur li.9. Methodi & lib.1. de differ. feb. Ex his illæ *ὀμώτοις* appellantur, in quibus materia ei, quæ transpirat, par relinquitur : *ἐπακμασιν*, in quibus vberior, quàm quæ dissipatur, restitat : vnde & increscentes Latinis dictæ : *ἐπακμασιν* his contrariæ, vbi plus resolvitur, quàm subinde succenditur.

21 Facile est enim indicationem à morbifica causa, veluti plethora, petere, ex aph.22. lib.1. Aph. Debet autē sanguinis quamprimū mitti ex libr.9. Method. metu suffocationis & syncopes, nisi sudor multus hæmorrhagiæve è naribus eius vacuationis vice fungatur.

22 Vt in vigore febris, apparentibus coctionis signis, nulla inflammatione in visceribus existente, nulla in ventriculo imbecillitate, nulla item obstructione. Frigidæ loco syrupos imperamus, acetosum, de limonib. de acetositate citri, qui conuenientibus aquis, vt rosar. acetosæ, cich. end. borrag. bugloss. abundè diluuntur.

Phlebotomia authoribus Græcis Medicis ex interna dextri brachij etiam 23 ad animi deliquium esse debet. Quod si vires, aut 24 alia repugnât, quod minus tantū materiæ semel auferatur, vacuationem partiri oportet. Et in mulieribus 25 propter menstrua, in aliis etiam propter suppressam aliquā vacuationem, ea seruanda ratio, quam sæpe diximus. Repetendum quoque, vt si quid vel cruditatis in vētriculo & primis venis, vel si quid veteris stercoreis in intestinis, hoc quidem clystere molli : cruditas verò molli pharmaco ante phlebotomiā excludatur. Aut si res patitur & tempus, cruditas illa frictionibus, vnctionibus, & aliis remediis concoquatur. Post phlebotomiam duabus aut tribus horis mulsam Græci propinabāt, ex hinc horā ptisanē

DE MORB. INTERNIS

cremorem. Nunc verò mulsæ loco, quæ quidem suspecta est in magno calore, aqua cocta, cui octaua pars sacchari commixta sit, vtendum est: deinde hordeato, loco cremoris ptisanæ.

23 Presertim si plethora, aut visceris inflammatio alicuius subest. Nam per largiorem illam sanguinis missionem statim totius corporis habitus refrigeratur, extinguitur febris, plurimis subducitur aluus, aliis sudores erumpunt, denique sanitas restituitur. Gal. comment. ad aph. 23. lib. 1.

24 Ætas, tempus, stomachi affectus, gestatio vteri, & similia.

25 Quæ si suppressa sint, primùm plenitudo, si adsit, minuitur secta basilica: tum verò saphena pertunditur ad menses prouocandos. Attamen scribit Gal. lib. de curandi ratione per sanguinis missionē sectam basilicam menstruorum fluxum præpedire ac reuocare. Sed hoc fortasse intelligendum de missione sanguinis haud exigua, quæ nihil vacuandum naturæ relinquat.

Victus in reliquum tempus instituendus est, qui refrigeret & humectet. Is autem 26 tenuis sit, & magna ex parte in sorbitionibus. Itaq; nostro more iuscula conueniunt è iunioribus pullis gallinarum, vel vitulina carne molliuscula. Alteranda verò ex acetosa, lactuca, & portulaca. Potus, aqua hordei, syrupus violatus, multa aquâ cocta dilutus, iulepus violatus, oxysacchara simplex, syrupus acetosus, iulepus Alexandrinus, oxymel simplex, dilutum, vel hæc 27 oxysacchara.

26 Nam venæ sectione imminutus calor pleniori cibo conficiendo non est. Itaque Hippoc. 4. de vict. rat. in acutis in diem suadet.

27 Oxysacchar vulgò paratur ex sacchar. lb. 1. succ. granat. acidor. 3. 8. aceti 3. 4. & sufficienti aquæ quâritate.

2. aquæ coctæ. lb. 4. sacchari lb. 2. aceti lb. 8. Fiat potus clarificatus pro pastu, & hora sitis. Verùm in

aceti & sacchari modo id obseruandum est. In mulieribus, in gracilibus corporibus, in iis quibus intestina facile mordentur & raduntur, acetum vsus suspectus est, aut certe minuendus modus. Quantom maior calor est, tantom minor modus debet esse sacchari. Apparentibus signis coctionis, nullus potus melior est aqua frigida. Postea etiam vino albo tenui, aquoso, vti licet, ex quo & sudores & vrinae prouocantur.

In morbo, si resistit aluus, clysteribus mollibus incitanda est. Si vero etiam crassities humoribus accedit, incidenda & attenuanda est, diluto oxymelite & aliis saepe enumeratis. Quod si materia incisa, vrinis aut sudoribus vacuata non est, leui pharmaco vti licet, manna, cassia, rhabarbaro. Praeterea videndum est, ne densata cutis, obstructa vel occlusa obstructionem faciat, a qua & putredo, & febris. Et, si quidem frigore densata est, calidis laxantibus vtendum erit, vt chamamelino. Si densata, adstringentibus: & siccata, ad ea quae humectant, refugendum est, vt hydrelaeum. Et iam apparentibus signis coctionis, ad balneum aquae dulcis. Si vero occluditur cutis humorum copia, vacuatione opus est: si humorum crassitie, attenuantibus vtendum est.

Si lentore, detergendum. Practici maximam partem curationis in refrigerantibus collocant, quae conficiunt ex hordeato mundato, prunis damasce-nis, glycyrrhiza, quatuor seminibus frigidis, endi-nia, scariola, cichorio, lactuca, rostro porcino, acetosa, floribus violarum, nenupharis, buglossi, borraginis, & aliquando aliquid aceti adiciunt. Nonnunquam syrup. capillorum veneris, portulacae,

acetosæ, & aliis supradictis vtuntur: syruposque diluunt aquis vel decoctis endiuïæ, capillorum veneris, portulacæ, acetosæ & similium.

De febribus 1 colliquantibus.

Febres 2 hæ pessimæ, in quibus substantia corporis multis modis diffluit: idque aliquando paulatim, vt in marasmo & febribus hæcticis: nonnunquã verò statim initio morbi substantia corporis dissoluitur, carnosum genus, pingue & solidum. Sed aliquando quidem fit effluxus substantiæ per insensibilem transpirationẽ.

1. Quæ sunt de genere continuarum, quas oleagineas appellauit Galen. comment. in sent. 28. sect. 1. lib. 6. Epid.

2. Talium febrium κακὴν ὄψαν satis indicat colliquatio febris pestilentis symptoma inseparabile, ex comm. in sent. 57. sect. 3. lib. 3. Epid. In his igitur feruentior calor aliàs humores tantum venis contentos liquat, nonnunquam corpus vniuersum: carnes primum, mox solida mēbra: quibus liquatis squamulæ cum vrinīs excernuntur ex lib. 2. Prognosticon.

Atque hoc quidem dupliciter: nam aliquando fit paulatim, vt in febribus, quæ marasmodes & hæcticæ nominantur: aliàs verò breuissimo tempore.

Huius signa sunt, 3 nares acutæ, oculi concaui, collapsa tempora, & cætera in eo prognostico enumerata. Sed longè periculum maius est, si id derepentè fit, ardore febris & igneo calore, qui quidem substantiã corporis resoluunt in fumos, frugi quoque spiritum & naturalem per poros excludunt. Minus periculũ est, quum ex vigilia, insigni purgatione, inedia, rebúsque eiusmodi colliquatio facta est, cãq; breui tempore reparari potest. Ex mœstitiã & grauioribus animi curis idem contingit, sed ea colliquatio non ita celeriter instaurari potest.

3 Hæc facies Hippocratica vulgò dicta, quæ fit ex colliquatione substantiæ in his partibus. Describitur ab Hippocrate sent. 3. lib. I. Prognost.

Propriè tum colliquans febris appellatur, in qua feruidus, malignusque calor est, qui non solum per insensibilem transpirationem, sed per 4 manifestâ excretionē exoluit corpus. In hac deiectiones alui rufæ, 5 crassiusculæ, foetidæ, aliquando pingues & viscosæ, biliosis quoque spuma insidet, quæ feruorem indicat: vrinæ similes. Aliquando etiam appetente morte tenuis sudor, syncope, & mors, à resolutione corporis totius.

4 Id scilicet quod liquatum est non modò per halitum & insensilem transpirationem, sed per deiectiones & vrinas vacuando.

5 In omni colliquante febre deiectiones & vrinas tales simul perpetuò apparere minimè existimadū est. Sufficit enim colliquationē vno excretionis genere manifestari.

Si itaque in febre acutissima statim initio ex facie illa mortifera colliquationem intelligas, maioribus remediis omninò abstinendum est: tantumq; procurandum est, vt effluxum illum prohibeas, & causas syncopes anteuertas. In his febribus virtus ferè languida est, quæ maiora remedia non admittit.

Atque vbi videris alui excrementa rufa, grauiter olentia, spumosa, & vires languidas, non solum maioribus remediis abstinendum, sed etiam syrupis, mellitisq; rebus, nisi eiusmodi syrupi plurimum diluantur. Hippocrates 6 interdicit mulsæ, quæ tantum octauam partem mellis recipit. Duo remedia annotat, ptisanæ cremorem & aquam frigidam. Utendum erit hordeato, lactuca, in summa,

rebus, quæ refrigerant & humectant. Aquæ frigida tempus est, cum res melius habere cœpit, & excrementa magis cocta sunt: quanquam & ante hoc tempus licebit uti frigida, si quidem æger vehementer appetit, vehementer sitit, & assuetus est potui frigida.

6 Itaque dicebat Galenus comm. 3. in lib. de vict. ratione in morbis acut. febribus colliquatibus aduersissimam omnium esse mulsam, ut iuuantissimam potionem aquæ.

Quod si ab ea metus est, refringi potest decima parte vel octaua sacchari communis, vel violati, vel conseruæ rosarum veteris, alioqui eadem mensura syrupi violati, de papaue. de nenuphar. de acetosa, de agresta, de limonibus & aliis eiusmodi. Præterea 7 epithemata, illitiones, & hypochôdriis & thoraci conueniunt, quæ refrigerant, humectant, leuiter adstringunt, ex aqua rosacea, aceti momento, oleo rosaceo, santalis. Constitui debent loco aura frigida perflato. Atque aliquando etiam flabello ventulū facere oportet. Et quia aliquando acrimonia excrementorum intestina exulcerari solent, clysteribus utendum erit, qui refrigerent, humectent, leniant, quorum compositio ex cap. de dysenteria.

7. Cordi, iecori, ventriculo admouenda. Litus autem toti plerumque spinæ instituuntur. Epithema erit eiusmodi. ℞. aquæ rosacæ 3. 6. aceti 3. 1. aut circiter: santalor. pulueratorum 3. 1. f. epith. Linimentum ex oleis refrigerantibus cerato refrigerante Galen. v. ugento Comitissæ parabitur.

Cibus optimus hordeatum est, quod ut magis refrigeret, ex decocto lactucarum, vel seminum frigidorum, confici potest. Accidentia hîc multa sunt, de quibus postea.

De febre 1 affode.

Hanc febrem cognosces ex eo, quòd perpetuò iactantur ægri, 2 nec ullam servant figuram decubitus. Omnia fastidiunt, hypochondria contenduntur, sitiunt, vigilant, aut in leui somno delirant. Materia crassus est humor, alioqui acris & biliosus, tunicis stomachi & vetriculi imbibitus. Quanquã & ex ardore febris aliquando etiam difficili natura ægri, vel dolore interiori, alioqui graniore, quædam accidètia eius febris esse possunt. Hippocrates 3 diluto oxymelite vtitur: nunc & syrupo acetoso, & oxysaccharà vti licet, multò magis cum & biliosus humor est, & calor acrior. Cicerù quoq; decocto, 4 diluto absynthij hordeato facto ex hordeo integro. 5 Purgatio levis esse debet ex rhabarbaro. Victus incídat & refrigeret. Tenuissimè nutriendum esse præcipit Hippocrates, si quidem permittunt vires. Neque 6 enim sorbitiones admittit, antequam urinæ maturentur, & malum remittatur.

1 *Ασθδης*, seu fastidiosa febris, velut superior, & quæ adhuc aliæ sequuntur, ad ardentem febrem veniunt referendæ. Hæc autem eo donata est nomine, quòd irrequieta graviter ægrum exerceat. Vide Galen. comment. ad sent. 47. lib. 4. de victus ratione in acutis. Idem Gale. comment. 2 in Prorrhet. sent. 43. dupliciter fieri monet: vno quidem modo, quum virtus à corpore opprimitur, nullámque figuram facile sustinet: altero quum os vetriculi à Pravis mordetur humoribus.

2 Ob naturæ infirmitatem.

3 Ad crassos humores incidendos & attenuandos, bilémque refrigerandam.

4 Dilutum absynthij saccharo edulcari debet: quia ingratum alioqui futurum.

DE MORB. INTERNIS

5 Vt. ʒ. expressionem ʒ. 2. rhei elect. in decocto tamarind. ping. semina. frigid. & flor. cardiacor. infusi cum ʒ. i. cinam. in colatura dissol. syru. viol. multar. infusionū ʒ. i. f. potio. Vel cathol. & syru. de cichor. compositi cum rh. ana ʒ. i. dissolues in sero lactis ad dosin.

6 Ne auocetur natura per accessionem alimenti à concoctione morbi sicæ causæ. At ex aph. 9. lib. i. Aph. videndum quid æger ferat.

Obscuro 7 loco iaceat æger, & molli lecto. Cōtineat corpus, &, vt minimum fieri possit, disiciat. Hypochondria hydrelæo foueantur, in quo semen lini, althææ, & similia coxerint.

7 Propter ægri impatientiam. Nam splendore spiritus excitati maiorem trahunt anxietatem.

Farina hordeacea ex eodem hydrelæo subigatur, & cataplasma fiat, quod hypochondriis applicetur. Pessimum hoc genus febris est, in quo celeriter 8 pulsus concidunt, & occasio præcipitur maiorum remediorum.

8 Delato humore, aut vapore tetro ad ipsum cor.

De Cardiaca.

Non minùs grauis est & periculosa 1 febris cardiaca. In hac vehemens æstus est, facies rubet, magnus est cordis saltus, exigua, frequēsq; spiratio. Residere volunt similiter pulmonariis. Dolitant in regione cordis. Inclinate morbo, 2 sudor tenuis fit, frigidus aliquando, instantis mortis nuntius, ab extincta facultate vitali, ex quo syncope, & mors. Alioqui vapor calidus per cutem exit, quod Medicum fallit, nisi & manum adhibeat ori & naso. Hinc enim spiritus frigidus, ex his mors. 1 Quæ fit æstuante vetriculi ore cor in sympathiam trahente. Funesta est, & breui interimit. Vnde Hippocr.

aph. 65. lib. 4. In febribus circa ventriculum fortis æstus, & cordis morsus, malum.

2 A copia humorum, quos sudor attenuarit.

Initiò detrahendus sanguis est inflammationis subtrahendæ ergò, aër frigidus imbibendus, flabello quoque æger ventilandus. Victus refrigeras & humectans. Epithemata ex aqua 3 violarum, nenupharis, buglossi & borraginis, additis santalis & momento croci, syrupo de limonibus, de acetosa, de nenuphare, acetosus, violatus, de papauere, ex quibus syrupis & aquis cordialibus iulepi confici debent. Loco lucido stare debent, suauis aura perflato. Altior sit decubitus.

3 Ut si sumantur earum aquarum 3.6. santalorum pulueratorum 3.1. croci 3. s. acetum modico addito. Pânus his intingitur, & thoracis regione cordis applicatur. Aut paratur vnguentum ex santali citrini 3.2. flor. violar. & nymphaeana 3.1. ceræ albæ & olei rosacei q. s. vngatur anterior thorax.

De febre lipyria.

Quæ sit hæc, non satis conuenit. Galenus libel. de inæquali intemperie cap. II. in eo genere reponit, in quo propter magnitudinē internæ inflammationis & malignum humorem interna ardent, externa refrigerantur. Id quod in medijs corporis inflammationibus contingit. Nam internus calor instar cucurbitulæ calorem externarum partium intrò attrahit. Aëtius lipyriam putat, quæ sequitur erisypelas ventriculi.

1. Lipyria febris epialæ ab similibus non est. In ea enim perfrigerantur extrema, calescentibus internis. Comm. in sent. 4. lib. 2. Prognost. Ac quidem tanto feruore exacerbat, ut calor ad interitum perducere videatur. Vnde ex Actuário lib. 2. suæ methodi λεπτύγία appellatur, quia in ea πῦρ λεπύται, calor deficit.

DE MORB. INTERNIS

Arabes pituitam crassam & viscidam, aut eiusmodi bilem collectam in primis venis, & calorem vnà cum vaporibus suffocantem, ne videlicet, calor dispergatur in corpus, causam faciunt huius febris. Alia quoque parum verisimilia de hac febre prodiderunt. Lipyria Græcorum primum quidē 2 phlebotomia, deinde refrigerantium vsu, vt lactucæ ex aceto diluto, ac iam vrgente morbo largo haustu frigida aquæ curari debet.

2 Ad reuellendam fluxionem à parte affecta, à maiore sanguinis copia imminentem. Conueniunt & cætera, quæ reuellendi vim habent, frictiones extremarum partium, ligaturæ, cucurbitulæ. Interea abstinendum omni medicamento purgante, præcipue si ventriculus infestetur, ne à cathartico in affectam partem attractio fiat. Gal. lib. 13. Method.

Cataplasmata ex hordeacea farina subacta cum succo semperuiui & similium hypochondriis applicentur: subinde commutentur.

Arabes syrupo acetoso, oxymelite materiam crassam incidunt, postea etiam oxymelite diuretico, sed perpetuò incidentibus aliquid admiscunt, quod stomachum roboret, vt syrupum rosatum, de agresta. Quod perpetuum est in febribus phlegmaticis, vt cum incidimus, stomacho etiam consulamus. Deinde purgant.

Purgatio 3 ex aloë, hiera, rhabarbaro. Interim incidunt, vomitum cient, clysteres acres imperant, vtuntur attenuante victu, eo modo stuphis & sudoribus vtuntur, deinde etiam antidotis, quomodo in epiala dictum est.

3 Nusquam catapotia præscripseris, si lipyria comitem solam habeat inflammationem.

De Hectica febre.

Hectica febris ex eo appellata, quia sic ¹ radices egit calor febrilis, ut iam aut nullo modo, aut ægerrimè extingui possit. Difficultas sæpe nascitur, quod vel nimis confirmata est, vel coniuncta est hecticæ febris putrida, tumor aliquis præter naturam, ut ² inflammatio, erysipelas, vlcus etiam pulmonum.

Tenuia corpora & pauci sanguinis ferè corripit, & celeriter consumit. Febres diarias, ardentes, & biliosas sequitur, rarò per se incipit, huiusque origo aliquando primùm ³ nascitur à thoracis partibus: sed ferè priùsquàm vigeat inde nata hectica, mors est.

Vita longior, & curatio facilior, si à ⁴ ventriculo, hepate, renibus, vtero, ieiuno & colo intestinis. Consumit calor hic hecticus humores corporis, deinde rorem illum, qui veluti còmeatus quidam, & futurum alimentum, spatiis inanibus corporis concipitur, postea etiam substantiæ pinguis carniū, fibrarū & solidatū partium humiditatē depascitur.

Hic tabes, marasmus, & summa ariditas corporis, vbi consummata hectica est & incurabilis.

¹ Solidum enim occupat corporis habitum, & solutu perdifficilis existit. Gal. lib. i. de different. febr.

² Ut quotidiana, vel quartana: sed tamen ita, ut hectica & putrida diuersis sint locis.

³ Interdum etiam sequitur diarrhæam, leienteriam & dysenteriam, ex lib. i. de diff. febr.

⁴ Siquidem ab earum partium affectibus cor minùs afficitur, quàm à partium thoracicarum morbis.

⁵ Haud aliter ac lucernæ flamma, quæ absumit primùm oleum: dein humidum proprium, ellichnij: postremo ellichnium ipsum. Hinc tres nascuntur hecticæ differentiæ.

Pulsus habet durum à siccitate arteriæ, debilem ab infirmitate facultatis vitalis, paruum & frequentem ab intemperie cordis, nisi aliquando urgente necessitate ad frequentiam & velocitatem commutetur. Quod idem contingit à cibo, quo tempore calor hecticus nō aliter efferuescit, quā calx viva, si aquam aut aliquid tale superinfundas. Calor toto corpore æqualis est, ex quo 6 non dolent, nec se febricitare intelligunt. Quāquam si manum admoueas, senties paulò post acerrimū, mordacēque calorem. Quod si in hectica febre calor inæqualis est, sentitur dolor, febrisque ab ægro intelligitur, iudicabis aut erysipelas, aut phlegmonem, aut febrem denique putridam complicari. Desperatio est, cum hæc hecticæ coniuncta sunt, præsertim si phlegmone, aut aliquid tale in parte principe incenditur, tūmq̃ue difficilima curatio est, 7 indicationibus inter se pugnantibus. Hecticis aliquando oculi cauantur, nasus acuitur, collabuntur tempora, nudātur ungues, & acuti fiunt, pedes etiam aliquando intumescunt, squalescit cutis, à cibo augeatur calor. 8 Calor maior in volis & plātis pedum, non reuera quidem, sed quia 9 manifestior illū est, aut fortasse, quia illū extremæ venæ sunt, & magis nudæ, eò procliuior motus caloris illū est.

6 Hæc duo sunt signa febris huius propria. Cæterum non dolent, quia iam facta est alteratio.

7 Quādo nimirum consummata est hectica. Aliæ enim hecticæ, alia complicatorū cū ea affectuū remedia.

8 Quāquā tamen calor per totū corpus sit æqualis, seruata interim partium analogia. Nam ex Gal. lib. de inæq. in temp. tota febris hecticæ essentia ad intemperie æqualitatem est referenda.

9 Vel quia téperationes sunt manuū volæ, & propterea ad omne mutationis sensum percipiendū propensiores.

Incipientem hecticam non facile cognoscimus: cognitam 10 facilius curamus. Reliqua genera non facile curantur, facile cognoscuntur.

In curatione hæc maximè obseruanda sunt, an simplex sit febris hectica, an coniuncta sit febris putrida, erysipelas, inflāmatio, an syncope frequens incidat. Hæc enim remedia hecticæ interpellant. Simplex nullo 11 maiori remedio irritari debet. Maiora remedia sunt, 12 phlebotomia & purgatio.

Deinde vehemens tum animi, tum corporis motus ex cap. 7. & sequentib. lib. 9. Method. vitandus est. Vnicus scopus est, vt refrigeres & humectes: idque partim balneis, partim alimentis, tum etiam epithematibus, rebúsque non naturalibus. Quod ad balnea attinet, exoleuit iam 13 curiosus ille apparatus veterum balneorum, nec nisi cum periculo tentari potest. Exoleuit etiam cōsuetudo: & si quid in apparatu peccatum est, grauius esse solet: itaque hoc tempore proximè lectum ægri labrum aqua plenum disponi potest.

10 Nihil enim adhuc, aut parum ipsius humidi primigenij exhaustum est.

11 Partes exsiccatae cum sint, exsiccari amplius per venæ sectionē & purgationē minimè desiderāt: imò quod absumptū est, id resarciri volunt. Itaq; satis fuerit simplici in hectica febris qualitatē alterare, & corp⁹ reficere.

12 Quando vsurpanda sit phlebotome, docet Hippo. sent. 29. sect. 3. lib. 6. Epidem. & Gal. in commentario.

13 Tria etenim parabātur balnea: primo ex aqua moderatè calida corporis meatus & spiracula aperiebantur & laxabantur: altero è tepida humectabatur corpus: tertio ex frigida constringebantur pori. Ad hæc tria cōparabant labra: nos vno contenti sumus.

Quod si ¹⁴ vapor balnei ægri corpore excipitur, priusquam immergatur, salubre est. Itaque linteo conuolui potest, vt duobus pluribûsue hominibus teneatur, ita vt frigidum aërem inspiret, reliquo corpore per raritatem lintei vaporem balnei excipiat. Iam rarefactis poris corporis, ac posteaquam æger vires receperit, satisque quieuerit, aliquoties aqua tepida & temperata immergi potest. Mora sit pro ratione virium. A balneo quoque corpus oleo ungi potest, vel cõmuni, vel nenupharino, vel violato, de cucurbita. Cæterum quod aliquando monuimus, & hîc quoque summopere obseruandum est, nec oleum, vel rancidum sit, vel falsum, quod vix reperiatis multis in locis. Vbi itaq; commodum oleum defuerit, butyrum recens vel per se, ¹⁵ vel prius ex aqua violarum lotum vsui esse potest. Subiiciebant veteres balneum è frigida: quod suspectum esse potest, nisi & vires consent, æstas sit, consuetudo frigidi balnei, temperamentum calidum & siccum, nulla cruditas, nullus tumor, nulla plenitudo. Alimenta imperari debent, lac asinæ, ¹⁶ vel mulieris, bubulum etiam vsui esse potest. Sed eligendum lac est, probandumque ¹⁷ notis suis. Sugatur è māmā, vel recens mulctum bibatur. Periculum fit mensuræ lactis datis primum 3.2. deinde 3. vel etiam 4. Quod si in ventriculo non corrumpitur, paulatim augeatur modus ad lb.ß. Corrumpi intelliges partim è ructu, maximè nidoroso, partim ex pulsu, qui debilior, tardior, rarior, lâguidior factus est. Quod si ructus nidorosus est, poterit aliquid aquæ incoqui cū lacte. Si acidus, momentum mellis aut sacchari misceatur. Hordeatum quoque maximè con-

uenit, vel ptisana ex tritico cōparata & colata, iusculum itē pulli gallinacci, in quo hordeū mundatū & excorticatū coxerit, alteratū cū lactuca & portulaca.

14 Sic cutis aperitur, vt vis aquæ penitiùs subeat. Cæterum pridie lotionis optimum erit clysterem blandum iniicere, nullo cāthartico, præter cassiā adhibito. Et quia sæpe fit, vt ob coctricis imbecillitatem cruda multa excrementa congerātur, licebit toto morbi cursu clysteres iterare. Parabuntur ex refrigerantib. humectatib. herbis, seminibus, florib⁹, dissolutis cassia, sacchar. ol. viola-cco, nenuph. & simil. Si nutriētes prætereā esse oportuerit, ex decocto capitis arietini, vel aliarum carniū iusculo, instituentur.

15 Huius loco valebit vnguentum resumptiuum.

16 Lac muliebre præstantissimū est propter naturæ familiaritatem, quā magis nutrit: quāuis Auicennæ magis refrigeret & humectet. Caprillum autē medium est. Sed de his vide cap. 6. lib. 7. Meth.

17 Lactis laudabilis hæ sunt notæ: spissitudo moderata, color albus, odor gratus, sapor dulcis, & cū instillatū in vnguem neque tardiùs, neque citiùs diffluit.

Et quia in hecticis vis attractrix infirmior est, 18 liquidiora sunt alimenta: alioqui aceti modicum, etiam si videri possit nocere, quia desiccat, misceatur. Lactuca, portulaca ex aceto diluto, aqua etiam aliquando frigida: quanquam modus esse debet, nec adeo gelida, nec multa exhiberi debet, 19 vbi nimis extenuatum corpus est.

18 Ad facilitiorē distributionē. Partes enim ob siccitatē attrahendi facultate minùs valent: vnde atrophia. Probantur aliis alimenta solidiora, quòd diutiùs nutriāt, & liquidiora celeriùs expirent. Sed vt illa concedantur, vires sapiùs effectæ his concoquendis non sunt.

19 Nam ex lib. 10. Meth. in iis qui parum sanguinis & carnis habent, ad partes solidas aqua celeriter peruadit, nulli, quod eius vim frangat, occurrens.

Potiones frigidiusculæ, solidiora alimenta non ita frigida, sed subtepida imperētur. Epithemata ex farina hordeacea, quam subiges è succo lactuæ, oxalidis, semperuiui & similium.

Portulaca per se contusa stomacho, & hypochondriis vtiliter apponitur. Alioqui.

℥. ceræ elotæ ʒ. ʒ. olei rosati similiter loti ℔. i. Liquefiant in vase duplici. Liquefacta refrigescant. Vbi refrixerint, ex aqua frigidissima, lactuæ succo, vel portulacæ subigantur. Fiat cerotum. Inungatur venter, hypochondria & partes, vnde primū hectica nata est.

Alioqui linteolum subinde inculcatum, omphacio, lactuæ, intybi, semperuiui, atque eiusmodi refrigerantium succo, hypochondriis & thoraci apponemus.

Verū in horum omnium vsu animaduertendū est, alia quidē refrigerare & humectare, alia siccare.

Humectantibus vtemur, si alui profluuium non est: tum enim siccantibus vtendum est simul, ²⁰ & refrigerantibus.

²⁰ Ea præcipuè, quæ adstringunt, declinanda sunt, quia respirationi obsunt. Et vt tutior sit refrigerantium vsus, oleū amygdal. dulc. vel etiam liliacē cōmiscetur.

Denique quia breui tempore admota remedia incalescunt, subinde commutare oportet. Præterea partes spirales non sine noxa diutius perferunt refrigerantia, sed inde dyspnœa nascitur: omnia itaque temperare oportet. Olea conueniunt ²¹ de nenuphare, de salicibus, cucurbita, papauere, violis, rosis, cydoniis, eadem seruata distinctione in vsu siccantium & humectantium. Supra omnia aër com-

ponendus est: qui si tēperatus, alterari non debet: si calidior, vt æstate, refrigerandus eo modo, quo capite de æstu dicemus. Hyeme iam frigidior, quo tempore leuiter alterari debet, non tam igne, maxime è prunis, quàm leui flamma, aut vapore aquæ calidæ.

21 His oleis thorax antrorsum & retrorsum illinendus. Spina quoque cerato antè præscripto inungenda.

In ratione alimentorum consideranda est virtus. Nutriemus enim pro ratione virium, lacte vacchino, à quo recens butyrum extractum sit, 22 lacte asinæ: aut si nutriendum, quàm alterandum magis, lacte muliebri. Bubulum plurimùm nutrit, sed ratione butyri nocere potest.

22 Asininum lac omni lacte humidius, & nulla acrimonia infectum. Hipp. 4. acutor.

Caprillum quoque vsui esse potest. Sugi debet, vt antè diximus, vel recētissimè mulctum bibi. Plurimùm nutrit panis sæpius lotus in aqua, deinde ex lacte recens mulcto comeditur. Plurimùm laudatur aqua hordei, in qua cancrorum caro detractis testaceis coxerit.

℥. hordei mundati ʒ. i. cancrorum excorticatorum ʒ. 2. bulliant in lb. 2. aquæ, dum dissiliat hordeū. Oportet antè excorticatos cancos prius diligenter ablui, vt omnem fœditatem odoris deponant, deinde coqui. Potionum eiusmodi cancrorum mundatorum singulæ vnciæ singulis lib. aquæ hordei incoqui debent. 23 Similia ex cap. de phthisi repeti possunt. In instaurando hordeata, in quibus etiam

vitellus oui dissoluatur. Aliquando quoque, vt refrigeres, semen portulacæ, lactucæ & similia concoquantur.

23 Vel hoc paretur destillatum. ℞. decoct. caponis iuuenis, armi vitul. alterator. cum lact. oxalid. bugloss. borrag. portul. scariol. seminib. frigid. maiorib. florib. violar. bugloss. nymph. lb. 6. micam panis vnus albiss. in lacte infus. limac. præparat. & in lacte infus. lb. 8. coxarum ranar. 3. 3. Ponantur omnia in alembico: destillentur in diplomate, seu balneo Mariæ. Hoc destillato vtatur sæpe cum saccharo pauco. Nutriet plenius, si testudo adiciatur.

Si à syncope metus est, aliquid etiam vini granatorum, margaritarū. semē acetosæ, & alia, ⁴² quæ cordialia appellantur. Iuscula carniū permittuntur, sed alterari oportet hordeo mundato, concocto oleribus, quæ refrigerant & humectant, lactuca, portulaca, scariola, &c. Permittitur in potu aqua, in qua aliquid sacchari dissolutum sit. 25 Vinum granatorum similiter dulcoratum. In viribus infirmis, expressionibus, colatitiis, distillatis, instaurantibus vtendum erit. Si à profluio alui metus est, aqua hordei paretur ex hordeo torrefacto, similiter & hordeatum. Quibus addi possunt gummi arabicū, milium torrefactum, & alia eiusmodi, quæ sine calore aluum supprimunt. Auenatum loco hordeati ad tempus comodum est. Etenim fluxiones alui supprimit. Sed dum symptomatibus consulimus, febris habenda ratio, & ad huius remedia tempestiuè redeundum est. Caseus recens sine sale paulò firmioribus conuenit, vt vocata gelatina minus firmis. Vinum dilutum bene contrā syncopem facit & lapsum virium. 26 Cibus duabus horis ante balneum

imperari debet, aut paulo post balneum. In balneo non est exprimendus sudor. Madidus enim vapor fatis. Summatim in usu balnei, ad vires diligenter animaduertere oportet. Multa, quæ ad hanc febrem pertinent, ex commentariis de sanitate tuenda, Methodo medendi, Libello de marcore colliges.

24 Ut rosæ, nymphaea, aurum (quod quam vim cordi conferat, peritiores viderint) vnicornis cornu, sapphyr. hyacynth. smaragd. vniones, santala, terra sigillata: quæ vel in zulapiis, vel conditis, vel opiatis exhibentur.

25 Vinum item album, tenue, oligophorum, optimè dilutum: quo tamen, nisi vires reclamationt, abstinendum.

26 Salubre est statim ante cibum aquam hordei sumere ad partium humectationem, ut ipsum alimentum facilius agglutinetur. Exemplo id sit cemenariorum, qui parietes prius aqua aspergunt, quam aut calce, aut cemento, aut gypso incrustent.

De febre ex cruditate.

Ebris hæc fere debilis, sed periculò non caret. Desperatio est, cum vel ventriculi, vel hepatis inflammatio accesserit, in qua quantus, qualis, quo loco intus crudus humor est, considerandum. Aliquando enim, cum sanguis utilis plurimus sit, cruditas exigua est. Contrà rursus, nonnunquam plurima cruditas est, exiguus vero sanguis reliquus. Humor crudus aliquando frigidior est, aliquando ad coctum succum accedit propius. Cruditas aliquando in primis venis, nonnunquam toto corpore aceruata est. Cruditatis in ventre & primis venis signa sunt, nausea, ructus, velliatio, ac tormenta ventris, frequens borborismus, hypochondrij tumor atque inflatio.

DE MORB. INTERNIS

1 De hac Gal.lib.4.Sanitatis tuendæ,& comment.in sent.31.sect.5.lib.6.Epid.

2 Cruditas enim plurima & flatulentus spiritus in venis mesaraicis continentur.

Alimenta ferè in flatus commutantur, ob caloris ventriculi imbecillitatem. Cruditatis totius corporis signa sunt vrinæ tenues, aquosæ, leuiter tinctæ, diuulsæ, conturbatæ, nonnunquam cum, sedimenti asperitate, calor faciei pallidus, aut alius quàm rubens, vt liuidus & plumbeus, totius corporis moles subtumida, pulsus inæqualis, obscurus, paruus. Adducienda sunt, quæ ad coniecturam adhibentur ex antea acta vita, otium, crapula, intempestiua exercitia, immoderata venus, & alia eiusmodi, quæ cruditatis coniecturam augent. Vocatus itaque ad eum, qui cum cruditate febricitat, ad hæc omnia animaduerte: & si quidè ad hæc omnia, vt malum faciei colorem, vrinarum cruditatem, pulsuum inæqualitatem & paruitatē, accesserit etiam totius corporis grauitas, tarditas, motus mentis & sensuum hebetudo, de remediis cogitandum non est, & de morte prænunciandum: multò magis, si qua subsit inflammatio ventriculi, vel hepatis. Illic enim & crudorum succorum plenitudo est, & vires admodum infirmæ, à quibus & syncope, & mors expectanda est. Si verò omnia leuia sunt, de remediis ita statuendum.

3 Debilis enim calor & materiæ contumacia læuem esse vetant, æqualémque hypostasim.

4 A flatu, & imperfecta assimilatione.

5 Ex cap.5. libr. de curand. ratione per sanguinis missionem.

Phlebotomia in hac febre 6 nunquam imperanda, nisi color faciei leuiter rubeat, pulsus sit mediocriter magnus & vehemens, nec ita inæqualis, vrine quoque melius colorentur. Hic enim coniicimus frugi sanguinem superiorem esse cruditate. Itaque aperiatur basilica angusto foramine, ac 7 modica quantitate sanguis detrahatur. Exibit primum sanguis tenuis, subalbidus: at simulatq; cœperit fluere magis rubens, vena claudatur. Neque 8 tamen perpetuò expectanda est sanguinis mutatio. Sed interim dum exit sanguis, vires è pulsu & aliis recognoscendæ sunt. A phlebotomia imperanda mulla, in qua aliquid origani, hyssopi & similium coxerit: & si quidè humor crassior est, oxymelite vti oportebit. Decumbant molli lecto, aëre temperato, dormiant & vigilent vtrūque mediocriter, victus incidat & attenuet. Sed aduertendum in vsu mullæ & mellitorum. Aliquando enim acrimonia 9 mollis aluus irritatur: diarrhæa sequitur: quæ si perseuerat, hominem præcipitat. Itaque si inde metus est, vel bene cocta mulla, ptisanæ tremore vtendum est. In vsu attenuantium & incidentiū tum alimenterum, tum medicamentorum, denique omnium, quæ vel intrò sumuntur, vel foris admoventur, vitanda sunt omnia, quæ nimis calfaciunt. Etenim febrem augment, humores crudos cōmouent, deiciunt vires, syncopen accelerāt & mortem. Hæc igitur omnia non longè à medio recedant. Frictionibus & inunctionibus opus est. Atq; hæc quidem omnia, 10 vt cruditas concoquatur. Aspero itaq; linteo crura, brachia, spina deinceps ordine perfricetur deorsum versus, 11 dum incalescant. Postea verò oleo

DE MORB. INTERNIS

dulci, non falso, non rancido, alioqui butyro recēti
 eadem partes inungantur. Hyeme etiā chamæme-
 lino, anethino & similibus, quæ leniter quidem cal-
 faciunt & digerunt. Sed perpetuò ad pulsum ani-
 maduertendū est: qui si minor, obscurior, magis in-
 æqualis fieri videatur, omninò viribus consulendū.
 Vinum dilutum propinādum, mica panis ex vino,
 hordeatum, lac amygdalarū, omnia quidem exigua
 quantitate, sed non ita magnis interuallis repetita.
 Alioqui si constant vires, tenuis victus conuenit, &
 per interualla. Leue catharticū phlegmagogum, vbi
 iam apparet aliquod signum coctionis. Maioribus
 pharmacis abstinēdum. Intempestiuus enim maio-
 ribus remediis vel necantur ægri, vel in periculum
 coniiciūtur, vnde vix possint reuocari. Animaduer-
 te ergò ad vires ¹² ex pulsu, ad coctionem ex vrinis.
 Vrinarū hic ferè ordo est. Vbi expectatur salus, ex-
 eunt initio crudæ & aquosæ, postea sedimentum
 ponunt crassum, diuulsum & asperū. Conturbātur,
 sed cōturbatæ sedimentū ponunt, celerius quidem,
 si quidē melius habet coctio: tardiùs, si non ita be-
 ne sedimentum. Deinde melius fit, propiùs acce-
 dens ad album, læue & æquale. ¹³ Melius procedē-
 te morbo, iam non sedimentum, sed sublimamen-
 tum, vel nebula in media vrina ostēditur. Cum iam
 appetit perfecta coctio, neque sedimentū, neq; su-
 blimamētum, sed tantū nebula in summo vrinæ
 attollitur: atq; ita vrinæ ad naturā redeunt, simul-
 que æger ad pristinā valetudinem. Videndū quo-
 que, ne te fallat vrinæ conturbatio. Perturbatur v-
 rina, vel quia calor natiuus iam cruda concoquit:
 vel quia extinguitur. Vtrūmq; distingues ex pulsu,

Etenim si pulsus, quàm ante, melior, coctio cœpta est. Si verò minor, obscurior, magisque inæqualis, mors in propinquo est. Suffocatur calor multitudi-
ne materiæ: deinde quia humor crassus vias inter-
cipit, multæq; obstructions fiunt. Clysteres, vbi re-
sistit aluus, acriusculi infundantur. Alioqui, si à viri-
bus metus est, remittenda sunt cætera remedia ad
tempus, & tantùm viribus consulendum est. Vbi o-
mnia mediocria sunt, mediocriter temperanda om-
nia, ac toto decursu morbi faciei color, urinæ com-
mutatio, & pulsus diligentissimè consideranda sunt.
Ex his omnis remediorum ratio colligitur. Et in hac
febre, quæ sæpe incidit, nullum leue peccatum est.
In summa clementer cum hac febre agere oportet.

6 Galen. ibidem, & lib. 4. Sapientis tuendæ. Attamen
si subflorida & subrubea facies eluceat, quæ indicio sit
sanguinem laudabilem cruditatē adhuc sua copia exu-
perare, inconcinnum non erit venam secare.

7 Pro periti medici arbitrio, ut ad 3. 4. scilicet vasculum
vnum & dimidium.

8 Sanguinis mutatio expectatur, cum vitiatu sanguis
paucus, & frugi multus: at si ille superet, minimè.
Item mutatio eadem ex lib. 2. de vict. rat. in acutis ex-
pectanda in inflammationibus à secta vena non longè
diffitis.

9 Ut si maior eius copia adiciatur, aut si æger diutius
vtratur.

10 Materiæ parte in halitus digesta.

11 Sedenim cum artus abundè calidi videbuntur, mo-
tusque erit, ne ex ampla frictione lassitudines sequatur,
tum desistendum.

12 Virtutis vitalis præcipua in morbis ratio habenda.
Arteriæ pulsu se prodit. Itaq; salutis & mortis indicium
securius ex pulsu, concoctionis ex urina, petitur.

13 Tunc enim fiunt urinæ similes sanorum, quæ se-
dimento carent.

DE SYMPTOMATIS

FEBRIVM.



Væ cadunt in febres, vt & alios in morbos, symptomata, triū sunt generum: aut enim actiones læsæ, aut excremētōrū & euacuatorū excessus, aut affectus corporū, seu mutaræ existūt qualitates. Primi generis sunt, somnus, vigilia, deliriū, capitis dolor, syncope, sitis, deiecta appetentia, rigor: secundi, fluor, obstipatio, sudor, vomitus, hæmorrhagia: tertij, linguæ scabrities, nigredo, icterus, & cætera id genus. Leuiora sunt interdū, & quæ medicū minus debeant exercere: aliās grauiora, & quibus maiore cum diligentia & sollicitudine, quàm febribus ipsis, sit cōsulendum. Dictum quidem est antea de iis febrium accidentibus, quæ ipsarum generationem necessario sequuntur, nec tamen curationem immutant: nunc ea traduntur, quæ præter cōmunem aliorum sortem curationē ad sese trahunt, quòd causarū vicem obtineant. De his fusiùs. Gal. lib. 12. Methodi.

De somno & vigilia.

S Omnis in febribus alius naturalis, alius præter naturam. Maxime 1 naturalis est in declinationibus, tum totius morbi, tū particularis accessionis. Præter 2 naturam verò initiis accessionum, atq; vbi multus humor vitiosus accuatus in capite. Sic enim vitium rapitur in medium

corpus, laborem facit, conuulsiones, timores, & alia eiusmodi. Ideo scriptum ab Hippocrate. In quo morbo somnus laborem facit, mortale: si verò iuuat, non mortale. Laborem facit qui præter naturam est: iuuat, qui est naturalis.

1 Somnus & vigilia, vt animalis facultatis sunt symptomata, explicatur. Naturalis somnus in febribus causas arguit moderatas & viles: at qui præter naturam est, contrarias, vt in lethargicis: medius est interdum, vt in temulentis, qui à naturali recedens, nondum tamen est præter naturam, qualis in pueris etiam cernitur.

2 Tunc enim somnus calorem alienum refrigerat & restinguit, & natium adauget.

3 Qui symptomatis ægrum auget, materiâ in intimû corpus confluentem, ex commentario in aphor. 1. lib. 2.

4 Quod funestum est ex Hippocrate aphor. 67. lib. 4. In febribus ex somnis timores, conuulsiones, malum.

Bonus est (inquit Hippocrates aphor. 2. lib. 2.) qui delirium sedat, intelligens malum, qui delirium facit. Ac rursus. Somnus atque vigilia, verâque si modum exceßerint, malum. Neq; enim omninò dormire bonum, aut vigilare. Sed hæc duo temperari debent, & maximè, vbi cruditas est. Somnus enim cōcoquit: vigiliæ verò digerunt, fuso calore in habitum corporis, atque ita repurgatis fumosis excrementis.

Habenda quoque morborum ratio. Est enim, cum non ita dormiendum est, sed quantum vires requirunt: quod in peste dicitur. Ac febres omnes somniculosas plenas esse periculo certum est: item quæ peruigiles sunt. Vtriusque ergò accidentis causa inuestiganda est. In febribus calor, siccitas, dolor, ferè vigiliâs inferunt: hinc celeriter vires conci-

DE MORB. INTERNIS

dunt, & facies illa Hippocratica inducitur. Nares acutæ, &c. Palpebræ vix se attollunt, pulsus ad instar chordulæ extensæ præ duritie & siccitate arteriæ, Huic itaque malo anacollematis, vinculis, odoribus potionibus, maturè succurrendum.

5 Ac cum noxius fuerit somnus, prohibendus iis, quæ ad lethargum præscripta sunt, clysteribus, frictionibus, errhinis, partium vellicationibus, clamoribus, odoratu calidorum, aut frigidorum incidentium & tenuantium.

6 A Galeno lib. 3. de causis pulsuum tres vigiliarum causæ assignantur, calor, siccitas, dolor: quibus toridem contraria sunt remedia opponenda, refrigerantia, humectantia, anodyna. Quæ refrigerant & humectant, partim assumuntur, partim admouentur. Assumuntur sorbitiones, ut hordeata & amygdalata è recetibus hordeo & amygdalis, additis seminibus frigidis lactucæ, portul. melon. cucurb. aut papau. alb. ad 3. 2. & hora somni, vel media nocte, si somni difficultas suadeat, exhibenda: potiones hypnoticæ, ex decocto seminum portul. lactuc. capitibus papau. alb. & simil. in quo. dissoluantur syrupi. papauerinus, neupharinus. violac. diacodium sine speciebus. Admouenda sunt, linimenta, frontalia, cataplasmata lotiones partium inferiorum. Horum omnium formulæ subiiciuntur.

7 Græci sub horam somni manus & pedes ad articulos vinculis constringunt, dum defatigentur. Soluunt vincula, subducunt lumen, imperant silentium. In ratione vinculorum animaduertendum, ne corpus arthriticum sit, aut sint vlcera ad articulos. Sic enim ad alia remedia confugiendum est.

7 Ut Paulus Ægineta cap. 41. lib. 2. Arthriticis verò vincula aptanda non sunt, ne fluxio aliqua in articulos imbecillos, vel iam laborantes, vi doloris conuehat.

Anacollemata, quæ frontalia appellant, ad repellendum commoda, ex olei rosacei 3. i. aceti 3. 2. cum oui candido.

Aliud.

℥. olei viol. & ros. ana 3. β. aque ros. vel betonicae, 3. 2. agitentur cum oui albumine. Fortius erit, si Gr. 6. vel eò plus opij addideris, aut 3. 2. populeonis. Sed in usu anacollematum habenda ratio naturarum. Nam pueris, mulieribus, epilepsiæ obnoxiiis, & mollioribus corporibus eiusmodi refrigerantia stuporē inferunt, & læduntque memoriam in reliquam vitam. In iis verò, qui remedia sustinere possunt, innouanda sunt sæpius: statim enim incalescunt.

8 Quinetiam lethargum promouent, vehementiorem cerebri frigiditatem cum humiditate coniunctam inducendo.

℥. capita 3. papaueris. In pul. redacta commisce oui albumini. Bene fiet, si albumen oui ex aqua rosacea prius agites, & despumes. *Aliud.*

9 ℥. olei papaueris albi 3. i. β. populeonis 3. β. albuminis ouorū ij, vt antè, despumat. 3. 2. lactis muliebris 3. β. Præferunt in hoc lac muliebre, si nutrit albo colore est, & puellam nutrit. Frontale siccum.

9 Vel tale fiat cataplasma. ℥. farinæ hordei subactæ cum succo lact. & oleo rosaceo 3. i. vnguenti popul. 3. i. f. cataplasma. Valentius hoc erit. ℥. flor. ros. viol. & nymphaeæ ana p. i. semin. hypocyami, lactucæ, papau. alb. ana 3. 2. coquantur, terantur, addendo olei papauerini 3. i. populei 3. i. Reposita inter duas telas raras portio fronti applicetur. Huc pertinebunt linimenta, qualia ex cetero refrigerante Galeni cum oleo rosaceo agitato, ex olei viol. ol. ros. & succ. solan. ana 3. 6. cum popul. & aceto, ex oxyrhodino cum albumine oui & aliis id genus confici solent.

DE MORB. INTERNIS

℥. quatuor sem. frigidorum ana ʒ. i. sem. papau. ʒ. 2. florū nenupharis, violarum, anethi ana P. i. fiat ex omnibus puluis, qui inuoluatur in linteo duplici: deinde perfumetur cum aqua rosarum & betonica, aut cum vino albo diluto his aquis. Aliud.

℥. nenupharis, rosarum, violarum ana P. i. corticis radicis mandragoræ ʒ. i. β. sem. papa. albi, coriandri ana ʒ. i. conquassentur crassiusculè, inuoluantur, & perfumentur, vt prius.

Potiones.

℥. syrupi papaueris, de nenuphare ana ʒ. 6. decoctionis lactucarum ʒ. 2. Capiat horā somni. Aliud.

℥. lactucarum P. i. dactylos tres, caput vnum papaueris. Fiat decoctio ad ʒ. 4. cum ʒ. i. syrupi rosati fiat potus. Vel.

℥. dactylos duos cum capite papaueris, fiat decoctio ad ʒ. 3. In col. dissol. sacchari rosati ʒ. 3. Conuenit vbi distillatio in pulmones cum vigiliis: ac ferè commiscemus ea, quæ adstringunt, vbi fluxio est, vt in dysenteria.

℥. syrup. de papau. ʒ. i. diacodij sine speciebus ʒ. i. aquæ ferratæ ʒ. β. Detur hora somni. Conuenit & syrupus rosatus, aliàs per se, aliàs cum aliis. Olfacere oportet oleum de semine lactucæ, de nenuphare, violarum, cucurbitæ, aut ex his nares inungere. Alioqui refrigerantia, vt lactuca, flores violarum, nenupharis, semen & capita papaueris, semen album hyoscyami, coquuntur aquâ: vapor auribus & naribus excipitur: spongia in his immersa & expressa subinde naribus admouetur. Conueniunt molles frictiones plantæ pedum, linteamina bene

munda, in stratum cubile refrigerantibus, susurri facti, identidem infusa aqua. Sunt qui abraſo capillo humectant caput ſpumâ ſeri lactis ſeruefacti: melius fuerit oleo roſaceo perfundere. Alij è floribus croci, demptis ſtaminibus, aquam diſtillant, eius aque ad 3.4. propinant hora ſomni. Quidam etiam probant manus & pedes ablui ex decocto refrigerantiũ. Bonũ quoque fuerit hordeata, lac amygdalarũ diſſoluere ex decocto lactucarũ, caput papaueris & ſimiliũ, iuſcula alterari cũ multa lactuca, nodulos quoq; fieri, qui iuſculis incoquantur, vt.

℥. quatuor ſem. frigidorum maiorum, portulacæ ana 3.ß. fiat nodulus. Vbi verò nimium ſomniculoſi ſunt, exprime ſuccum è radice fœniculi, & in deſ. naribus, aut ſpongiam imbues aceto, in quo prius concifa radix fœniculi, hyſſopus, nux moſchata, aut quid ſimile coxerit. 10

10 Nam per cæcos neruorum meatus, qui ad partes illas perreptant, vapores cerebrum irrigantes & humectantes, ſomnũque tepore ſuo cõciliantes efferuntur. Parabitur autem lotio ex decocto foliorũ ſalic. lactuc. vitium, florib. nymph. viol. chamæmeli. Licebit eodem decocto, (additis tamẽ aliquot cephalicis, vt beton. ſtæchade, & ſimilibus) caput abluere: nam vapores acres reſoluendo & refrigerando ſomnum conciliabit. Poterit quoque ſacculus inſtitui ex roſis, viol. cortice papauer. alb. ſeminibus lactucæ & hyoſcyami, pulueratis, ac ſæpè & ſæpè naribus obiiici.

De ſiti.

Sitis fit 1 ab humido deficiente, aut calido ſuperante. Calori aliquando coniuncta eſt ſiccitas, vt in ardoribus: aliquando humiditas, vt in hydropicis, & quum pituita ſalſa ventriculo inhæſit.

DE MORB. INTERNIS

¹ Galen. cap. 30. lib. 1. Simplic. Sic comment. 1. in lib. Hippoc. de natur. humana, sitis (inquit) fit nobis siccescentibus. Est autem id symptomatis genus febrium ferme omnium indiuiduum, sed maximè continuarum omnium, ardentium, atque adeò tertianarum proprium.

Nascitur autem vel ita alterato toto corpore, vel certis partibus: quales sunt gula, stomachus, ventriculus, viscera, primùm intestinum, pulmo. Sitis quedam est, quæ nullo potu expleri possit, ideòque *δίψασις* Græci vocant. Etenim non aliter quàm qui à dipsade serpente morfi, inexplibili siti ardent. Id quæ aliquando in morbo contingit, de quo cap. de profluuiò vrinæ. Aliquando id contingit iis, qui veteri vino ² indulgentiùs sese ingurgitarunt: aut vinum alioqui calidum largiùs hauserunt: vel qui marinam aquam, ducis inopiâ, diutiùs biberunt: qui deniq; falsis & medicatis alimentis, vel etiam pharmacis ipsum contraxerunt. Vbi humidum efferuescit, biliosus succus, saluæ pituita in vetriculi tunicis imbibita est, hoc idem accidit. At verò ex contrariis causis sitis nulla est, vel quia sentiendi facultas demortua est in ventriculo. Hoc verò in febribus maximis & ardentibus exitium denunciat. Est quum adsit iusta causa sitis, non sitiant tamen, qui febricitant: tum quia, vt modò dicebatur, extincta est sentiendi facultas vetriculi: tum quia à capite ³ humiditas defluit, atque inde irrigatis partibus, vnde sitis incendi solet, non sitiunt.

² Vinum enim meracius & largius epotum haud aliter in ventriculo, ac mustum in dolio, dum feruet, fumos & vapores calidos emittit, à quibus sitis.

³ Iuxta Hippocratis aphorism. 54. lib. 4. Quibus plurimùm siccescunt tussis leuiter irritantes in febribus arden-

sibus sunt, non multum siti infestantur. Nam (ait Galen. in commentario) madescunt quodammodo loca, quæ ad asperam arteriam spectant.

Vitiosa quoque sitis est, cum scilicet alienos potus appetimus ex natura humoris vitiosi imbibiti tuni-
cis ventriculi, qualis est pica circa cibos, id est, absur-
da mulierum appetentia, quæ vterum gerunt. Hæc
itaque prius distinguenda sunt, quàm de potu fide-
liter decernas. Neque permittendum est, ut diutius
sint, maximè in febribus: atque ubi siccitas est.
Quin & in declinatione cogedi sunt, ut bibant. In
accessionis principio & augmento potus prohiben-
dus, ne veluti in fornacibus fabrorum suffusa aqua,
aut alio liquore febrilis calor vehemètiùs incenda-
tur: sed tum sitis fallenda est madefacta lingua, vel
etiam còuoluta folio lactucæ, acetosæ, aut linteolo
in aqua frigida, vel oxycrato madefacto. In vigore
collutionibus iam utendum, & gargarismis: qui
ubi inclinat, & vehementer sitiunt, largiter ac con-
fertim bibendum, quantum, videlicet, haurire pos-
sint. Sic enim fit, ut subito motu & contrarietate
potus excitatus calor foras dissipetur.

Somnus 4 sitim sedat à siccitate, declinationibus
tempestivus. Sanguinem enim intrò colligit, vnde
siccitas temperatur. Vigilia verò sitim lenit à calore:
calorem enim foras excludit. Ideoque quicumque
merum largius hauserunt, ac per fumos & vapores
calidos sitiunt, iis non modò frigida potus, sed etià
vigilia remedio est. Sedandæ sitis ardentium, & eo-
rum, qui calido & sicco laborant, conueniunt, quæ
refrigerant & humectant: quale est dilutum oxycra-
tum, id est, aceti modicum, cuiusque tenuis & bene

DE MORB. INTERNIS

puri, multæ aquæ mixtum, vt facîle bibi possit. Acriore enim vtendum erit, vbi pituita salsa est, aut alioqui humiditas iuncta calori, vt in hydrope.

Aqua frigida, si neque infirmitas visceris, neque cætera prohibent, tempestiuè data, efficacissimè sitim extinguit, quam calor & siccitas faciunt. Quòd si ab aqua frigida noxa metuitur, quinta parte tepidæ vini aquosi, iulepi violati, aut rosati, parte subdecupla sacchari temperari potest.

4 Hippocr. sect. 4. lib. 6. Epid.

5 Nam si sit aliquis humor collectus, qui perpetuam febris afferat consecutionem, purgatione deturbandus. Sic vomitu reiecta bile, inquit Galenus, extinguitur sitis.

Aliud.

℥. seminis lactucæ & cucumeris ana ʒ. ʒ. liquiritiæ recentis & rasæ ʒ. i. bulliant in 6. lb. aquæ. Aqua refrigerata per se vel cum modico aceti, vt prius, aut aliis proximè dictis, bibatur. Hordeatum mundatum & excorticatum in quadrupla aqua bibitur. Ptisana 6 vulgaris bene cocta ex hordeo mundato, recenti, succulento, excorticato, & glycyrrhiza similiter recenti, & rasa, vtilissima est. Sed hæc Medico animaduertenda sunt, alioqui sitim facit, non extinguit. Cydonia & pira humidiora, cucurbita, cucumer in rotulas conciduntur, immittuntur vase aqua frigida pleno, vas in puteum ita demittitur: vsus tempore aqua bibitur, cum vehemēs ardor est. Mel rosatum more Veterum præparatum, aut saccharum rosatum, sæpiùs refusa aqua rosacea factum, in octupla aqua dissoluitur. Cydonia, pruna, extrema lactucæ ac portulacæ, capreoli vitis, ramenta

cucurbitulæ & cucumeris, aqua plantag. vel rosacea maceratur, & ore continentur. Similiter & granatorū succus, sirupi violacei 3.1. in 3.4. decoctionis lactucæ. Iulepus violatus, rosatus, vel ex aqua & saccharo factus, saccharo quidem cōmuni, vel violato. Vinum granatorum, syrupus limonum & similia cum aqua hordei, decocto glycyrrhizæ & similibus propinantur. Pilulæ sunt ab Antiquis commendatæ sub lingua retinendæ.

¶ 4. semin. cucumeris 3.4. gummi tragacanthi 3.2. gummi dissoluatur oui albumine, semina trita cōmisceantur, 7 fiant pilulæ.

Siccentur in vmbra, paulatim deglutiantur.

¶ Circa guttur inūctio ex oleo rosaceo cum aquis, aut succis semperuiui, solani, vmbilici veneris, lactucæ, acetosæ, portulacæ, muccagine psyllij, aliquot granis caphuræ, in quibus linteolum subtile & rarium subinde madefiat, ac frequenter apponatur. Conueniunt & ea, quæ contra æstum dicta sunt cap. de Febre ardente.

¶ 6 Cum ea ptisana vulgari, virgente siti, dissoluuntur syrupi conuenientes, acetosus simplex, de limonibus, violaceus. Vel vtere conserua ros. recenti in cyatho aquæ agitata. Sitim enim mirificè sedat. Sed potionis exhibendæ tempus imprimis captandum. Initio accessio- num à potu arcendus æger: in declinatione ad potum inuitandus largiorem: in incremento fallenda tantum sitis.

¶ 7 Harum pilularum vna sub lingua teneatur, & humor salina solutus paulatim deglutatur.

DE MORB. INTERNIS

*De lingua scabritie & nigredine,
totiusque oris.*

Ingua tunica vestitur, quam communem habet cum toto ore, palato, larynge, gula, stomacho, internoque ventriculo: tum etiam angustissimas venas, per quas visceribus communicat: ita fit, ut ex colore lingue de viscerum, venarumque habitu coniciamus.

1^a Quæ lingue scabrities & asperitas fit ob immodicam siccitatem, ut nigror ob immoderatum calorem, Gal. commentat. in sent. 4. libr. 4. de rat. vict. in morb. acut.

Humores enim, aut certe vapores 2 è reliquo corpore eò sublatis, ubi iam non habent, quò ultra progrediantur, in spongiosa lingua consistunt, & corpus lingue afficiunt; inducunt scabritie, nigredine, fissuris, siccitate, aliisque id genus. Eadem quoque affectio totum os, quin & asperam arteriam & œsophagum occupat. Scriptum ab Hippocrate 4. Aphor. & 6. Epide. Quibus plurimum siccae tussis leuiter irritantes in febribus ardentibus fiunt, non multum siti infestantur, neque iis lingua exurit. Aliquando enim tenuis humiditas in os & linguam defluit, vel frequente tussi è vicinis corporibus glandulosis eadem humiditas excutitur. Pars quoque in partes inferiores defluit, unde hæc omnia humectantur, ex quo neque multa sitis, neque exustio. Pessimum signum est, ubi nigrescit lingua, & nimis scabra est. Hic igitur in primis 3 prohibendi fumi sunt, qui à reliquo corpore attolluntur, coriandris præparatis, saccharo rosato, interceptis viis, ut po-

stea dicetur. Lingua scabra hydrelæo tepido sæpius fouenda est. Sed oleum dulce sit, & bene lotum aqua pura, nulla qualitate vitiosa. Alioqui tantum aqua tepida vtendum est: in qua, si vis, præcoxerint semina cydoniorum, althææ, maluæ. Posteaquam verò abluta lingua est, scabrities & humor qui inhæsit, satis aspero linteo, spongia, cæruleo panniculo, cochleari argenteo, vel ad id parato instrumēto detergēda, abradendāque. Sæpe enim veluti nigra fuligine obducta est lingua, quæ pertinaciùs hæret, nisi abradatur. Idque ferè fit ab adusta bile, & sursum lata, vnde iis & deliria, & profluvia sanguinis ferè contingunt. Aurelianus spongia aqua tepida imbuta absterget simul, & humectat. Quod si humectandi consilium vincit, quia sicciore lingua est, lini semen, cydoniorum, althææ, maluæ, psyllij, portulacæ, myxaria seu sebesten, althææ radices, aliāque eius generis, quæ humectant & emolliunt, in aqua prius coquenda sunt, in qua molle linteolum subinde inculcabis, atque ita linguam remolles. Vbi verò scabrities vincit, atque ideo abstergēdum magis asperiore linteo, panniculo illo cæruleo, extremitate baculi alligato, vel spongia vtēris, & in præscripta aqua aliquid sacchari candi dissolues, atque vbi satis humectatum, atque repurgatum os fuerit, frigida colluendum est. Cautio ne phreniticis & delirantibus, dum os abluis, in os digitorum inducas. Mordicant enim, & digitorum abscindunt. Cornelius Celsus penicillo è carpto linteolo & constructo, ne dissipetur, linguam deterget, quam prius aqua calida inculcat: deinde melle vngit, & oleo rosaceo. Mel enim purgat & deterget. Rosaceum

reprimat, & siccescere non finit.

2 Non enim lingua colorem mutat ratione aliquorū humorum, nisi ij aut ventriculo contineantur, aut præ vehementi calore fusi, atque in spiritum versi, in sublime ferantur. Comment. in sent. 14. sect. 5. libr. 6. Epid.

3 Quia verendum est, ne fumorum istorum in cerebrum raptus phrenitidem committat.

Alioqui butyrum recens sæpius ex aqua rosacea ablues, cui deinde saccharum commiscebis. Quod si sola ariditas, cerato rosaceo liquidiore vtor. Saccharū candū retentum ore humectat & deterget. Paulus Celso ferè consentit, & rosaceum incorporatum melli plurimū cōmendat. Sumach incoquatur mulla, hinc scabritiem detergebis. Pruna damascena & sebesten incocta aqua rosacea humectando conueniunt, & reprimendo, succus portulacæ, cuiusque folia ac reliquæ id genus herbæ prius enumeratæ cap. de siti.

Archigenes sale Indo utebatur: nos saccharo cado. Auicennas bacculo rusci, aut salicis deterget: oleo amygdalino cum modico saccharo optimo humectat & deterget. Quod si oleū odiosum est, lacte amygdalino vtendum erit. Sed aliquando profundius scabrities inhæsit: cancerum vulgus appellat. Tum Chirurgo vti oportet, qui depressa linguâ instrumentum ad id conueniens profundius immittat atque detergeat, ex quo gargarismis vtendū est. ʒ. 4. aquæ hordei aut ptisanæ bene præparatæ ʒ. 4. sacchari violati, sacchari candi ana ʒ. ʒ. vel.

4 Hoc gargarismate colluendum os: vel linteo aspero demerso lingua infricanda: vt si cochleari, aut instrumento conuenienti abradatur, mox abluatur.

ʒ. hordei

℥. hordei mundati ʒ. i. tragacanth. alb. sem. cydoniorum, sem. malux, liquiritiæ recentis mundatæ, succi eiusdem ana ʒ. β. Fiat decoctio in aqua purissima ad ℔. β. In expressione dissolue penidiorum ʒ. 2. Fiat gargarismus, quo tepido vtatur. Alius.

℥. sacchari candi, tragacanth. alb. gummi arabici ana ʒ. 2. sem. psyllij, cydoniorum, portulacæ ana ʒ. β. conseruæ violarum ʒ. β. Vniantur omnia: deinde dissoluta in iulepi violati quantitate sufficienti, gargarismus faciunt contra scabritiem arteriæ, totiusque oris interioris. Collum verò, qua maximè parte venæ sunt & arteriæ, illinatur subinde hoc vnguento.

℥. olei violati sæpiùs loti in aqua violarum ʒ. 2. butyri recentis sæpiùs loti ex aqua rosarum ʒ. β. Fiat vnguentum. Vulgus vtitur s foliis linguæ canis, quæ collo circumponit, aliisque herbis plurimis. Frequens quoque illi est aqua caprifolij & arnoglossi, similiter & omphacio aliquando vtitur. Decumbere oportet in ⁶ alterum latus. Supinis & ore ⁷ hiantib⁹ celerius lingua exarescit. Sternutationes linguam humectant, quia violento motu è vicinis partibus humidis humiditas in os exprimitur.

5 Hæc parum iuuant sic admota. Addit interdum vulgus animalcula millepeda vocata, quia fortasse scriptum est à Dioscoride ea lita cum melle anginis remedio esse.

6 Nam per supinos decubitus vena caua & aorta arteria incalescunt impensius: vnde nimietas caliditatis, linguæ siccitatis & asperitatis parens.

7 Oris enim hiatus madorem, seu saluosum humorem absorbit.

De dolore capitis in febris.

DE dolore capitis iam multa dicta sunt, quæ in hunc locum referri possunt. Peculiariter in capitis doloribus, qui cum febre per initia inuadunt, prima aut secunda remissione 1 sanguinem mittito, si vires & cætera permittunt. Verum priusquam de phlebotomia decernas, videndum ne dolor hic propter adstrictâ aluum, aut vapores ventris, non quia 2 materia in capite est, excitetur. Hic enim, quod ad dolorem attinet, phlebotomia necessaria non est, sed clyster sufficit: ut si post septimū diem dolor primū inuasit; sanguis quidem detrahendus non est: sed aluus liberaliter mouenda est, vel pharmaco mediocri, vel rhabarbaro, catholico, vel clystere acriusculo. Quod si nec clysteri quidem, aut pharmaco concedit dolor, cucurbitula occipitio, vel ceruici defigenda est: sine vulnere quidē, si tantū vapor est causa: cum vulnere, si qua materia capite continetur.

1 Dolor capitis febris symptoma non semper curationem ad sese trahit. Etenim in crisi, ne naturæ motus interturbetur, eo etiam infestante, nihil moliendum. Scopis tamen assentientibus si sanguis sit mittendus, interna primū secanda, si plethora adest: sin minū, externa: dein vena frontis. Nam posteriora capitis dolenti vena in fronte secta iuuat, aphor. 68. lib. 5. Denique ex arteria, si res postulat: quanquam ista particularium capitis venarū pertusio haud ita sit frequens, ut prima ad librum superiorem exercitatione diximus.

2 Materiæ in capite contentæ indicia ex rubentibus oculis & facie, pulsu magno in temporibus, produntur.

Veteres raso capillitio aspersioibus plurimū

utebantur, & ex alto infusis liquoribus in eas partes capitis, quæ per futuras anteriores humor in caput descenderet. Utebantur ferè oxyrhodino, rosaceo cum aceti modico, si quidem calidior febris, talisque aëris conditio.

Frigidiore verò corporis habitu, & hyeme, chamæmelino cū aceti quinta parte, quod propè fiet, si 3.2. aceti, olei 3.1. commisceas. Sed nunc ferè anacollematis, seu frontalibus utimur, quæ frontem & tempora comprehendant ex eadem materia. Vel.

℥. olei rosarum 3.2. olei communis, vel chamæmelini 3.6. Æstate frigidis, atque ubi feruentior febris est: ubi verò mitior febris, nec cœlum feruet, modò tepidis, modò calidis utendum est. Aliquando proximæ mixturæ succum polygoni commiscemus, nonnunquam capita papaueris in oleis elixamus æstate, & vehementiori febre: alioqui serpillum, mentham, betonicam, saluiam, anethum, peucedanum, & similia.

Perseuerante dolore cataplasmata fingenda sunt.

℥. farinæ hordei M. 2. malaxentur cum succis fœniculi, & 3 olei rosacei ana quantum sufficit. Fiat cataplasma, quod in totam frontem & tempora extendatur. Quòd autem & subinde remedia commutari, priusquam nimium incalescant, quòdque olea nec rancida, nec grauius olentia, nec falsa esse oporteat, iam sæpe dictum est.

3 Efficacius erit cataplasma, si olei rosacei loco papauerinum adieceris.

Cornelius Celsus 4 rosas in aceto macerat, fascia in eo aceto madefacta maceratas rosas inuoluit:

DE MORB. INTERNIS

fronti, & temporibus apponit, sæpe innouat: alioqui lana in eo aceto inculcata vim remedij conseruat, quod & in aliis remediis fieri potest, ne celerius incalescant, sæpiusque commutanda sunt.

4 Ad huius imitationem similia fiunt ex lactuca recenti, portulac. seminibus frigidis, semine papaueris, floribus violar. & nymphaeæ, singulis parum contusis, & rarioꝛe panno exceptis.

Alij pane ex psyllij & similium succo subacto cataplasinata fiunt. Nonnulli eandem micam panis cum foliis hyoscyami conterunt, vel papaueris recentis, deinde oxyrhodino commiscent. Abstinendum verò assidua potatione, collutione immodica, luce, calore, colloquiis, ingratis odoribus & vaporosis, clamoribus, strepitu, & vehemēti animi motu. Auicennas & Arabes hac irrigatione vtuntur.

℞. florū chamæmeli M.℞. furfuris, violarum, rosarum an. ʒ. ℞. Fiat decoctio: materia sacculo excipiat, qui subinde madefactus in decocto exprimat, deinde fronti ac temporibus apprimatur. Neotericorum formulæ sunt.

℞. olei rosarum ʒ. ℞. olei violarū & lactis mulieris ana ʒ. 2. aceti albi ʒ. 1. panniculus in ea mixtura inculcatus applicetur fronti & temporibus.

Aliud.

℞. aquæ rosarum & damasci ana ʒ. 1. aquæ nenupharis ʒ. ℞. misce, similiter vtete.

Vitis capreoli & folia concisa, tela inuoluta, & imposita dolorem sedant, & somnum conciliant: similiter & reliqua materia, quæ refrigerat. Viden-

dum tamen, ne nimium refrigeremus, ideoque & aceto, & aliis eiusmodi, sed illo maxime, interdictum est, ne quis, videlicet, solo utatur. Nam præterquam quod nimium refrigerat, nervis etiam inimicum est. Atque iis multo magis abstinendum est in pueris, mollioribus corporibus, & cælo frigido.

Auicennas in dolore capitis à febre abstinet stipticis refrigerantibus, quia timet ne inde materia compingatur, & crassescat nimium. Alioqui materia exprimatur, ubi catarrhus calidus est.

Delirium in vigore febrium multosprehendit ob capitis repletionem, inquit Galen. comment. in sent. 36. sect. 3. lib. 6. Epidem. De eo maximopere sollicitum esse Medicum minime oportet, nisi forte metuat, ne in phrenitidem concedat, ut ferè fit calidioribus in naturis, quæ ingentiore febrium ardore exercentur. Quanquam verò sæpius leue est symptomatis id genus, huic tamen occurrere expedit, quia mente constare bonum. Si ergo à vaporibus acrioribus sursum latis fiat, sumenda & ad-mouenda sunt, quæ illorum ascensum prohibeant, tum quæ discutiant. Qualia multa inuenias cap. de phrenitide libro primo. Si humores in vasis calidi huic malo materiam suggerant, secunda vena. Si fæces in intestinis restitantes, enemata subdenda. Discutient materiam capite contentam catelli ex-enterati, & calidè appositi.

DE MORB. INTERNIS

De sudore.

Sudor excretio est serosi humoris per poros corporis. Causas ¹ habet, efficientem quidem calorem, materialem vel vaporem, vel humiditatem. Vapor à calore, qui humores resoluit, deinde in superficiem corporis attollit, relaxat poros: sed vapor occurſu cutis refiſtit, atque hîc in humorem cōuertitur, non aliter quàm in aëre pluuiâ, in ollis coquinariis humor è vapore ſublato, ſi quid ſolidum opponitur. Humor verò cōmodo materia eſt ſudoribus, vt etiam vrinis. Atque vt in his aliquid etiam bilis emungitur, ita & in ſudoribus tenuior bilis expurgatur. Sed venoſum genus per vrinas magis, habitus corporis per ſudores expurgatur. Eſt cum calor externus attrahit humores, liquefacit, ac reſoluit, quod in balneis & vaporariis intelligitur. Aliquando etiam medicamenta quædam partium tenuitate & calore humores liquefaciunt, ac celeriter in habitum corporis penetrant, ſecumque liquefactos humores rapiunt, vnde ſudor. Atque interim imbecillitate caloris natiui, ac prope diſſoluta naturâ diſfluit ſudor, iſque ferè frigidus, ² vt in malignis febribus. Nonnunquam etiam præ copia humorum aut alimenti, ſudor fit, de quo ſcriptum ab Hippocrate aphor. 41. lib. 4. *Sudor multus à ſomno factus ſine cauſa manifeſta corpus vti pluri cibo ſignificat. Quòd ſi non aſſumentibus cibum hoc accidat, ſcire oportet, quòd indiget euacuatione.* Et ex copia humorum perpetuus ferè ſudor eſt in febrium generibus, quas typhodeis, & helodeis appellabamus.

¹ His cauſis duabus tertiam addere licet, vt corporis præparationem, ſcilicet raritatem.

2 In his enim vruntur interna, & externa frigent. Frigidus etiam sudor elicitur præ caloris imbecillitate, propter quam calferi non potuerit copiosior materia.

In febribus sudor est optimus, qui fit; die critico, præcedentibus signis coctionis, qualitate tepens, toto diffluens corpore, substantia tenui, nullo graui odore, cum pulsu bono & vndoso, & à quo leuatur febris, ægerque incipit habere salubrius: cōtrā verò pessimus est ei contrarius. Quòd si ante crisim aut accessionem fit, malus est. Etenim vi exertitur, exprimiturque. Post crisim & accessionem fuso calore, laxato corpore, natura vincente salutaris est. Qui circa ceruicem tantum & thoracem, aut toto quidem corpore, sed exiguus, naturam languidam, vel copia grauatam significat. Deterior tum est, vbi in supernis tantum partibus. Nam si tum natura infirma est, syncopem denunciat: quòd si etiam frigidus est, iam syncope est. Alioqui si non ita infirma natura est, partem, vnde effluit sudor, grauatam copia coniicies, vel aliter affectā. Qua parte sudor, ibi morbus, inquit Hippocrates, aph. 38. li. 4. vt & hoc. Frigidi sudores cum acuta febre mortem, cum mitiore morbi longitudine significat, ex aph. 27. lib. 4. Hæc omnia in febribus distinguere oportet, vt intelligamus, qui sudor bonus, quiq; malus sit, qui reprimendus, & rursus quem excitare oporteat. Est & genus sudoris incogniti antiquis, qui paucis diebus hominem resoluit, ferè similis ei sudori, quem cardiacum dicebamus. Vocatur autem 4 Anglicus, quia in Anglia anno millesimo quadringentesimo octuagesimo sexto populariter grassari cœpit, quo correpti stomachi & capitis æstuoso dolore cruciantur,

DE MORB. INTERNIS

toto corpore sudorem foetidum effundunt, sitiunt, intra viginti quatuor horas animo deficiunt & moriuntur. De quo iam multa scripta sunt. Sed qui eo tēpore vixerunt, afferunt præcipuā causam mortis, quòd loco stare nequeant ægri, pedes, manúsque ad refrigerium iactent, ac suppresso sudore moriantur.

3 Dies criticos sudoribus dicatos expressit Gal. cōm. in aphor. 36. lib. 4.

4 Nonnulli sudorem eiusmodi ad typhodē febrem retulerunt, cū tamen ad pestilentem potius videatur referendus. In Anglia, vnde nomen obtinuit, cœpit grassari ob regionis illius humiditatem. Idem Germanos anno 1528. infestavit.

Itaque cautio fuit Anglis, vt qui interdium corripetur, s statim cum veste decumberet, foueret sudorē: qui verò noctu, sese colligeret, benè cooperiret vt efflueret medicus sudor. Potu vtatur, qui tēperet sitim, cibo si carere potest, bene est: sin minùs, frugaliter vtatur: nec se dimoueat lecto, nec iactet membra ad refrigerium. Est enim lethale, vt vix cētesimus quisque euadat: aut si qui euadunt, in morbum bis tērque relabantur, & tandem concidant. Hæc ex Chronicis Angliæ, quas scripsit Polydorus Virgilius.

5 Sic Aristoteles sect. 1. Problemat. iubet ægros febricitantes, potissimū cū sudores eruperint, contineri.

Sudores verò in febribus aliàs cohibere, aliàs excitare oportet. Critici, si quidem resistunt, excitari debent: ac ferè resistunt, vel quia copiosior materia est, vel qualitate crassior & lentior: alioqui ex-

terna causa est. Propterea consuetudo est, ut syrupum acetosum cum ptisana, vel aqua hordei calida imperent: alioqui ptisanam vel aquam hordei saccharo conditam. Atque hæc calida imperentur, ut citius penetrent in corpus.

In summa quæcunque vim habent aperiendi, nec adeò calefaciunt, mouendis sudoribus imperari debent.

Atque ubi materia crassior est, minúsque viscida, decoctum hyssopi, thymi, pulegij & similium, vel oxymeliti, vel syrupo acetoso miscendum est.

Verum in sudoribus etiam criticis 6 modus quidem esse debet, quemadmodum & in reliquis omnibus criticis excretionibus.

6 Critica excretio etsi sistenda non est, si tamen vehementior fuerit, metu nimiae virium exolutionis, tutò sistitur. Nonnunquam enim natura suam semel molita euacuationem seipsam continere nequit, non secus, ac qui per decliue suum cursum instituerunt.

Modum verò tibi indicabit pulsus, qui per eiusmodi excretiones vehemens & magnus. Quo igitur tempore talis permanet, nihil ab excretionem tibi metuendum est: ubi verò cœpit imminui & languescere, sistenda hæc excretio est. Historia est apud Galenum libell. de usu respirationis. Imperitus quidam Medicus sudantem adolescentem in balneum deduxit, & extinxit, præter modum citatis sudoribus.

In 7 syncope copia grauante, inflammationibus viscerum, principiis morborum acutorum sudores mali. Etenim naturæ imbecillitate, non robore effluunt. Ab animi quoque molestia, conuulsionibus,

magnis doloribus sudores commoti cohiberi debent, vt etiam qui 8 resolutio corporis habitu diffuunt. In sudoribus remissis neque satis fluentibus melius est aquam guttatim cadere, quàm tenuiter & parè corpus madefacere.

7 A qua frigidus est sudor, naturæ infirmitatē à crudis humoribus, vt antè dictum est, arguens.

8 Habitus corporis colliquatio abit in sudores: suorū verò in venis per deiectiones, aut vrinas.

Diapasmata Græci vocāt, quæ ad sudores insperguntur, vt Alipasmata, quæ inunguntur, magisque cohibendis sudoribus. Diapasmata ex materia refrigerante & adstringente, vt est rosarum siccarū puluis, terra Samia, Cimolia, creta, alumē scissile, plumbum exustū, gypsum lotum, mala panica. Hæc singula cōmixta, vel per se subtiliter trita corpori asperguntur, vel astringente oleo commixta inunguntur.

Ad 9 sinistram mammam, & totum ventrem remedia adhibenda sunt, ac subinde mutanda sunt. Cæterum vbi tumor præter naturā in hypochondriis, adstringentibus abstinere oportet, vtendūmq; panē ex rosaceo: subactō Alioqui farinā volatilē ex aqua, vel rosaceo subactā hypochondriis impones. Atq; remedia, quæ sudores cohibēt, fugere oportet.

9 Ab his enim partibus sudores effluunt copiosiores.

Aërius cataplasmatibus refrigerantibus sinistram mammam & totum ventrem cōprehendit: sinigmatibus verò aut diapasmatibus, id est, puluisculis, collum, thoracem, alas, inguina conspergit. Corpus quoque ventilandum est, atque leuandum stragulis. Possumus succo plantaginis, portulacæ & simi-

lium media corporis irrigare : vniuersum corpus ceratis ex oleo adstringente inungere.

Paulus resistentem sudorem criticum, aut remissum, fotu, quiete, calido clystere, sorbilationibus, somno denique adiuuat.

Sudores ab animi molestia, conuulsione & similibus, extremitatum ligatura, fotu extremorum, vestimentis laneis compescit.

In summa nullus sudor vi exprimendus est. Sed vbi natura eam excretionem molitur, tum quidem adiuuanda est. Certissimum indicatiū salutaris sudoris è pulsu colliges, qui magnus & vndosus esse debet, si quidem sudor salutaris futurus est : ac præter cætera animaduerte, quæ sudoris causa extiterit.

Si enim præter naturam est, qualis est dolor animi, molestia, conuulsio, interior inflammatio, & similia: sudor quidem resoluit corpus, nõ leuat: itaque cohibendus est. Contrà verò si naturæ victoria est, pulsus magnus erit & vndosus, neque tum sudor cohibendus: sed si resistit, incitandus, dum incipiat pulsus languescere. Signa prognostica, è quibus præfagias sudorem, iam ante descripta sunt cap. de febre ardente.

Sudor qui grauiter olet, putridam, corruptamque materiam ostendit. Suspectus est, qui non soluit febrem, qui non minuit symptomata, qui alio die, quàm critico, existit.

De morbo Regio.

Q Vibus in febribus morbus regius i ante diem septimū accidit, malum, inquit Hippocrates. Tum scriptum ab eodem primo de morbis popularibus, multos seruatos, quibus die

DE MORB. INTERNIS

quarto morbus regius accidisset, & lib. de rat. victus acutorum. Morbus regius ante septimum si 2 cum horrore, salus: si sine horrore, mors. Quæ quia pugnare videntur, meminisse oportet morbum regium ante septimum ferè exitiosum, 3 nisi sequatur excretio, qualis est fluor sanguinis è naribus, alui profluuium, vrina multa, sudor, vomitus, & similia.

1 Non enim ante diem septimum bilem iudicatoriè efferri potis est, inquit Gale. comment. in eum Hippocr. locum. Adde quod etiam si fiat post septimum, periculo non vacat, vt si sit ab obstructione, inflammatione, vel scirrho.

2 Horror enim aut rigor sequuturam indicant excretionem.

3 Sic Hippocrates sent. 67. sect. 2. lib. 1. Epid. seruatos multos ante diem septimum commemorat, quòd alia copiosa excretio esset cõsequuta. Nam ante septem dies alij quoq; sunt critici, in quibus omnimoda fieri potest excretio, sed non solius bilis in cutem. Hæc enim sola depulsio ad crism non sufficit ante septimum.

Alioqui naturæ infirmitas ostenditur, grauis intemperies, aut obstructio hepatis, eiusdem inflammatio, aut scirrhus. Quòd si initio morbi natura concidit, exigua spes reliqua est.

Post septimum diem verò, si quidem criticus est, salutaris est.

Post septimum significare sudorem scripsit Hippocrates lib. de 4 Iudicationibus.

4 In febribus enim ardentibus (inquit Hippocrates lib. de Iudicationibus) si posterius septimo die regius accadat morbus, indicium est sublatis sudoris, & solutæ febris.

Si igitur post septimum morbus regius sit, & criticus est, expectanda salus: multò magis, si quæ excretio critica coniuncta est: vnde leuetur natura,

minuatur febris, eiûsque symptomata.

Verùm aliquando & morbus regius fit, & sequitur excretio, & mori contingit. Ita Hermippus in Epidemiis cùm à morbo regio abundè excreuisset per aluum, mortuus est.

Phanagorè seruus tertio die auriginosus nihil excreuit, mortuus est.

Heraclides & alij permulti sexto die auriginosi seruati sunt : quibus sequuta per vesicam purgatio, turbata aluus est, vel profluxit sanguis è naribus.

Præter remedia, quæ proprio capite de morbo regio descripta sunt, conueniunt, balnea dulcia, vntiones ex oleo chamæmelino, anethino, irino, aut cui rosmarinus incoctus sit.

Potiones, quæ aperiant, rarefaciant, moueant sudores, quæque partim capite de variolis, partim capite de sudoribus descripta reperiuntur. Atque vbi extincta febris est, liberior vsus est aperientium. Oculis conueniunt fots ex aqua tepida, in qua summitas sceniculi, flores chamæmeli, anethi, rosmarini efferbuerint. Atque eadem aqua, & facies, & corpus vniuersum ablui potest.

Oxysacchara, Granatorum succus cum modico melle albo, vel saccharo oculis inungitur. Errhina imperantur.

Ablutio faciè ex aceto albo tepido. Errhinorum vsus in balneis ex aceto acerrimo scyllitico, succo nasturtij, maioranæ, betæ, sceniculi, rosmarini. Elaterij momentum in lacte muliebri dissolutum.

De dissoluta & appetentia.

Appetentiæ ideo consulendum est, quia longiore inedia vires dispereunt. Itaque quantum

DE MORB. INTERNIS

morbus patitur, curandum vt æger aliquid appetat. Neque omninò denegandum est, quod æger appetit, etiamsi non ita morbo conuenire videatur. Scriptum enim est ab Hippocrate aph. 38. lib. 2. Parùm deterior potus aut cibus, &c. quòd ea quæ cum voluptate assumuntur, ventriculus amplexetur auidius, & faciliùs concoquat.

1 Dissoluitur appetentia, & cibi fastidium ingeneratur à vitiosis humoribus, quos imbibit ventriculus. Ad hanc quoque causam accedit virtutis imbecillitas, quæ præsertim calidam sequitur intemperiem.

Atque interim coguntur vti clysteribus, 2 qui nutriant, vbi nimium deiecta appetentia, nihil assumit æger, aut omnia reuomit. Similiter & cibum non sentientibus, & cardiacis, iuscula caponũ, pullastrorum cum modico saccharo, hordeatum & amygdalogala.

2 Gale. lib. 5. Method. ait iniectos clysteres non ascendere ad ieiunum intestinum, & tenue vix pertingere. Primo de facultatibus naturalibus addit nihil nutrire posse, nisi quod concoctionis loca præterierit. Arabes cõtraria sunt in opinione. Agnoscit tamen Galenus lib. 3. de natural. facultatib. in intestinis vim eoquendi, & ab his per mesaraicas hepar aliquando attrahere contendit. Sic lib. 6. de symptom. causis clysteres vomitu reijci posse asseuerat. Vnde constat alimentum his quoque posse suppeditari. Clyster ita imperabitur. ℞. decocti caponis cum lactuc. portulac. & acetos. alterati lib. β. vel lib. i. sacchar. rosati, vel violati ℥. i. vitellos ouorum duorum. f. clyster. Iniiciatur ante somnum, vel quo tempore æger cibum capessere solebat, sed repurgata prius suis facibus per alium clysterem aluo.

Oribasius alicam, triticum, far, furfures, panes coquit, & decocta infundit nutriendo, & stercora duriora excludendo. Meliùsque fuerit, priusquam nu-

trientem clysterem iniicias, alio clystere intestinum repurgare, ac quantum fieri potest, & paulatim & in profundum nutriendus clyster infundatur.

Aëtius oua confracta in prisanæ cremore, aut alicæ, iniicit vacuo intestino, hoc est, bene repurgato veteri stercore. Nunc vitellum oui in hordeato, lacte amygdalino, iure carniū dissoluemus. Potus sit 3 iulepus rosatus, distillatum: sed quia dulcia sunt, quarta pars vini granatorum adiici debet. Gelatina cum eodem vino, vel granis acidi granati, granatum quoque acidulum, cum modico saccharo exhibeatur. Iulepus factus ex succo depurato capreolorū vitis. Syrupus de agrestā cum aqua cocta frigida. In conualescentibus sæpe humor aliquis reliquus est imbibitus ventriculo, unde deiecta appetentia. Eos scripsit Hippoc. egere vacatione.

3 Huius zulapij duo aut tria cochlearia breuibus interuallis sine aqua sunt assumenda, Vt. ℞. zulapij rosati ʒ. 3. succi granatorū ʒ. i. cōmisce: capiatur per interualla.

Vacuatio olim ex hiera: nunc ex rhabarbaro. Optimum fuerit vacuans medicamentum imperare ex decocto eorum, quæ detergent, & maximè cicerum rubrorum, absynthij, hordei & similium. Cinamomum aceto scyllitico maceratur: estur matutino.

Incidit aliquandō febricitātibus vomitus superfluus. Remedia ex lib. priore, cap. de cholera morbo & vomitu petenda sunt. Quinetiam incidunt hæmorrhagia, singultus, syncope, quorum remedia propriis capitibus descripta reperias, habita semper ratione causæ, seu febris copulatæ. Interim si alius durior fuerit, mollienda clysteribus, ex iis, quæ par-

DE MORB. INTERNIS

tim ardorem attemperent, remolliant, &, si fuerit opus, aliquid trahant. De profluentis alui remediis, tremore cordis & cardiaca febre abunde antè ductum est.

DE EXANTHEMATIBVS, PAPVLIS, VARIOLIS & Morbillis.

Criticæ sunt ¹ interdum eiusmodi papulæ in synochis putridis. Atque aliàs quidem vbi appetet morbi solutio, circa labia tantum & nares existunt: in aliis febribus à corruptorum succorū colluie ² toto ferè corpore, aut plurimis partibus erumpunt. In pestilenti constitutione & maligno genere febrium vlcerantur, saniem reddunt, & naturam carbunculi imitantur. Nonnunquam celeriter resiccantur & concidunt. Deteriores aliis quæ vel interna occupant, vel foris faciem. Plures deteriores paucioribus, maiores minoribus, diutiùs perseverantes iis, quæ celerius decidunt, malæ quoq; pruriginosæ & ardentes, quæq; sunt ³ cū fluore alui, aut frequēti vomitu. Etenim melius est hîc aluum adstringi, multò magis vbi apparuerint, aut mediocriter solui.

¹ Pustulæ siue eruptiones, quæ florum instar in cute exiliunt (vnde *ἑξανθήματα* Græcis nominantur) febribus præsertim malignis & pestilentibus superueniunt, vt constat ex sent. 51. sect. 3. libr. 3. Epid. Variolæ verò minutæ vulgò appellântur, in quibus cutis tantum deturpatur, & quæ neque fœda vlcera, neque arthritidas inducunt, vt lues venerea inferre eius generis morbos consuevit. Morbilli sunt rubri paucitate materiæ à variolis distincti. De generatione papularum istiusmodi paulò post differitur.

2 Itaq; ait Hippocrates in Coacis animaduersionib.
Quibus in febris exanthemata erumpunt per corpus vniuersum, lethale, si non purulentus abscessus fiat.

3 Metus est enim lethalis dysenteriae ex acris humoris in aluum diadoche & effusione.

Vbi igitur apparent in febris, recognoscenda sunt, quæ præcesserunt signa. Virtus consideranda est, si præcessit coctio, si virtus robusta, si febris leuior, facilior spiratio, cætera quoque meliora facta sunt, salutare papulas iudicabis, alioqui exitiosas. Nonnullis sub mortem & in morte certis partibus excitantur, Vulgus purpuram rubras id genus maculas appellat. Variolas aliquando febricula præcedit, idque melius est, quàm consequi. Fiuntque ea omnia naturæ motu, quæ quod vel copiâ grauat, vel qualitate lædit, extrâ propellit. Atq; aliquando tanta vitij multitudo, vt natura nequeat excludere, & papulis quidem scateat tota cutis, & pulmones, guttur, intestina, partésq; interiores eodem malo vitientur. Fit aliquando, vt quæ iam foras exierant, intrò recurrât imbecillitate naturæ, Vere plurimum præ copia, Autumno magis vitio humorum, cælo & constitutione calida & humida, infantibus ac pueris, post etiam adolescentibus, rariùs iuuenibus & viris, rarissimè senibus excitantur. Arabes ad 4 menstruum sanguinem partem causæ referunt, qui poris corporis inhæsit, & robore naturæ aliquando excluditur. Alioqui ad ea, quæ priùs, copiam vitiumque sanguinis, referenda causa est. Sed à copia ferè rubent, nisi cùm iam corrupta materia est. A vitio repræsentant colorem succi redundantis.

4 Causam hanc Arabes protulerunt, quòd hic morbus velut congenitus videatur, quem pauci, vel propè

DE MORB. INTERNIS

nulli possint effugere. Non tamen dubio caret ista ratio. Nam si variolæ & morbilli causam habeant à retentione reliquiarum menstrui sanguinis in corporis poris, cur mulieres, quibus supprimuntur menses, istiusmodi morbis non defcendantur? Adhæc non omnes hoc laborant affectu, cum tamen in omnium poris nonnihil menstrui sanguinis relinquatur. Ideoq; è recetioribus nonnulli causam ad aërem transtuierunt.

Minus periculosa, quæ rubent, aut albicant, quæque extant in superficie corporis. Magis periculosa, quæ flauæ, violaceæ, liuidæ, nigræ, quæque sanie virulenta sordent, aut latent in corpore.

Perniciem adferunt, quæ intrò redeunt, nisi cita aluo pròluuies exeat. Periculum est, cum magnitudo febris, sitis vehemens, æstus, dyspnœa, iactatio corporis, dysenteria, urinae malæ, nigræ, animi deliquia & alia eiusmodi lethalia coniuncta sunt. Sunt qui paulò antè quàm erumpât papulæ, veluti Epileptici concidunt. Vbi enim naturæ impetus superiora appetit, aliàs hoc accidens commouet, aliàs graues capitis dolores, quo tempore summa difficultas anhelitus aliquândo fit, densatur sputû, & pruriunt nares, facies rubet, fulgor oculis prætenditur, vox raucescit, ⁶ fluunt lachrymæ, pulsatio in spina, dolor in dorso, territatio in somniis, corpus veluti aculeis configitur, exiguæ notæ quasi capita acuum, aut milij magnitudine, rubent, quæ paulatim inaugmentur, & numero crescunt, apparent ferè primo, secundo aut tertio die post febriculam. Melius ⁷ est citò apparere, celeriter augeri & maturari.

⁵ Ab incensis vaporibus caput petentibus.

⁶ Liquata scilicet in cerebro materia vi caloris, & in oculos prolabente.

⁷ Hinc enim roboris. naturæ certa significatio fit,

atque etiam materiæ facilitatis.

Alij anginosi, quod plurimum est : nonnulli dysenterici, quidā etiam syncope moriuntur. 8 Morbillos magis biliosos esse volunt : Variolas magis sanguineas.

8 Propterea morbilli citius, variolæ tardiùs erumpunt. Ex his sanies : ex illis nihil profunditur humoris.

Curatio.

Apparent ferè exanthemata intra diem tertium. Primo itaque aut secundo die 9 sanguis detrahendus est, sic enim meliùs transpirat corpus. Putredinis causā intercipitur, leuatur nātura, & si quid vitij reliquum est, celerius in superficiem corporis repurgatur : alioqui periculum est, ne ex magna putredine ardentissima sequatur febris, & natura oppressa multitudine, vel nihil exponat in superficiem, vel tantum partem vitij : quæ si per imbecillitatem naturæ, quæ nimium oppressa est, intrò recurrit, suffocatur æger, nisi beneficio naturæ initio reuocata materia vomitu, vel deiectione excludatur.

9 Si plethoricum sit corpus, & metuatur, ne in effero illo materiæ orgasmo fiat humorum in nobilem aliquam partem decubitus.

Tempestiuè igitur detrahendus sanguis est ex interna brachij. Verum vbi iam malum euasit in habitum corporis, periculosa est phlebotomia, quia videlicet, à superficie in medium corpus vitiosam materiam reuocat. Cæterum perpetuum non est abstinere phlebotomia, cum iam papulæ in superficie corporis extiterunt. Etenim fit aliquando præcopia vitij, vt & plurimum reliquum sit in corpore, vrgeat vehementer difficultas spirandi, grauis sit febris: quo tēpore, si nihil repugnat, vena secanda est.

Alioqui sanguifugis vtendum erit, quas dorso, scapulis & naribus affiges. Similiter cucurbitulis cum scarificatione.

Sunt, qui loco phlebotomiæ hæmorrhoidas, & menses incitât, profluuiû quoq; sanguinis è naribus.

Quòd ad purgationem attinet, ¹⁰ leues clysteres satis esse possunt, qualis est ex diluto hordeato, in quo vitellus oui, & oleum chamæmelinum dissolui debet. Alioqui in aquæ hordei, ℥b. ℥. cassiæ autem 3. 6. modicum sacchari, & vitellus oui dissoluatur. Clysteres diutissimè retinere oportet, & minimè acres esse, multò maximè, cum iam materia in superficiem cômouetur. Pharmaca quoq; ¹¹ leuia esse debent, ex decocto iuinbarum, tamarindorum, prunorum, cassia, manna, glycyrrhiza, iure galli veteris.

¹⁰ Clysteres & purgationes nō nisi urgente necessitate vsurpâtur, cum præsertim corpus extimû exanthematis scatet, quia intrò virulentam materiam reuocant. At papulis nondum extuberantibus non ita periculosum leuiter purgare. Sic Gal. lib. 5. Meth. seruatos inquit omnes ab exanthematis pestilentibus, qui purgati antè fuerant.

¹¹ Nam vehementiora alui profluuiam excitarent.

Aut vbi ardentior febris est, & bilis redundat in corpore, 3. 1. aut 3. 4. rhab. in aqua endiuizæ infundantur. Fiat inde potus. Et similiter in aliis humoribus leuissima quoq; ¹² pharmaca eligenda sunt. Et quia hæc omnia vitia efferuescente sanguine fiunt, statim initio laborandum est, vt feruor sanguinis extinguatur, & putredo prohibeatur. Cui rei conueniunt, quæ refrigerant, & leuiter adstringunt. Alimenta quoque eiusmodi, & quæ contemperât.

Conueniunt itaque syrupus de ribes, de acetositate citri, de granatis, & reliqui refrigerantes syrupi mox in pestilentia numerandi, in quibus etiā misceri possunt antidoti illiū descriptę ex 13 materia refrigerāte.

12 Hęc exhibentur primo, vel secundo die, antequā natura mouere incipiat, corpore cacochoymo existente & plethorico, ad vitādam bilis efferuescentis occasionē.

13 Vt conseru. rosar. viol. nenuph. bugloss. borrag. pulu. diamargarit. frigid. rasur. eboris. cornu cerui, oss. de corde cerui, vnicorn. margarit.

Quod si vehemens sanguinis motus est, neque id genus remedij resistit, natura iuuanda est, vt propellat foras.

Conueniunt igitur, quę sudores mouent, & in superficiem corporis materiam adigunt: qualia ferē sunt descripta à multis, ficus sicca, passula, lens, semen apij, semen fœniculi, oxysacchara, decoctum calamenthi, hyssopi, ligni sancti, syrupus acetosus simplex, aqua hordei & similia. In quorum delectu habenda est ratio 14 magnitudinis febris. Imperabis igitur ficuum siccarum 3.6. liquiritiæ 3.2. bulliant in aquā sufficienti, detur expressio ad 3.4. Cap. in siti, aut pastu.

14 Vt si ingens sit febris, temperatis: si læuis, fortioribus utaris. Horum enim plurima impensē sunt calida.

Aliud.

℥. sem. apij, & fœniculi ana 3.1. lentium excorticatarum 3.2. ficus siccas duas, bulliant in aqua sufficienti, detur expressio. Aqua distillata ē floribus lini huic rei confert, potestq; modico saccharo condiri. Alij 15 res rubras prætendunt corpori. Linteum insuccatum in aqua fœniculi & apij, vel horū succo tepidum corpori admovent, & tepidum conseruāt.

15 Sed quæ corpus non contingant, quòd quandam habeant adstrictionem.

Nonnulli aquæ hordei ʒ.3. vini subtilis ʒ.1. propinant. Aëre temperato collocādi sunt initio, priusquam appareant.

Somnus conceditur, sed posteaquam eruperunt, idem minuendus est.

Alimenta initio, quæ refrigerant & 16 leuiter adstringant: postea verò quæ contemperant. Vbi apparet motus, frictio mollis cōuenit. Variolæ ferè ad septimū maturantur, quo tēpore animaduertendū aliàs quidem maturas esse, aliàs crudas. Quæ maturæ sunt, molles, & plenæ sanie, acu configantur. Molli linteolo sanies detergeatur, quæquæ maiores sunt, pluribus locis configi debent. Vbi iam sanies deterſa est, ne supersit cavitās, puluis aliquis ex iis, quæ implent, inspergēdus est: ut ex 17 amilo, thure manna thuris, aloë, lithargyro, cerusa, farina fabarū, cicerum, orobi, lupinorum. Atq; hīc habenda ratio partis est, ætatis, temperamentī, eaq; omnia ad cōsiliū adhibenda sunt, quæ adhiberi solent, cum vlcus carne replendum est, ne supersit deformitas.

16 Ad partium robur, quò sese ab impetu humorum tucantur.

17 Hi pulueres sarcotici sunt, non quòd reuera carnem regenerent, sed quia dum saniem & sordes detergent, caro facilius refarciatur.

Crudæ, quæquæ duræ sunt, nec maturæ, vapore decocti chamæmeli, caricarum, passularum, tritici, dactylorum pinguium & maturorū, sem. althææ, lini, scœnogræci & similibus perfumādæ sunt: tum eodem decocto fouendæ: post quæ linteum calens mediocriter imponendum, dum matureſcant.

Atque vbi maturuerint, vt priores, curandæ sunt.

Variolis 18 oculi, nares, pulmones, intestina sæpe læduntur & vestigia supersunt, vnde deformitas. Itaque vbi signa se produnt variolarum, muniendi sunt oculi fotu è succo granatorum, aqua rosacea.

℥. coriandri, sumach. ana 3. i. santali albi & rubri ana ʒ. ʒ. in pul. redacta concorporentur albumini, meliusque fuerit albumen oui, mixta aqua rosacea, prius agitari & despumari. Vel.

℥. 19 sumach cōquassati 3. 2. madefiant in aquæ ros. 3. 2. Fiat fortis expressio: expressioni adde caphuræ Gr. 4. Iam læsis oculis pistacia conteruntur, trita aqua rosacea madefiāt, expressioni farina hordei torrefacti commiscetur. Item.

℥. cerusæ lotæ 3. 5. sarcocollæ 3. 1. ʒ. tragacanthi 3 ʒ. opij. Gr. 4. cū mucagine tragacanthi extracta in aqua plantaginis, fiat collyrium, quod postea dissoluatur in lacte muliebri, vel albuminibus ouorum.

Ori & gutturi conseruando 20 granatorum succus & berberorum. Si iam vlceratio est, abluatur primū aqua hordei, cui aliquid sacchari vel mellis, vt ad 3. ʒ. commixtum sit. Deinde ex supradictis succis, diamoro & diacorio fiat gargarisma. Post collutionem oris, folium plantaginis inducat.

18 Quia à variolis oculis albugo, & sæpe cæcitas, naribus erosio, pulmonibus phthisis, intestinis vlcus impendit, partes hæ meritò veniunt muniendæ.

19 Hoc collyrium deterget, refrigerat, exsiccat & agglutinat. Opium verò immiscetur ad acerbissimum dolorem obtundendum.

20 Ex his in aqua rosarum & plantaginis, vel in aqua hordei dissolutis gargarismata parantur.

DE MORB. INTERNIS

Pulmonibus 21 syrupus de papauere : postea diatragacanthum in decuplo decocto liquiritiæ, caricarum, passularum dissoluatur.

Liquor ouorum extractus ex albuminibus, & distillatus, delet vestigia, & illustrat faciem.

21 Sumendum erit è cochleari sensim lambendo, vel ex bacculo glycyrrhiæ, vt eius aliquid in asperam arteriam isto sumendi modo deceret.

Naribus odoretur acetum rosaceum, item in quo rosæ coxerint. Excipiatur vapor è decocto rosarum, santalorum. Linteolum quoque in his insuccatum, vel in mixtura omphacij, aceti, aquæ rosarum sæpe inducatur naribus.

Iam exulceratis, ceratum rosaceum, vel violaceum mixta quarta parte muccaginis tragacanthi in aqua ros. vel plantag. extractæ, conuenit. Intestinis decoctum rosarum & cydoniorum.

Delendis vestigiis hæc conueniunt.

℥. lithargyri, cerusæ lotæ, cadmiæ lotæ, pul. caninarum adustarum, croci ana ʒ. ss. Trita incorporentur cerato facto ex cera & oleo liliaceo. Conueniunt aqua fabarum, aqua distillata è pedibus vituli, arietis, porcellorum, aqua distillata è melle, terebinthina, radice serpentariæ, limonibus, citrangulis, floribus fabarum, aqua quæ folliculis vlmorum includitur.

Bene repurgatur à vermiculis, & modico saccharo cando commiscetur, vel cum melle & terebinthina distillatur.

℥. cerusæ lotæ, amili farinæ, fabarum, cicerum, phasiolorum, tragacanthi ana ʒ. 2. Vniantur omnia lacte muliebri.

Aliud.

℥. mastichis, myrrhæ electæ, aloës hepaticæ, spicæ nardi, sanguinis draconis, olibani, opopanax, bdellij, carpobalsami, croci, gummi arabici, styra-cis liquid. & rubr. ana 3.2. ℥. terantur omnia, & cum terebinthina ad pondus omnium fiat distilla-tio in alembico.

℥. lithargyri argenti ℥. ℥. Optimè trita deco-quatur in ℥.2. aceti albi optimi, semper agitando, vsque ad consumptionem medietatis: deinde per filtrum distilletur, & in vase bene mundo repo-natur. Postea.

℥. caphuræ 3.3. aluminis, boracis, ana 3.6. mo-schi Gr. 4. Terantur omnia: quibus adde olei de tartaro 3.1. ℥. Bulliant omnia in ℥.2. aquæ ros. ad consumptionem tertiæ partis, semper commiscen-do. Postremò per filtrum distillentur, & in ampul-la bene clausa reponantur.

Oportebit primùm contingere maculas priore distillato: deinde secundo. Alia permulta è Practi-cis colliges.

De Varicibus.

Varix vena est dilatata & tortuosa, nata pri-mò imbecillitatis vitio ex 1 sanguine cras-so, melancholico, interim pituita mixta.

Quæ ab atra bile, atriozem cutem reddit: quæ verò à pituita, albiorem. Nascitur plurimùm in cruribus, interiori tibiâ. Aliquando in testiculis, ven-tre, temporibus. Supposita vulnere prohibet, ne vulnus coalescat. Itaque primùm hoc modo cu-randa est.

1 Ex Galen. commentar.3. in libr. de articulis sent.4.

Consultis ægri viribus, cæterisque ad phlebotomiæ consilium adhibitis, ex axillari brachij eiusdè lateris cum crure, in quo varix est, 2 sanguinè detrahes, nisi vitio lienis varix intumuerit. Tum enim è sinistra axillari sanguis detrahendus est.

2 Vt plethora imminuatur, & fluentis sanguinis comoda fiat retractio.

Missò sanguine vires reparandæ alimentis boni succi, ex quo imperandum pharmacum, quod vnà melancholiam & pituitam expurget, adhibita tamen ea ratione, vt ex colore varicis, tum etiam aliis humorem redundantem iudicemus. Vtérque humor cum sit crassus, 3 primùm incidendus est & attenuandus, tum per interualla repurgandus.

3 Plerùmque contingit serosum esse sanguinem, qui tum incidi, & attenuari minùs postulat.

Incidetur oxymelite, in quo hyssopi, aut radicis fœniculi aliquid maduerit, si quidem pituita reducere videbitur.

Si verò atra bilis, eodem oxymelite, in quo cortex radicis capparis, aut tamarici bullierit, adiectis interim seminibus anisi, apij & similibus.

Pituita repurgatur agarico ad ʒ.4. in eiusdem oxymelitis ʒ.3. infuso cum granis aliquot zinziberis. Senna atram bilem repurgabit ad ʒ ʒ. aut ʒ.3. in eodem oxymelite, aut sero lactis infusa, adiectis ʒ.4. cinamomi. Efficacior quoque potio, si ʒ.2. eius pul. cum absynthij decocti ʒ.3. propines, aut epithymi tantundem loco sennæ.

Vtrunque humorem, qui ferè mixtus est in varice, hoc syrupo purgabis.

℥. betonicæ, cichorij, florum cordialium ana
 P.i. liquiritiæ, anisi, cuscutæ ana ʒ. 4. passularum
 mundatarum ʒ.i. ʒ. polipodij queryni ʒ. ʒ. agarici
 trochil. 3 6. folliculorum sennæ electæ ʒ.i. ʒ. Fiat de-
 coctio ad quartaria tria. In ea dissolue sacchari al-
 bissimi quartariū. Fiat syrupus mediocriter coctus,
 capiat ʒ.i. ʒ. per intervalla cum ʒ. 3. feri lactis, pri-
 sanæ, aut aquæ hordei. Iam secta vena, & purgato
 corpore, 4 varicem in longum scarificabis, iniectis
 vinculis supra genu, vt tuméant magis, ita sangui-
 nem è varice exprimes. Vbi satis vacuaueris, ei ipsi
 venæ sectæ varicosæ medeberis eo modo, quo ve-
 nas vulneratas curare oportet.

4 De sectione varicum vide Paul. Æginetam cap. 82.
 libri sexti.

Itaque curato varicis vulnere, tum demum ad
 maligni vlceris curationem redibis. Hæc ex. 4.

℥. γέν.

FINIS.

